



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search


Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

SCIENTIFIC LIBRARY.

Shelf number 130-2690


in whom

**PARKE, DAVIS & CO.,
DETROIT, MICH.**



**THE GIFT OF
PARKE, DAVIS AND COMPANY**

QH
43
59
G56
1789



Linne, Carl von

CAROLI A LINNÉ,

EQUITIS AURATI DE STELLA POLARI,

Archiatrī Regiū, Med. & Botan. Profess. Upsal Acad. Paris.
Upsal. Holm. Petropol. Berolin. Imper. Londin. Angl.
Monsp. Tolos. Florent. Edimb. Bern. Soc.

SYSTEMA
NATURÆ

PER REGNA TRIA NATURÆ,

Secundum Classes, Ordines, Genera, Species;
cum Characteribus, Differentiis, Synonymis,
Locis.

TOMUS PRIMUS.

EDITIO DECIMA TERTIA, AUCTA, REFORMATA.

CURATA

JO. FRID. GMELIN,

Philos. & Med. Doctor. hujus & Chem. in Georgia Augusta Prof.
P. O. Acad. Cæsar. Naturæ Curiosorum & Electoral. Moguntin.
Erfordensis, necnon Societ. Reg. Scient. Goettingensis, Physicæ
Tigurin. & Metallicæ Membri.

Ed. 11. B.

LUGDUNI,

Apud J. B. DELAMOLLIÈRE.

1789.

O JEHOVA,

Quam ampla sunt tua Opera !

Quam sapienter Ea fecisti !

Quam plena est Terra possessione Tua !

DAVID, Psalm. CIII. 24.

off
Parker Davis & Co.

8-3-1934 S^r R^s M^{ts} SUMMÆ FIDEI VIRO, iii
3rd 10

CELSISSIMO ILLUSTRISSIMOQUE
COMITI

D^{NO} CAR. G. TESSIN,

Regis Regnique Suio Gothici Senatori, Regiæ Cancellariæ Præfidi,
ad Aulam Regiarum Celsitudinum Supremo Marefchallo, educa-
tioni Seren. Princ. GUSTAVI Præfesto, Cancellario Academiæ
Aboensis, Ordinjs S^r R^s Maj. Seraph. Equiti Aurato & Com-
mendatori, Equiti Aurato de Aquila nigra, nec non omnium
S^r R^s Maj. Suëcicæ Ordinum Cancellario, Sacrum.

Cum quivis auctor speret se apud posteros gratiam
habere, et posse secum duratura nomina educere,
AUCTORI meæ fortunæ Libellum ultimo nunc offero:
ILLE me, peregrinum in patria, reducem excepit;
ILLE mihi stipendium ab ordinibus Regni expetiit;
ILLE mihi spartam Medici classici procuravit,
ILLE mihi Munus, quo fungor, conciliavit;
ILLE mihi Titulum, quò distinguor, paravit:
ILLE me ad Serenissimos Reges introduxit;
ILLE me cuso Numismate posteritati commendavit;
ILLE meas errare boves, ut cernis, et ipsum
ludere quæ vellent calamo permisit agresti;
quare cana prius gelido desint absinthia ponto,
quam nostro illius labatur pectore vultus.

TANTI MÆCENATIS.

Upsaliæ 1766,
d. 24 Maj.

cultor devotissimus
C. A LINNÉ.

MS. B. 1. 1. 2. 6. 10

*Magnus est DEUS noster ;
& magna est potentia Ejus ,
& potentiæ Ejus non est numerus.*

RATIO EDITIONIS.

SYSTEMA NATURÆ iteratis vicibus prodiiit:

1. Leydæ 1735. Fols imper. pag. 12. a me per I. F. GRONOVIVM.
Conspedus tantum operis, & quasi Mappa Geogr.
2. Holmiæ 1740. Octavo pag. 80. a me ipso revisum.
Auctum animailium nomenclaturis, characteribus.
3. Halæ 1740. Quarto oblong. p. 70. per J. J. LANGEN.
Latino-germanice; ceterum idem cum 1.
4. Parisiis 1740. Octavo. pag. 108. t. 1. per B. JUSSIEVM.
Adjecta nomina Gallica. idem cum 2.
5. Halæ 1747. Octavo. pag. 88. per M. G. AGNETHLER.
Nomina Germanica; ceterum idem cum 2.
6. Holmiæ 1748. Octavo. pag. 232. t. 8. auctum a me ipso.
Characteres essent. Vegetabilium. Species Animal. & Lapid.
7. Lipsiæ 1748. Octavo. pag. 232. t. 8. per Typographum.
Nomina Germanica; ceterum idem cum 6.
8. Holmiæ 1753. Octav. p. 135. Vegetabilia per J. J. HAARTMAN.
At regnum Lapideum Scaræ 8vo per H. MÖLLER.
9. Leydæ 1756. Octavo. pag. 226. per GRONOVIVM.
Paucissima de Avibus, Piscibus. idem cum 6.
10. Holmiæ 1758. Octavo. Longe auctius factum a me ipso.
11. Lipsiæ 1762. Octavo. furtim prodiiit vitiosa.
Nil additum.
12. Holmensi hac propria ultima penultimaque editione.
*Species Animalium omnium mihi cognitorum cum Differētiis,
Synonymis, Locis, nominibus Trivialibus.
Methodus Animalium ex novis observatis reformata.
Piscium inprimis nova methodus cum Auctorum observatis
radiis pibnarum.
Plantarum reformati characteres, emendatæ differentiæ variae.
Lapidum plures species, observationes, & omnium Nomina
Trivialia.
Observationes in Regna Naturæ novæ, cum introductione
in Naturam.*

COLLECTANEA, quæ obtinere potui, disposui; inprimis adju-
varunt

- S. M. ADOLPHI FRIDERICI Regis Museum T. I. Holm. 1754.
fol. Prodomus Tomi 2. Holmiæ 1764. Octavo.
Utrumque animalibus exoticis refertum.

S.æ LOUISÆ ULRICÆ Reginae Museum. Holmiæ 1764. Oðav.
In Conchylis & Insectis stupendum.

C. G. TESSIN Museum. Holm. 1753. Fol.
In Lapidibus & Conchylis magnificum.

C. DE GEER Museum :
Amphibiis , Insectis aliisque rarioribus dives.

UPSALIENSIS Museum Academiae :
Ex Animalibus undiquaque conquistis.

STOCKHOLMENSIS Museum Academiae Scientiarum :
Variis pulchris naturalibus scatens.

ITINERA varia hujus causa institui :

Iter Lapponicum (1732) *ineditum.*

Iter Dalecarlicum (1734) *ineditum.*

Iter Oelandicum (1741) Holmiæ 1745. Oð. suec.

Iter Gotlandicum (1741) Holm. cum præcedente. Oð.

Iter Westrogothicum (1746) Holm. 1747. Oð. suec.

Iter Scanicum (1749) Holm. 1751. Oð. suec.

Fauna Suecica. Holmiæ (1746) duplo audior illa 1761. Oð.

Amoenitates academicæ. Holmiæ 1749-1763. Oð. Vol. 6. (VII.
 1769. VIII. IX. cur. Schrebero Erlang. 1785.)

Discipulorum quondam meorum instituta Itinera , mihi, ab
 exterorum gazophylaciis remoto , proficua.

C. TERNSTROEM in Asiam (sed periit in Poulicandor) 1745.

P. KALMII in Pensylvaniam & Canadam. 1747.

Iter Americ. sept. Holm. 1753-1760. Oðav. suec. Vol. 3.

L. MONTINI in Lapponiam Lulensem 1749.

F. HASSELQUIST in Ægyptum & Palæstinam. 1749.

Iter Palæstinum. Holm. 1757. Oð. suecic.

O. TORENI in Malabariam & Suratte. 1750.

P. OSBECKII in Chinam & Javam. 1750.

Iter Indiæ orient. Holm. 1757. Oð. suec.

P. LOEFLINGII in Hispaniam & Americam. 1751.

Iter hispanicum. Holm. 1758. Oð. suec.

P. J. BERGII in Gotlandiam insulam. 1752.

M. KÄHLERI in Italiam & Apuliam. 1752.

D. SOLANDRI in Lapponiam Pitensem & Tornensem. 1753.

D. ROLANDRI in Surinamum & Eustatium. 1755.

A. R. MARTIN in Spitzbergam. 1758.

C. AESTROEMER in Europam australem. 1760.

J. FALK in Gotlandiam. 1760.

FINEM Operis obtinvero , si inde

Peregrinatores dignoscant notiora antea naturalia.
Curiosi attentiores, *Musca* intrantes, visa intelligant.
Docti nova, nec trita, *adis* suis inferant.
Scientia facilius *augeatur*, sepositis vulgarioribus.
Nomina magis stabiliantur, inprimis *Trivilia* & *Generica*.
Œconomia fundamenta sternantur.
Teleologia primæ lineæ ducantur.

His utere L. B. donec alii plura præstantioraque fiant,

Upsalix 1766.

Docuisti me, DEUS, a juventute mea,
 & usque nunc pronuntiabo Mirabilia Tua.

R A T I O

NOVÆ HUIUS EDITIONIS.

NOTA nimis sunt atque agnita, tot tantisque malevolorum detractorum in divos quoque manes insurgentium obtredationibus non extenuata, immortalis Viri, cujus nomen in fronte gerit hic liber, de restauranda historia naturalis scientia merita, ut illis celebrandis inhaerere, supervacaneus videatur labor: Et ne tironem quidem naturalis scientia latet, quot quantaque commoda præbeat rerum naturalium studiosis catalogus, in quo uno quasi intuitu, quæcunque novimus corpora naturalia, in suas classes, ordines, genera digesta ac distributa sistuntur, quæ in aliorum Virorum operibus arbitrario ordine disposita, per numerosissima volumina dispersa, verbosissime aliquando descripta vix invenias. Sed inter laudes, quas hoc etiam B. Viri opus meretur, hæc certe minima est, in qua omne ponunt ejus meritum, qui nomenclatoris titulo eum insignientes ludibrio exponere virum tot meritis illustrem student: Altera enim est hujus operis, de qua nemo alius ante eum jure gloriari potest, prærogativa; descripta sunt omnia, quotquot sua ætate cognita erant, corpora naturalia, aut a sagacissimo atque indefesso Viro ipso observata, aut a discipulis numerosis in omnem terrarum orbem exeuntibus notata, aut incredibili industria ex aliorum fide dignorum Virorum mutuata vel operibus, vel narrationibus.

Omnibus numeris absolutum opus, quis æquus ab humano ingenio expectabit! quis sanæ mentis præstolabitur in campo tantopere immenso! Quare hallucinantem hinc inde magnum Virum, notas aut generis aut speciei aliquando imperfectius justo exponentem, limites utriusque & varietatis non

semper curatissime definientem, posteris, quæ emendari addique possint stabilito jam ædificio, relinquentem, quis vituperabit, aut extra officii sui regiones vagatum dicet, quum tantum tentaret opus! Adde quod plurimæ & emendationes & accessiones a dignis tanto Præceptore discipulis proficiſcantur.

Quum a duodecima systematis naturæ editione quatuor jam & ultra elapsa sint lustra, conjunctis tot tantorumque naturæ scrutatorum indefessis studiis, scrutiniis, itineribus, non potuit non fieri, quin quotidie fere nova detegerentur, atque adeo cresceret corporum naturalium cognitorum numerus, ut, his ad ordines & genera sua relatis, novam quasi faciem indueret naturæ systema, quod quidem nomen suo operi imponere placuit B. *Linnæo*.

Non inutilem ideo, nec ingratam navaturum me esse operam spero, dum bibliopolæ etiam desideriiis satisfactorius, novam hanc, & posterorum laboribus auctam egregii operis editionem sisto, parum mutatam, si faciem & ordinem spectes, non nisi duce principe quodam, ex *Linnæi* præsertim discipulis, viro, & suadente natura ipsa hinc inde alteratur, sed recentius inventis ac detectis generibus & speciebus, suo singulis loco insertis, multopere auctam, amplioribus, ex posterorum laboribus haustis descriptionibus æque ac synonymis passim locupletatam, ex autoptarum testimoniis & curatioribus scrutiniis emendatam.

Congessi igitur & digessi, quæcunque ad hunc meum finem facere poterant, vastissimo librorum, quo Regia Munificentia hanc musarum sedem exornavit, thesauro, & amica eorum, qui huic administrando præfunt, opera, mirifice adjutus; si quis, hic meus labor est, quamvis ejus etiam partem non exiguam in historia quidem mammalium ordi-

nanda curis Ill. *Schreberi*, & *Pennanti*, potissimum B. *Erxleben*; in enarrandis avium speciebus *Latham*; in disponendis insectis Ill. *Fabricio*, & summe rever. *Goerzio*; in redigendis ad suum locum recentius detectis testaceis summe rever. *Schroetero*; in vermium reliquorum historia O. Fr. *Müllero*; in plantis recensendis Car. *Linnaeo* immortalis Auctoris filio, & praesertim conjunctissimo mihi Ill. *Murrayo*; in minerali regno *Cronstedtio*, ejusque commentatori *Wernero*, Generosiss. a *Vetheim*, Ill. *Gerhardo* & *Kirwano*, B. denique *Bergmano* me debere, gratus profiteor.

Habes igitur hic catalogum non eorum modo corporum, quæ *Linnaeo* suo tempore nota erant, sed eorum quæque, quæ post ejus fata egregiorum & illustrium ejus discipulorum, *Thunbergii*, *Sparrmanni*, *Falckii*, *Solandri*, *Dryandri*, *Forskahlii*, O. & I. Chr. *Fabricii*, O. Fr. *Mülleri*, *Brünnichii*, *Bjerkandri*, *Retzii*, *Fries Rottboell*, *Schreberi*, *Murrayi*, *Ferberi*, *Pajkuhlii*, aliorum ejus vestigiis insistentium Virorum Illustrium *Pallas*, *Forstherorum*, *Jacquin*, *Sonnerat*, *Scopoli*, *Pennant*, B. *Leskii*, B. S. G. *Gmelini*, *Lepechinii*, *Georgii*, *Habliizl*, B. *Güldenstedti*, *Kæhreuteri*, *Gærtneri*, *Houttuyni*, *Storrii*, *Bowlesii*, *Molinæ*, *Sestini*, *Ceui*, *Comitis de Borch*, *Equit. Dolomieu*, *Fortis*, *Andreas*, *Schranckii*, J. & B. Fr. *Hermannii*, *Carosi*, *Gilii*, *Clavigeri*, *Bancroftii*, *Aubletii*, *Merrem*, *Gouani*, *Gottwaldi*, *Zimmermanni*, *Walbaumii*, *Boddærti*, *Blochii*, *Goetzii*, *Wernerii*, *Batschii*, *Broussoneti*, *Meidingeri*, *Laichartingii*, *Bergstræsseri*, *Schalleri*, *Fuesslini*, *Knochii*, *Herbstii*, *Crameri*, *Drury*, *Seppii*, *Stollii*, *Schæfferi* & *Harrerii*, *Geoffroæi*, *Fourcroy*, *Chemnitzii*, *Martini*, B. *Walchii*, *Spengleri*, *Oederi*, *Veissii*, *Weberi*, I. *Milleri*, *Schmiedelii*, *Gisekii*,

Rothii, *G. Fr. Hoffmanni*, *Hedwigii*, *Curtis*, *P'Heritier*, *Gloxin*, *Sagii*, *Monneti*, *Burtini*, *Saussurii*, *Voigui*, *Brückmanni*, *Giraud-Soulavie*, *Genßanii*, *Pini*, *Abildgaardii*, *Palasso*, *La Perrouse*; *Wulfemi*, *Klipsteinii*, *Generosiff. de Trebra & Dietrich*, *Illustriiff. Com. a Rafoumowski*, & aliorum indefessa industria & sagacitate innotuerunt. Neque prætermiffa sunt ea, quibus adversarii B. Autoris, tot acribus censuris in eum inveci, *Illustriiff. Com. a Buffon*, *Adanson*, *Camper*, *Laurenti*, *Hacquet*, *Medicus* nostram hanc scientiam auxerunt. Nihil tamē supereffe, quod aut coævī aut posteri vel emendent vel addant, ut gloriē, ego quidem multum absum. Quicumque fata singularum historiarū naturalis partium animo secum volvit, semelvetentavit, constantes & perpetuas cujusdam corporis naturalis eruere notas, quicumque luxuriosam naturā in coloribus varietatem e. g. in animalibus nostris domesticis (taceam eam, quā hybridā generationi suos debet natales) novit, novit præterea, in discernendis multis animalium præsertim avium speciebus vix ullas dari notas, nisi a coloribus desumtas, novit, easdem aves alio atque alio anni & ætatis (ne sexum dicam) tempore, in alio atque alio climate solumque viventes, alio atque alio victu utentes, feras & domesticas, aliis atque aliis non raro comparere formis & coloribus, novit, multa & animalia & vegetabilia, potissimum marina & peregrina, imperfectius esse cognita, semel, non omni vitæ suæ tempore, non in omnibus ætatis sexusque variationibus observata, alia ad iconum fidem, ad solitaria, mortua, siccata, facta, in spiritu vini asservata, variis artificibus (v. g. testacea) mutata, alio aliove modo paululum deformata & decolora exempla esse descripta; facile ille videbit, ab eo perfectionis fastigio longe adhuc abesse historiarū naturalis studium.

Quum hoc volumen sub prelo sudaret, hinc inde detecta sunt, quibus aut emendari aut augeri posset

Ita felici omine accidit, ut zootomorum facile princeps, Ill. *Camperus* in Sirenen Linnæi, ab *Elliso act. anglic.* Vol. 56. nuperies delineatam, serpentibus victitantem, in limo se occultantem incideret, & dissectandæ illius copia data, branchias utrinque tres veras membranis denticulatis discretas, dentes firmos & validos, ventriculum cordis unicum, intestina longissima & ampla deprehenderet, & ex iis concluderet, verum esse perfectumque piscem branchiostegum, proxime ceterum ad muranæ genus accedentem, quamvis pinnis pectoralibus tetradactylis & offiulis branchialibus tribus pinnatifidis a reliquis speciebus haud parum diversum.

Duas etiam piscium in oceano occidentali ad littus Bahusæ repertorum, ut videtur, novas species descripsit nov. act. Stockh. Vol. VII. trim. 1. n. 9. *Euphrasen*, alteram ad insulam Kluedesholm, gobii, uncialem, nigro-punctatam, pinnæ dorsalis secundæ radiis 8-11, maculaque nigra utrinque ad basin caudæ facile discernendam, pinnæ dorsalis primæ radiis 7, pectoralium 15, ventralium coalitarum 8, analis 8, caudalis 12 conspicuam, a Ruuthensparro cognominatam; alteram in Kyrkesund obviam, cotti, supra fuscam subtus albam, scorpione minorem, capite spinoso, scabro, bicorni facile dignoscendam, membranæ branchiostegæ radiis 6, dorsalis prioris 8, posterioris 13, pectoralium 15, ventralium 4, analis 8, & caudalis 10 conspicuam, bubalis cognomine insignitam.

Detecta etiam fuit nuperius simiæ species, homini reliquis omnibus similior, a naso elegantiori nasalis dicta, cujus plenior descriptionem ab Ill. *Daubenton* expectamus.

Dabam Gœttingæ, d. 16. Mart. 1788.

J. FRID. GMELIN.

INTROITUS.

HOMO mundi intraturus theatrum quæritur **QUIS** sit : *Unde ortus ? e stemmate Creationis ; Quo tendat ? ad vitam beatam ; Quid hic ? intueri naturam ; Quo munere ?* **CURIOSUM** esse similemque quidem reliquis animantibus (quæ vorant , ludunt , pruriunt , generant , multiplicantur , dormiunt , com-
moda stabula quærunť , proximis sui generis inserviunt , vitam tuentur , sentiunt , percipiunt ,) sed nobiliorem , utpote qui curiosius observat quæ sensibus patent , indeque sapientius ratiocinando rite concludit , adeoque miratur pulchrum sapientis opus Artificis. O quam contempta res est Homo , nisi supra humana se erexerit ! Quid enim erat , cur in numero viventium positum se gauderet ? an ut Cibus & Portiones percolaret ? ut hoc corpus casurum periturumque farciret ? quæ tanta necessitas in fundum telluris intimæ hominem mersit , ut oblitus dierum , oblitus fortunæ melioris , ab hoc se averteret ? puto certe multos ad sapientiam perventuros , nisi superbia magnæ fortunæ inflati , putassent se pervenisse. Sapiens utique est , qui fines respicit.

FINIS CREATIONIS EST GLORIA DEI EX OPERE NATURÆ , PER HOMINEM SOLUM.

Tanto igitur magis nosse Naturam operæ pretium , quo nullum majus est ! neque enim quidquam habet in se hujus materiæ tractatio pulchrius , dum multa lateant futura usui , quam quod hominem Magnificentiæ suæ detinet , nec mercede , sed Miraculo colitur ! Quota enim pars operis Tanti nostris oculis committitur , & quam multa , præter hæc , quæ vidimus , in secretum eunt nunquam humanis oculis orientia ; neque enim omnia **DEUS** humanis oculis nota fecit. Multa etenim sunt , quæ esse audivimus , qualia autem sint , igno-

2
ramus ! quamque multa hoc primum cognovimus seculo ! & quidem multa venientis ævi populus , ignota nobis , sciet ! multa seculis tunc futuris , cum memoria nostri exoleverit , reservantur ! veniet tempus , quo ista , quæ nunc latent , in lucem dies extrahat & longioris ævi diligentia. Rerum enim Natura sacra sua non simul tradit ; initiatos nos credimus , in vestibulo ejus hæremus ; ejus arcana non promiscue , non omnibus patent ! reducta & in interiori sacrario clausa sunt ; involuta veritas in alto latet. Si in hoc juvenus sobria , sui Creatoris memor , incumberes (*) , si hoc Majores docerent , & hoc Minores addicerent , vix tamen ad fundum veniretur , in quo veritas posita est , quam nunc in summa Tellure , & levi manu quærimus. Magni omnino res est rerum Naturæ latebras dimovere , nec contentum exteriori ejus conspectu , introspicere & in divina secreta descendere ! *Senec.*

Intravi itaque densas umbrosasque Naturæ Silvas , hinc inde horrentes acutissimis & hamatis spinis , evitavi quotquot licuit plurimas , at neminem tam esse circumspæctum didici , cujus non diligentia sibi ipsi aliquando excidat , ideoque ringentium Satyrorum cachinnos , meisque humeris insilientium Cercopithecorum exultationes sustinui ! incessi viam , & quem dederat cursum fortuna peregi.

O J E H O V A !

Quam magnifica sunt Tua opera !
Vir insipiens non cognoscit ea ,
Stultus non animadvertit ea.

David.

(*) Confer. *Worm. mus. præfat.* 1.

IMPERIUM NATURÆ.

DEUM *sempiternum, immensum, omniscium, omnipotentem* exper-
gectus a tergo transeuntem vidi & obstupui! Legi aliquot ejus
vestigia per creata rerum, in quibus omnibus etiam in minimis ut
fere nullis, quæ Vis! quanta Sapientia! quam inextricabilis Per-
fectio! Observavi *Animalia* inniti vegetabilibus, *Vegetabilia*
terrestribus, *Terrestria* telluri; *Tellurem* dein ordine inconcussio
volvi circum Solem, a quo vitam mutuatur; *Solem* demum circa
axin gyron cum reliquis *Astris*, systemaque *Siderum*, spatio &
numero non definiendum, mediante motu in vacuo nihilo sus-
pensum teneri ab incomprehensibili *Movente primo*, **ENTE EN-**
TIUM (a), *Causa Causarum*, *Custode Redoreque universi*, *mun-*
dani hujus operis Domino & Artifice. Vis illud **FATUM** vocare,
non errabis, est ex quo suspensa sunt omnia. Vis illud **NATURAM**
vocare, non errabis, est ex quo nata sunt omnia. Vis illud **PRO-**
VIDENTIAM vocare, recte dices, est cujus consilio mundus adus
suos explicat (b); Totus est **SENSUS**, totus **VISUS**; totus **AUDI-**
TUS, totus **ANIMÆ**, totus **ANIMI**, totus **SUI**; Hujus extera
indagare non capit humana conjectura mentis (c); **NUMEN** esse
credi par est, æternum, immensum, neque genitum, neque crea-
tum (d). Hoc sine quo nihil est, quod totum hoc fundavit & con-
didit, quodque oculos nostros & implet & effugit, cogitatione
tantum visendum est; in sanctiore enim secessu *Majestas tanta*
delituit, nec ulli dat aditum nisi animo (e).

MUNDUS complectitur omnia sub Jove, quæ in notitiam nostram
per sensus cadere possunt; sunt hæc *Astra*, *Elementa*, *Tellusque*
inenarrabili velocitate circumacta; horum inoffensam velocitatem
procedere videmus æternæ legis imperio, nec esse temere errantis
hunc ordinem, neque quæ temere coiverunt tanta arte pendere,
ut terrarum gravissimum pondus sedeat (quasi) immotum, &
circum se properantis cæli fugam spectet (f).

ASTRA sunt remotissima corpora lucida, quæ gyronitur motu per-
petuo, sunt hæc aut **SIDERA**, propria luce radiantia, ut *Sol*,
remotioresque *Stellæ fixæ*; aut **PLANETÆ**, a sideribus lucem

(a) *Aristoteli*. (b) *Senec. quæst. II. 45.* hoc respectu, sed caute, ne effectus
sumatur pro causa. (c) *Exod. XX. 4.* (d) *Plin. Natur. II. 1. 7.*
(e) *Senec. VII. 31.* (f) *Senec. I. 1.*

mutuantes, quorum primarii Solares : *Saturnus, Jupiter, Mars, Tellus, Venus, Mercurius*; secundarii, obsecundantes Planetis, ut *Luna Telluri*, alique; nec posse sine *Custode tantum opus stare*, nec hunc *Siderum discursum fortuiti impetus esse*, nam quæ casus incitat saepe turbari & cito arietare debent (g).

ELEMENTA sunt corpora simplicissima, atmosphæram Planetarum constituenta, spatia inter Astra forte replentia :

IGNIS lucidus, resiliens, calidus, evolans, vivificans.

AER pellucidus, elasticus, siccus, obvolans, generans.

AQUA diaphana, fluida, humida, tranans, concipiens;

TERRA opaca, fixa, frigida, quiescens, sterilis.

Sic tota hujus Mundi concordia ex discordibus constat (h).

TELLUS est globus planetarius, horis 24 rotatus, circum Solem quotannis in orbem actus, *Elementorum* atmosphæra obvelatus, rerum *Naturalium* stupendo cortice tectus, cujus cognoscendæ superficiei studemus. Globus hic terraqueus est, cujus depressiorem partem Aquæ inundant & *Mare* lente coarctandum; elatio-rem vero aquæ fugiunt sensim dilatandam in *Continentem* siccam & habitabilem. Hæc Aquarum halitu, vi Aëris in *nubes* acto, irroratur, ut summi montes perennique nive Alpini *Scaturigines* in *Fluvios* perennes concurrentes eamque permeantes potum terrestri cibo addant in alimentum incolarum, dum *Venti* motum excitant *Ignis* calore vivificatis corporibus. *Omnium Elementorum alterni recursus sunt*; quicquid alteri perit, in alterum transit; alterna sunt vices rerum (i).

NATURA lex immutabilis DEI, qua res est id, quod est, & agit, quod agere iussa est (*Helmont.*); Hæc opifex rerum, sui juris, docta a nullo edocta, saltus non facit; clam operatur; quod commodissimum in omnibus suis operationibus sequitur; nihil frustra, nihilque supervacaneum agit, dat singulis singula & omnibus omnia; Consuetudinem solam ardet. *Omnia adjuvabunt Naturam, ut Naturæ opera peragantur* (k).

NATURALIA sunt corpora cuncta Creatoris manu composita, Tellurem constituenta, in REGNA NATURÆ tria divisa, quorum limites concurrunt in Zoophytis.

LAPIDES corpora congesta, nec viva, nec sentientia.

VEGETABILIA corpora organisata & viva, non sentientia.

(g) Seneca. (h) *Helmontii* definitio. (i) *Senec. III. 10.* (k) *Senec. III. 29.*

ANIMALIA corpora organisata & viva, & sentientia, sponteque se moventia.

Non ad unam Naturæ formam opus suum præstat, sed in ipsa varietate se jactat (l) Ideoque ex aliis alias reparat naturæ figuras, non uno contenta tenore valet, sed immutatas gaudet habere vires.

REGNA Naturæ, Planetam Telluris constituentia, ideoque tria sunt :

LAPIDEUM rude inhabitat interiora; a Salibus in Terris generatur; temere miscetur; casu modificatur.

VEGETABILE virens superficiem vestit, Radiculis bibulis terrena haurit; Foliis obvolitantibus ætherea respirat; calida metamorphosi declaratur in festivales Nuptias, generantes dispergenda intra præscriptas stationes Semina.

ANIMALE sentiens exteriora ornat; voluntarie movetur; respicit; ova generat; pellitur irata Fame, læta Venere, mœstoque Dolore; prædando coercet Vegetabilia Popularesque, ut omnium proportio perennet.

HOMO sapiens, creatorum operum perfectissimum, ultimum & summum, in Telluris Cortice, Majestatis Divinæ stupendis indicis oblecto, constitutus, secundum sensus judicans artificium, admirans pulchritudinem, veneraturus Auctorem. Retrogrediendo per generationes multiplicatas videt Creatorem; Progrediendo per conservationem multiplicandam videt Naturam; ad utrumque invitant Pulchritudo, Mechanismus, Nexus, Fines, Commoda. Hic omnipotentia Divina nobilitat Terras in Vegetabilia; Vegetabilia in Animalia; hæc demum in Hominem, qui sapientiæ radios reflectet versus majestatem radiantem duplicata luce. Sic totus Mundus gloria divina plenus est (m), dum omnia creata opera Deum glorificant per hominem (n), qui ex inerti humo, Dei manu vivificata, contemplatur auctoris sui Majestatem ex fine creationis, dignus hospes constitutus, Summi Entis præco. Hæc contemplatio Naturæ evadit voluptatis cælestis vestibulum, cæsus particeps Animus in luce obambulat & tanquam in terrestri cælo vitam degit (o); Nec pietas adversus DEUM, nec quanta huic gratia debeatur, sine explicatione Naturæ intelligi potest; Homo enim ortus est ad contemplandum DEUM, & Naturæ contemplatio est ad DEI admirationem proxima & apertissima via (p).

(l) Senec. VII. 27. (m) Esa. VI. 4. (n) David Ps. CXVIII. (o) Aâ. Holm. (p) Cicero. At mortuo Marco Aurelio milites creabantur imperatores, qui proprium nomen vix exarare noverant, doctosque propigris habe-

SAPIENTIA, divinæ particula auræ, summum est attributum Hominis Sapientis, hæc iuste iudicat de iis, quæ sensus sistunt, hi vero sistunt res mere naturales circumstantes; Primus tum Sapientiæ gradus est res ipsa nosse. Notitia consistit in vera *Idea* objectorum, qua similia a dissimilibus distinguuntur *Notis* propriis, a Creatore rebus inscriptis; hanc notitiam ut cum aliis communicet, *Nomina* propria, non confundenda, singulis diversis imponat; Nomina enim si pereunt, perit & rerum cognitio. Hæc literæ elementaque erunt, quibus destitutus nemo naturam legerit; quum *ignorato genere proprio*, nulla *descriptio*, quamvis accurate tradita, certum demonstret, sed plerumque fallat (q).

METHODUS, anima Scientiæ, indigitat, primo intuitu, quodcunque Corpus naturale, ut hoc corpus dicat proprium suum Nomen, & hoc nomen quæcunque de nominato corpore beneficio seculi innotuere, ut sic in summa confusione rerum apparenti, summus conspiciatur Naturæ ordo. Systema apte quinque tantum subdividitur: sic

Classis, *Ordo*, *Genus*, *Species*, *Varietas*.
Genus summum, *G. intermedium*, *G. proximum*, *Species*, *Individuum*.
Provincia, *Territoria*, *Paræcia*, *Pagi*, *Domicilium*.
Legiones, *Cohortes*, *Manipuli*, *Contubernia*, *Miles*.
Nisi enim in ordines redigantur, & veluti in castrorum acies distribuuntur, tumultu & fluctuatione omnia perturbari necesse est (r).

NOMINA respondeant Methodo Systematicæ; sint itaque *Nomina Classium*, *Ordinum*, *Generum*, *Specierum*, *Varietatum*, *Character Classium*, *Ordinum*, *Generum*, *Specierum*, *Varietatumque* Differentiæ; nam nomina nosse oportet, qui rem scire velit, *confusis enim nominibus omnia confundi necesse est* (s).
 Primi itaque hominis actio, in aurea ista ætate, erat inspectio Creaturarum, & secundum Genera, impositio Nominum Specierum.

SCIENTIA Naturæ innitur Cognitioni Naturalium Methodicæ & Nomenclaturæ Systematicæ tanquam filo ariadneo, secundum quod Naturæ mæandros unice tutoque permeare liceat; in his *Classis* & *Ordo* est Sapientiæ, *Genus* & *Species* Naturæ

bant, literis relictis solis Monachis intra sua claustra; hi naturæ contemplationem nauci faciebant, deum ut imperferutabilem adspernabantur, mox ejus cultores uti magos prolequebantur, a quo tempore verbum Dei naturale & revelatum contraria simplicitate titubant. *Suhm. Añ. Nidros. 1763.* (q) *Cæsalpinus*. (r) *Cæsalpinus*. (s) *Cæsalpinus*,

opus ; omnis vera cognitio est *Specialis* , solida autem *Generalis* .

Ordo alius struentis est , alius est inhabitantis . Creator incipit a simplicissimis elementis Terrels , per Lapides , Vegetabilia , Animalia , in Hominem desit . Homo autem incipiat a se ipso , desinat in terram . Auctor Systematis a particularibus ad universalialia adscendat ; Doctor vero contra a generalibus ad specialialia descendat . Fontes enim concurrunt in rivos , hi in fluvios ; adscendat autem nauta , quousque poterit , nec tamen fontium ultimas origines attigerit . Data distincta rerum cognitione , ulterius penetrandum in Specialissimas Proprietates , Phænomena , Mysteria , Dotes , Vires , Utus ; Naturalis quum Scientia trium regnorum Fundamentum sit omnis Diætæ , Medicinæ , Œconomix tam privatæ , quam ipsius naturæ . *Felices agricola bona si sua norint !*

Omnes res creatæ sunt divinæ sapientiæ & potentiæ testes , divitiæ felicitatis humanæ ; ex harum usu *bonitas* Creatoris ; ex pulchritudine *Sapientia* Domini ; ex œconomia in *Conseruatione* , *Proportione* , *Renovatione* , potentia *Majestatis* eluocet . Earum itaque indagatio ab hominibus sibi relictis semper æstimata ; a vere eruditis & sapientibus semper exulta ; male doctis & barbaris semper inimica fuit .

Narrabo mirabilia Tua DOMINE ,
Et virtutem Terribilium Tuorum dicant generationes.

David.

REGNUM ANIMALE.

ANIMALIA, organisatione viva, animato Medullari *sentiunt*, Nervis *perciipiunt*, seque ex arbitrio *movent* motu possibili.

VITA animalis Machinæ hydraulicæ, perpetui mobilis, e Medulla a primordio continuata flagrat vesicalis ignis flammula æthereo-electrica, spiraculis sustentanda, in qua incomprehensibilis arbitraria voluntas motrix residet.

VIVENTIA singula, in multiplicatione prodiga Natura, oritur a minimis, generat in fluido, incipit in ovi liquido, cum *omne vivum ex ovo*.

OVUM intra *Tunicas*, sæpe includentes *Albumen*, continet *Vitellum*, cuius lateri emergenti insertum *Punctum* saliens, *vegetans* in Embryonem, *caulescentem* Funiculo umbilicali, *radicatum* placenta vitellina.

MATER prolifera promit ante generationem vivum compendium *medullare* novi animalis sui que simillimi, carinam Malpighianam dictum, tanquam plumulam vegetabilium; hoc ex genitura pollinifera *Cor* adfociat ramificandum in corpus; *Punctum* enim saliens Ovi incubantis Avis ostendit primum *Cor* micans *Cerebrum*que cum *Medulla*; corculum hoc, cessans a frigore, excitatur calido halitu, premitque *Bulla* aërea, sensim dilatata, liquores secundum canales fluxiles. *Punctum vitalitatis* itaque in viventibus est tantum a prima creatione continuata medullari vitæ ramificatio, cum ovum sit gemma medullaris matris a primordio viva, licet non sua ante proprium *Cor* paternum; sic *Generatio Æquivoca nulla*.

MACHINA Animalis hydraulica, conformis Vegetabili, sed verticalis & Facultatum *officinis* concamerata, varie in diversis modificata:

MEDULLARIS intima, mollusca, e *Bulbo* baseos cerebroso elongata *Caule* simplicissimo, apice per se infinite progressivo, emittens ad totum *fila* nervea simplicissima, sibi homogenea.

INTERANEA crusta induranda, priorem vestiens, e *Tubere* cranii elongata in *Caulem* vertebrarum, articulatam geniculis mobilibus, oppositè artubus ramosum, cui insident *Folia* muscularia, determinate sparsa, apice proximo articulo etiam affixa, fibroso-carnosa, contractilia.

CORTICALIS extima, Radicata interius lacteis, e *Bulbo* cordis elongata in *Cauiem* vasculosum duplicem paremque, similiter ramosum, infinite ramulosum, e cuius ultima dichotomia *Fructificatio* genitalium.

FACULTATUM cameræ intra machinam animale[m] sunt V.

Δ **ANIMALIS** electrico-motoria, suprema, officina τὸ θεῖον ἰσθιὺς viventis, clam agentis, volentis sentientisque, intraque bulbum organisatum ratiocinantis, se pandens, per fila electrica totum gubernat, regit.

Α **TITALIS** pulmonum, pneumatica, secunda, aëris principium vitale haurit pro flammula animali.

▽ **NATURALIS** Vasorum, hydraulica, tertia, e cordis perpetuo mobili, reciproce recipit propellitque per totum succos addendos auferendosve, ne unquam deficient.

∇ **ALIMENTARIS** intestinorum, digestiva, quarta, præparat intra tubum intestinale[m] succos aptos pro vasis lacteis, deferendos ad vitalem corticem & ultra.

○ **GENIALIS** spermatica, combinatoria, infirma, ex ultimo trunci animalis naturalisque, coadunat Medullarem cum Corticali, ut inde distincta promanet machinula animalis.

ORGANA sensuum machinæ sunt physicæ, insertæ extremitati nervi, sensorio cerebri proximi, quibus divina arte percipit Animal remota.

OCULUS : *Camera obscura*, imaginem proportionem, figura, colore depingens.

AURIS : *Tympanum* membranæ chorda tensæ super cochleam, a motu ætheris tremens.

NASUS : *Membrana* latissima humida contortuplicata, aëris perreptantis volatilia figens.

LINGUA : *Spongialæ* bibulæ, sparsæ, humido solutum attrahentes.

TACTUS : *Papillæ* molliusculæ, figuram impressam brevi assumentes.

His gaudent plurima Animalia, sed non omnia omnibus. Plura si Creatori addere placuisset, plura percepissent; uti Magnete præsentiam Ferri, Electro electricitatis phænomena. *Antennas* insectis folis concessit, nobis æque ignotas, ac illis Aures.

Indicat *Oculus* ex luce, *Auris* ex aëre appropinquantia; percipit *Tactus* ex unione solida præsentia: examinat *Nasus* volatilia nervis, *Lingua* solubilia fibris, assumentia: s. Grata, concessa, salutaria, s. Ingrata, vetita, noxia.

COGITANS allicit ad *velle* gratum aut *nolle* ingratum.

GAUDIUM puerile, sanguineum, rubrum, oleosum,
spongiosum, tepidum, libere pulsans, anhelans,
ridens, transpirans, promptum, *Vita*.

METUS juvenilis, phlegmaticus, pallefcens, aquofus,
laxus, horrens, debile pulsans, dyspnoicus,
fuffocans, cacans, tremens, *Morbus*.

IRA virilis, cholericæ, lutea, spirituoſa,
ſtricta, fervens, dure pulsans, aſthmatica,
ſtertens, miſturians, agitans, *Medicina*.

MÆROR ſenilis, melancholicus, ater, acidus,
rigidus, frigidus, tarde pulsans, orthopnoicus.
ſuſpirans, obſtipans, quieſcens, *Mors*.

Sic *Gaudium* bonis fruitur, *Metus* fuga eripit, *Ira* armis defendit,
Mæror amiſſa luget.

POLITIA Naturæ manifeſtatur ex tribus Naturæ regnis ſimul:
quemadmodum enim Imperantium cauſſa Populi non ſunt nati,
ſed ſubditorum ordini ſervando Imperantes conſtituti, ita Ve-
getabilium cauſſa Animalia Phytiphaga, phytiphagorum Car-
nivora, & ex his Majora ob parva, Homo (qua animal) ob
maxima & ſingula, ſeſe vero præcipue, ſæva mercede conducta
tyrannidem exercent, ut Proportio cum Nitore Reipublicæ
naturæ perennet. Viciffim ſinguli cives conſpirant in Majeſta-
tem Hominis rationalis imperantis, cujus eſt ſummum Rei-
publicæ auctorem agnoſcere. *Amænit. Acad. VI. p. 17.*

RESPUBLICA Naturæ, tanquam Aqua e Fontibus in Rivulos,
Amnes, Fluvios ad Mare tranans, e numeroſiſſima *Plebe* in
pauciores *Nobiles*, pauciſſimosque *Magnates* ad *Imperantem*
adſcendit, dum Animalia minima, numero, vi potentiaque
facile infinita, in uſum cedant majoribus, inertioribus, præſ-
tantioribus, cum natura nunquam magis, quam in minimis
tota fit.

MINISTRI Politicæ, propriis muniis præfixi, tot ſunt, quot ani-
malium *Species*, ſinguli ad officia proprio commodo allecti, quum
ex labore ſuſtentationem ſuam reportent, ne quidquam deficiat,
ubi nihil ſupervacaneum. Ne autem alter alterius negotiis ſeſe
immifceat, ſimulque lucrum alteri præripiat, ſub pœna capitali
ſancita *Lex veneni*, iſtis ſenſibus, *Olſædus* inprimis & *Gufus*,
inſcripta, ne tranſgreſſores excuſabiles evaderent.

OPERATIONES Naturæ incolarum præcipuæ sunt :

1. *Multiplicare* speciem , ut negotiis sufficiant.
2. *Æquilibrium* inter species Animalium & Vegetabilium servare, ut proportio perennet.

Detondere quotannis Vegetabilia , ut renovetur annum theatrum.

Coercere erronea , ne expellantur legitima.

Auferre languida , mortua , immunda , conspurcata , stagnantia , acida & putrida , ut nitor aulæ fulgeat.

3. *Vindicare* se ipsos ab interitu , ne vacet administratio.

ÆCONOMIA Naturæ versatur circa Rerum *Generationem* , *Conservationem* , *Destructionem* , ut opus Creatoris illibatum persistat , ad quod tota conspirat Natura :

Generata calido sanguine , pro educatione , aliorum curæ opus habent ; cumque Creator non remunerandus primi individui curam gessit , depositum hoc transeat linea descendenti ad natos , qui id parenti non reddunt.

Conservatio quotidiano alimento , sed late disperso , adeoque impigre quærendo ; sic Fames dispergit per orbem ea , quæ Venus convocat.

Destructio unius fit alterius reparatio , cum deficientibus cadaveribus laborioso venatu sustentabitur vita ; Sic Rapina rerum omnium est , quam armis , munimentis , motu diversimodo , halituque eludant vivaciora , dum languida succumbant & vegetiora in motu festinent , ut opus naturæ perenni flore rideat.

IMPULSORES Naturæ etiam præfixi ad munia promte peragenda :

Venus blanda ad Multiplicationem convocat irritatque ,

Fames avara ad Conservationem dispergit sollicitatque ,

Dolor atrox ad Destructionem concitat repellitque , neque hi sine Numine.

DIVISIO Naturalis Animalium ab interna structura indicatur :

COR biloculare , biauriturum ;	{ viviparis	<i>Mammalibus.</i>
<i>Sanguine</i> calido , rubro.	{ oviparis	<i>Avibus.</i>
COR uniloculare , uniauriturum ;	{ pulmone arbitrario	<i>Amphibiis.</i>
<i>Sanguine</i> frigido , rubro.	{ branchiis externis	<i>Piscibus.</i>
COR uniloculare , inauriturum ;	{ antennatis	<i>Insectis.</i>
<i>Sanie</i> frigida , albida.	{ tentaculatis	<i>Vermibus.</i>

I. MAMMALIA.

Cor biloculare, biauritus; *Sanguine* calido, rubro (*).

Pulmones respirantes reciproce.

Maxillæ incumbentes, testæ: *Dentibus* intrusis plerisque.

Penis intrans viviparas, lactiferas.

Sensus: Lingua, Oculi, Aures, Papillæ.

Tegmenta: Pili, pauci indicis, parvissimi aquaticis.

Fulcra: Pedes quatuor, exceptis mere aquaticis, in quibus pedes posteriores plane deficiunt. Cauda plerisque.

II. AVES.

Cor biloculare, biauritus; *Sanguine* calido, rubro.

Pulmones respirantes reciproce.

Maxillæ incumbentes, nudæ, exsertæ, edentulæ.

Penis subintrans absque scroto oviparas, crusta calcarea.

Sensus: Lingua, Nares, Oculi, Aures absque auriculis.

Tegmenta: Pennæ incumbentes, imbricatæ.

Fulcra: Pedes bini. Alæ binæ. *Uropygium* cordatum.

III. AMPHIBIA.

Cor uniloculare, uniauritus; *Sanguine* frigido, rubro.

Pulmones spirantes arbitrarie.

Maxillæ incumbentes.

Penes (multis) bini. Ova plerisque membranacea.

Sensus: Lingua, Nares, Oculi, Aures.

Tegmenta cutacea nuda.

Fulcra varia variis, quibusdam nulla.

IV. PISCES.

Cor uniloculare, uniauritus; *Sanguine* frigido, rubro.

Branchiæ extus comprimendæ.

(*) In omnibus animalibus, quibus sanguis non coalescit, a se ipso incisus ventriculus cordis unicum reperit Haller *Elementa physiolog.* T. I. p. 305-307. & mirandum tanto magis, quod crocodilo 2 ventriculos adscribat Hasselquist *Itin. Palæst.* p. 293. quod Borrichius *hermetic. sapient. Egypt.* p. 276. in eodem animali non nisi unum viderit.

Maxillæ incumbentes.

Penes (*plerisque*) nulli. Ova absque albumine.

Sensus : Lingua , Nares ? Oculi , Aures.

Tegmenta : Squamæ imbricatæ.

Fulcra : Pinnæ natatoriæ.

V. INSECTA.

Cor uniloculare , uniauritur ; *Sanie* frigida.

Spiracula : Pori laterales corporis.

Maxillæ laterales.

Penes intrantes.

Sensus : Lingua , Oculi ; *Antennæ* in capite absque cerebro ,
non Aures , Nares.

Tegmenta : Cataphracta cute ossea sustentante.

Fulcra : Pedes , quibusdam Alæ.

VI. VERMES.

Cor (*plerisque*) uniloculare , inauritur ; *Sanie* frigida.

Spiracula obscura.

Maxillæ multifariæ , variæ variis.

Penes varii Hermaphroditis , Androgynis.

Sensus : Tentacula. Oculi (*plerisque*). Cerebrum nullum , non
Aures , nec Nares.

Tegmenta calcarea aut nulla , nisi Spinæ.

Fulcra : nulli Pedes aut Pinnæ.

* * * * *

VIVARIUM Naturæ sic alit sextuplicis formæ Animalia :

<i>Mammalia</i>	pilosa	in <i>Terra</i>	gradiuntur	loquentia.
<i>Aves</i>	plumosæ	in <i>Aëre</i>	volitant	cantantes.
<i>Amphibia</i>	tunicata	in <i>Calore</i>	serpunt	fibilantia.
<i>Pisces</i>	squamati	in <i>Aqua</i>	natant	poppyzantes.
<i>Insecta</i>	cataphracta	in <i>Sicco</i>	exsiliunt	tinnitantia.
<i>Vermes</i>	excoriati	in <i>Humido</i>	panduntur	obmutescentes.

C L A S S I S I.

M A M M A L I A.

Balatu Pecorum & crebris Mugitibus amnes

Arentesque sonant ripæ colleſque ſupini.

VIRGIL. III. 554.

MAMMALIA hæc & nulla alia mammata Animalia, ex ſtructurâ, viſceribus, organiſ homini proxima, pleraque *Quadrupeda*, nobiſcum Continentem inhabitant, tanquam inter hoſtes atrociffimos, dum maxima pauca *Pinnata* intra Pelagum ſe ſubducunt.

VESTITUS Quadrupedum e *Pilis* flexilibus, molliſſimis, diſtinctis, injuriæ minus obnoxiiſ; iſſque fertilioribus in frigidis, quam æſſuantibus terris. Hi vero Pili in *Aculeos* coaliti (*Erinaceo*, *Hyſtricus*), aculei explanati *Squamas* (*Mani*), ſquamæ coadunatæ in *Scutum* (*Dafypodibus*); at pilorum vellus ſæpe diſtinctum *Suturis* (*Cani*, *Equo*), quæ elongatæ in *Jubam* (*Equo*, *Sui*); Sed *Aquatica nuda* evaſere, ne madefierent, niſi in terram exire aliquando neceſſe habeant. Præterea *Facies* ſæpe *Verrucis* ſetiferis, *Labia Vibriffis*, *Mentum Barba* (*Homini*, *Simiæ*, *Capræ*) & *Pedes* *Pectusque Callis*, (*Equo*, *Camelo*,) non raro notata ſunt.

FULCRA, motus inſtrumenta, pro expeditiori fuga in evitando hoſtem, aut aſſequendo prædam, **TERRESTRIBUS** ſunt *Pedes quatuor*, quorum anteriores *Palmis* inſtruuntur, interdum tanquam *Manus* remoto pollice diviſæ (*Primatibus*, *Didelphibus*); Poſteriores autem *Plantis*, ut validius properarent, & hi vel *Palmati* digitis membrana connexis, ut natarent, vel *Fiffi* digitis ſeparatis, ut facilius currerent, aut *Taliſ* innixi, ut firmius perſiſterent (*Homini*, *Urſo*): Ne vero fuga detererentur inter aſpera, vel denſo vellere manicati (*Lepori* timido, *Vulpi* *Lagopodi*, *Bradypodibus*), vel **UNGULATI**, *ungulis* tanquam calceolo digitum veſtientibus (*Belluiſ*, *Pecoribus*), quibus ſæpe etiam *Tali ſuccenturiatiſ* incluſi; at vero ferociora magis **UNGUICULATA** *unguibuſ* digito ſuperimpoſitiſ ariſtata armataque, ut prædam apprehenderent, adverſarium lacerarent, terramvè foderent; hiſ ungueſ plerumque ſubulati, arcuati; pauciſ manuleatiſ ovalet, complanati; at vero rapaciores *Feræ unguibuſ* armatæ ſubulatiſ; ſed *Volantia* vel manibuſ elongatiſ palmatiſque aëra ſcandunt (*Veſ-*

pertiliones), vel membrana inter palmas plantasque expandenda velificant (Lemur, Sciurus, Mus.) Aliter AQUATICA, unguibus unguisque destituta f. *mutica*, quibus loco pedum pinnæ pectorales, ex homoplate, humero, ulna, carpo, metacarpo & digitis conflatae (Cetis).

ARMA Mammalium præter dictos *Ungues*, nominandosque *Dentes*, imprimis *Cornua* cartilaginea capiti inserta sunt; hæc vel *solida* perennia (Rhinoceroti), vel *ramosa* annua, primumque pilosa apiceque crescentia (*Cervis*), vel *cava* vaginantia basique crescentia (Bobus, Capris, Ovibus), quibus adversarium occurrant, penetrant, verberant; sic eludunt hostem varie vel dimicando, mordendo, lacerando, calcitrando, feriendo, vel currendo, subsiliendo, scandendo, fodiendo, urinando, natando, volitando, vel foetendo, clamando, terrefaciendo.

CIBARIA instrumenta *Dentes* audiunt, qui triplices: *Primores* sæpe compressi Incisores pro evellendo, rodendo, confcindendo; *Laniarii* conici longiores absque antagonista occurrante pro lacerando; *Molares* latiores pro conterendo, & hi obtusi phytiphagis, acutiores carnivoris; at *edentula* solæ Myrmecophagæ & Manes evasere.

UMBRACULUM est *Cauda*, e vertebriis dorsi multiplicatis postice elongata, qua turpissimæ absconduntur partes; hæc paucis *nulla* (Homini, Simiis & Muribus nonnullis), *abbreviata* nec femoribus longior (Lepori, Satyro, Talpæ, Erinaceo), *elongata* ad pedum longitudinem & ultra (Canibus, Muribus, &c.); harum singulæ vel *Nudæ* (Muribus) vel *Prehensiles* convolvendæ proque quinta manu intervientes (Simiis, Hystrici, Didelphibus), vel *Comosæ* longis setis (Equis, Bobus), vel *Floccosæ* apice penicilliformi (Leoni mari, Dipodi Jaculo), vel *Distichæ* utrinque pilosæ (Sciuris, Myrmecophagæ).

CUSTODES Animalium *Sensus* sunt pro conservatione individui:

Auriculæ, exceptis aquaticis, pro Auditu præstantiore: rotundatæ, ovatæ, acutæ, acuminatæ, fissæ; erectæ, pendulæ.

Oculi *Pupilla* orbiculari diurnis, lineari expandenda vel perpendiculari vel transversali nocturnis. *Membrana nictitans* paucis. *Palpebræ mobiles* omnibus; utræque ciliatæ (Homini Simiisque), superiore tantum ciliata plerisque reliquis.

Nasus compressus, simus, refusus, aut bifidus, labiis brevior (Simiis), paulo longior (Feris plerisque), aut elongatus in *Proboscidem* (Elephanti); *Nares* ovatæ aut orbiculatæ.

Lingua simplex plerisque, denticulato-ciliata (Canibus), supra aculeata (Felibus), filiformis (Manibus, Myrmecophagis), bifida (Phocis); *Labium superius* lacunofum plerisque, bifidum (Gliribus).

GENTALIUM curiosior indagatio displicet, quamvis varia & singularis Clitoride, Nymphis, Scroto, Pene, qui tamen posset ad ordines naturales viam monstrare.

VENERE *Vaga* pruriunt pleraque, ubi Mares dimicant inter se, quo valentiores polleant pro sobole vivaciore, ineuntes feminas viviparas, foetum intra se excludentes, quem enixum lactant, defendunt, curant in proximas nuptias, adultioremve ætatem. *Polygama* autem nonnullis, ubi Mas gynæceum ex plurimis feminis sibi associatis defendit (Phocæ); paucissimis vero Monogamia est; dum Mas & Femina individui socii curam gerunt foetus (Simiæ nonnullæ, Lemur, Vespertiliones, Erinaceus).

MAMMÆ lactantes Feminis omnibus, etiam Maribus (excepto Equo) numero determinato pares. *Pectorales* (Primatibus, Cetis); *Abdominales* (Didelphibus, Phocis); *Inguinales* (Pecoribus, Belluis); *Abdominales Pectoralesque* simul (Gliribus pluribus); *longitudinaliter digestæ* (Suibus aliisque), at sæpius binæ pro singulo foetu ordinario.

USUS: coluntur varia inprimis Pecora ob *Carnes*, *Lac*, *Corium*, *Vellera*, *Pinguedinem*; ad *Onera* vero Equus, Bos, Camelus, Elephas; instituuntur Feræ variæ pro *venatu*, *muribus*, *serpentibus*; Vivariis asservantur rariora.

AUCTORES præcedentis seculi GESNERUS, ALDROVANDUS, JONSTONUS, præsentis RAJUS, BRISSON, HOUTTUYN, Comes de BUFFON, PENNANT, PALLAS, SCHREBER, KLEIN, CETTI, ERXLEBEN, BLUMENBACH, CAMPER, STORR; Scientia ex ovo ordiunda secundum cujuscunque Mammalis Descriptionem, Dietam, Economiam, ut ex historia fines Creatoris eruantur; vide Exempla de Cane domestico, Cervo Tarando, Mure Porcello, Sue Scrofa, Ove Ariete in *Amœnit. Academ.* proposita.

ORDINES inprimis a dentibus defumuntur :

MAMMALIA	Ungiculata	Dentes	Primores nulli utrinque.	BRUTA.	2.
			Primores incisores 2. Laniarius 0.	GLIRES.	4.
			Primores incisores 4. Laniarius 1.	PRIMATES.	1.
			Primores conici (6, 2, 10) Laniarius 1.	FERÆ.	3.
MAMMALIA	Ungulata		Primores superiores & inferiores.	BELLUÆ.	6.
			Primores superiores nulli.	PECORA.	5.
MAMMALIA	Mutica.	Dentes	varii in variis.	CETE.	7.

I. PRIMATES.

Dentes primores incisores: superiores IV *paralleli* (exceptis tamen aliquot *vespertilionum* speciebus, quibus aut II tantum aut nulli sunt). Laniarii solitarii.

Mammæ *pectorales* binæ.

Pedes duo *Manus* sunt; Ungues (plerisque) *complanati, ovales*.

Victus *incidendo fructus*, paucis *animalis*.

II. BRUTA.

Dentes primores nulli *superius* aut *inferius*.

Pedes *unguibus validis*.

Incessus *ineptior*.

Victus ut plurimum *vegetabilis, comprimendo*.

III. FERÆ.

Dentes primores conici *utrinque sæpius* VI. Laniarii *longiores*. Molares *cuspidato-conici* (non *truncati*).

Pedes *ungiculati*: Unguibus *subulatis*.

Victus *lacerando cadavera rapinasque animalium*.

IV. GLIRES.

Dentes primores incisores II *superius inferiusque*. Laniarii *nulli*.

Pedes *ungiculati*, *curfu salientes*.

Victus *rodendo cortices, radices, vegetabilia, &c.*

V. PECORA.

Dentes primores inferiores incisores plures; superiores nulli.

Pedes *ungulati bisulci*.

Victus *evellendo plantas ruminandas*.

Ventriculi 4: Rumen *macerans, ruminans*; Reticulum *cancellatum recipiens*; Omasus *multiplicatus consumens*; Abomasus *fasciatus accescens coagulato pro sebo, ut minus calefcat*.

VI. BELLUÆ.

Dentes primores obtusi.

Pedes ungulati.

Incessus gravis.

Vitus extrahendo vegetabilia.

VII. CETÆ.

Pedum loco Pinnae pectorales; cauda horizontalis (plagiura) plana.
Ungues & pili nulli.

Dentes aliis cartilaginei, aliis offei. Nasus loco fistula, in calvarie parte anteriore & superiore.

Vitus e Molluscis, Piscibus.

Locus pelagicus.

Hos a Piscibus divulsos jussi Mammalibus associari ob Cor biloculare calidum, Pulmones respirantes, Palpebras mobiles, Aures cavas, & aeris dpe sonum percipientes, vertebrae colli septem, lumbos & coccygem, Penem intrantem Feminam, Mammis lactantem, idque ex lege naturæ jure meritoque.

CHARACTERES MAMMALIUM.

I. PRIMATES.

1. HOMO: *Situs erectus. Hymen & Menstrua Feminarum.*
2. SIMIA: *Dentes laniarii, hinc remoti.*
3. LEMUR: *Dentes primores, inferiores sex.*
4. VESPERTILIO: *Manus palmato-volantiles.*

II. BRUTA.

36. RHINOCEROS: *Cornu in fronte positum.*
5. ELEPHAS: *Dentes laniarii & molares, Nasus proboscide elongatus.*
6. TRICHECHUS: *Dentes laniarii superiores; molares ex osse rugoso. Pedes compedes.*
7. BRADYPUS: *Dentes molares primo longiore, absque laniariis primoribusve. Corpus pilosum.*
8. MYRMECOPHAGA: *Dentes nulli. Corpus pilosum.*
9. MANIS: *Dentes nulli. Corpus squamatum.*
10. DASYPUS: *Molares absque laniariis primoribusve. Corpus cataphractum.*

III. FERÆ.

11. PHOCA: *Dentes primores superiores 6; inferiores 4.*
12. CANIS: *Dentes primores 6, 6: superiores intermediis lobati.*
13. FELIS: *Dentes primores 6, 6: inferiores æquales. Lingua aculeata.*
14. VIVERRA: *Dentes primores 6, 6: inferiores intermediis breviores.*
15. MUSTELA: *Dentes primores 6, 6: inferiores conferti: duobus alternis interioribus.*
16. URSUS: *Dentes primores 6, 6: superiores excavati. Penis osse flexuoso.*
17. DIDELPHIS: *Dentes primores superiores 10; inferiores 8.*
18. TALPA: *Dentes primores superiores 6; inferiores 8.*
19. SOREX: *Dentes primores superiores 2; inferiores 4.*
20. ERINACEUS: *Dentes primores superiores 2; inferiores 2.*

IV. GLIRES.

21. *Hystrix*. *Corpus spinis tectum.*
Cavia. *Dentes primores cuneati: Molares 4 ad utrumque latus.*
Clavicula nulla.
23. *Castor*. *Dentes primores superiores cuneati. Molares 4 ad utrumque latus. Clavicula perfecta.*
24. *Mus*. *Dentes primores superiores cuneati. Molares 3 ad utrumque latus. Clavicula perfecta.*
- Arotomys*. *Dentes primores cuneati. Molares superiores 5, inferiores 4 ad utrumque latus. Clavicula perfecta.*
25. *Sciurus*. *Dentes primores superiores cuneati, inferiores acuti. Molares superiores 5, inferiores 4 ad utrumque latus. Clavicula perfecta. Cauda disticha. Mystaces longæ.*
26. *Myoxus*. *Mystaces longæ. Cauda rotunda apice crassior.*
Dipus. *Pedes anteriores perbreves, posteriores prælongi.*
22. *Lepus*. *Dentes primores superiores duplicati.*
Hystox. *Dentes primores superiores lati. Cauda nulla.*

V. PECORA.

27. *Camelus*. *Ecornis. Dentes laniarii plures.*
28. *Moschus*. *Ecornis. Dentes laniarii solitarii: superioribus exertis.*
Giraffa. *Cornua brevissima. Pedes anteriores posterioribus multo longiores.*
29. *Cervus*. *Cornua solida ramosa decidua. Dentes laniarii nulli.*
Antilope. *Cornua solida simplicia persistentia. Dentes laniarii nulli.*
30. *Capra*. *Cornua tubulosa erecta. Dentes laniarii nulli.*
31. *Ovis*. *Cornua tubulosa reclinata. Dentes laniarii nulli.*
32. *Bos*. *Cornua tubulosa porrecta. Dentes laniarii nulli.*

VI. BELLUÆ.

33. *Equus*. *Dentes primores superiores 6; inferiores 6.*
24. *Hippopotamus*. *Dentes primores superiores 4; inferiores 4.*
- Tapir*. *Dentes primores superiores 10; inferiores 10.*
35. *Sus*. *Dentes primores superiores 4; inferiores 6.*

VII. CETÆ.

37. *Monodon*. *Dentes in maxilla superiore 2 protensi, offei.*
38. *Balaena*. *Dentes in maxilla superiore, cornei.*
39. *Physeter*. *Dentes in maxilla tantum inferiore, offei.*
40. *Delfhinus*. *Dentes in maxilla utraque, offei.*

I. PRIMATES.

Dentes primores incisores : superiores IV , paralleli.

Mammæ pectorales binæ.

I. HOMO. Nosce te ipsum. (*)

Sapiens. I. H. diurnus ; varians cultura , loco.

Ferus. Tetrapus , mutus , hirsutus.

Juvenis ursinus Lithuanus. 1661.

Juvenis lupinus Hassiacus. 1544.

Juvenis ovinus Hibernus. Tulp. obs. IV. 9.

Juvenis bovinus Bambergensis Camerar.

(*) NOSSE SE IPSUM gradus est primus sapientiæ, dictumque Solonis, quondam scriptum literis aureis supra Dianæ templum.

Physiologie : Te contextum Nervis , intertextum Fibris , Machina fragili, sed adolescente in perfectissimam, facultatibus instructam fere omnibus, pluribusque quam reliqua cuncta. Nudum in nuda humo, natali die, abjicit naturam, ad vagitus statim & ploratum, manibus, pedibusque devinciendum, flens Animal ceteris imperaturum ; cui scire nihil sine doctrina : non fari, non ingredi, non rejci, non aliud naturæ sponte. Plin. Vides itaque qualem vitam nobis rerum natura permisit, quæ primum nascentium omen fletum esse voluit. Seneca. Sed miseret atque etiam pudet asstantem, quam sit frivola animalium superbissimi origo : Plin.

Tecum habita.

Diatetice : Te sanitate & tranquillitate si noveris felicem, Cræso, Salomone, Alexandroque majorem : Te Moderatis conservandum, Nimiis destruendum, Variatis afficiendum, Insuetis frangendum, Consuetis indurandum. Te polyphagum Culina instructissima, per errores gratissima, igne vinoque horrenda. Parvo fames constat magno fastidium. Opinio immensum desiderat ; Natura exiguum & parabile, ergo ad si pervacanea sudatur. Seneca. Prout vivis, ita ibis.

Cura valetudinem !

Pathologie : Te tumidam usque dum crepueris bullam, piloque pendulam in puncto fugientis temporis Nihil enim homine imbecillius terra alit. Homer. Nulli vita fragilior, nulli tot morbi, tot cura, tot pericula : Breve universum utique ævi tempus : Pars æqua morti similis exigitur, nec repuantur infantie anni, qui sensu carent ; nec senectæ in pœnam vivaces ; hebescent sensus, torpent membra, præmoriuntur visus, auditus, incessus, dentes, ciborum instrumenta. Plin. Sic magna pars mortis jam præterit, quicquid ætatis retro est mors tenet. Totum denique hunc, quem vides populum, quousque cogitas est ; cito natura revocabit & condet ; mors omnes æque vocat ; iratis Diis propitiisque moriendum. Senec. II. 59.

Memento mori !

Naturaliter : Te audacis naturæ miraculum, animalium principem, cujus causa cuncta genuit natura, esse simium animal flens, ridens, melodum, loquens, docile, judicans, admirans, sapientissimum : sed fragile, nudum,

Juvenis Hannoveranus. 1724.

Pueri Pyrenaici. 1719.

Puella Transsilvana. 1717.

Puella Campanica. 1731.

Johannes Leodicensis Boerhavii.

America- a. rufus, cholericus, rectus.

nus. Pilis nigris, rectis, crassis; naribus patulis; facie ephelctica; mento subimberbi.

Pertinax, contentus, liber.

Pingit se lineis dædaleis rubris.

Regitur consuetudine.

*Euro-
pæus.*

β. albus, sanguineus, torosus.

Pilis flavescentibus prolixis; oculis cæruleis.

Levis, argutus, inventor.

Tegitur vestimentis arctis.

Regitur ritibus.

suapte natura inerte, ad omnem fortunæ contumeliam projectum, alienæ opis indigens, anxie mentis sollicitæque tutelæ, querulæ vitæ, precarii spiritus, pertinacis spei, rardæ sapientiæ. Temporis annihilari emortui contemto, presentis vividæ dilapidatorem, futuri dubii æstimatorem in vitæ volucris, pretiosissima, irrevocabili; sic optima quæque dies miseris mortalibus ævi prima fugit; alium ad quotidianum opus laboriosa egestas vocat, alium luxus incarcerat, altalemque suffocat; alium ambitio nunquam quæta sollicitat; alius divitiis, quas optaverat, metuit, & vovet laborat suo; alium solitudo, alium vestibulum semper obsidens turba. Hic se habere doler liberos, hic se perdidisse; lacrymæ nobis deerunt, antequam causâ dolendi, quas detergant sola oblivio. *Sed quousque nos malos nostrâ mala rapere; circumferre pericula, ruere in ignotos, iratos sine injuria, ferarum more occidere quem non odimus, secundos optare ventos, quorum felicitas est ac bella perferre: parum videlicet ad mortis nostras terra late patet. Sentit cetera animantia congregari contra dissimilia, at homini plura ex hominè mala. Plin.*

Innoque vivo, Numen ad:st!

Politice: Te recti loco tenere errorum publicum factum, qui te vix enixum consuetudinis larva induit, nutrit, educat, alit, regit, secundum quam honestus, fortis, sapiens, moratus, pius existimaris; cum gubernatus opinione vivas ad consuetudinem, nec ad rationem. Te, inter perituros constitutum cum nulli contigit impune nasci, beneficii loco petere, ut ultimus cervicem præbeas, dum interim, dulci fortuna ebrius, colligendo in crastinum lapillos fortunæ certas, latratu in furorem ageris, aliter theoreticè pios odio persequeris, quantosque tumultus excitas, non ut servias, sed cui; nugis irrevocabile tempus consumis; immortalia æternaque animo volutas, de seris nepotibus pronepotibusque disponis, novas spes oblitus conditio- nis tuæ inchoas, immemor sepulchri arces fruis, cum interea longa co- panthem mors opprimit, at in agone oculos aperiens (*ἰδὼντες*) somnium primo observas; *Sic vivimus ut immortales, et morimur, ut mortales. Senec.*

MAMMALIA PRIMATES. Homo.

Asteticus. γ. luridus, melancholicus, rigidus.

Pilis nigricantibus; *oculis* fuscis.

Severus, fastuosus, avarus.

Tegitur indumentis laxis.

Regitur opinionibus.

Afer. δ. niger, phlegmaticus, laxus.

Pilis atris contortuplicatis, *cute* holosericea; *naso* simo;
labiis tumidis. *Feminis* sinus pudoris, *mammae* lac-
tantes prolixæ.

Vaser, segnis, negligens.

Ungit se pingui.

Regitur arbitrio. (*)

Esse antiqua virtute & fide!

Moraliter: Te combinatum medullari animato volente iustum, & corporeo af-
fectuoso volente gratum, sub *larva* ineptum, lascivum, sectatorem, ambi-
tiosum, prodigum, querulum, astutum, morosum, invidum, malitiosum,
avarum, transformari in attentum, castum, consideratum, modestum, so-
brium, tranquillum, sincerum, mitem, beneficium, gratiosum, suis con-
tentum. *Uni* animantium *luctus*, *luxuria*, *ambitio*, *avaritia*, *vivendique cupi-
do*, curat atque etiam post se de futuro. *Plin.*

Benefac & letare!

Theologice: Te ultimum finem creationis;

In telluris globum, Omnipotentis magisterium, introductum; ratione sapiente,
secundum sensus concludente, mundi contemplatorem; ut ex opere agnosce-
res Creatorem omnipotentem, omniscium, immensum & sempiternum
DEUM, cuius sub imperio quod moraliter vivas, a iustissima ejus nemeli
convincaris. (*Cetera revelata a Theologis explicanda.*)

Duo enim sunt, quæ in cognitionem DEI ducant, Creatio & Scriptura.

Augustinus.

DEUS itaque *Natura* cognoscendus, dein *Doctrina* recognoscendus.

Tertullianus.

Homo solus DEUM contemplatur, *Naturæ & revelationis eundem Auctorem.*

quem Te DEUS esse

passit, & humana qua parte locatus es in re, discet.

Perf. Sat. III. 71.

Memento Creatoris Tui!

(*) Melius forsitan dispescerentur hominum species ita:

albus. α. *Structura* ad *leges pulchritudinis*, quas nos quidem putamus esse,
quam maxime accommodata.

Huc spectant Europæi fere omnes; incolæ *Asiæ*, intra *Obium*, mare
Caspium, montem *Imaum*, & *Gangen* sitas; porro *Africæ*
septentrionalis, & ipsi *Groenlandi* et *Eskimos*.

hadius. β. Ex *flavo* fusci, *pilis* rarioribus, *facie* plana, *oculis* parvis.

Huc referas reliquos *Asiæ* incolæ.

niger. γ. *Pilis* crispis, *naso* retuso, *labiis* tumidis.

Huc pertinent ceteri *Africæ* incolæ.

Monstro- ε. solo (a) & arte (b. c.) variat :

- fus.* a. *Alpini* parvi, agiles, timidi.
Patagonici magni, segnes.
 b. *Monorchides* ut minus fertiles : *Hottentotti*.
Imberbes plures Americae populi.
 c. *Macrocephali* capite conico : *Chinenses*.
Plagiocephali capite antice compresso : *Canadenses*.

Habitat intra Tropicos Palmis Lotophagus.

Hospitatur extra Tropicos sub novercante Cerere, carnivorus.

DESCRIPTIO : CORPUS erectum, nudum, uti quidem in lucem editur inerme, pilis raris remotissimis adpersum, subsexpedale.

CAPUT obovatum : *Pileus* longius pilosus : *Synceipite* obtuso, *Vertice* obtuso, *Occipite* gibboso.

Facies nuda : Frons planiuscula quadrata, temporibus compressa, angulis sinu intra pileum abscondens. *Supercilia* prominula pilis extrorsum in futuram imbricatis, interincta *Glabella* planiuscula. *Palpebra superior* mobilis, inferior quiescens ; utraque ciliis exstantibus subrecurvatis pectinata : *Oculi* nullo musculo suspensorio detenti, rotundi : *Pupilla* orbiculata absque membrana nictitante. *Genae* gibbae, molliusculae, coloratae. *Mala* compressiusculae. *Buccae* laxiores. *Nasus* prominens, labio brevior, compressus, apice altior gibbosiorque : *Naribus* ovatis intus hirtis, margine crassiusculo. *Labium superius* subperpendicularare, *lacuna* exaratum ; *labium inferius* erectiusculum, magis gibbum. *Mentum* prominens, obtusum, gibbosum. *Os* maribus fetis barbatum, inprimis mentum fetis fasciculatum. *Dentes* maxillae ipsi insidentes utrinque *Primores* incisores, erecti, paralleli, approximati, magis aequales, plani ac rotundi, quam quidem in aliis animalibus ; *laniarii* solitarii, primoribus paulo longiores, breviores tamen, quam in aliis animalibus, utrinque reliquis approximati ; *molares* quini, obtusiusculi, non tam alte incisivi, quam in aliis animalibus. *Aures* laterales : *auriculae* rotundato-lunatae, appressi-

capreus δ. Colore cutis ad cuprum accedente.

Huc numerandi reliqui praeter Groenlandos & Eskimos Americae incolae.

fuscus. α. Ut plurimum colore fusco, naso lato, pilis densioribus.

Huc spectant insularum australium, & plurimarum indiarum incolae.

MAMMALIA PRIMATES. Homo.

25

ufculæ , nudæ , fupra margine fornicatæ ; infra gibbofæ , molles.

TRUNCUS confans collo , thorace , dorfo , abdomine.

Collum teretiufculum , capite brevius ; *vertebræ* ejus nullo ligamento fufpenforio connexæ ; *cervicis nucha* concava ; *gula* fupra concava , medio fubtus gibba.

Thorax antice pofticeque depreffiuſculus ; *pedus* planiuſculum , *jugulo* excavato , *axillis* concavis barbatis , *ſcrobibus* planiore. *Mammæ* duæ , pectorales , diftantes , gibbæ , rotundatæ ; *papilla* cylindrica , obtuſa , rugoſa , *areola* cinſta.

Dorſum tergo planiuſculo , *humeris* exſtantibus , *interſcapulio* depreſſo.

Abdomen gibbum , laxum ; *umbilico* excavato , *epigaſtrio* planiore , *hypogaſtrio* gibboſiore , *inguinibus* planiuſculo-concavis. *Pubis* regio barbata. *Pelvis* fupra dilatarata , infra anguſtata. *Genitalia* exſerta : pene cylindrico , ſcroto ſubrotundo , rugoſo cute laxa , *futura* longitudinali per *perinæum* excurrente , ſ. *vulva* gibba compreffiuſcula , *hymene* , *clitoride* , *nymphis*que inſtructa , ex qua fluxus adultis ſanguinis periodicus. *Cauda* exſerta nulla.

ARTUS ex *Manibus* loco pedum anteriorum , & *pedibus* poſterioribus.

Manuum Armi divaricati craſſiuſculi , teretes , longitudine pedum. *Cubitus* obtuſo prominulus. *Ulna* craſſitie armorum , teres , introrſum planior. *Palma* rotundatæ , dilatata , planæ , extus convexæ ; *vola* concava ; *digiti* V : *Pollex* remotus , brevior , craſſior ; *Digiti* 2 , 3 , 4 , 5 approximati horum 5 minor reliquis , dein 2 , 4 , ſed 3 paulo longior , medium femoris attingens. *Ungues* omnibus rotundati , obovati , plano-convexi , *lunula* pallida.

Pedum Femora approximata , *lumbis* muſculolis , *natibus* gibbis carnoſis , *genubus* antrorſum verſis , obtuſiſſimis , *poplitibus* fubtus concavis. *Crura* longitudine femorum ; poſtice muſculoſo-ventricoſa , inferne anguſtiora , antice macra. *Calcanei talis* oblongis & (quam in aliis animalibus) latioribus , cum planta pedis ipſa junctis , inſiſtentes ; craſſi , prominuli , gibbi : *malleolis* lateraliſibus oppoſitis , hemiſphæricis , duriuſculis. *Plantæ* oblongæ fupra convexiuſculæ , fubtus planæ , tranſverſim concavæ. *Digiti* V : omnes incurvi , fubtus gibbi , approximati : *Pollex* craſſior , brevior ; 2 , 3 ſubæquales , 4 , 5 decreſcentes , ultimo minimo. *Ungues* ut in manibus omnes.

Differt itaque a reliquis corpore erecto nudo; at piloso capite, superciliis, ciliisque, in maturis pube, axillis, in masculo sexu mento. Mammæ 2. pectorales. Caput cerebro omnium maximo; uvula; organa loquelæ; facies abdomini parallela, nuda; naso prominente, compresso, brevior, mento prominente. Cauda nulla. Pedes talia insistentes. Feminis hymen, & menstrua.

2. SIMIA. *Dentes Primores* utrinque IV, approximati.

Laniarii solitarii, longiores, hinc remoti.

Molares obtusi.

* Cauda nulla, *Simiæ* veterum.

Troglodytes. 34. S. ecaudata macrocephala torosa, dorso & humeris pilosis, reliquo corpore glabro. *Blumenbach Compend. histor. natur.* I. p. 65. & *de generis humani varietate nativa.* p. 37.

Satyrus indicus. *Tulpii observat. medic.* p. 284. Tab. XIII. Chimpanzee. *Scotin. v. Nov. Ad. Er. Lips. m. Sept.* 1739. Tab. V. p. 564.

Habitat in Angola. 1738. *mensis Augusto primo in* Europam, Londinum scilicet, *delatum animal.*

Satyrus. 1. S. ecaudata ferruginea, lacertorum pilis reversis, natibus tectis. *Amanit. acad.* 6. p. 68. t. 76. f. 4.

Homo sylvestris. *Edw. av.* 5. p. 6. t. 213.

Orang-Utang. *Camper kort Bericht wegens de Ontleding van verschiedene Orang-Utangs.* Amsterd. 1778. 8.

Habitat in insula Borneo.

Quæ de homine troglodyte refert Immortalis Auctor, partim figmentis nituntur, partim ad monstruosam morbosamve hominum progeniem, partim ad simias pertinent. Ad prima refero præsertim, quæ de loquela, cogitationibus, ratiociniis ejus referuntur; alterum testatur citatum Kakurlacko synonymon, tertium Bontius allegatur & reliqua descriptio: Ad ficticia refero pariter luciferum sive hominem caudatum.

Simia quam similis turpissima bestia nobis, *Ennius*; quod *Simiæ* Mammæ, Glitoris, Nymphæ, Uterus, Uvula, Cilia, Ungues hominis sunt; ligamentum colli suspensorium, ut illi, deficit: *Mirum adeo parum differre stultissimam Simiam a sapientissimo homine.*

Corpus bipedale, sæpius erectum, undique vestitum brunneum, pilis rarioribus rufo-fuscis, longitudine vix digiti. Pili in lacertis reversi versus cubitum. Nates testæ. Caput rotundum. Frons nuda. Oris margo hirtus. Cilia nigra; superiora longiora, densiora. Superciliorum loco series transversa pilorum. Nares brevissimæ subvillosæ. Palmæ insus glabræ, pollice palma brevior. Plantæ forma pedum, pollice brevissimo, reliquis digitis longioribus.

Magna huic cum homine intercedit similitudo, osse etiam hyoideo; ast præter alia cum simiis communia pollicis pedum posteriorum deest unguis, laryngis alia plane structura, & tum musculi, tum universa ossium compages ostendunt non natum esse bipedi ingressui animal.

Habetur hujus varietas major quinque vel sex pedum.

Great Ape. Pennant synopsis. of quadr. n. 64. p. 93.

Pongo. Buffon histoire. natur. Vol. XIV. p. 43.

Homo sylvestris, Orang-utang. Bont. jav. 84. t. 84.

An sexu aut ætate, vel, quod probabilius, varietate aut specie differunt, patria certissime diversæ, quæ ipsis est Angolæ?

Homo sylvestris, Orang-Outang. Tyson anat. of a pygmy. Lond. 1699. 4. f. 1. 2.

Jocko. Buffon histoire. natur. Vol. XIV. p. 43. T. 1. *

Cyolock. de Visne aë. angl. Vol. XIV. p. 73. T. 3.

Lar.

35. S. ecaudata, natibus calvis, brachiis longitudine corporis.

Homo Lar, brachiis longitudine corporis. Mantiss. pl. 2. p. 521. Miller on various subj. of nat. hist. t. XXVII. A. B.

Grand Gibbon. Buffon hist. natur. T. XIV. p. 92. T. 2.

Longarmed ape. Pennant Quadr. p. 99. n. 66.

Simia longimana. Schreber Sæugthiere, 1. p. 66. Tab. III. 1.

Habitat in India, mitis, segnis, frigoris pluviaeque impatiens.

Facie incarnata subnuda, & ingressu sæpius erecto magis ad hominem accedit, quam Satyrus. 4 pedum altitudinem assequitur, niger.

Habetur autem varietas fusca vix ultra $2\frac{1}{2}$ pedes alta.

Petit Gibbon. Buffon hist. nat. XIV. t. 3.

Schreber Sæugth. T. III. f. 2.

Sylvanus. 2. S. ecaudata, natibus calvis, capite subrotundo, brachiis brevioribus.

Simia. Gesn. quadr. 847.

MAMMALIA PRIMATES. Simia.

Simia unguibus omnibus planis & rotundis. *Briss. quadr.* 188.

Cercopithecus. *Jonst. quadr. t.* 59. f. 5.

Pitheque. *Buffon hist. nat. Vol. I. p.* 84.

Pygmy-ape. *Pennant synopsis*, p. 98, n. 65. *T. 12. f. 1.*

Habitat in Africa, Zeylona. Minatur minis, cachinno blandidur, Caffrorum more salutat. Sorbilia manu haurit.

Frons ad superciliorum regionem transverse gibba. Facies brevis plana. Pellis ursina. Scrotum tanquam intra vulvam reconditum; vel penis intra scroti foramen; autumno testiculi intumescunt. Sedes feminae rapi instar extuberans. Lacertorum pili subtus reversi, uti & cervicis.

Pinxerunt veterum.

Anatome. E. N. C. d. 2. a. 7. obs. 40.

Inuus.

3. *S. ecaudata*, natibus calvis, capite oblongo.

Simia cynocephala, unguibus planis & rotundatis. *Briss. quadr.* 191.

Cynocephalus 1 & 2. *Alpin. ægypt. p.* 241. *T. 15. f. 1. & T. 16.*

Magot. Buffon hist. natur. XIV. p. 109. *T. 8. 9.*

Barbary-ape. Pennant synopsis. p. 100. n. 67.

Simia Inuus. Schreber Sæugthiere, I. p. 71. *T. V.*

Habitat in Africa.

Simillima S. Sylvano & Cynocephalo, sed rostro productiore, colore pallidiore; non miscetur cum Sylvano. Ungues omnes rotundati.

*** Cauda abbreviata: Papiones, Kuvinskaya veterum.*

Nemestri-
na.

4. *S. femicaudata subbarbata grisea*, iridibus brunneis, natibus calvis:

Simia brevicaudata. Edw. av. 5. p. 8. t. 214.

Habitat in Sumatra.

Apedia.

5. *S. femicaudata*, palmarum pollice approximato, unguibus oblongis: pollicum rotundatis; natibus tectis.

Simia cauda abrupta, unguibus compressis: pollice palmarum digitis adhærente. *Amæn. acad. I. p.* 278.

Habitat in Indiis.

Magnitudo & color sciuri, subgrisea.

Pollex manuum anticarum non remotus. Ungues omnes oblongi compressi, sed pollicum tam anteriorum, quam posteriorum humanis similes. Cauda brevissima, vix pollicis

*transversi. Os fustum pilis patulis. An u S. sciurea
specie distincta?*

Sphinx. 6. *S. semicaudata*, ore vibriflato, unguibus acuminatis, natibus calvis.

Papio f. Baboon. *Gesn. quadr.* 252. t. 253. *Aldrov. dig.* 260. *Jonst. quadr.* 145. t. 61. f. 1. *Raj. quadr.* 158. *Briss. quadr.* 192.

Papion. *Buffon hist. nat. T. XIV. p. 133. T. 13. 14.*

Simia Sphinx. *Schreber Sæugthiere*, I. p. 80. *Tab. VI.*

Habitat in Borneo; animal libidinosum, mulieribus facile vim inferens, robustum & ferox.

Caput oblongum canis, sed obtusius. Collum longum.

Cauda brevis, erecta. Nates sanguinolenta.

Mormon. 36. *S. semicaudata subbarbata nigro-fusca*, malis tumidis nudis cyaneis oblique striatis, natibus talvis sanguineis. *Alstroemer Ad. Holmiens.* 1766. *Vol. 27. p. 138.*

Simia semicaudata barbata, vertice setis erectis mitram referentibus obrito, unguibus acuris. *Kramer animal. austr. p. 310.*

Mantegar. Philosoph. Transact. n. 290.

Chloras. Brestauer Natur-u. Kunstgesch. XV. Verf. 177.

Tufted ape. Pennant synopsis. p. 102. n. 68. T. 12. 13. f. 2. 1. (ic. mal.)

Simia Mormon. Schreber Sæugthiere, I. p. 65. *T. VIII. Habitat in India.*

Frons pilis erectis fastigiatis canis. Rostrum productum nudum. Nafus sanguineus. Bucca nuda cærulescens, oblique sulcata. Barba alba brevis. Gula flavescens. Collum supra canum, subtus flavescens. Dorsum griseofuscum. Abdomen exalbidum. Lumbi pilo tenuiore perlucente, cute violacea. Nates tuberosæ nudæ, sanguineæ. Sutura abdominis longitudinalis, nuda, sanguinea. Cauda abbreviata. Ungues acutiusculi, pollicum rotundati. Georgii.

Maimon. 7. *S. semicaudata subbarbata*, genis cæruleis striatis, natibus calvis.

Cynocephalus, Gesn. quadr. 93. t. 93. *Clus. exot.* 370.

Cynocephalus 2. Jonst. quadr. t. 59. f. 4.

Cercopithecus cynocephalus, antèrius longis pilis, naso violaceo nudo. *Briss. quadr.* 214.

Mandrill. Buffon hist. nat. XIV, p. 154. T. 16. 17.

MAMMALIA PRIMATES. Simia.

Ribbed-nose ape. *Pennant Synops.* p. 103. n. 69.

Simia Maimon. Schreber Saeugthier. I. p. 74. T. VII:

Habitat in Guinea.

Differt a priori naso similiter caerulefcente, & deficiente verticis coma.

Portaria. 48. *S. semicaudata*, capite fuillo, roftro nudo, corpore fufco-olivaceo, natibus teftis, unguibus acuminatis.

Boddaert Naturf. 22. p. 17. t. 1. 2.

Habitat in Africa, xneyridum Aristotelis, 3 pedes & 6 pollices longus.

* * * *Cauda elongata: Cercopithecus, K&C Aristotelis.*

* *buccis faccatis, natibus calvis.*

Cynofu- 37. *S. caudata imberbis*, facie elongata, fronte fuliginofa, ros. fascia superciliari albida, genitalibus mafculis coloratis, unguibus convexis. *Scopoli delie. flor. et faun. in subric:*

Ticin. 1786. fol. P. I. p. 44. T. XIX.

Habitat in ---

Statura canis mediocris; corporis longitudo fere bipedalis:

Animal infidum, inquietum, falaciffimum.

Hama- 8. *S. caudata cinerea*, auribus comofis, unguibus acutiufculus. natibus calvis.

Simia aegyptiaca, cauda elongata, elunibus tuberosis nudis:

Haffelq. it. 189.

Simia fupra aures comata. Alpin. hift. nat. Aeg. p. 242.

T. 17-19.

Cynocephalus. Gefn. quadr. p. 252. fig. p. 253.

Dog-faced ape. Penn. fynops. p. 107. n. 72. *Tab.* 14. f. 1.

Simia Hamadryas. Schreber Saeugth. I. p. 82. T. X.

Habitat in Africa:

Corpus cinereum. Cauda longitudine vix corporis. Aures

longa coma utrinque dependente galericuli in modum.

Nates calvae fanguinolenta:

Veter. 9. *S. caudata barbata alba, barba nigra.*

Cercopithecus barbatus albus, barba nigra. Briff. quadr. p. 147.

Simia alba feu incanis pilis, barba nigra promiffa. Raj. quadr. p. 158.

Lowando. Buffon hift. nat. T. XIV. p. 169.

q. *Simia lactea barbata. Penn. fynops.* p. 110.

Habitat in Zeylona.

- Silenus. 10.** *S. caudata barbata nigra, barba nigra proluxa.*
Cercopithecus barbatus niger, cæsarie proluxa faciem
cingente. Briss. quadr. 209.
Simia Callitrix magnitudine magnorum cynocephalorum.
Alpin. æg. p. 242. t. 21.
- β.** *Simia Silenus caudata barbata, corpore nigro; barba*
nivea proluxa. Syst. edit. X. p. 26.
Cercopithecus barbatus niger, barba incana promissa.
Raj. quadr. p. 158.
Ouanderon. Buffon hist. nat. T. XIV. p. 169. T. 18.
Lion-tailed ape. Pennant syn. p. 109. n. 73. T. 13. A. f. 1.
Simia Silenus. Schreber Sæugth. Tom. I. p. 88. sqq. Tab. XI.
Habitat in Zeylona et reliqua India.

- Faunus. 11.** *S. caudata barbata, cauda apice floccosa.*
Cercopithecus barbatus infra albus, barba incana mucro-
nata, cauda in floccum. Briss. quadr. 209.
Cercopithecus barbatus 1. Clus. exot. p. 371.
Malbrouck. Buffon hist. nat. T. XIV. p. 224. Tab. 29.
Simia Faunus. Schreber Sæugth. I. p. 90. T. XII.
Habitat in Bengala.
Corpus nigricans. Pectus et abdominis anteriora alba.
Barba incana mucronata. Ungues humani.

- Cyno- 15.** *S. caudata imberbis, naribus bifidis elatis, cauda arcua-*
molgos. *ta, natibus calvis.*
Cercopithecus cynocephalus, naribus bifidis elatis, natibus
calvis. Briss. quadr. 213.
Cercopithecus angolensis major. Raj. quadr. 155.
Macaque. Buffon hist. nat. XIV. p. 190. t. 20.
Hare-lipped ape. Penn. syn. p. 111. n. 74.
Simia cynomolgos. Schreber Sæugth. I. p. 91. T. XIII.
Habitat in Africa; vigiliis noctu instituit in arboribus,
vix a sequente diversa.

- Cyno- 16.** *S. caudata imberbis flavescens, ore producta, cauda*
phalos. *recta, natibus calvis.*
Cercopithecus cynocephalus ex viridescens et flavican-
tibus pilis. Briss. quadr. 213.
Cercopithecus. Jonst. quadr. t. 59. f. ult.
Habitat in Africa.
Simillima S. Inuo, sed caudata.

MAMMALIA PRIMATES. Simia.

Diana. 17. *S. caudata barbata*, fronte barbaque fastigiata. *Ad. Stöckh.* 1754. p. 210. Tab. 6.

Cercopithecus barbatus fuscus, punctis albis inspersis, barba alba. *Briss. quadr.* p. 148. n. 23.

Cercopithecus barbatus guineensis. *Raj. quadr.* 159.

Cercopithecus barbatus 2. *Clus. exot.* 371.

Spotted ape. *Penn. syn.* p. 112. n. 75.

Simia Diana. *Schreber Sæugth.* I. p. 94. T. XIV.

Habitat in Guinea.

Junior ludibunda dejicit omnia, peregrinos nutitando salutat, irata maxillas, hiantefore exagitat. Adultior. dentibus lanariis elongatis mordax & maligna evadit. Cubile purum servat; vocata respondet grece.

Magnitudo felis majoris, nigra punctis albidis. Dorsum postice ferrugineum. Femora subtus helvola. Gula pectusque albu. Frons pilis erectis albis fastigiatis linea transversa in formam lunæ crescentis. Barba fastigiata nigra, subtus alba longiorque, insidens tuberi adiposo. Linea alba ab ano ad genua ab exteriori latere femorum ducta. Cauda recta longa nigra, uti facies, aures, abdomen, pedes.

Sabæa. 18. *S. caudata imberbis flavicans*, facie atra, cauda cinerea, natibus calvis.

Cercopithecus ex cinereo flavescens, genis longis, pilis albis obfritis. *Briss. quadr.* p. 145. n. 17.

Cercopithecus de S. Jago. *Edw. av. V.* p. 210. t. 215.

Callitriche. *Buffon hist. nat. T. XIV.* p. 272. T. 37.

Green ape. *Penn. syn.* p. 112. t. 76.

Simia Sabæa. *Schreber Sæugth.* I. p. 100. t. XVIII.

Habitat in Insulis promontorii viridis, ad caput bonæ spei, et in finitimis regionibus.

Corpus statura Dianæ s. Aygulæ, magnitudine cati, supra cinerea-viridi-flavescens; subtus gula, pectore, abdomine, femoribus album. Facies nuda, atra. Tempora ex albedo flavescencia pilis longioribus reversis; supercilia nigra setosa. Cauda recta, longitudine corporis, cana. Pedes cinerei; ungues rotundati, sed in anticis avati.

Cephus. 19. *S. caudata*, buccis barbatis, vertice flavescente, pedibus nigris, cauda apice ferruginea.

Cercopithecus nigricans, genis & auriculis longis pilis ex albo flavicantibus, ore cærulecente. *Briss. quadr.* 206.

Cerco-

Cercopithecus barbatus alius *Guineensis*. *Raj. quadr.* 156.

Monstac. Buffon hist. nat. T. XIV. p. 285. t. 39.

Simia Cephus. Schreber Sæugth. I. p. 101. T. XIX.

Habitat in Guinea.

Corpus statura Dianæ, fuscum, subtus. cerulefcente-candicans. Caput pilis arrectis albidis; lunula superciliorum alba transversa; palpebræ superiores albæ; buccæ pilis patulis; os cerulefcentis.

Æthiops. 38. S. caudata imberbis, capillitio erecto lunulaque frontis albis. Syst. nat. ed. X. p. 28. n. 14.

Mangabey. Buffon hist. nat. T. XIV. p. 244. t. 82. 83.

White eye-lid ape. Penn. syn. p. 114. n. 77.

Simia Æthiops. Schreber Sæugth. I. p. 105. T. XX. XXI.

Habitat in Madagascar.

Aygula. 21. S. caudata subimberbis grisea, eminentia pilosa verticis reverfa longitudinali. Osbeck iter. 99.

Simia nigra magnitudinis mediæ. Edw. av. 221. t. 311.

Aigrette. Buffon hist. nat. T. XIV. p. 190. t. 21.

Simia Aygula. Schreber Sæugth. I. p. 106. T. XXII.

Habitat in India, præsertim Java.

Corpus griseum lupi coloris, subtus gula, pectore, abdomineque albicans. Cauda corpore longior cinerea attenuata. Facies planiuscula, albida, nuda. Nasus depressus, brevissimus, ab ore remotus, lacuna labii superioris gemina. Bucca subbarbata, pilis sursum versis. Supercilia frontis gibba, setosa, prominentia. Pedes nigri, semipalmati. Ungues pollicum rotundati, reliqui oblongi. Auriculæ acutiusculæ. Sutura arcuata ab aure versus oculos deorsum ad basin maxillæ inferioris. Sutura alia cubiti longitudinali.

Varietas? mea capite rotundiore, facie minus nigra, colore corporis minus ferrugineo; ligata saltat continuo.

niçitans. 23. S. caudata imberbis nigra punctis pallidis adpersa, naso albo, pollice palmarum brevissimo, natis testis.

Cercopithecus angolensis alius, totum niger, at insperso cano nigredini per totus corpus, naso albo. Marcgr. Brasl. p. 227.

Habitat in Guinea, ludibunda, capite continuo niçitans apud Profess. Botan. Burmannum Amstelodami visa.

Magnitudo fere Sylvani. Os breve. Facies pilosa. Orbitæ nudæ. Irides luteæ. Pili corporis nigri, annulis

MAMMALIA PRIMATES. Simia.

aliquot pallidis. Labia & mentum albida. Cauda recta cylindrica, corpore longior. Pedes & cauda nigra. Pollex palmarum non longior primo articulo indicis. Cl. Alstroemer.

Sinica. 39. *S. caudata imberbis, capillitio undique horizontaliter caput obumbrante. Mantiss. plant. 2. p. 521.*

Bonnet chinois. *Buff. hist. nat. T. XIV. p. 224. tom. 30.*

Chinesse ape. *Penn. synops. p. 117. n. 83.*

Simia finica. *Schreber Saeugth. I. p. 108. t. XXIII.*

Habitat in Bengala.

Cauda corpore multo longior: Ungues pollicis rotundi, reliquorum digitorum oblongi.

Nemæus. 40. *S. caudata imberbis, buccis barbatis, cauda alba. Mantiss. plant. 2. p. 521.*

Cercopithecus cinereus, genis longis pilis ex albo flavicantibus oblitis, torque ex castaneo purpurascens. Brisson. quadr. p. 146.

Douc. *Buffon hist. nat. T. XIV. p. 298. T. 41.*

Cochinchina ape. *Penn. syn. p. 119. n. 85.*

Simia Nemæus. *Schreber Saeugth. I. p. 110. t. XXIV.*

Habitat in Cochinchina.

Statura bipedalis. Facies fere spadicea; aures ejusdem coloris. Frontis fascia angusta magis fusca; pili suprapositi nigri; pili faciem cingentes albidus flavidis intermixtis: Colli ad anteriora torquis ejusdem coloris ac frontis fascia. Humeri & brachia superiora nigra; manus albida; inguina ejusdem coloris. Crura superius, ut et digiti pedum nigri. Pedes ipsi inde a genibus fuscii. Ex hac specie potissimum Bezoar sumitur.

Mona. 41. *S. caudata barbata, lunula superciliari elata ex albo grisea.*

Cercopithecus pilis ex nigro & rufo variegatis vestitus, pedibus nigris, cauda cinerea. Briss. quadr. p. 141.

Mone. *Buff. hist. nat. T. XIV. p. 258. t. 36.*

Varied ape. *Penn. syn. p. 118. n. 84.*

Simia Mona. *Schreber Saeugth. I. p. 97. t. XV.*

Habitat in Mauritania & calidiore Asia.

Animal sesquipedale, blandum, docile, frigus ferens.

rubra. 42. *S. caudata barbata, buccis barbatis, vertice, dorso caudaque ex rufo sanguineis.*

Pates. Buffon hist. nat. T. XIV. p. 208. t. 25. 26.

Red ape. *Penn. syn.* p. 116. n. 8.

Simia Mona: *Schreber Saength.* I. p. 98. t. XVI.

Animal sesquipedale. Fascia supra oculos nunc alba, nunc nigra. Cauda corpore longior.

Talapoin. 43. *S. caudata barbata, buccis barbatis, auribus, naso & pedum plantis nigris.*

Talapoin. *Buffon hist. nat. T. XIV. p. 287. t. 40. Schreber Saength.* I. p. 101. t. XVII.

Altitudine pedem non superat. Cauda sesquipedalis.

Petaurista. 44. *S. caudata barbata, dorso, cauda superiore, & pedum anteriore latere ex olivaceo nigris, facie nigra, nasi macula triquetra nivea.*

Blanc-nez. *Allamand édit. de l'hist. nat. de Buffon. T. XIV. p. 141. t. 39.*

Simia Petaurista: *Schreber Saength.* I. p. 103. t. XIX. B. *Habitat in Guinea.*

Blandum & agile animal, 13 pollices altum, cauda 20 circiter pollices exquant.

Maura. 45. *S. caudata barbata, buccis & universa facie, palpebris & regione ab oculis ad nasi finem protensa exceptis, barbata, corpore ex luteo fusco.*

Middle-sized black monkey. *Edw. av. 3. p. 221. t. 311.*

Simiolus ceilonicus. *Seba thes. I. p. 77. t. 48.*

Negro ape. *Pennant syn. p. 115. n. 80.*

Simia Maura: *Schreber Saength.* I. p. 107. t. XXII. B.

Habitat in Zeylona & Guinea.

Agile animal, dum sedet, 7 pollices altum. Cauda corpore longior.

Roloway. 46. *S. caudata barbata, capite, dorso, manibus pedibusque extrinsecus nigris, interius una cum abdomine & corona pilorum faciem triquetram ambiente albis.*

Palatine ou Roloway. *Allamand édit. de l'hist. nat. de Buffon. T. XV. p. 77. t. 13.*

Habitat in Guinea.

Animal blandum sesquipedale, cauda ejusdem longitudinis.

* * *buccis non saeculis, natibus testis.*

* *cauda prehensilis*

Beelzebub. 19. *S. caudata barbata nigra, cauda prehensilis, extremo pedibusque brunneis.*

Cercopithecus niger, pedibus fuscis. Briffon quadr. 194.

MAMMALIA PRIMATES. Simia.

Guariba. *Marcgr. brasl. p. 226.*

Howling baboon. *Bancroft Guiana. p. 133.*

Onarine *Buffon hist. nat. T. XV. p. 5.*

Habitat in America meridionali.

Gregatim noctu & interdum vagatur, continuo & satia sonoro ululatu sylvas replens, ferox.

Corpus magnitudine vulpis nigrum, pilis longis levissimis nitidum. Barba rotunda nigra. Pedes & cauda extremum fusca.

Seniculus. 13. *S. caudata barbata rufa, cauda prehensili.*

Cercopithecus barbatus saturate spadiceus. Briss. quadr. 206.

Cercopithecus barbatus maximus ferruginosus stenorofus, Alacuta, Singe rouge. Barrere Franc. équin. p. 150.

Arabata. Gumilla Orenoquo. 2. p. 8.

Alouate. Buffon hist. nat. T. XV. p. 5.

Habitat Carthagenæ, in Cayenna, ad Amazonum fluvium in sylvis. Transeuntes ex arboribus voce ingrata, rauca admodum, simul clamosa minusque audienda salutant; vix adspici se sinunt, quin illico clament. Visitant musæ fructibus. Jacquin.

Corpus mediocre, colore conformi rubro. Os hominis instar in anteriore faciei parte mento propendente satis magno, ut in homine.

Paniscus. 14. *S. caudata imberbis atra, cauda prehensili, palmis tetradactylis.*

Simia fusca major, palmis tetradactylis, cauda prehensili ad apicem subtus nuda. Brown. jamaic. 489.

Cercopithecus in pedibus anterioribus pollice carens, cauda inferius versus apicem pilis destituta. Briss. quadr. 211.

Coaita. Buffon hist. nat. T. XV. p. 16. t. 1.

Quato. Bancroft Guiana. p. 131.

Simia Paniscus. Schreber Sacugth. 1. p. 115. t. XXVI.

Habitat in America meridionali. Agilis, audax, gesticalationum & vindictæ amans, frigoris impatiens.

Corpus atrum, aliquando potius fuscum, magnitudine molossi. Pedes omnes, quemadmodum abdomen, graciles; hi & cauda dimidia exterior nunc brunnea, nunc cum reliquo corpore atra. Caudæ extremitas hinc nuda, qua, quicquid a terra elevat, prehendit. Digi pedum 4-5. Hallmann; est vero pollex reliquis minor, introrsum a reliquis remotus. Ungues manuum rotundati, pedum oblongiusculi. D. Aymen. Faci nuda rubra. Auriculæ nudæ.

trepada. 20. S. caudata imberbis, capillitio erecto, manibus pedibusque cæruleis, cauda prehensili villosa.

Simia, cauda comata. *Edw. av. t. 212.*

Habitat in Surinamo.

Corpus fuscum subtus ferrugineum. Capitis pili erecti nigri in capillitium hemisphaericum. Cauda pilosa. Ungues rotundati. An sola varietas Apella?

Fatuellus. 28. S. caudata imberbis, cauda prehensili, capitis fasciculis pilorum duobus corniculorum æmulis. *Briss. quadr.*

195. n. 3.

Habitat in America meridionali.

Corpus : Facies, latera, abdomen, crura anteriora fusca; Vertex, medium dorſi, cauda, pedes, crura posteriora nigra. Ungues longi obtusiusculi. Cauda spiralis. An reapse differt ab Apella?

Apella. 29. S. caudata imberbis, cauda subprehensili, corpore fusco, pedibus nigris, natibus tectis.

Cercopithecus fuscus, capitis vertice nigro. Briss. quadr.

p. 137. n. 1.

Sajou. Buffon hist. nat. T. XV. p. 37. t. 4.

Simia Apella. *Schreber Sæugth. I. p. 119. t. XXVIII.*

Habitat in America meridionali.

Agilis, undique circumspiciens, frigoris non valde impatiens, sono pulli meleagridis famelici. Faciei peripheria quasi a barbitonfore rasa.

Capucina. 30. S. caudata imberbis fusca, cauda prehensili hirsuta, pileo artubusque nigris, natibus tectis.

Simia imberbis nigra, cauda longa hirsuta, facie flavescente. *Mus. Ad. Frider. p. 2. t. 2.*

Cercopithecus totus niger. Briss. quadr. 139. n. 5.

Sai. Buffon hist. nat. T. XV. p. 51. t. 8.

Weeper. Pennant syn. 127. n. 94.

Simia Capucina. *Schreber Sæugth. I. p. 120. t. XXIX.*

Habitat in America meridionali. Tarsis incedit, non saltat, misera & ejulans semper, clamore horrendo hostes pellit;

Nota primaria Simiarum sunt Cauda recta s. prehensilis; Nates calvae s. tectæ; Ungues rotundati s. subulati; Mentum barbatum s. imberbe; Buccae saccata s. non saccata.

Tecto comis arborum intexto altissimisque columnis innixo obumbrantur terræ a fluantes, inter tropicos Indiæ, ne adurantur; hæc tectum inhabitant genera Simiarum cum Psittacis volucibusque aliis.

MAMMALIA PRIMATES. Simia,

fridet sæpius uti cicada ; irata latrat more catuli, Caudam spiralem gerit, circumque collum sæpius conjicit. Moschum olet.

Corpus magnitudine felis domestica, fuscum, at caput, pedes, caudaque nigra. Facies fronte nunc nigra nunc incarnata. Dentes laniarii approximati. Nasus versus oculos carinatus. Ruga varicosa nigra retrahilis supra frontem ante pileum. Cauda longa semper curvata, pilis longioribus villosa. Pedes situ transverso ponit, ut postici semper ante anteriores collocentur.

sciurea. 31. *S. caudata imberbis, occipite prominulo, unguibus quatuor plantarum subulatis, natibus tectis.*

Simia imberbis, cauda longa, occipite gibbo, unguibus plantarum quatuor oblongis. Mus. Ad. Frider. p. 3.

Cercopithecus pilis ex fusco flavicante & candicante variegatis, pedibus ex flavo rufescentibus. Briss. quadr. 197.

Simia americana parva subbarbata, caudata, ore e cæruleo nigro, unguibus oblongis. Wagner mus. Baruth. p. 1. t. 1.

Cercopithecus minor luteus. Barrere franc. équinox. p. 151. Caïtaia. Marcgr. bras. p. 227.

Saimiri. Buffon hist. nat. F. XV. p. 67. t. 51.

Orange ape. Penn. syn. p. 128. n. 95.

Simia sciurea. Schreber Sæugth. I. p. 121. t. XXX.

Habitat in America meridionali. Lepidum animal quiescit supra abdomen ; alloquentis aspicit fauces, climatis Europei impatiens.

Corpus sciuri, sedentis animalis septem pollices altum, griseo-virens, subtus albidum. Ulnæ & tibiæ ferrugineæ. Cauda villosa, apice nigra, corpore duplo longior. Pollicum ungues rotundati. Os fusco-cærulescens. Supercilia setacea. Auris villis raris albidis.

Morta. 32. *S. caudata imberbis spadicea, ore fusco, cauda nuda squamosa.*

Cercopithecus americanus minor Monkie dictus. Séba, mus. I. p. 22. t. 33. f. 1.

Cercopithecus dorso spadiceo, ventre glabro, cauda murina. Briss. quadr. 201.

Habitat in America.

Ætate solum minore a S. sciurea differre videtur.

Species simiarum inter mammalia plurima, sed paucissima rito descripta & cognita, plurimæ obscuræ ignorantur.

Syrichta. 33. *S. caudata imberbis, ore ciliisque vibrissatis.*

Cercopithecus caudatus imberbis, ore fusco, cauda nuda squamosa, Gronov. Zooph. 21.

Cercopithecus luzonicus minimus, Pet. gar. 21. t. 13. f. 11.

* * cauda non prehensili.

Pithecia. 22. *S. caudata imberbis, vellere nigro apice albo, cauda nigra villosissima.*

Simia minima capite albido, dorso fusco pene rufescente, cauda crinita. Brown. jam. 489.

Cercopithecus pilis nigris apice albo vestitus, cauda pilis longissimis nigris obita. Briss. quadr. 195.

Saki Buff. hist. nat. T. XV. p. 88. t. 12.

Sakkawinke. Bancroft Guian. p. 80,

Fox-tailed ape, Penn. syn. p. 130. n. 98.

Simia Pithecia, Schreber Saecul. 1. p. 125, XXXII.

Habitat in America meridionali, lepidissima, facile mansuescens.

Corpus aliquando sequispedale nigrum, pilis omnibus apice albis. Facies pilis brevissimis albidis. Gula & abdomen pilis sordide albicantibus. Ungues longi obtusi.

Jacchus. 24. *S. caudata, auribus villosis spatulis, cauda hirsutissima curvata, unguibus subulatis: pollicum rotundatis.*

Cercopithecus tæniis transversis alternatim fuscis & e cinereo albis variegatus, auriculis pilis albis circumdatis.

Briss. quadr. 202.

Cercopithecus brasiliensis 3. Sagouin. Clus. exot. 372. t. 372.

Galeopithecus, qui Sagouin a Brasiliensibus nominatur. Gesn. quadr. p. 369.

Cagui minor. Marcgr. bras. 227.

Sanglin on Cagui minor. Edw. av. V. p. 15. t. 218.

Ouistiti. Buff. hist. nat. XV. p. 96. t. 14. Pall. n. nord. Beitr. 2. p. 41.

Striated ape. Penn. syn. p. 132. n. 100.

β. *Cercopithecus ex albido flavescens, moschum redolens.*

Briss. quadr. 197.

Cercopithecus brasiliensis primus. Clus. exot. 371.

Habitat in Brasilia, agilis, irrequieta, scandens more sciuri, incurvata non prehensili cauda; rodit ligna, ut mures, edit insecta, fructus, lactinia, panes triticeos martiosque, theam, passeris, indomita, morsitans, felibus infestissima, quibus se sub earum ventre affigit. Sequitur stridor sibilans, odor moschi.

MAMMALIA PRIMATES. Simia.

Corpus sciuro minus, vix octo pollices longum, griseo-cinereascens. Caput minimum atrum, Labia & frons alba, sed inter oculos flavescent. Aures antice tegit barba alba, longitudine totius auriculæ, ne flatus intret. Cauda corpore longior albo - annulata. Dentes primores 4: intermedii latiores paralleli; laterales acuti, minus apice distantes.

Œdipus. 25. *S. caudata imberbis, capillo dependente, cauda rubra, unguibus subulatis.*

Cercopithecus pilis ex fusco & rufo vestitus, facie ultra aurículas usque nigra & nuda, vertice longis pilis albis obfito. Briss. quadr. p. 150. t. 28.

Little-Lion-monkey. Edw. av. 3. p. 195. t. 193.

Cagui major Brasiliensibus. Marcgr. bras. 227.

Pinche. Buff. hist. nat. T. XV. p. 114. t. 17.

Red-tailed ape. Penn. syn. 133. n. 102.

Habitat in America meridionali. Agilis & lepida gestibus leonem imitatur, S. Jaccho satis affinis magnitudine, paulo tamen minore, odore moschi. Vox muris.

Corpus parvum, sex circiter, pollicum, griseum, subtus album, Caput capillitis dependente longo albo. Facies nigra, ultra aures pilis raris albis. Verruca in utraque bucca. Irides ferrugineæ. Auriculæ subrotundæ, nigre, nudæ. Ungues omnes subulati, excepto pollicis palmarum brevi. Cauda corpore duplo longior, parum pilosa, basi rufa, ceterum nigra, Ani regio rubra.

Rosalia. 26. *S. caudata imberbis, capite piloso, faciei circumferentia pedibusque rubris, unguibus subulatis.*

Cercopithecus ex albido flavicans, faciei circumferentia saturate rufa. Briss. quadr. 200.

Cercopithecus minor dilute olivaceus, parvo capite, Acarima à Cayenne. Barrere Fr. équin. p. 151.

Marikina. Buff. T. XV. p. 108. t. 16.

Silki monkey. Penn. syn. p. 133. n. 101. t. 15.

Simia Rosalia, Schreber Saeguth. I. p. 130. t. XXXV.

Habitat in America meridionali, lepida, & frigoris minus impatiens, quam affines.

Simia suspensa, memores, potulantes, imitatores, gesticulatores, indociles, minantur, ridens, cibos bucca macerant, pediculos venantur, tadu excellunt, natos ulnis gerunt. terrefacta cacant immunda, urina meatu saepe disfindo a vulva; utero etiam gerentes libidinosæ; phytiphaga.

Corpus ex albedo flavicans. Pollices omnes unguibus rotundatis. Auriculæ nudæ, sub capitis pilis occultatæ. *Briss.*

argentata. 47. S. caudata imberbis exalbida, facie rubra, cauda fuscescente. *Mant. pl. 2. p. 521.*

Cercopithecus ex cinereo albus argenteus, facie auriculisque rubris splendidibus, cauda castanei coloris. *Briss. quadr. p. 142. n. 12.*

Mico. *Buffon hist. nat. T. XV. p. 121. t. 18.*

Fair ape. *Penn. syn. p. 134. n. 103.*

Simia argentata. *Schreber Sæugth. I. p. 131. t. XXXVI.*

Habitat ad Amazonum fluvium, septem pollices longa. Ungues incurvi, pollicum plantarum rotundati.

Midas. 27. S. caudata imberbis, labio superiore fissio, auribus quadratis nudis, unguibus subulatis, pedibus croceis. *Mus. Ad. Frid. 2. p. 4.*

Cercopithecus minimus niger leontocephalus, auribus elephantinis. *Barrere Fr. équin. p. 151.*

Cercopithecus niger minimus, manibus & pedibus croceis. *Edw. av. 196. t. 196.*

Cercopithecus niger, pedibus croceis. *Gronov. zooph. 20. Cai. Raj. quadr. 155.*

Tamarin. *Buff. hist. nat. XV. p. 92. t. 13.*

Habitat Surinami.

Magnitudo sciuri. Manus & pedes crocei. Corpus atrum. Cauda duplo longior, nigra. Aures nudæ, amplæ, re-tusæ. Ungues omnes subulati s. ferini, exceptis pollicum plantarum rotundatis s. humanis.

3. LEMUR. *Dentes primores superiores IV: inter-* *mediis remotis.*

inferiores VI longiores,
porrecti, compressi,
paralleli, approximati.

Laniarii solitarii, approximati.

Molares plures sublobati: anticæ
longiores, acutiores.

tardigradus. 1. L. ecaudatus subferrugineus. *Schreber Sæugth. I. p. 134. t. XXXVIII.*

Simia unguibus indicis pedum posteriorum longis, incurvis & acutis. *Briss. quadr. 190. n. 3.*

MAMMALIA PRIMATES. Lemur.

Simia cynocephala unguibus indicis longis, incurvis & acutis. *Briss. quadr.* 191. n. 2.

Animalculum cynocephalum tardigradum dictum. Seba thes. I. p. 55. t. 35.

Cercopithecus ceylonicus seu *tardigradus* dictus major. *Seb. thes.* I. p. 75. t. 47. f. 1.

Loris. Buff. hist. nat. T. XIII. p. 210. t. 30.

Tail-less Maucauco. Penn. syn. p. 135. t. 16. f. 1.

Habitat in Zeylona, agilis, auditu excellens, monogamus.

Statura sciuri, subferruginea, linea dorsali subfusca; gula albidior. Linea longitudinalis oculis interjecta alba.

Facies tecta. Auriculæ urceolatae, intus bifoliae. Pedum palmæ plantæque nude. Ungues rotundati: indicum plantarum vero subulati. Cauda nulla. Mammæ 2 in pectore, 2 in abdomine versus pedus.

Indri. 9. *L. ecandatus niger.*

Indri. Sonner. it. 2. p. 142. t. 88.

Habitat in Madagascar, 3½ pedes altus, junior facile circumdandus, & ab incolis ad venatum adaptatus; vox ejulantis infantis.

Dentes canini in utraque maxilla 8, primores in superiore 2, in inferiore approximati 4; pedes pentadactyli, unguibus complanatis acutis, plantarum pollice prægrandi; pili densi, sericei, in ani regione crispi, albi; versus genitalia & in facie grisei, ceterum nigri; caudæ vestigium tactu discernendum.

Potto. 6. *L. caudatus subferrugineus, cauda unicolore.*

Potto. Bosman. bestuyo. van de guin. kust. II. p. 30. f. 4.

Habitat in Guinea, præter caudam priori simillimus.

Mongoz. 2. *L. caudatus griseus cauda unicolore. Schreber. Saeugth. I. p. 132 sqq. t. XXXIX. B.*

Mongoz. Edw. av. 5. p. 12. t. 216. Walch Naturforsch. VIII. p. 26.

Woolly Maucauco. Penn. syn. p. 136. n. 105.

Corpus griseum vel potius fuscum, subtus album. Fascia ocularis nigra. Manus dilute cinereæ.

β. *corpore griseo vel fusco, facie manibusque nigris. Edw. av. 5. p. 13.*

γ. *corpore griseo vel nigro, macula nigra circa oculos.*

Simia-sciurus lanuginosus fuscus ex Johannæ insula, an Cercopithecus indicus Bugee dictus Raji? Petiv. gaz. p. 26. t. 17. f. 5.

MAMMALIA PRIMATES. Lemur.

43

- ♂. corpore fusco, naso manibusque albis.
Profimia fusca, naso, gutture, pedibusque albis. *Briss. quadr. p. 156. n. 2.*
 - ♀. corpore toto fusco.
Simius Zambus. *Nieremb. hist. nat. p. 176.*
Profimia fusca. *Briss. quadr. p. 156. n. 1.*
 - ♀. corpore griseo, facie nigra, manibus fulvis. *Schreber Saeugth. I. p. 138. t. XXXIX. A.*
Profimia fusca, rufo-admixto, facie nigra, pedibus fulvis.
Briss. quadr. p. 157. n. 3.
Mongows. *Buffon hist. nat. XIII. p. 174. t. 26.*
Habitat in insula Madagascar, S. Johanne & vicinis.
Ungues indicis plantarum subulati, longiores.
- Macaco. 3. L. caudatus niger, collari barbato. *Schreber Saeugth. I. p. 142. t. XL. A.*
Black Maucaco. *Edw. av. 5. t. 217.*
Ruffed. Maucaco. *Penn. syn. p. 138. n. 107.*
- β. corpore fusco.
Lemur cauda floccosa, corpore fusco. *Gronov. zooph. 22.*
 - γ. corpore albo.
Antavarre tout blanc. *Cauche rel. de Madag. p. 127.*
 - ♂. corpore nigro & albo mixto. *Schreber Saeugt. I. p. 142. t. XL. B.*
Vericassi. Flacourt voy. p. 153.
Vari. Buffon hist. nat. XIII. p. 174. t. 27.
Habitat in insulis Madagascar, S. Johanne & vicinis.
Cubile purum ferrat; radiis solis delectatur; dormit in loco tenebricoso; respuit ova, carnes, pisces; rugitus edit fere instar leonis.
Plantarum ungues indicis fere subulati.
- Catta. 4. L. caudatus, cauda albo nigroque annulata. *Mus. Ad. Frid. 2. p. 5. Schreber Saeugth. I. p. 143. t. XLI.*
Hermann Naturf. XV. p. 159.
Profimia cinerea, cauda cincta annulis alternatim albis & nigris. *Briss. quadr. p. 222.*
Simia-sciurus madagascariensis sive Maucaco. *Edw. av. 4. 197. t. 197.*
Mococo. Buff. hist. nat. XIII. p. 174. t. 22.
Ring-tail Maucaco. *Peun. syn. 137. n. 106.*
Habitat in insulis Madagascar, Franciæ, S. Johanne, gregaria, mitissima, scandit omnibus pedibus, ut simia

MAMMALIA PRIMATES. Lemur.

Vidit at fructibus, oleribus, radicibus; cibos tenet manibus; tardiuscula, placida & tranquilla murmurat ut felis. Oculus dexter diurnus pupilla lineari perpendiculari; sinister nocturnus pupilla orbiculata magna in mea erat; an sic natura vel faso? Ungues indicis palmarum non longiores aut subulati.

auratus. 7. *L. caudatus cinereus, cauda ferruginea. Miller on various subjects of natural history. T. XIII. A. B.*

Habitat in Madagascar.

Ungues omnes plani rotundati.

bicolor. 8. *L. caudatus, supra ex atro griseus, subtus fordide albus, macula frontali cordata fordide alba. Miller on various subjects. T. XXXII. f. A.*

Habitat in America meridionali.

Capite canem molossum refert. Ungues omnes subulati.

laniger. 10. *L. caudatus ex flavo rufescente testaceus subtus albus, cauda ex rufescente fulva unicolore.*

Maquis à bourres Sonner. it. 2. p. 142. t. 89.

Habitat in Madagascar, sine cauda novem pollices ultra pedem longus.

Pili mollissimi crispi, in regione lumborum ex rubescente fulvi; facies nigra; auriculæ minutæ; oculi magni, ex viridescente grisei; dentes primores in maxilla superiore 2, in inferiore 4; cauda 9 pollices longa; pedes pentadactyli, unguibus longis, pollicum ungue rotundato.

volans. 5. *L. caudatus, membrana ambiente volitans. † Pallas Ad. Ac. Sc. Petrop. 1780. P. I. Schreber Sæugth. I. p. 146. t. XLIII.*

Cato-Similus volans Camelli. Petiv. gaz. 14. t. 9. f. 8. Ad. angl. 277. n. 1065.

Vespertilio admirabilis. Bont. jay. 68. t. 69.

Felis volans ternatea. Seb. mus. 1. p. 93. t. 58. f. 2. 3.

Habitat in Gufurate, insulis Philippinis & Moluccis, viditans fructibus arborum, gregaria, vespertino tempore.

Membrana more sciuri s. muris volantis a capite ad manus, a manibus per latera ad plantas, a plantis ad apicem caudæ expansa. Ungues acuti. Mammæ 2 pectorales. Ex mammis videtur lemuribus s. simiis proximum animalculum. Hujus descriptio & generica notæ, dum modo juniora exempla in Europam pervenerint, etiamnum deficiunt.

4 VESPERTILIO. *Dentes omnes erecti, acuminati, approximati.*

*Manus palmatæ volitantes
membrana corpus cingente.*

* *Dentibus primoribus in utraque maxilla quatuor.*

Vampyrus. I. V. ecaudatus, naso simplici, membrana inter femora divisa.

Ternate bat. Penn. syn. p. 359. n. 274.

a. colore potissimum nigro. Schreber *Sacughiere*, I. p. 153. t. XLIV.

Pteropus rufus aut niger, auriculis brevibus acutiusculis. Briss. quadr. p. 153.

Vespertilio ingens. Clus. exot. p. 94.

Vespertilio volans. Bont. jav. 68. t. 69.

Canis volans ternatanus orientalis. Seb. mus. I. p. 91. t. 57. f. 1. 2.

Chien volant. Daubenton ad. Paris. 1759. p. 384.

Rousslette. Buff. hist. nat. X. p. 55. t. 14.

β. corpore ex atro fusco.

Pteropus fuscus, auriculis brevibus acutiusculis, collo superiore rubro. Briss. quadr. p. 154.

Chauve-Souris de l'isle Sabuda dans la nouvelle Guinée. Dampier voy. V. p. 81. t. 5.

Great bat. Edw. av. 4. p. 180. t. 180.

Rousslette. Daubent. ad. Paris. 1759. p. 385.

Rougette. Buff. hist. nat. X. p. 55. t. 17.

γ. corpore stramineo.

Lesser Ternate bat. Penn. synopsis. p. 362. t. 31. f. 1. *Habitat in Africa occidentali, Asia meridionali, insulis oceanii indici, & australis. Noctu haurire sanguinem dormientium fervorum, cristas gallorum & lacrymas palmarum fertur, phlebotomus felicissimus in pleuritide. Magnis glomeribus aliquando adhæret arboribus.*

Dentes primores obtusiusculi; laniarii superiores solitarii, antice ad inferiorem dentem fulcati; inferiores bini cum dente primore parvo obtuso inter utrosque; molares obtusiusculi plures. Nares vix divisæ. Corpus magnitudine

Vespertilionum genus nocturnum volitat palmis expansis palmatis membranaque laterali. Phalanis inprimis viditans.

• MAMMALIA PRIMATES. Vespertilio

sciuri a 5-9 pollices longum. Manuum digitus primus separatus unguiculatus, secundus membrana affixus. Plantæ fissæ unguiculatæ, calcaneis postice exeuntibus in subulatam cartilaginem membranæ annexam. Membrana nictitans in cantho oculi majore. Uterus simplex.

Spectrum. 2. V. ecaudatus, naso infundibuliformi lanceolato. Schreber Sæugt. I. p. 159. t. XLV.

Pteropus auriculis longis patulis, naso membrana antrorsum inflexa aucto. Briss. quadr. 154.

Canis volans maxima aurita ex nova Hispania. Seb. mus. 1. p. 92. 58. f. 1.

Andira guacu, vespertilio cornutus. Piso brasl. p. 290.

Vampire. Buff. hist. nat. X. p. 55.

Habitat in America Australi. Rolander.

Nares antice infundibulum referentes, superne ascendentes in folium lanceolatum. Aures ovatae, interius lacinia subulata membranacea, longitudine auriculæ. Dentes laniarii solitarii magni; molares anteriores breviores obtusiores. Alarum digiti 4, quorum 1 annexus 2do; pollex brevis ungue arcuato. Pedes digitis 5 æqualibus, unguibus arcuatis. Calcaneus exferit tendinem subulatum secundum marginem membranæ inter pedes posticos, non coequentem eum opposito.

perspicillatus. 3. V. ecaudatus, naso foliato plano acuminato. Mus. Ad. Frid. p. 7. Schreber Sæugth. I. p. 160. t. XLVI. A.

Vespertilio americanus vulgaris. Seb. mus. 1. p. 90. t. 55. f. 2.

Habitat in America australi.

• Palmæ huic & sequenti digitis quinque.

Spasma. 4. V. ecaudatus, naso foliato obcordato. Schreber Sæugth. I. p. 158. t. XLVIII.

Vespertilio cauda nulla, naso foliato, auriculis maximis appendiculatis. Gronov. zooph. 1. p. 7. n. 27.

Vespertilio subrufus, auriculis duplicibus, naso gemino. Briss. quadr. p. 161. n. 4.

Glis volans ternatanus. Seb. mus. 1. p. 90. t. 56. f. 1.

Cordated bat. Penn. syn. p. 364. n. 278.

Habitat in Zeylona & insulis Moluccis.

Ovid. met. IV. 12.

Lucemque perosa;
Nocte volant, seraque tenent a vespera nomina.

MAMMALIA PRIMATES. Vespertilio.

47

hastatus. 6. V. ecaudatus, naso foliato trifolii figuram æmulante.

Schreber Sæugth. I. p. 161. t. XLVI. B.

Le Chauve-fouris fer de lance. *Buff. hist. nat.* XIII. p. 226. t. 33.

Javelin bat. *Penn. syn.* 363. n. 276.

Habitat in America australi, perspicillato affinis, obscure fuscus vel niger.

foricinus. 8. V. ecaudatus, rostro producto, naso foliato cordato. *Pal-las Spicileg. zoolog.* III. p. 24. t. III. *Schreb. Sæugth.* I. p. 161. t. XLVII.

Vespertilio cauda brevissima, naso foliato acuminato, auriculis subsimplicibus rotundatis. *Gron. zooph.* p. 7. n. 26.

Vespertilio americanus vulgaris. *Edw. av.* 5. 201. t. 201. f. 1.

Leaf bat. *Penn. syn.* 364. n. 277.

Habitat in America australi.

Cauda brevissima. Lingua papillis acutis obsita.

leporinus. 9. V. caudatus, labio superiore bifido. *Syst. nat. Ed.* X. p. 26. n. 5. *Schreber Sæugth.* I. p. 162. t. LX.

Noctilio americanus labio inferiore varicoso. *Syst. nat. Ed.* XII. p. 88. n. 1.

Vespertilio americanus rufus. *Briss. quadr.* 227.

Vespertilio cato similis americanus. *Seb. mus.* I. p. 89. t. 55. f. 1.

Chauve-souris de la vallée d'Ylo. *Feuill. obs.* I. p. 623.

Peruvian bat. *Penn. syn.* p. 365. n. 279.

Habitat in America meridionali, visitans fructibus arborum, ratto magnitudine æqualis.

* *Dentibus primoribus in maxilla superiore 4, in inferiore 6.*

auritus. 5. V. caudatus, naso oreque simplici, auriculis duplicatis capite majoribus. *Fn. succ.* 3.

Vespertilio auribus majoribus. *Frisch. av.* t. 103. *Edw. av.* 5. t. 201. f. 3.

Vespertilio caudatus, naso simplici, auriculis maximis inappendiculatis. *Gron. zooph.* p. 23.

Vespertilio murini coloris, auriculis duplicibus. *Briss. quadr.* 160.

Vespertilio auriculis quaternis. *Johnst. av.* p. 34. t. 20.

Oreillar. *Buff. hist. nat.* VIII. p. 118. t. 17. f. 1.

Habitat in Europa. Vere distincta a sequenti species.

auribus. 6. V. caudatus, naso oreque simplici, auriculis capite minoribus. *Fn. suéc.* 2.

Vespertilio murini coloris auriculis simplicibus. *Briss. quadr.* p. 158. n. 1.

Vespertilio. *Aldrov. ornith.* p. 575. 576.

Vespertilio auribus minoribus. *Frisch. av. t.* 102. *Edw. av. 4. t.* 201. f. 2.

Chauve-souris. *Buffon hist. nat.* VIII. p. 113. t. 16.

Common bat. *Penn. syn. p.* 371. n. 291.

Habitat in Europa.

Noctu volat; vidit in primis phalanis; prædatur a strigibus; capitur arctii lappæ calycibus candefactis; de terra non evolat. Hybernât mortuus, reviviscit superatis noctibus plumbeis initiis florescentiæ. Æstate fætens.

Anatome É. N. C. d. 2. a. 1. obs. 48.

Noctula. 10. V. caudatus, naso oreque simplici, auriculis ovalibus operculatis: operculo exili. *Schreb. Sæugth.* I. p. 166. t. LII.

Vespertilio. *Gesn. av. p.* 694. ic.

Vespertilioes alii. *Aldrov. ornith. p.* 575. 576.

Noctule. *Buff. hist. nat.* VIII. p. 128. t. 18. f. 1.

Great bat. *Penn. zool. br. ill. t.* 103.

Habitat in Gallia, Germania, Britannia, æstate fætens.

serotinus. 11. V. caudatus flavescens, auriculis brevibus emarginatis. *Schreber Sæugth.* I. p. 167. t. LIII.

Serotine. *Buff. hist. nat.* VIII. 129. t. 18. f. 2.

Habitat in Gallia & Germania.

Pipistrel. 12. V. caudatus ex atro fuscus, fronte convexa, auriculis ovatis, emarginatis, capite vix longioribus. *Schreber Sæugth.* I. p. 167. t. LIV.

Pipistrelle. *Buff. hist. nat.* VIII. p. 129. t. 19. f. 1.

Habitat in Gallia rarius in Germania, vix duos pollices longus, paulisper fætens.

Barbastel. 13. V. caudatus, buccis elatis pilosis, auriculis magnis fassius angulatis. *Schreber Sæugth.* I. p. 168. t. LV.

Barbastelle. *Buff. hist. nat.* VIII. p. 130. t. 19. f. 1.

Habitat in Burgundia, duos pollices longus.

hispidus. 14. V. caudatus pilosus, naribus canaliculatis, auriculis longis angustis. *Schreber Sæugth.* I. p. 169. t. LVI.

Campagnol volant. *Daubent. aî. Paris.* 1759. p. 388.

Autre

MAMMALIA PRIMATES. Vespertilio.

49

Autre chauve-souris. *Buff. hist. nat. X. p. 88. t. 20. f. 1. 2.*

Bearded bat. *Penn. syn. p. 367. n. 202.*

Habitat ad Senegal fluvium.

*** *Dentibus primoribus in maxilla superiore 4,
in inferiore 8.*

- picus. 15. V. caudatus**, naso simplici, auriculis infundibuliformibus appendiculatis. *Gronov. zooph. p. 7. n. 25. Pallas spicil. III. p. 7. Schreber Saeugth. I. p. 170. t. XLIX. Vespertilio ternataeus. Seb. mus. I. p. 91. t. 56. f. 2. 3. Mulcardin volant. Daubent. ad. Paris. 1759. p. 388. Autre chauve-souris. Buff. hist. nat. X. p. 92. t. 20. f. 3. Striped bat. Penn. syn. p. 368. n. 284. Habitat in Zeylona, ubi Kiriwonla audit.*

**** *Dentibus primoribus in maxilla superiore 2,
in inferiore 6.*

- Nigrita. 16. V. caudatus** ex flavescente fuscus capitis parte anteriore, pedibus caudaque nigris. *Schreber Saeugthiere, I. p. 171. t. LVIII. Marmotte volante. Daubent. ad. Paris. 1759. p. 385. Chauve-souris étrangère. Buff. hist. nat. X. p. 82. t. 18. Senegal. bat. Penn. syn. p. 366. n. 281. Habitat ad fluvium Senegal, quatuor pollices longus. Adanson.*

***** *Dentibus primoribus in maxilla superiore 2,
in inferiore 4.*

- Melofus. 17. V. caudatus**, cauda longe ultra membranam connatentem protensa, labio superiore pendulo. *Pallas spicil. 1001. III. p. 8. Bull-dog bat. Penn. syn. p. 366. n. 280. α. major, supra ex cinereo fuscus, infra cinereus, & in medio ventre fuscus. Schreber Saeugth. I. p. 171. 172. t. LIX. ic. inf. Mulot volant. Daubent. ad. Paris. 1759. p. 387. Autre chauve-souris. Buff. hist. nat. X. pag. 84. t. 19. f. 1. β. minor, supra subfuscus cinereo mixtus, infra sordide albus. Schreber Saeugth. I. p. 171. 172. t. LIX. f. sup. Autre chauve-souris. Buff. hist. nat. X. pag. 87. t. 19. f. 2. Habitat in insulis Americae oppositis.*

***** *Dentibus primoribus in maxilla superiore*
2, in inferiore 0.

cephalo- 18. V. caudatus, capite magno, labiis productis, naribus
res. spiraliibus, verrucis subocularibus, auriculis parvis non
operculatis. *Pallas spicil. Fasc. III. p. 10. t. 1. Schreber*
Saeugth. I. p. 172. t. LXI.

Habitat in Moluccis, 2½ pollices longus. Schlosser.
Lingua echinata. Pili supra cinerei, infra albi.

***** *Dentibus primoribus in maxilla supe-*
riore 0, in inferiore 4.

lepturus. 19. V. caudatus, naribus tubulatis, auriculis longis obtusis
operculatis, membranæ utrique pedes connectenti annexo
interius marsupio. *Schreber Saeugth. I. p. 173. t. LVII.*
Habitat in Surinamo. Rudolph.

Ferrum 20. V. caudatus, naso ferro equino simili, auribus caput
equinum. æquantibus non operculatis, cauda dimidia corporis
longitudine.

Fer à cheval. Buff. hist. nat. VIII. p. 131. t. 17. f. 2.
p. 132. t. 20.

α. major. Schreb. Saeugth. I. p. 174. t. LXII. ic. sup.

β. minor. Schreb. Saeugth. I. p. 174. 175. t. LXII. ic. inf.

Habitat in Gallia & Franconia, ab Ill. Daubenton de
vespertilionum genere meritissimo detectus.

***** *Dentibus primoribus plane nullis.*

ovebo- 21. V. caudatus, cauda longa, naso brevi acuto, auribus
racenis. brevibus rotundis.

New-York bat. Pen. syn. p. 367. t. 31. f. 2.

Habitat in America septentrionali.

***** *Dentium numero & ordine (mihi*
quidem) ignoto.

ascopte- 22. V. caudatus, membrana pedes connectente latissima.
rus. *Schreber Saeugth. I. t. LVIII. B.*

asiurus. 23. V. caudatus labiis tumidis, cauda lata. *Schreb. Saeugth.*
I. t. LXII. B.

II. BRUTA.

Dentes primores nulli utrinque.

7. BRADYPUS. *Dentes Primores nulli utrinque.*

*Molares utrinque VI oblique truncati cylindrici, anteriores duo longiores, am-
plo hiatus distantes.*

Corpus pilis tectum.

- tridacty- 1. B. pedibus tridactylis, cauda brevi. *Mus. Ad. Fr. 4.*
lus. *Bradypus crinitus, palmis tridactylis, unguibz arcuatis.*
Brown jam. p. 489.
Tardigradus pedibus anticis & posticis tridactylis. Briss.
quadr. p. 21.
Arctopithecus. Gesn. quadr. p. 869.
Ignavus. Clus. exot. p. 372. fig. p. 373.
Luyvaert. Nienhof Brasil. p. 27.
Pigritia sive Haut. Nieremb. hist. nat. 163, 164.
Sloth. Edw. av. t. 220.
Al. Buffon hist. natur. XIII. p. 34. t. 5. 6.
Pareseux. Gautier obs. sur l'hist. nat. I. P. 2. p. 81 t. A.
f. 4.
Habitat in America meridionalis calidioris arboribus. Vidi-
tat foliis teneris, inprimis Cecropiæ; non bibit; imbres
metuit. Facile scandit, tardissime & ægre incedit, viz
uno die 50 passus; attonitus quasi caput flectit; sonus se-
narius ascendens; clamor horrendus, lacrymæ misera.
Corpus pilosissimum griseum; Facies nuda; Gula flava; Au-
riculæ nullæ. Cauda subovata. Pedes anteriores lon-
giores posterioribus, divaricatissimi: digiti combinati, in
singulis pedibus tres; ungues compressi, validissimi, toti-
dem. Mammæ 2 pectorales.

- didacty- 2. B. manibus didactylis, cauda nullâ. *Mus. Ad. Fr. 4.*
lus. *Schreber Sæugt. II. p. 200. t. LXV.*
Bradypus pedibus anticis didactylis, posticis tridactylis.
Briss. quadr. p. 22.
Tardigradus Zeylanicus. Seb. mus. I. p. 34. t. 33. f. 4. &
t. 34. f. 1.
Unan. Buffon hist. nat. XIII. p. 34. t. 1.

MAMMALIA BRUTA. Myrmecophaga.

Habitat in America meridionali & India. Videtur fructibus & radicibus; olfactu debili, visu magis nocturno, quam diurno.

Corpus pilis ferrugineis undulatis. Caput rotundatum. Auriculæ magnæ. Ungues in palmis 2, in plantis 3. Mammæ 2 pectorales.

8. MYRMECOPHAGA. *Dentes nulli.*

Lingua teres extensilis.

Os angustatum in rostrum.

Corpus pilis tectum.

didactyla. 1. M. Palmis didactylis, plantis tetradactylis, cauda villosa. Mus. Ad. Fr. I. p. 8.

Myrmecophaga rostro brevi, pedibus anticis didactylis, posticis tetradactylis. Briss. quadr. 98.

Tamandua f. Coati americana alba. Seb. mus. I. p. 60. t. 37. f. 3.

Little ant-eater. Edw. av. t. 220.

Fourmiller: Buffon hist. nat. X. p. 144. t. 30.

Habitat in America australi. Talis lente incedit.

Corpus flavescens, reliquis minus. Rostrum reliquis brevius.

tridactyla. 2. M. palmis tridactylis, plantis pentadactylis, cauda villosa.

Myrmecophaga rostro longissimo, pedibus anticis tridactylis, posticis pentadactylis, auriculis longis flaccidis. Briss. quadr. 27.

Tamandua-guacu. Seb. mus. I. p. 60. t. 37. f. 2.

Habitat in India. Lente currit, cauda lata instar muscariæ se tegit; arbores etiam scandit.

Mammæ pectorales 2, abdominales 6. Plaga lateralis nigra. Dorsum longitudinaliter jubatum. Cauda compressa, subtus nigra, pilis longioribus, supra pilis longioribus apice albis.

An vere distincta species?

jubata. 3. M. palmis tetradactylis, plantis pentadactylis, cauda jubata. Schreber Sæugth. H. p. 203. t. LXVII.

Myrmecophagæ vescuntur formicis, quarum nidos ungue secant, insecta ipsa lingua acervis inserta alliciunt: Mansuescunt & aui absque victu vivunt; interdum dormiunt, capite sua brachiis recondito, nocte exeunt. Vellus crassissimum.

MAMMALIA BRUTA. Myrmecophaga. 79

Myrmecophaga rostro longissimo, pedibus anticis tetradactylis, posticis pentadactylis, cauda longissimis pilis vestita. *Briss. quadr.* 24.

Tamandua-guacu. *Marcgr. bras.* 225. t. 225.

Tamanoir. *Buffon hist. nat.* X. p. 141. t. 29.

Great ant-eater. *Penn. syn.* p. 331. n. 260.

Habitat in America australi, & Africa regno Congo.

Cauda dum dormit & contra pluviam se tuetur.

Plaga pectoralis lateralis nigra. Cauda villosissima, pilis longis planis, nec teretibus. Caro ab America incolis comeditur.

tetradac- 4. *M. palmis tetradactylis*, plantis pentadactylis, cauda
tyla. calva. *Schreber Saeugth.* II. p. 205. t. LXVI.

Myrmecophaga rostro longissimo, pedibus anticis tetradactylis, posticis pentadactylis, cauda fere nuda. *Briss. quadr.* 26.

Tamandua-i. *Buff. hist. nat.* X. p. 144.

Middle ant-eater. *Penn. syn.* p. 332. n. 261.

Habitat in America meridionali. Noctu exit, die dormit; irata baculum prehendit, stertit posterioribus pedibus insidens.

Caudæ extremitas calva, qua se ex ramis arborum suspendere potest. *Plaga pectoralis lateralis nigra.*

capensis. 5. *M. palmis tetradactylis*, rostro longo, auriculis magnis pendulis, cauda corpore breviori ad apicem attenuata. *Pallas miscell. zoolog.* n. 6.

Habitat ad Caput bonæ spei, reliquis speciebus major, ut cum porco comparet Kolbe, & centum libras ponderare asserat: Fodit, interdiu dormit, noctu exit.

9. MANIS. Dentes nulli.

Lingua teres extensilis.

Os angustatum in rostrum.

Corpus supra squamis mobilibus ossibus tectum.

pentadac- 1. *M. pedibus pentadactylis.* *Ad. Stockh.* 1749. p. 265.
tyla. t. 6. f. 3. *Schreber Saeugth.* II. p. 210. t. LXIX.

Philodotus pedibus anticis & posticis pentadactylis, squamis subrotundis. *Briss. quadr.* 29.

Lacertus indicus squamosus. *Bont. jav.* p. 60.

Lacertus squamosus minor setulis adspersus. *Petiv. gaz.* 32. t. 20. f. 2.

MAMMALIA BRUTA. Manis.

Armadilles squamatus major ceylanicus, seu diabolus tajanovicus dictus. *Seb. mus. I. p. 88. t. 54. f. 1. & t. 53. f. 4.*

Myrmecophagus squamatus f. Dæmon thebaicus. *Herm. mus. 295.*

Pangolin. *Buff. hist. nat. X. p. 180. t. 34.*

Short-tailed Manis. *Penn. syn. p. 329. n. 259.*

Habitat in Guinea, China, India & Infulis oceani Indici.

tetradac- 2. M. pedibus tetradactylis. *Schreber Saeugthiere, II. p. 211. t. LXX.*

Philodotus pedibus tetradactylis, squamis mucronatis, cauda longissima. *Briff. quadr. 31.*

Lacertus squamosus peregrinus. *Clus. exot. 374.*

Lacerta indica yvanæcongener. *Aldr. avip. dig. 668. t. 667.*

Scaly lizard. *Grew rar. p. 46.*

Long-tailed Manis. *Penn. syn. p. 328. n. 258.*

Platagin. *Buff. hist. nat. X. p. 180. t. 34.*

Habitat in India.

10. DASYPUS. *Dentes Laniarii nulli.*

Molares breves cylindrici utrinque 7-8.

Corpus cataphractum testa ossea zonis interfecta.

unicin- 1. D. tegmine tripartito, pedibus pentadactylis.

ctus.

Cataphractus scutis duobus, singulis duodecim. *Briff. quadr. 43. Schreb. Saeugth. II. p. 225. t. LXXV. LXXVI. f. 11. 12.*

Tatu f. Armadillo africanus. *Seb. mus. I. p. 47. t. 30. f. 3. 4.*

Kabasson ou Tarou à douze bandes. *Buff. hist. nat. X. p. 218. t. 40.*

Twelve-banded Armadillo. *Penn. quadr. p. 326. n. 256.*

Habitat in Africa.

Manis victitat formicis, vermibus, lacertis; non sonora, lente incedit, fodit, noctu vidum querit, irata squamas erigit horrende, territa in globum se contrahit capite caudaque ventum versus adductis, ut nil conspici queat, nisi squamosus globus. Caro edetis. Cauda pinguis, epulis expetita. Corpus supra squamis besifriatis satisque interstinctis vestitum, ut flobitus; subtus hirtum est. Sed Cauda utrinque squamosa etiam subtus imbricata. Auriculæ nuda rotundæ. Ungues primores medii majores, quibus contradis incedit Myrmecophagæ adeo affinis, ut solo vestimento differat.

MAMMALIA BRUTA. Dasypus.

33

Tegmen dorſi anterieus ſeptem, poſtremum novem ſcutulorum ſeriebus conſtat.

- 18 cinc-**
tus.
9. D. cingulo ſimplici. *Syſt. nat. Ed. VI. XII. 1. β.*
Cataphractus ſcuto unico, cingulis 18. *Briff. quadr. 37.*
Tatu muſtelinus. *Raj. quadr. p. 225.*
Cirquincon ou Tatou à dix-huit bandes. *Buff. hiſt. nat. X. p. 220.*
Weeſle-headed armadillo. *Grew muſ. p. 19. t. 1.*
Habitat in . . .
An vere a quadricincto diſtinctus & ab 18 cincto Molinæ hiſt. nat. Chil. L. IV. p. 271. qui palmas tetradaſtylas reſert?
- tricinctus. 2.** Dasypus cingulis tribus, pedibus pentadaſtylis. *Houtt. nat. 2. p. 280. t. 16. f. 2. Schreber Saeguth. II. p. 215. t. LXXI. A. LXXXVI. 1. 2.*
Cataphractus ſcutis duobus, cinguliſtribus. *Briff. quadr. 24.*
Tatou f. Armadillo. *Red. exper. 91. t. 92.*
Tatu f. Armadillo orientalis. *Sch. muſ. 1. p. 62. t. 38. f. 2. 3.*
Tatu apara. *Marcgr. braſ. 232.*
Armadillo f. Tatou genus alterum. *Cluſ. exot. 109.*
Armadillo. *Grew muſ. 17.*
Apas ou tatou à trois bandes. *Buff. hiſt. nat. X. p. 206.*
Habitat in Braſilia; viſcit melonibus, batatis, gallinis.
Loricæ cingulum intermedium eſt anguſtiſſimum; ſingulorum, etiam ſquamarum, ex quibus ſcuta conſtant, ſuperficies nodosa.
- quadri-**
cinctus.
3. D. cingulis quatuor.
Cataphractus ſcutis duobus, cingulis quatuor. *Briff. quadr. 25.*
Cheloniscus. Column. aquat. 2. p. 15. t. 16.
An varietas præcedentis? An diſtinctus ab hoc Dasypus quadricinctus Molinæ hiſt. nat. Chil. L. IV. p. 270.
- ſexcinctus. 4.** D. cingulis ſenis, pedibus pentadaſtylis. *Muſ. Ad. Fr. 7. Schreber Saeguth. II. p. 218. t. LXXI. B.*
Cataphractus ſcutis duobus, cingulis ſex. *Briff. quadr. 25.*
Tatu f. Armadillo prima Marcgravii. *Raj. quadr. 233.*

Viſitant Dasypi radicibus, melonibus, batatis, carnibus, piſcibus, inſectis, lumbricis, node exeunt, interdum quieti, fodiunt, mites ſcuti, quod globi inſtar contrahunt, ab adverſariis ſe muniunt, meridionalis potiſſimum Americæ incolæ; ſemina ſingulis menſibus pariunt.

Tatu & Tatu-paba Brasiliensibus. *Marcgr. bras. p. 231.*

Armadillo. *Olear. mus. p. 7. t. 6. f. 4.*

Armadillo f. Tatou. *Clus. exot. 330.*

Encouvert ou Tatou à six bandes. *Buff. hist. nat. X. p. 209. t. 42.*

Habitat in America meridionali. Edulis videtur melonibus, aliis fructibus, batatis aliisque radicibus, plantationibus infesta.

Cervix etiam scuto tecta. Penis spiralis; glande plane compressa, marginata.

septem-
cinctus.

5. D. cingulis septenis, palmis tetradactylis, plantis pentadactylis. *Amern. acad. I. p. 281. Schreber Saeguth. II. p. 220. t. LXXII. LXXXVI. f. 3. 4.*

Tatus quadrupes peregrina. *Gesn. quadr. 103.*

Habitat in India & America meridionali.

Scutum anterius antice emarginatum. Cingula non nisi sex mobilia.

octocinc-
tus.

8. D. scutis duobus, cingulis octo. *Schreber Saeguthiere, II. p. 222. t. LXXIII. LXXXVI. f. 5. 6.*

Cataphractus scutis duobus, cingulis octo. *Briss. quadr. 27.*

Aiatochtli. *Hernand. mex. p. 314.*

Tatouette ou Tatou à huit bandes. *Buff. hist. nat. X. p. 212.*

An hæc & mox prægressa vere distinctæ species? an differt octocinctus Molinae hist. nat. Chil. L. IV. p. 271. qui plantas habet pentadactylas?

novem-
cinctus.

6. D. cingulis novem, palmis tetradactylis, plantis pentadactylis. *Mus. Ad. Fr. 6. Houtt. nat. 2. p. 284. t. 16. f. 3. Schreber Saeguth. II. p. 223. t. LXXIV. LXXXVI. f. 7. 10.*

Cataphractus scutis duobus, cingulis novem. *Briss. quadr. 42.*

Tatus. *Gesn. quadr. p. 935.*

Tatu été. *Marcgr. bras. p. 235.*

Tatu f. Armadillus americanus. *Seb. mus. I. p. 45. t. 29. f. 1.*

Armadillo f. aiatochtli. *Nieremb. hist. nat. p. 158. f. supr.*

Pig-headed Armadillo. *Grew. mus. p. 18.*

Cachicame ou Tatou à neuf bandes. *Buff. hist. nat. X. p. 215. t. 37.*

Habitat in America meridionali, frequens præsertim in Gujana. Caro esculenta.

An propria species II cinctus Molinae hist. nat. Chil. L. IV. p. 271. palmis tetradactylis, plantis pentadactylis?

36. RHINOCEROS. Cornu solidum perenne conicum, naso insidens, cum osse non cohærens.

unicornis. I. R. cornu unico. *Gesn. quadr. p. 842. Albin. tab. muscul. 4. 8. Knorr delic. T. II. p. 110. t. K. X. Parsons philosoph. Transact. Vol. XLII. n. 523. Edw. av. t. 221. f. 2.*

Habitat inter & prope tropicos in paludosis, jam Jobo memoratus, sed nomine REEM; in pugnis animalium apud Romanos celebratis vulgatus, per longum tamen temporis spatium in Europa invisus, donec seculo decimo sexto aliqua ejus exempla in Europam devenerint: Vidit atque veperitibus, spinis, in cæno se volutans, parumper mansuescens, mitis, nisi laceffatur, irritatus cum fragore arbores prostermit; retro mingit & coit; unum modo pullum parit. Visus debilis, olfactus & auditus tanto præstantior.

Statura & magnitudine, pedibus brevioribus exceptis, non tamen sagacitate & docilitate ad elephantem, reliqua forma, moribus, voce grunniente propius ad suam præsertim æthiopicum accedit. Cutis dura, ut sagittæ, globuli sclopetarii, gladii ictus inde resiliant, nuda pilis, nisi cauda & auriculis: Suture s. rugæ transversales α) capitis postica. β) scapularis. γ) abdominalis ante femora. δ) femoralis trans femora. Caro crassa, spongiosa, vix edulis. Lingua mollis. Cornu basi crinitum, acutum, fibrosum, 3 aliquando pedum longitudinem attingens. Dentes primores adulto nulli, juniore remotissimi solitarii occurrentes. Ungulæ tres. Cauda attenuata, pedibus brevior.

bicornis. 2. R. conubus duobus. *Syst. nat. Ed. X. p. 56. n. 2. Sparrmann ad. Holm, 1778. trim. 4. n. 5.*

Habitat in Africa, ossibus ejus, teste nuperius Pallas, frequentissime in Russia, boreali quoque sepultis; jam Pansaniæ & Martiali dictus, in numo Domitiani obviis, a Cosmo sexto seculo memoratus, vix differre videtur specie, neque tamen modo sexu aut ætate.

Caro adsuillam, viscera ad equina accedunt. Cystis fellea nulla, Dentes primores nulli, Cornu aliterum supra primum versus frontem.

Rarior est rhinoceros tricornis, tertio tum cornu ex alterutro priorum excrecente.

5. **ELEPHAS.** *Dentes Primores nulli utrinque.*
Laniarii superiores elongati,
inferiores nulli.
Proboscis longissima prehensilis.
Corpus nudiusculum.

maximus. I. **ELEPHAS.** *Briss. quadr. 45. Raj. quadr. 131. Seb. mus. I.*
t. III. f. I.

Elephantus. Gesn. quadr. 377. Aldr. quadr. I: I. c. 9.
Jonst. quadr. 30. t. 7. 8. 9. Edw. av. t. 221. f. I. Buff.
hist. quadr. XI. p. I. t. I.

Habitat in Zonæ torridæ orbis antiqui paludosis ad amnes,
secundum nonnullos Behemot Sobi; edit juniores arbores,
ramos, folia, fructus hesperidum præsertim & musæ
paradisiacæ, cujus etiam lignum devorat, Cocos, Gui-
landiæ semina, frumentum, vorax, gregarius, lon-
gævus, docilis, cerebro quamvis perexiguo prudens; pro-
boscidem longissimam extensilem & contrahilem, acute
odorantem, ad finem tunc flexili instructam loco manus
habet; ea cibum potumque haurit hostemque pellit; ea
præcisâ occiditur; murem metuit sub somno, ob trachææ
insertionem. Retro mingit, femina supina jacente coit,
quæ per annum gravida est; pullus labiis appressis lac
maternum sugit. Portat domos aliaque, rectore collo insi-
dente; celeri satis passu ingreditur, dexterrime natat.
In bello armatur apud Indos, apud Romanos olim falci-
bis, a pulvere pyrio invento huic usui minus idoneus;
vulnuscule inter exin & atlantem furiosus occiditur.

Maximum quadrupes, adeo ut exempla sint elephanti 4500
libras pondere æquantis. Corpus cinereum, rarius rubef-
cens aut album, pilis raris. Proboscis subtus plana, apice
truncata. Oculi parvi. Dentes laniarii superiores
cornuum ad instar sursum exserti (Ebur) fibris crispis
insignes, adeo ut singuli non raro 150 libras pondere æ-
quant: Aures amplissimæ, pendulæ, dentatæ, Ad. angl.
177. p. 1051. Cutis crassissima callosa, tamen ita, ut
globi sclopetarii, etiam plumbei, penetrent, & muscarum
adeo puncturas sentiat. Mammæ 2 juxta pedus.
Ungues supra apices quinque loborum pedum. Genua flexilia.
Collum breve.

Petri G. C. Elephantographia. Lips. 1723.
Anatome in Bibliotheca medica Dublin. 1681.

P. Gillii nova descriptio elephanti, ad calcem Aeliani de hom. anim. Lugd. 1565. 8. p. 497-525.

(Fr. Serao) opuscoli di fisico argomento. Napol. 1766. 4. p. 1-62. t. I.

Ossa elephanti creberrime in zonis etiam temperatis ipsaque frigidis, adeo America sub terra sepulta. Pallas Nov. Comm. Acad. Scient. Petrop. Vol. XIII. & XVII., & Merk Lettres 1-3 sur les os fossiles d'éléphants & de rhinocéros, qui se trouvent en Allemagne, &c. à Darmst. 1786. 4.

Pedes vestiuntur corio calloso, quod integrum detrahi potest instar ungulae equi, & inde sub belluis non inepte militaret; cum vero pedes appareant tanquam unguibus, 3 in anterioribus & 4 in posterioribus superimpositis, aptius judicavi, ei locum heic concedere, præprimis cum mammas in axillis, brachiorum gerat.

6. TRICHECHUS. Dentes Primores (adulto) nulli utrinque.

Laniarii superiores solitarii.

Molares ex osse rogofo utrinque.

Corpus oblongum.

Labia geminata.

Pedes posteriores compedes coadunati in pinnam.

Rossmarus. I. T. dentibus laniariis superioribus exsertis remotis. Houtt. nat. 2. p. 7. t. II. f. I. Schreb. Saeugthiere, II. p. 262. t. LXXIX.

Odobenus. Syst. nat. Ed. X. p. 38. Briff. quadr. 48.

Rossmarus. Jonst. pisc. t. 44. Worm. mus. 289. Olear. mus. 38. t. 23. f. 3. Bonann. mus. 269. f. 27. Gesn. aquat. 211.

Equus marinus f. Hippopotamus falso dictus. Ray. quadr. 191. Ellis hudson. t. 6. f. 3.

Mors f. Mors, Rossmarus. Gesn. aq. 211.

Trichechi omnes maris incolæ, fucis, corallinis, testaceis, non carne videntur.

MAMMALIA BRUTA. Trichechus.

Wallrofs. *Martens spitsb.* 78. t. 1. f. B.

Morse. *Buff. hist. nat.* XIII. p. 358. t. 54.

Habitat intra & circa polum arcticum ad ostia præsertim fluviorum. Mugit instar bovis ; dormiens sterit , ad 18 pedes longus , animose contra hostes se defendit , gregarius. Dentes primores juniori animali in maxilla superiore bini exigui ; laniarii remotissimi acuminati , subtiliter striati , 30 aliquando libras pondere æquantes , Ebur fibris intertextis non adeo facile flavescens , nucleo tamen in fuscum vergente ; molares in utraque maxilla utrinque quatuor exiles , acuti , pone apicem fovea plana excavati. Vibrissæ culmi straminei crassitie pellucidæ. Nares lunares. Collum crassum. Pedes digitis 5 , unguibus brevioribus. Ex pelle lora curruum conficiunt Russi , nuperius Galli. Pinguedo expetita. Sceletum rejectum in arenam potior pars Mammotovacostr.

Dugong. 3. T. dentibus laniariis superioribus exsertis approximatis.

Dugon. *Buff. hist. nat.* XIII. p. 374. t. 74.

Indian Wallrus. *Penn. syn.* p. 338. n. 264.

Habitat in mari inter Caput bonæ spei & insulas Philippi- nas interjecto, rosmaro cetera satis similis ; caput tamen magis acuminatum & angustius ; nares ampliores & altius positiæ ; loco dentium primorum planum inclinatum ad laniarios allidens. Dentes laniarii in maxilla inferiore nulli , in superiore approximati , extrorsum flexi ; molares latiores , distantes , in superiore maxilla utrinque 4 , in inferiore tres. Mammæ 2 pectorales. Caro bovillam sapit.

Manatus. 2. T. dentibus laniariis nullis. *Art. gen.* 79. sym. 107.

Manatus. *Rondel. pisc.* 490. *Gesn. pisc.* 213. *Hern. mex.* 323. *Briss. quadr.* 49.

Manati. *Clus. exot.* 133. *Aldr. pisc.* 728.

Manati f. vacca marina. *Raj. quadr.* 193.

Lamantin. *Buff. hist. nat.* XIII. p. 277. t. 57.

australis. *. pilosus , pedibus tetradactylis unguiculatis.

Habitat in mari africano & americano , præsertim ad ostia fluviorum ; quos creberrime ingreditur , parum a litore recedens ; 8-17 pedes longitudine , 6-7 latitudine , 500-800 libras pondere æquans. Cutis ex atro cinerea. Dentes molares in utraque maxilla utrinque 9 quadrati , cortice vitreo vestiti. Vertebrae 50.

borealis. β . nudus, pedibus nec digitis nec unguibus instructis.

Habitat ad litus Americæ occidentale, & insularum inter Americam & Kamſchatkam positarum, frequentissima quoque ostia fluviorum intrans. Longitudine 23 pedes, pondere 8000 libras æquat; cutis dum madet fuca, exsiccata nigra. Loco dentium molarium in utraque maxilla utrinque os rugosum. Vertebra 60.

Manſueſcit sæpe ſylveſtribus americanis muſicaque delectatus, veterum Delphinus; vorat indefinenter. Sociati mas, femina, adultus & proles. Monogami vere coeunt, femina varlis gyris primum fugiente, reſupinata. Dorſum inter paſcendum ex aquis eminet avibus ibi pediculos venantibus. Mugitus bovinus. Viſus debilis, auditus tanto acutior. Pedes anteriores teſtudinum marinarum fere ad inſtar palmati; loco poſteriorum cauda horizontalis. Auriculæ nullæ. Nares diſtantes regulares. Labium ſuperius muricatum vibriffis rigidis incurvis. Mammæ 2 pedorales. V. Deſham & Steller Nov. Comm. Petropol. Vol. II. p. 294. ſqq. Caro ſapidiſſima. Phocis Cætiſque affinis. Quicquid veri habent cantatæ toties de ſtrenibus fabulæ, ad hunc ſpectare videtur.

7. fibirica, colore argenteo.

Habitat in lacubus Baikal. & Orom.

8. caspica, colore vario.

Habitat in mari, præsertim septentrionali, etiam pacifico, & caspico. Dormiunt in lapide ex aqua eminente; pariunt in glacie, per quam adscendere traduntur halitu, non descendunt. Mammas retrahunt duas abdominis; inter halecum catervos saginantur; a laris provocata exspuunt pisces; idu supra nasum facillime occiduntur. Alias varietates, cineream, bovis, si adoleverit, magnitudine, albam vel margaritaceam, utramque in aquis ipsis dormientem, griscam, nigram, & minorem maculatam refert Oedman a.d. Stoskh. nov. ann. 1784. trim. I. n. 10.

Vibrissæ undulatae. Oculi membrana nictitante instructi, humore crystallino globoso. Lingua bifida. Foramen ovale fertur apertum esse.

Anatome. E. N. C. d. I. a. 9. obs. 98. & d. 3. a. 7. app. 15.

Mona-
chus.

5. Ph. capite inauriculato, dentibus incisforibus utriusque maxillæ quatuor, palmis indivisis, plantis exungiculatis. *Hermann a.d. nat. scrutat. Berol. IV. p. 456. t. XII. XIII. Habitat in mari dalmatico.*

groenlan-
dica.

6. Ph. capite lævi inauriculato, corpore griseo, lateribus luna nigra. *Erxleben syst. mamm. p. 588. Swartfide. Egede Groenl. fig. p. 62. Attarfoak. Cranz Groenl. p. 163. The harp. Penn. syn. n. 269. p. 242. Habitat in Groenlandia & Newfoundland, nec non circa Kamtschatkam.*

hispida.

7. Ph. capite lævi inauriculato, corpore pallide fusco pilis surrectis hispido. *Erxleben syst. mamm. p. 589. Schreber Saecul. III. p. 312. t. LXXXVI. Phoca foetida. Muller zool. dan. prodr. p. VIII. Neitsek. Cranz Groenl. p. 164. Habitat ad littus Groenlandiæ & Labrador. Ex pellibus vestes conficiunt incolæ.*

cristata.

8. Ph. capite antice cristato, corpore griseo. *Erxleben syst. mamm. p. 590. Klap-myssen. Egede Groenl. p. 62. t. 6. Blandruselus. Olaffen Isth. I. p. 283. Neitser-foak. Cranz Groenl. I. p. 164. Hooded seal. Penn. syn. n. 268. p. 342.*

Habitat

Habitat in parte meridionali Groenlandiæ, occidentali Islandiæ, & circa Newfoundland. Prioribus major, pelle inter pilos albos brevi, densa, nigra lana instructa.

barbata. 9. Ph. capite lævi ihauriculato, corpore nigricante. Müller *zool. dan. prodr.* p. VIII.

Utselur, Wetrafelur. *Olass. Isl.* I. p. 260.

Utsuk. *Cranz groenl.* I. p. 165.

Lachtak. *Steller nov. comm. Petrop.* II. p. 290.

Sea calf. *Parsons act. angl. n.* 469. p. 383. t. 1. f. 1.

Grand phoque. *Buffon hist. nat.* XIII. p. 333. 343.

Habitat ad Scotiam atque Groenlandiam australiorem, vulgaris circa Islandiam. Novembri atque Decembri parit pullos albos. Cutis densa, pilis nigricantibus obsita. Corpus longitudine 12 pedum.

pusilla. 10. Ph. capite lævi subauriculato, corpore fusco. *Schreber Sæugth.* III. p. 314. t. LXXXV.

Vitulus marinus. *Bellon. aquat.* p. 19. f. p. 21.

Vitulus maris mediterranei. *Rondel. pisc.* p. 453.

Veau marin. *Dampier voyag.* I. p. 116.

Loup marin. *Ulloa voy.* II. p. 2. ? 26. ?

Vitello marino picciolo. *Aless. quadr.* IV. t. 171.

Petit phoque. *Buffon hist. nat.* XIII. p. 333. t. 53.

Habitat in Oceano, mari mediterraneo, ad littus Chilense, ad insulam Juan Fernandez. Phoca Aristotelis, Vitulus marinus Plinii.

An hujus forte varietas Phoca porcina Molin. hist. nat. Chil. &. IV. p. 248. rostro longiore, auriculis magis promiqualis, pedibus pentadactylis diversa?

12. CANIS. *Dentes Primores superiores VI; laterales longiores distantes; intermedii lobati.*

Inferiores VI; laterales lobati.

Laniarii solitarii incurvari.

Molares VI - VII. (pluresve quam in reliquis).

familiaris. 1. C. cauda (sinistrorsum) recurvata. *Faun. suet. 5. Amari acad.* 4. p. 43. t. 1. f. 1.

Canis. *Gesn. quadr.* 91. *Aldr. dig.* 482. *Jonst. quadr.* 122. *Raj. quadr.* 176.

- domestici-
cus. *a.* auriculis erectis cauda subtus lanata.
Canis *cinereus* f. domesticus. *Raj. quadr.* p. 177. n. 8.
le Chien de berger. *Buffon hist. nat.* V. p. 241. t. 28.
- pomeranus. *β.* pilis in capite longioribus, auriculis erectis, cauda sursum
quam maxime curvata.
Chien-loup. *Buffon hist. nat.* V. p. 242. t. 29.
- fabrius. *γ.* auriculis erectis, pilis per universum corpus longis.
Kosha. *Steller kamtschatk.* p. 182.
Chien de Sibirie. *Buffon hist. nat.* V. p. 242. t. 30.
- islandicus. *δ.* auricularum erectarum apicibus pendulis, pilis rostro
brevi excepto longis.
Fiaar-hund. *Olafs. Isl.* I. p. 30.
Chien d'Islande. *Buff. hist. nat.* V. p. 242. t. 31.
- aquaticus. *ε.* pilo crispo longo instar ovis.
Canis sagax ad aquas. *Aldrov. dig.* p. 556.
Canis aviarius aquaticus. *Gesn. quadr.* p. 256. *Raj. syn.*
p. 177. n. 6.
Grand barbet. *Buffon hist. nat.* p. 246. t. 37.
Water-dog. *Penn. quadr.* II. var. *δ.* p. 145.
Budel. *Bidinger Thiere*, t. 18.
- minor. *ζ.* minor pilo crispo longo, circa auriculas longiore & recta
propendente.
Petit barbet. *Buffon hist. nat.* V. p. 250. t. 38. f. 2.
- brevipilis. *η.* capite minore, rotundato, rostro brevi, cauda sursum
curvata.
Canis melitenensis brevioribus pilis. *Aldrov. dig.* p. 541.
Gredin. *Buffon hist. nat.* V. p. 247. t. 39. f. 1.
Pyrame (niger maculis flammeis). *Buffon hist. nat.* V. t. 39
f. 2.
King - Charles - dog (palato pilisque nigris). *Penn. quadr.*
p. 145. n. III. *α.*
- extrarius. *θ.* auriculis longis lanatis pendulis.
Canis hispanicus, auribus demissis. *Aldrov. dig.* p. 561. 562.
Epagneul. *Buffon hist. nat.* V. p. 246. t. 38. f. 1.
- melitæus. *ι.* magnitudine sciari, pilis per totum corpus mollissimis, se-
riceis, longissimis.
Canis melitenensis hirsutus. *Aldr. dig.* p. 542.
Canis melitæus. *Raj. syn. quadr.* p. 177. n. 9.
Bichon. *Buffon hist. nat.* V. p. 257. t. 40. f. 1.

leónius. *: minimus, pilis abdominis & caudæ brevioribus.

* Chien-lion. *Buffon hist. nat. V. p. 251. t. 40. fi. 2.*

variegatus. λ. auriculis parvis subpendulis, rostro exili acuto, pedibus tenuibus.

Petit danois. *Buffon hist. nat. V. p. 247. t. 41. f. 1.*

hybridus. μ. auriculis parvis subpendulis, naso subfimo crasso:

Roquet. *Buffon hist. nat. V. p. 253. t. 41. f. 2.*

An ex λ & ν hybridus ?

fricator. ν. naso refimo, auribus pendulis, corpore quadrato:

Doguin. *Buffon. hist. nat. p. 252. t. 44.*

Pug dog. *Penn. quadr. p. 147. n. V. β.*

Cane maffolo. *Aleff. quadr. III. t. 103:*

a. hybridus ex ν & μ.

Artois. *Buffon. hist. nat. V. p. 253:*

b. hybridus ex ν & ρ.

Chien d'Alicante. *Buffon hist. nat. V. p. 254:*

Molossus. ζ. magnitudine lupi labiis ad latera pendulis, corpore toroso:

Canis sagax fanguinariu. *Gesn. quadr. 251.*

Dogue. *Buffon hist. nat. V. p. 249. t. 43.*

Bull-dog. *Penn. quadr. p. 147. n. V. α.*

Bärenbeißer. *Ridinger Thiere. t. 3.*

anglicus. α. maximus labiis ad latera pendulus, corpore toroso:

Canis bellicosus anglicus. *Aldrov. dig. p. 559:*

Canis mastivus. *Raj. quadr. p. 176. n. 1.*

Mastiff. *Penn. quadr. p. 146. n. IV. δ.*

Dogue de forte race. *Buffon hist. nat. V. p. 252. t. 45.*

Englische Dogge. *Ridinger Thiere, t. I. 2.*

sagax. α. auriculis pendulis, digito spurio ad tibias posticas.

Teutscher Jagdhund. *Ridinger Thiere, T. V. icon. duæ ad dextram.*

gallicus. ρ. auriculis pendulis, digito spurio ad tibias posticas, albicans.

Canis venaticus sagax. *Raj. quadr. p. 174. n. 4.*

Chien courant. *Buffon hist. nat. V. p. 243. t. 32.*

Hound. *Penn. quadr. p. 144. n. II.*

Französischer und englischer Parforcehund. *Ridinger Thiere, T. V. ic. duæ ad finistr. & T. VI.*

scoticus. α. scoticus sagax. *Gesn. quadr. p. 250.*

Bloodhound. *Penn. quadr. p. 144. n. II.*

Canis sanguinariu. *Raj. quadr. p. 174.*

Schweishund. *Ridinger Thiere, T. X.*

- venaticus. r. Leithund. *Ridinger Thiere*, T. IV.
- avicularius. v. cauda truncata.
Canis fagax ad coturnices capiendas, pantherinus. *Aldrov. dig. p. 535.*
Canis aviarius seu hispanicus campestris. *Raj. quadr. p. 177. n. 5.*
Spaniel. *Penn. quadr. p. 145. n. III.*
Braque & Braque de Bengale. *Buff. hist. nat. V. p. 245. t. 33. & 34.*
Hünerhund. *Ridinger Thiere*, T. XIV.
- aquatilis. r. cauda truncata, pilis longis asperis.
Barbet. *Ridinger allerley Thiere*, t. 42.
- cursorius. x. capite longo, rostro robusto, auribus parvis subpendulis, pedibus longis torosis, corpore longiore graciliore.
Curshund. *Ridinger Thiere*, t. 13.
- hibernicus. j. magnitudine o, trunco curvato, rostro attenuato. *Schreber Secugh. III. p. 327. t. LXXXVII.*
Canis grajus hibernicus. *Raj. quadr. p. 176. n. 3.*
Irish. greyhound. *Pennant quadr. p. 146. n. IV. a.*
- turcicus. a. magnitudine o, trunco curvato, rostro attenuato, pilo subcrispo. *Ridinger Thiere*, t. 9.
Canis leporarius turcicus. *Aldr. dig. p. 550?*
- grajus. aa. magnitudine lupi, trunco curvato, rostro attenuato.
Canis scoticus venaticus. *Gesn. quadr. p. 249. Aldrov. dig. p. 545.*
Canis venaticus grajus seu græcus, nonnullis scoticus. *Raj. quadr. p. 176. n. 2.*
Lévrier. *Buffon hist. nat. V. p. 240. t. 27.*
Common greyhound. *Pennant quadr. p. 146. n. IV. β.*
Windspiel. *Ridinger Thiere*, t. 7.
- hirsutus. ββ. magnitudine lupi, trunco curvato, rostro attenuato, pilo paulo longiore crispo.
Canis leporarius hirsutus. *Aldrov. dig. p. 549.*
Zotiger Windhund. *Ridinger Thiere*, t. 7. f. anter.
- italicus. γγ. minor, trunco curvato, rostro attenuato.
Levron. *Buffon hist. nat. V. p. 241.*
Italian greyhound. *Pennant quadr. p. 146. n. IV. β. 1.*
Kleines Windspiel. *Ridinger Thiere*, t. 15.
- ægyptius. δδ. nudus absque pilis.
Canis sine pilis. *Aldrov. digit. p. 562.*

MAMMALIA FERÆ. Canis

Canis pilis carens minor, indian dog. *Brown jamaica*,
p. 486?

Chien turc. *Buffon hist. nat. V. p. 248. t. 42. f. 1.*

Naked dog. *Penn. quadr. p. 147. n. V. d.*

lanarius. 22. corpore angusto, pedibus torosis, cauda robusta recta,
pilis brevibus appressis.

Martin. *Buffon hist. nat. V. p. 239. t. 25.*

aprinus. 23. corpore angusto, pedibus torosis, cauda robusta recta,
pilis longis asperis.

Sauvander. *Ridinger Thiere, t. 11.*

suillus. 24. capite rostroque robusto, trunco postice angusto, pe-
dibus longis, pilis longis asperis.

Sauriden. *Ridinger Thiere, t. 12.*

vertagus. 25. pedibus brevibus, trunco longo sæpius variegato.

Turnspit. *Penn. quadr. p. 145. n. II. 7.*

a. pedibus rectis.

Basset à jambes droites. *Buffon hist. nat. V. p. 245.*
t. 35. f. 1.

b. pedibus curvatis.

Vertagus, a Tumble. *Raj. quadr. p. 177. n. 7.*

Basset à jambes tortes. *Buffon hist. nat. p. 245. t. 35.*
f. 2.

Dachschlieffer, Dachswürger. *Ridinger Thiere, t. 16.*

c. pilis longioribus crispis.

america- 26. magnitudine a capite parvo, auribus pendulis, dorso
nus. curvato, cauda brevi.

Alco. *Buffon hist. nat. XV. p. 150.*

a. Ytzcuinte porcotli, Canis mexicana. *Hernandez hist.*
Mexic. p. 466.

Michuacanens. *Fernand. anim. nov. Hisp. p. 7.*

b. Techichi. *Fernand. anim. nov. Hisp. p. 10.*

Habitat sæpius cum homine, passim etiam spontaneus eva-
sit, at in India inquilinus?

Edit carnes, cadavera, vegetabilia farinosa; non perinde
olera. Digerit ossa; vomitu a gramine purgatur; cacat
supra lapidem. Potat lambendo; mingit ad latus, cum
hospite sæpe centies; odorat anum alterius; odoratu ex-
cellit naso humido; oblique currit; incedit supra digitos;
vix sudat; calidus linguam exferit; cubitum iturus cir-
cumit locum; dormit auditu acutius, somniat. Proci-
santibus crudelis; menstruant catullit cum variis; mor-
det illa illos; coaret copula junctus; gravida 63 diebus;

MAMMALIA FERÆ. Canis,

parit sæpe 4 ad 8, masculis patri similibus, feminæ matri. Fidiſſimus omnium; hominibus cohabitât; blanditur ad domini accessum; ejus instidum non fert; præcurrit in itinere, in bivio respicit; docilis, amissa inquirît, vigilias noctu instituit, advenas indicat, ad merces vigilat, pecora ab agris arceat, tarandos coarceat, boves ovesque a feris custodit, leones detinet, feras agitât, anatibus adstat, repit affiliens ad rete, occisa a venatore apportat, a rapina desistens; veru trahit in Gallia, rhedam in Sibiria. Mendicat ad mensam; furatus timet cauda incurvata; invidus edit; inter suos dominus domi; mendicorum hostis, ignotos sine injuria laceſcit. Lambendo vulnera, podagram, carcinomata lenit; ululat ad musicam; mordet projectum lapidem; instante tempestate fœtet ægrotans; tania laborat; rabiem diffeminat; demum cæcutit & se ipsum rodit; ab oleo empyreumatico caudæ adperso clamat; sæpe gonorrhæa infectus; a Mahometanis expellitur. Anatomicorum victima in sanguinis circulatione, transfusione, vasis lacteis, nervo reſecto, &c. medicorum in venenorum efficacia exploranda.

Caput vertice carinatum. Labium inferius lateribus dentatis nudis occultatum. Mystaces ordinibus 5, s. 6. Nares extorsum recurvato sinu lunares. Auriculæ margine basios superiore reflexo, posteriore duplicato, antica trilobo. Verrucæ faciei pilosæ 7. Sutura velleris 8, collares, sternea, cubitales, abdominales, oculares, lumbares, auriculares, anales. Mammæ 10: harum 4 in pectore. Pedes subpalmati.

Lupus. 2. C. cauda incurvata. Faun. suec. 6. Schreber Sæugth. III, p. 346. t. LXXXVIII.

Canis ex griseo flavescens. Briss. quadr. p. 170.

Lupus. Gefn. quadr. 634. Aldrov. dig. 144. Jonſon quadr. 89. Raj. quadr. 173.

Loup. Buffon hist. nat. VII. p. 39. t. I.

Wolf. Penn. brit. zool. I. p. 61. t. I.

Wolf. Ridinger wilde Thiere, t. 21.

Canis genus vorax, morſu lacerans, arbores non ſcandit, cursu quamvis celer; semina plures pullos parit, mammis plerumque 10 instructa, 4 in pectore, 6 in abdomine positis. Caput vertice plano, rostro tenuiore. Truncus antice crassior. Penis nodosus est. Pedes anteriores, excepta hyæna & crocuta, cui quatuor tantummodo sunt, digitis 5, posteriores 4, singulis unguibus longis, paulisper curvatis, immobilibus, cum feli, phoca, urſo, mustela in utrisque pedibus 5.

Habitat in Americæ borealis, Asiæ, Africæ, Europæ potissimum sylvis etiam frigidioribus, ex magna Britannia inde ab anno 800 exterminatus. Catervatim incedit, pecora, equos, sues, canes occidit; in sylvis suspiciosissimus vix audet; tractum funiculum metuit, portam non subit, sed sepimentum supersilit; sonitum tubæ stentoræ non fert; auditu atque olfactu excellit; coit Januario; grvida per 10 hebdomadas parit pullos 5-9 cæcos; adulescit anno tertio, & 15-20 annorum ætatem attingit; summa fame & frigore laceffitus, in propriam speciem & hominem sævit; in ediam diu tolerat; unguibus retractis incedit; collum facile flectit; noctu ululat; lichene vulpino occiditur. Fn. succ. 1129. Stroenm soendm. 391.

Anatome. E. N. C. d. 2. a. 9. obs. 71. & cent. 10. app. 450.

mexicanus.

8. C. cauda deflexa lævi, corpore cinereo fasciis fuscis maculisque fulvis variegato.

Canis cinereus, maculis fulvis variegatus. *Briss. quadr.* 237. Quanhpecotli s. Felis montana americana. *Seb. mus.* I. p. 68. t. 42. f. 2.

Xoloitcuintli, lupus mexicanus. *Hernand, mex.* p. 479.

Cuatlachtli, lupus indicus. *Fernand. nov. Hisp.* 7.

Loup de mexique. *Buffon hist. nat.* XV. p. 49.

Habitat in calidioribus regni Mexicani.

Corpus cinereum, fasciis fuscis. Maculæ fulvæ in fronte, collo, pedore, ventre, cauda.

Thous. 9. C. cauda deflexa lævi, corpore subgriseo, subtus albo. *Habitat in Surinamo.*

Corpus griseum subtus totum album, magnitudine majoris cati. Aures concolores erectæ. Verruca supra oculos, in buccis, sub gula. Lingua lateribus ciliata.

Hyæna. 3. C. cauda recta, pilis cervicis erectis, auriculis nudis, pedibus tetradactylis. *Schreber Sæugth.* III. p. 371. t. XCVI. *Miller on various subj.* T. XIX. A.

Taxus porcinus sive hyæna veterum. *Kaempfer amœnit. exot.* p. 411. t. 407. f. 4.

Lupus marinus. *Bellon. aquat.* 33. t. 34. *Jonston quadrup.* t. 57. *Gesner Thierb.* p. 359.

Hyæna. *Briss. quadr.* p. 169.

Hyæna. *Buffon hist. nat.* V. p. 268. t. 25.

Striped hyæna. *Penn. syn.* p. 161. n. 118.

Indianischer Wolf. *Ridinger allerl. Thiere.* t. 17.

MAMMALIA FERÆ. Canis.

Habitat in Oriente, Persia, Africa, etiam meridionali.
Tana, Κυνική, Κυνουδα, veterum, Tanae etiam Aris-
totelis, excavat terram degitque in antris; diutius sine
cibo vivit; in humana cadavera sævit, quæ e tumulis
effodit, cæmeteriis infesta; quidquid irritatus ore pre-
hendit, mordicus tenet, nec vivus dimittit pertinacis-
simus, inde venatoribus facilius cedit.

Magnitudo suis, facies apri. Pili dorsi subspithamei, erecti,
apicibus nigris. Oculi rostro propinquoiores. Auriculæ
nudæ. Cauda sæpius annulis nigricantibus verticillata;
crura annulis nigris variegata. Striæ corporis fuscæ &
nigræ, transversales, a dorso ad ventrem ductæ. For-
san ad ursi vel melis genus relegandum animal, quod
etiam, quemadmodum melcs, inter animum & caudam
succum unguine fetido refertum habet.

Crocuta. 10. *C. cauda recta, corpore nigro maculato, pedibus tetra-*
dactylis. Erxleben hist. mamm. p. 578.

Hyæna five congener illi Crocuta. Ludolf Aeth. L. I. c.
10. n. 59.

Quumbengo. Barbot Guin. p. 486.

Jachhals vel Boshond. Boffin guin. p. 291.

Sported Hyæna, Penn. syn. quadr. p. 162. n. 119. t. 17.
f. 2.

Habitat in Guinea, Æthiopia, ad caput bonæ spei in
terræ rupiumque caveis. Noctu prædatur oves, sepul-
cra adit voratque cadavera, ipsosque homines adoritur.
Vox terribilis.

Facies & caput supra nigra. Juba brevis nigra. Corpus
pilis brevibus, mollibus, cum artubus rubro-fusum,
maculis rotundis nigris. Cauda brevis nigra villosa.

aureus. 7. *C. cauda recta, corpore pallide fulvo. Schreber Sæugeth.*
III. p. 365. t. XCIV.

Canis flavus. Briff. quadr. p. 171.

Lupus aureus. Kämpfer amant. exot. p. 413. t. 407. f.
3. Raj. quadr. p. 174. Klein quadr. p. 70.

Vulpes indiæ orientalis. Valent. mus. 452. t. 452.

Adil. Bellon observ. p. 160.

Chacal, Adivè. Buffon hist. nat. XIII. p. 255.

Chien sauvage indien. Vosmaer descript. Amst. 1773.

Schakall. S. G. Gmelin it. russ. III. p. 80. t. 13. & Göl-
denstedt nov. comm. Petropol. XX. p. 449. sqq. t. X.

MAMMALIA FERÆ. Canis.

75

Habitat in Asiæ regionibus calidioribus, & in Barbaria, ὄνις Aristotelis & Æliani, Δυνος ξανθὸς & χυρὸς Oppiani, Thoes Plinii.

Die latet in montibus sylvisque; noctu catervatim ad 200 incedit, furto deditus; lente ambulat, capite dependente, at præda detecta celerrime currit; adultos homines vix invadit, pueros trucidat; edit animalia minora, aves, cibaria varia, fructus quoque horæos, radices, cadavera e terra effodienda. Coit canino more verno tempore, per mensem gravida; 5-8 pullos parit, valde mansuescit, moschum olet. Uno clamante, clamant remoti alii, ambulante sono nocturno; ululatus execrabilis, quasi ejulatus latratu interceptus. Lustratu exagitare fertur feras, hæc audientes reliquæ in exercitum concurrere, prosequi miserum cervum, dum leo tigrisve ex insidiis fugientem prosternat, prædamque voret, circumfeditate venatorum corona, usque dum rex satiatius discesserit. An canis ferus?

mesome- 11. C. cauda recta, corpore ferrugineo, fascia dorsali nigra: las.

Erxl. syst. mammal. p. 574. Schreber Sæugth. III. p. 370. t. XCV.

Jackhals. Kolbe cap. bon. sp. p. 150.

Chacal, Buffon hist. nat. XIII. p. 268.

Habitat vulgaris ad caput bonæ spei.

Facies vulpina; longitudo corporis 2½ pedum, caudæ pedis unius.

Lycaon. 12. C. cauda recta, corpore toto nigro. Erxl. syst. mamm. p. 560. Schreber Sæugth. III. p. 353. t. LXXXIX.

Miller on various subjects, T. XIX. B.

Vulpeculæ nigræ. Scheff. Lappon, p. 340.

Schwarze Füchse. Steller Kamtschatk. p. 124.

Loup noir. Buffon hist. nat. IX. p. 362. t. 41.

Black fox. Penn. syn. quadr. p. 152. n. 112. 7.

Lupo nero. Aless. quadr. I. t. 24.

Habitat in Europæ, Asiæ, & Americæ frigidioribus, omnium astutissimus & lupo satis similis, magnitudinis etiam inter hunc & vulpem intermedia; color totus niger, ut tamen aliquando colore subgriseo, vel argenteis pilorum apicibus variet. Pellis pretiosissima.

Vulpes. 4. C. cauda recta, apice albo. Schreber Sæugth. III. p. 354. t. XC.

Vulpes. Gesn. quadr. 966. Aldrov. dig. 195. Jonst. quadr. 82. Raj. quadr. 177.

Renard. *Buffon hist. nat.* VII. p. 75. t. 6.

Fuchs. *Ridinger jagdbare Thiere*, t. 14.

Habitat in Europa, Asia, Africa, regno Chilensi Americæ, αλλοι Aristotelis & Aeliani, κειν Oppiani, antra fodiens, animal astutissimum; sævit in agnos, anseres, gallinas, aviculas, non accipitres fætidioresque; edit stercore animalium; pinguescit uvis; non rapit facile in prædio, quod inhabitat; pruriens noctu clamat; bombardas explosas odoremque pulveris pyrii fugit; pellitur fumo.

Corpus fulvum, pedibus anticis & auricularum apicibus nigris; raro album. Auriculæ erectæ. Labia alba. Ambrosiaco fragrat odore supra caudæ basin.

Alopex. 5. C. cauda recta: apice nigro. *Schreber Sæugth.* III. p. 358. t. XCI.

Vulpes villo densiore & nigricante. *Gesn. quadr.* p. 967.

Charbonnier. *Buffon hist. nat.* VII. p. 82.

Brant-fox. *Penn. syn.* p. 153. ♂.

Habitat in Europa, Asia, regno Chilensi Americæ.

Præcedente rarior, minor, magis obscurus, cetera satis similis.

Corfæ 13. C. cauda recta fulva, basi apiceque nigra. *Syst. nat.* XII. app. 3. p. 23. *Schreber Sæugth.* III. p. 359. t. XCI. B. Korfaki. *Ryttschkow Orenb.* I. p. 232. *Pallas neue nord. Beytr.* I. 29.

Habitat frequentissimus in magno deserto ab Ural fluvio versus Irtim; sævit in aves, fætet, clamat, latrat, vulpe minor, ceterum satis similis.

Karagan. 14. C. cauda recta, corpore griseo, auriculis nigris.

Karagan & Steppenfüchse. *Pallas it.* I. p. 199. 234.

Habitat in desertis Kalmyccis & Kirgificis.

cinereo- 15. C. cauda recta, corpore cinereo, collo lateribus fulvo-
argenteus. *Erxleb. syst. mamm.* p. 567. *Schreb. Sæugth.* III. p. 360. t. XCII. A.

Habitat in America boreali, vulpe minor. Griesfuchs.

virginia- 16. C. cauda recta, corpore ex cinereo albicante. *Erxleb. syst.*
nus. *mamm.* p. 567. *Schreb. Sæugth.* III. p. 361. t. XCII. B.

Canis vulpes cinerea. *Briff. quadr.* p. 174.

Vulpes cinereus americanus. *Klein quadr.* p. 71.

Grey fox. *Catesb. carol.* II. p. 78. t. 78.

Habitat in Carolina, & reliquis Americæ borealis calidi-
dioribus, in cavis arboribus, facile mansuescens,

MAMMALIA FERAÆ. Canis.

77

Lagopus. 6. *C. cauda recta*, palmis plantisque pilosissimis. *Erzl. syst. mam.* p. 568.

Canis cauda recta apice concolore. Syst. nat. XII. p. 59. *Schreber Sæugth.* III. p. 362. t. XCIII. utraq.

Canis hieme albus, æstate ex cinereo cærulefcens. Briss. quadr. p. 174.

α. *Vulpes alba. Kalm, bahus.* 236.

Ifatis. J. G. Gmelin nov. comm. Petrop. V. 1760. p. 358. *Buffon hist. nat.* XIII. p. 72.

The artic fox. *Penn. syl. quadr.* p. 155. t. 17. f. 1.

β. *Vulpes cærulefcens. Faun. suec.* 14.

Habitat ad omne mare glaciale frequentissimus, etiam in America boreali, in ipso regno Chilensi, non in sylvis, sed in nudis montibus; degit in cuniculis; edit mures, anseres, nec nisi fame coactus baccas & testacea. Latrat, non fector vulpis. Graviditas per 9 hebdomadas. Pellis egregia. An hujus vel vulpis potius varietas est? Vulpes crucigera fulvus, crucem nigram in dorso gerens, Briss. anim. p. 241. n. 6.

&

Canis (Culpæus) cauda recta elongata, apice concolore lævi. Molin. hist. nat. Chil. L. IV. p. 259?

Cerdo. 17. *C. cauda recta*, corpore pallido, auriculis roseis erectis prælongis. *Schwoeldebrand ad. ac. suec. ad ann. 1777. trim.* 3. art. 7. t. 6.

Habitat in magno Africæ deserto sabuloso Saara.

Reliquis speciebus minor, cursu celerrimus scandit, locustis aliisque insectis vescitur. Canis junioris adlatrat. An revera hujus generis?

13. FELIS. Dentes primores intermedii æquales. Molares terni.

Lingua retrorsum aculeata.

Ungues retractiles.

Leo.

1. *F. cauda elongata*, corpore helvolo. *Schreber Sæugth.* III. p. 376. t. XCVII. A. B.

Felis cauda elongata floccosa, thorace jubato. Syst. nat. 6. p. 4. n. 1.

Felis cauda in floccum desinente. Briss. quadr. p. 194.

MAMMALIA FERÆ. Felis.

Leo. *Gesn. quadr.* 572. *Aldr. dig.* 2. *Jonst. quadr.* 72.

Dodart ađ. 1. t. 1. & 7. t. 7. *Raj. quadr.* 162.

Lion. *Buffon hist. nat.* IX. p. 1. t. 1. 2.

Habitat in Africa, præsertim interiore, rarior in desertis Persiæ, Indiæ, Japaniæ, olim quoque in reliqua calidiori Asiæ parte, Palæstina, Armenia, Thracia. Segnis, esuriens prædatur equis & aliis majoribus animalibus, nec nisi famelicus homine; fugatur accensa flamma; canibus coercetur; junior mansuescit, retromingit. Rugitus horrendus a tracheæ annulis integris imbricatis; dormit in aprico, esurit tertio die, tagax; incessus lentus, prædantis saliens; halitus fœtidus; olfactus debiliior; caro Afris esculenta.

Color luteo-rufus, nonnunquam obscurior. Caput magnum, rotundatum. Frons quadrata. Oculi ingentes. Labia pendula. Cor maximum. Mas femina quarta parte major, ut longitudo 8 pedes aliquando superet; thorax hirsutus; capitis & collilatera pilis flavescentibus in fuscum vergentibus propendentibus circiter bipedalibus, reliquis pilis brevibus appressis; cauda floccosa. Anatome. E. N. C. d. 1. a. 2. obs. 6. Bartholin. ađ. 1671. n. 17. Nov. coment. Acad. Imper. Petropol. præ ann. 1771. T. XVI.

Tigris. 2. F. cauda elongata, corpore maculis omnibus virgatis. *Schreber Sacugth.* III. p. 381. t. XCVIII.

Felis flava, maculis longis nigris variegata. Briss. quadr. p. 195.

Tigris maculis virgatis. Ludolf. hist. æth. comm. p. 151.

Tigris. Gesn. quadr. 936. *Aldr. dig.* 101. *Jonst. quadr.* p. 84. t. 54. *Bont. jav.* p. 53.

Tigre. Buffon hist. nat. IX. p. 129. t. 9.

Habitat in Asia calidiore; etiam China & Japania, in ipso monte Ararat in silvis & dumetis, præsertim ad fluvios; animal astutissimum, crudelissimum, robustissimum, fœtidum, tremendæ velocitatis; homini pessimum, desolat præcipue Indos; etiam a partu cicuratum insitam ferociam exercet, ut primum a vinculis se liberavit, mas oc-

Felis genus sobrium, scandit facile arbores, cursu celer, noctu potissimum speculatur casu delabitur in pedes contusioni vix obnoxium; glans penis, ipsis muricatus retrorsum; retractis unguibus acutissimis incedunt, iisque fœvunt; inhiando sanguinem hauriunt; visa præda caudam movent; vegetalibus ultro non vescuntur. Femina multipais mammae 8, 4 pectorales, 4 abdominales,

vidit proprios liberos. Visus, qui necavit leonem. Salta ex insidiis prædam adoritur.

Pulcherrima fera, maculis virgatis transversis, magnitudine fere leonis.

Anatome. E. N. C. d. 1. a. 2. obs. 7. & a. 9. obs. 194.
S. G. Gmelin itin. russ. III. p. 483.

Pardus. 3. F. cauda elongata, corpore maculis superioribus orbiculatis; inferioribus virgatis. *Schreber Saength.* III. p. 384. t. XCIX.

Felis ex albo flavicans, maculis nigris in dorso orbiculatis, in ventre longis. Briss. quadr. p. 194.

Panthera, Pardus, Pardalis, Leopardus. Gesn. quadr. p. 824. Raj. syn. p. 166.

Pardus maculis seu scutulis varius. Ludolf hist. ath. comm. p. 51.

Panthère. Buffon hist. nat. IX. p. 151. t. 11. 12.

Habitat in Africa & calidioræ Asiæ parte; cauda non mensurata 5 - 6 pedes longa, Περδαλις μικρὴ Oppiani; homini non infesta, nisi irritetur; noctu domus ingreditur, & catos venatur; ceterum genio & prædandi more tigri similis.

Unica. 9. F. cauda elongata, corpore albido, maculis irregularibus nigris. *Erxleb. syst. mamm. p. 508. Schreber Saength.* III. p. 386. t. C.

Once. Buffon IX. p. 151. t. 13.

Habitat in Africa boreali, Persia, Hircania, Sina, Panthera Plinii, Περδαλις ολιγοποικ. Oppiani, prioribus mitior, ut cicurata venatui adaptari possit, & minor, ut corpus ipsum $3\frac{1}{2}$ pedes longitudine non superet.

Leopardus. 10. F. cauda mediocri, corpore fusco maculis subcoadunatis nigris. *Erxl. syst. mamm. p. 509. n. 5. Schreber Saengthiere,* III. p. 387. t. CI.

Uncia. Caj. op. p. 42. Gesn. quadr. p. 825.

Léopard. Buffon hist. nat. IX. p. 151. t. 14.

Habitat in Africa, præsertim occidentali; priori vix major, & moribus similis. Caro Hottentottis edulis.

Onca. 4. F. cauda mediocri, corpore flavescente, ocellis nigris rotundato-angulatis medio flavis. *Schreb. Saengthiere,* III. p. 388. t. CII.

Felis flavescens, maculis nigris orbiculatis, quibusdam rosam referentibus variegata. Briss. quadr. p. 196.

Felis cauda elongata, maculis subrotundis fere æqualibus:

Brown nat. hist. of Jamaic. p. 485.

Pardus aut *Lynx brasiliensis*, *Jaguara dictus*, *Lusitanis Onza. Raj. syn. p. 168.*

Tlatlauhqui ocelott seu tigris mexicana. Hermand. mex. p. 498.

Jaguara. Marcgraf. bras. p. 235. Pis. ind. p. 103.

Tigre de la grande espèce, que les Portugais appellent tigre royal. *Perr. anim. III. p. 287.*

Habitat in omni America meridionali ad Mexico usque; tigris ferocitate & moribus, non animositate æquans, quamvis omnibus præcedentibus minor; ex insidiis tribus saltibus prædam rapit; æquo insilit supra humeros; se triplo majorem aufert; gustato humano sanguine non desistit; capere primo æthiopem, tum europeum, ultimo americanum fertur; piscibus etiam vescitur; crocodili hostis; igne fugandus.

Corpus lutescens maculis ocellaribus nigris sæpe pupillari-gra una alterave instructis. Abdomen album maculis atris, ut in pedibus, ubi minores. Cauda corpore dimidio brevior, maculis nigris longis. An hujus varietas Guigna Chilensium? s. Felis cauda elongata corpore maculis omnibus orbiculatis?

Pardalis. 5. *F. cauda elongata, corpore maculis superioribus virgatis, inferioribus orbiculatis. Schreber Seugthiere, III. p. 390. t. CIII.*

Felis rufa, in ventre ex albo flavicans; maculis nigris, in dorso longis, in ventre orbiculatis variegata. Briss. quadr. p. 199.

Pardus cauda brevis. Klein quadr. p. 78.

Tlacoozelotl, Tlalocelotl, catus pardus mexicanus. Hernand. mexic. p. 512.

Catus pardus s. catus montanus americanorum. Raj. quadr. 169.

Ocelot. Buff. hist. nat. XIII. p. 239. t. 35. 36.

Mexican cat. Penn. syn. p. 177. n. 128.

Habitat in America calidiore, præsertim Terra firma, California & nova Hispania; viso cane arbores ascendit; hominem metuit, ceterum ferox nec mansuescens, simias eludere dicitur.

Magnitudo melis; supra fuscus, subtus albicans; lineæ punctaque nigra per totum corpus longitudinaliter sparsa, sed pedes & abdomen tantum punctis; latera lineis latioribus

albis & fuscis pinguntur. Aures breves margine bifidæ absque penicillis. Pedes 5-4. Cauda verticillato-variegata, proportionē cati. Myſtaces 4 ordinum, in ſingulis ordinibus ſetæ 3-5, albæ, baſi nigræ, longitudine capitis.

jubata. 11. F. cauda mediocri, corpore fulvo, maculis nigris, collo jubato. *Erxl. ſyſt. mamm. p. 510. Schreber Sæugth. III. p. 392. t. CV.*

Felis pilis crispis veſtita, maculis nigris variegata. Briffon anim. p. 271. n. 10.

Tygerwolf. Kolbe Vorgeb. p. 171. t. 6. f. 5.

Guépard. Buff. hiſt. nat. XIII. p. 249. 254.

Hunting cat. Penn. ſyn. p. 174. n. 125. t. 18. f. 1.

Habitat in Africa meridionali, & India; cicurata venatulus inſervit.

diſcolor. 12. F. cauda elongata, corpore potiſſimum nigro. *Schreber. Sæugth. III. p. 393. t. CIV. B.*

Felis nigra. Erxl. ſyſt. mamm. p. 512. n. 8.

Jaguarete. Marcgr. braſ. p. 235. Piſ. ind. p. 103. Raj. quadr. p. 169.

Once. des Marchais voy. III. p. 300.

Black tiger. Penn. ſyn. p. 180. n. 130. t. 18. f. 2.

Habitat in America meridionali, robuſta & crudeliſ.

Magnitudo vituli annui. Pili breves, colore ſplendido ex fuſco nigro; labium ſuperius, palmæ et plantæ albeſcent; labium inferius, gula, pectus, abdomen, interior pedum facies albeſcunt.

ſonclor. 9. F. cauda elongata, corpore immaculato fulvo. *Mantiſſ. pl. II. p. 522. Schreber Sæugth. III. p. 394. t. CIV.*

Felis ex flavo ruſcens, mento & infimo ventre albicantibus. Briffon anim. p. 272. n. 11.

Puma ſ. leo americanus. Hernand. mexic. p. 518.

Cuguacuara. Piſ. ind. p. 103.

Cuguacuarana. Marcgr. braſ. p. 235. Raj. quadr. p. 169.

Panther. Lawſon Carol. p. 117. Cateſb. app. p. XXV.

Tigris fulvus. Barrere Fr. équinox p. 166.

Cougouar. Buff. hiſt. nat. IX. p. 216. t. 19.

Brown cat. Penn. ſyn. p. 179. n. 129.

Habitat in America a Canada ad Patagoniamuſque; ſcandit arbores, hominem vix adoritur, ceterum atrox & aſtuta; ignem metuit.

Magnitudine & habitu corporis ad tigrin accedit, deſectum macularum differt.

tigrina. 13. *F. cauda elongata, corpore fulvo nigro striato maculatoque subtus albido. Erxl. syst. mamm. p. 517. n. 11. Schreb. Sæugth. III. p. 396. t. CVI.*

Felis ex griseo flavescens, maculis nigris variegata. Briss. quadr. p. 193.

Felis fera tigrina. Barr. Fr. équin. p. 152.

Maraguo live Maracaja. Marcgr. brasíl. p. 233.

Tepe Maxtlaton. Fernand. nov. Hisp. p. 9.

Margag. Buff. hist. nat. XIII. p. 248. t. 38.

Cayenne cat. Penn. syn. p. 182. n. 132.

Habitat in America australi, non cicuranda, avibus victians. Vox & magnitudo cati.

Catus. 6. *F. cauda elongata annulata.*

F. cauda elongata, auribus æqualibus. Faun. succ. 3.

ferus. α. *cauda elongata fusco-annulata, corpore fasciis nigricantibus, dorsalibus longitudinalibus tribus, lateralibus spiralis. Schreber Sæugthiere, III. p. 397. t. CVII. A. CVII. Aa.*

Felis pilis ex fusco flavicante & albido variegatis, cauda annulis alternatim nigris, & ex fordide albo flavicantibus. Briss. quadr. 192.

Felis sylvestris. Aldrov. digit. p. 582. fig. p. 583. Jonston quadr. p. 127. t. 72.

Catus sylvestris. Gesn. quadr. p. 353. Klein quadr. p. 75.

Chat sauvage. Buffon hist. nat. VI. p. 1. t. 1.

Wilde Kaze. Ridinger wilde Thiere, t. 240.

Wild cat. Penn. brit. zool. I. p. 47.

domestici- β. *minor, pilis brevioribus & crassioribus. Schreb. Sæugth. III. p. 397. t. CVII. B. 1.*

cus.

Felis domestica. Briss. quadr. 191.

Felis. Aldrov. dig. p. 564.

Felis vel catus. Gesn. quadr. p. 344. fig. p. 345.

Felis domestica. Jonst. quadr. p. 126. t. 72. Raj. quadr. p. 170.

Chat domestique. Buffon hist. nat. VI. t. 2.

angorensis. γ. *pilis longioribus argenteis sericeis, in collo longissimis. Schreber Sæugth. III. p. 398. t. CVII. B. 2.*

Felis pilis longissimis toto corpore vestita. Briss. anim. p. 266. n. 4.

Chat d'Angora. Buffon hist. nat. VI. t. 3.

Angora-cat. Penn. quadr. p. 184. n. 133.

δ. *nigro;*

hispani- ♂. nigro; albo; aurantioque varius.
cus: Chat d'Espagne: *Buff. hist. nat.* VI. t. 3.
 Tortoise-shell Cat. Penn: *quadr. p.* 184. n. 133. ♀.

cæruleus. ♂. pilis omnibus ex cæruleo cinereis.
 Chat des Chartreux. *Buff. hist. nat.* VI. t. 4.
 Blaue Kaze: *Kolbe Vorgeb. p.* 153.
 Blue Cat. Penn. *quadr. p.* 184. n. 133. ♂.

ruber. ♂. facia rubra in dorso a capite incipiente.
 Rothe Kaze. *Kolbe Vorgeb. p.* 153.
Habitat in Europæ & finitimæ Asiæ silvis. Moribus con-
generum; tranquilla ore molat; caudam erigit; excitata
agilissima, scandit, irata fremit odore ambrosiaco; oculi
noctulcent; pupilla interdiu perpendiculari oblonga, noc-
tu tereti ampliata; anguibus intro tractis incedit; parce
bibit; urina maris corrosiva; ructus fetidissimus; ster-
eus sepelit; clamando rixandoque misere amat; cum pul-
lis repentibusque ludit; in prædam intenta caudam mo-
vet; murium, & in statu fero aliorum etiam minorum
quadrupedum & avium leo; pacata in comessantibus; pul-
los convocat; carnes piscesque edit; calida, salsa vegeta-
biliæque respuit; os instante tempestate manu lavat; dor-
sum in tenebris elecrisat; in altum acia decidit in pedes.
Pulices non habet. Coit primo vere; per 63 dies gra-
vida, parit 6 cæcos per dies novem. Delectatur
maro; nepenthes, valeriana.

capensis. 14. F. cauda subelongata fusca nigro-maculata, corpore fulvo
 supra maculis virgatis infra orbicularibus, auriculis nu-
 dis macula lunata alba.

Cape-Tiger: Penn. *quadr. p.* 181. n. 131.

'Nussi. *Labat éth. I.* 177.

Felis tigrina capensis. Forster aâ. angl. Vol. LXXI. P. I.
 n. 1. t. 1.

Habitat in promontorii bonæ spei montosis silvis; mori-
bis cato similis, videtur leporibus, dipodibus, antilopis;
facile circuratur, mitis.

Manul. 15. F. cauda elongata nigro-annulata, capite punctis & fasciis
 duabus lateralibus nigris insignito. *Pallas itin. III. p.* 692.
 n. 2.

Habitat in apertis deserti tatarico-mongolici, præsertim
circa fluvios Selenga & Dschida; vescitur lepore daurico.
Magnitudo vulpis.

Serval 16. F. cauda subabbreviata, corpore supra fusco maculis nigris, orbitis ventrequæ albis. *Erl. syst. mamm.* p. 523. n. 13. *Schreber Sæugth.* III. p. 407. t. CVIII.

Chat-pard. *Perr. anim.* I. p. 108. t. 13.

Serval Buff. hist. nat. XIII. p. 233. t. 35.

Habitat in India & regno Tibetano, ut plurimum in arboribus; hominem metuit, nisi in iram acta, non circumranda.

Caus. 17. F. cauda mediocri, apicem versus annulata, apice ipso nigra, corpore reliquo ex fuscescente luteo, auriculis extus brunneis apice nigro barbatis. *Güldenstedt Nov. comm. Petrop.* X. ann. 1775. p. 483. t. XIV. XV. *Schreber Sæugthiere*, III. p. 414. t. CX. B.

Habitat in sitivosis desertorum circa mare caspium sitorum, præsertim in provinciis persicis Gilan & Masanderan.

Moribus, voce, viduato fero similis, magnitudinis inter hunc & lynxem media; loca culta non frequentat ferocissimum animal, raro arbores scandit, noctu per inundata & campos vagatur, pisces, mures, aves venaturum in prædum insiliens.

Caracal. 18. F. cauda subabbreviata & omni corpore unicolore ex fuscescente brunneo, auriculis extus nigris apice barbatis. *Schreb. Sæugth.* III. p. 413. t. CX.

Siyah-ghush. Charleton ex. 25. p. 23. Raj. quadr. p. 168. *Ad. angl.* LI. P. 2. p. 61. t. 14.

Lynx cauda vitulina. Klein quadr. p. 77.

Caracal. Buff. hist. nat. IX. p. 262. t. 24. & XII. p. 442.

Persian. cat. Penn. quadr. p. 189. n. 137. t. 19. f. 2.

Habitat in Barbaria, Persia & India; noctu prædatur, circumcuratus venatui inservit. Glans lavis.

rufa. 19. F. cauda abbreviata subtrus & apice alba, supra nigro-fasciata, corpore rufo fusco maculato, auriculis apice barbatis. *Schreber Sæugth.* III. p. 412. t. CIX. B.

Bay cat. Penn. quadr. p. 188. n. 136. t. 19. f. 1.

Habitat in provincia noveboracensi; cato magno duplo major.

An singularis sit species felis the lesser leopard Pennanti & the particular beautiful kinds of cat Kaempteri, in India orientali & Japonia habitans, decidunt autopsia; idem valet de Gingy Congensium & sele tigrina Tibetana; pariter de Colocolo Chilensium sive sele cauda elongata nigro-annulata, corpore albo maculis irregularibus æris flavisque. Molina hist. nat. Chil. p. 261.

Lynx.

7. F. cauda abbreviata, obsolete annulata apice atra, capite & corpore ex albido rufo nigro maculato, auriculis apice barbatis. *Schreber Saeugh.* III. p. 408. t. CIX.

Felis cauda abbreviata: apice atra, auriculis apice barbatis. *Syst. nat.* XII. I. p. 62. n. 7.

Felis cauda truncata, corpore rufescente maculato. *Fn. suet.* I. n. 4. *It. Wgoth.* 222.

Felis auricularum apicibus pilis longissimis præditis, cauda brevi. *Briss. quadr.* p. 200.

Pinus dasypus. *Nieremb. hist. nat.* p. 153.

Lupus cervarius. *Gesn. quadr.* 677.

Lynx. *Aldrov. dig.* p. 90. *Raj. quadr.* p. 166. *Jonston quadr.* p. 83. t. 71. *Buff. hist. nat.* IX. p. 231. t. 21. *Penn. quadr.* p. 186. n. 135.

Loup cervier. *Tournef. voy.* II. p. 193. t. 193.

Luchs. *Ridinger wild. Thiere*, p. 22.

8. cauda truncata, corpore albo, maculato. *Fn. suet.* I. p. 2. n. 5. & II. p. 5. n. 11.

Lynx colore albo, maculis nigris, cauda truncata. *Klein quadr.* p. 77.

Felis alba maculis nigris variegata, cauda brevi. *Briss. anim.* p. 274. n. 14.

Habitat in Europæ, Americæ, Asiæ borealis, etiam Japoniæ silvis densioribus, in arboribus degens; venatur cervos, martes, aliasque mustelæ species, catos, sciuros; visitat leporibus, sciuris, avibus, ipsisque adeo, si fame prematur, ovibus & capris stabulantibus; astutissimum animal visu & odoratu acutissimo in prædam insilit; coit Februario, & 9 hebdomadibus elapsis 3-4 catulos parit.

Magnitudo circiter vulpis, β paulo inferior. Cauda femoribus paulo brevior; Palpebra superior versus canthum majorem & inferior albicans. Macula linearis fusca pone oculos. Manus amplissima.

14. VIVERRA. *Dentes primores VI: intermediis brevioribus.*

laniarii utrinque I, reliquis longior.

molares plures quam tres.

Lingua retrorsum sæpe aculeata.

Ungues exserti.

Ichneu-*i.* V. cauda e basi incrassata sensim attenuata apice floccoso, pollicibus remotiusculis. *Schreber Sæugth. III. p. 427. t. CXV. B.*

Mustela pilis ex albedo & nigro variegatis vestita. Briss. quadr. p. 181.

Meles digitis mediis longioribus lateralibus æqualibus, unguibus subuniformibus. Hasselq. it. p. 191.

Ichneumon, que les Egyptiens nomment rat de Pharaon. Belon obs. p. 95.

Ichneumon f. lutra Egypti. Aldrov. dig. p. 298. fig. p. 301.

Ichneumon. Gesn. quadr. p. 566. Alpin. hist. Æg. p. 234. t. 14. f. 3. Maillet descr. de l'Egypt. p. 90. t. 88. Shaw travels T. II. t. ad p. 74. fig. sup. Penn. quadr. p. 226.

Habitat in Ægypto ad ripas Nili, quo exundante in hortos & pagos recedit. Mansuescit; more felis in domibus murres venatur; his præsertim, gallinis, vermibus, insectis, variisque amphibis, serpentibus, ranis, lacertis, crocodili ovibus viçitat; mustelarum, catorum hostis, quos trucidat; animosum & astutum animal repit & prosilit ad prædam. Calcaneis incedit.

Frons plana. Labium superius prominens. Auriculæ rotundatæ. Mystaces simplici serie in omnibus labiis lateralibus ad marginem. Lingua scabra. Cauda longitudine corporis. Folliculus ante aperturam ani sub æstu apertus. Pili albedo & griseo nigrescente verticillati. Magnitudo cati.

Mungo. 7. V. cauda e basi crassa sensim attenuata non floccosa, pollicibus remotiusculis. *Schreber Sæugthiere, III. p. 430. t. CXVI. A. CXVI. B.*

Viverra ichneumon β. Syst. nat. XII. 1. p. 63.

Mustela glauca. Syst. nat. 5. Amœnit. acad. II. p. 109.

Viverra ex griseo rubescens. Briss. quadr. p. 177.

Mustela f. *viverra* Indis Mangutia. *Kaempf. amœn. exot.* 574. t. 567.

Quil vel Quiopela. *Garcias arom. p. 214. Raj. quadr. 197.*
Serpenticida five Moncus. *Rumpf. herbar. amboin. aud. p.* 69. t. 72. f. 2. 3.

Indian ichneumon. *Edw. av. 199. t. 199.*

Ichneumon indien. *Vosmaer descript. Amst. 1772. 4.*

Ichneumon. *S. G. Gmelin it. III. t. 30.*

Mangouste. *Buffon hist. nat. XIII. p. 150. t. 19.*

Habitat in Bengala, Persia, aliisque Asiæ calidioribus plagis; ichneumone minor & glauca; ceterum moribus, vidu, præda, corporis habitu similis; cum serpentibus, ipsaque naja dimicat, morsa ab his ophiorhizam assumere fertur; a vento reformidat; cicurata more capis sequitur; mundum animal, frigoris impatiens.

cafra.

8. V. cauda e basi crassa sensim attenuata apice atra. *Schreber Sæugh. III. p. 434. n. 9.*

Habitat in promontorio bonæ spei; habitu externo mustelæ putorio similis, longitudine mustelæ lutræ æqualis. Auriculæ brevissimæ, pilosæ. Mylæces simplici serie, nigrescunt, Pili nitentes, asperi, ex lutea, fusco & nigro misti. Pedes nigricant.

Zenik.

27. V. tetradactyla, corpore griseo, fasciis 10 transversis nigris, cauda ex atro spadicea, versus apicem nigra. *Zénik des Hottentots. Sonner. it. 2. p. 145. t. 92.*

Habitat in terra Hottentotum, muris amphibii magnitudine.

Palmarum ungues prælongi, fere recti; plantarum breves, uncinati; cauda gracilis; rostrum elongatum; dentes, ut quidem numerat Sonnerat, in utraque maxilla primores 2, canini 6.

tetrada-
ctyla.

9. V. pedibus tetradactylis, naso producto mobili. *Schreber Sæugh. III. p. 434. t. CXVII. Miller on various subjects. T. XX.*

Suricate. Buffon hist. nat. XIII. p. 72. t. 8.

Viverris corpus longum, æqualis crassitie, pedes breves, plerumque pentadactyli, ungibus immobilibus, auriculæ parva, rostrum acutum, inter anum & genitalia rima, ducens ad folliculum unguine scitido in propriis glandulis secreto resectum. Cursus celer; alia calcaneis incedunt, alia scandunt, alie fodiunt. Femina multipara. An 2, 3 & 9 cum leure flavo potius meli jungenda?

Habitat in Africa australi.

Longitudo pedalis, & una cum cauda fefquipedalis; viſitat carnibus, præcipue ovīs & piſcibus; pedibus anterioribus fodit; facile manſueſcit, tunc miriſſima.

Nafua. 2. *V. rufa*, cauda albo annulata, naſo producto mobili.

Schreber Sæugh. III. p. 436. t. CXVIII.

Urfus naſo producto et mobili, cauda annulatim variegata. Briff. quadr. p. 190.

Vulpes minor, roſtro ſuperiori longiuſculo, cauda annulatim ex nigro & ruſo variegata. Quachy. Barr. Fr. équin. p. 167.

Coati. Marçgr. braſil. p. 228.

Coati mondi. Ad. Pariſ. T. III. P. 3. p. 17. t. 37. Raj. quadr. p. 180. Houttuyn ſamenſtel II. p. 238. t. 15. f. 2.

Coati noirâtre. Buff. hiſt. nat. VIII. p. 358. t. 48.

Braſilian Weeſel. Penn. quadr. p. 229. t. 22. f. 1.

Habitat in America australi, egregie fodit, quæſiturus lumbricos; viſitat etiam muribus, pomis, pane; dum iræſcitur, peſſime ſætet.

Corpus magnitudine cati, ſtatura lotoris; ruſum, ut in vulpe, pilis in dorſo rigidulis. Macula albida, ſupra, infra et pone oculum. Auriculæ parvæ, ſupra nigræ. Verruca ſupra palpebram ſuperiorem, ſub oculo; in bucca, ſub gula. Gula flavescens. Naſus educus in proboscidem nigram, longiſſimam, undique mobilem, apice introrſum truncatam, abſque lacuna ſubtus. Dentes primores ſuperiores laterales majores; inferiores medii convergentes. Lingua ſiſſuris lobata, ut ſilium quercus. Cauda erecta, corpore longior, ruſca, annulis 10 pallidis, pilis patulis depreſſa, apice compreſſa. Pedes calcaneis incedentes tarſo greſſu, etiam ſcandentes. Digiti ſingulis 5, pollice non remoto. Ungues acuti compreſſi.

Nanica. 3. *V. ſubruſca*, cauda concolore, naſo producto mobili. *Schre-*

ber Sæugh. III. p. 438. t. CXIX.

Urfus naſo producto & mobili, cauda unicolore. Briff. quadr. 190.

Coati brun. Buff. hiſt. nat. VIII. t. 48.

Habitat in America australi, tam profunde fodiens, ut totius animalis ſola cauda promineat; caſo & naſua paullo major. Edit lumbricos, panem, fruſtus, radios; aquam etiam intrat, & in arbores adſcendit.

Vulpecula- IO. V. tota castanea, naso producto. *Schreber Sacugth.*
 III. p. 440. t. CXX.

Yzquiepatl seu vulpecula, quæ maitzium torrefactum
 æmulatur colore. *Hernandez mexic. p. 332. Raj. quadr.*
 p. 181.

Coase. *Buffon hist. nat. XIII. p. 288. 299. t. 38.*

Stirling Weefel. *Penn. quadr. p. 230. n. 165.*

*Habitat in Virginia & nova Hispania, foetidissima videtur
 vermibus, scarabæis, avibus. Longitudo 16 pollicum.
 Mystaces nigra. Palmae tetradaçylæ.*

Quasje. II. V. castanea subtus flavescens, naso producto, cauda
 annulata. *Syst. nat. X. I. p. 44.*

Meles ex saturate spadiceo nigricans, cauda fusca annulis
 flavicantibus quasi cincta. *Briss. quadr. p. 185.*

Ichneumon de yzquiepatl. *Seb. mus. I. p. 68. t. 42. f. 2.*

Tamandua mexicana, yzquiepatl seu vulpecula dicta.
Seb. mus. I. p. 66, t. 40. f. 2?

*Habitat Surinami; fodit, vermibus, insectis, frustibus
 vescens, mansuescens, foetida.*

Putorius. 4. V. nigricans lineis quinque dorsalibus parallelis albidis.
Schreber Sacugt. III. p. 442. t. CXXII.

Mustela nigra, tæniis in dorso albis. Briss. quadr. p. 181.

Polcat, *Catesb. carol. II. p. 62. t. 62.*

Polcat, Skunk, Fiskatta. *Kalm itin. II. p. 378.*

Conepate. *Buffon hist. nat. XIII. p. 288. t. 40.*

Striated Weefel. *Penn. quadr. p. 232. n. 166.*

*Habitat in America septentrionali, antra fodiens, die dor-
 miens, noctu currens, lumbricis & insectis viduans, car-
 nium, avium, ovorum amans; a canibus dum urgetur,
 se contrahit; irritatus, instar plurimarum hujus generis
 specierum, halitum explodit, quo nihil foetidius; in-
 cessu tardus nec homines nec feras metuens; vestes fo-
 tore inquinatæ purgantur sepeliendo per diem. A. Kuhn.
 Fodit & scandit, talis incedit, cati magnitudine.*

*Magnitudo martis. Color subtus ex albo & nigro varie-
 gatus. Pedes talis incedentes. Ungues 5-9: antero-
 res compressi longi; posteriores breviores, subtus excavati.
 Dentes primores superiores paralleli depressi æquales;
 inferiores 6 æquales compressi, quorum 2 interiores; mo-
 lares 3; laniarii supra & infra utrinque approximati,
 infra tamen magis. Caput subglobosum, rostro producto,
 naso nudo; mystacum triplici ordine; rostro brevi; col-
 lum brevissimum; palmae breviores unguibus longissimis;*

plantarum ungues breviores ; cauda horizontalis apice alba , pilis longissimis ; penis osse cartilagineo.

Conepatl. 12. *V. nigricans*, lineis duabus albis dorſalibus per caudam productis.

Conepatl ſeu vulpecula puerilis. *Hernand. mex.* p. 232.
Habitat in nova Hiſpania.

Mephitis. 13. *V. dorſo albo*, linea longitudinali alba. *Schreb. Sæugth.* III. p. 444. t. CXXI.

Chinche. *Buffon hiſt. nat.* XIII. p. 294. t. 39.

Skunk Weefel. *Penn. quadr.* p. 233. n. 167.

Habitat in America a regno Chilenſi ad Canadam uſque, manſueſcens, ſectore horrendo ſe defendens, ova venatur.
Longitudo 16 pollicum. Pili longi ſplendidi. Cauda po-
tiſſimum alba.

Zorilla. 14. *V. albo nigroque variegata.* *Schreber Sæugth.* III. p. 445. t. CXXIII.

Zorilla. *Buffon hiſt. nat.* XIII. p. 289. t. 41.

Mapurito, Maſutiliqui. *Gumilla Orenoq.* III. p. 240.

Habitat in America aſtrali.

Longitudo 14 pollicum. Cauda corpore brevior poſtea alba. Roſtrum breve & obtuſum. Pili longi.

Mapurito. 15. *V. nigra*, fascia nivea a fronte ad dorſi medium producta auriculis nullis.

Viverra Putorius, Mutis æt. Holmiens. 1769. p. 68.

Habitat in nova Hiſpania circa metalla Pamplonæ, interdum dormiens, noctu vagans, curſu veloci; viſitat vermibus & infectis, profunda antra fodit.

Longitudo corporis 20, caudæ apice albicantis 9 pollicum.

Pedes pentadactyli, talis incedentes, unguibus longis.

Caput parvum. Roſtrum elongatum. Lingua lævis.

vittata. 16. *V. nigricans*, vitta alba ab humeris ad frontem producta. *Schreber Sæugth.* III. p. 447. t. CXXIV.

Grifon. *Buffon hiſt. nat.* ed. *Allam.* XV. p. 65. t. 8.

Chinche *Feuillé voy.* I. 272?

Yaguane ; Maikel. *Falkner Patagon.* p. 158. 159?

Habitat Surinami, ſorſan in omni America aſtrali.

Pedes pentadactyli. Cauda corpore brevior, pilis etiam brevioribus. Auriculæ brevæ.

Zeylanica. 17. V. supra cinerea, fusco mista, infra albida. Schreb. *Sæugthiere*, III. p. 451.

Martes philippinensis. *Camell. ad. angl.* XXV. p. 2204?

Habitat in Zeylona, forsan quoque in insulis Philippinis. Magnitudine et habitu ad martes accedit. Pedes pentadactyli, unguibus paulisper retrahilibus. Cauda longitudine corporis, basi paullo crassiore. Mystaces albæ, ordine 5 plici, labium inferius dentatum. Dentes primores superiores laterales longiores conici, medii obtusi. Lingua verrucosa.

Capensis. 18. V. nigra, dorso griseo albo-marginato. *Erxl. syst. mamm.* p. 493. Schreb. *Sæugth.* III. p. 450. t. CXXV.

Mustela subfusca, linea longitudinali alba per utrumque latus ducta. *Brown. jamaic.* p. 486. n. 1?

Stinkbinksen. *Kolbe Vorgeb.* I. 167.

Blaireau puant. *la Caille voyag.* p. 182.

Fizzler. *Penn. quadr.* p. 234. n. 269.

Habitat in Capite bonæ spei et Guinea, melle sylvestri pasci fertur, fectore contra hostes se defendens.

Longitudo bipedalis, caudæ octo pollicum. Auriculæ nullæ. Pili longi et asperi. Annon galoni adjungenda?

Civetta. 19. V. cauda superius maculata, versus apicem fusca, juba castanea, dorso cinereo fuscòque maculato. Schreber *Sæugth.* III. p. 418. t. CXI.

Meles fasciis et maculis albis nigris et rufescentibus variegata. *Briss. quadr.* p. 186.

La civette, qu'on nommoit anciennement hyæna, *Belon observ.* 208. fig. p. 209.

Civetta. *Clus. cur. post.* p. 57.

Felis zibethi. *Gesn. quadr.* p. 836. *Aldrov. dig.* p. 342. *Olear. gottorf. Kunstkam.* p. 7. t. 6. f. 3.

Civetta. *Buffon hist. nat.* IX. p. 299. t. 34.

Habitat in Æthiopia, Guinea, Congo, Capite bonæ spei. Corporis habitu catum refert, capitis forma propius ad mungo accedit: Sub oculis macula, in dorso numerosæ rotundatæ & angulatæ maculæ castaneæ, quæ versus crura in strias abeunt. Pedes ex atro fusci. Dentes molares in utraque maxilla utrinque sex.

Zibetha. 5. V. cauda annulata, dorso cinereo nigroque undatim striato. Schreber *Sæugth.* III. p. 420. t. CXII.

Felis zibethi. *Gesn. quadr.* p. 837.

MAMMALIA FERÆ. Viverra.

Animal zibethi vel hyæna veterum Bellonii. Aldrov. dig. p. 343. Raj. quadr. p. 178.

Animal du musc. Ad. Paris. 1731. p. 443.

Zibet. Buff. hist. nat. IX. p. 299. t. 31.

Habitat in Arabia, Malabar, Siam, et insulis Philippinis; fera, indomita, mansuescens quidem, sed facile in priorem ferociam revertens; irata pilos dorso erigit; morsu se defendit; vescitur animalibus minoribus, avibus, piscibus, radicibus adeo et fructibus; facile et scandit et currit.

Corpus gracile et oblongum, magis quam quidem civetta; rostrum quoque longius et tenuius, supra paulisper emarginatum. Dentes primores superiores sex paralleli; intermedii paulo minores; inferiores paralleli: medii paulo breviores; alternis interioribus. Laniarii solitarii, utrinque distantes. Molares acuti, denticulati, inferiores utrinque 5, superiores 6. Auriculæ rectæ, breviores quam civettæ. Corporis pili cinereo nigroque undati, rigidiusculi, appressi. Pedes fusci, subtus nigri. Cauda longior quam civettæ. Longitudo corporis $2\frac{1}{2}$ pedum. Folliculus zibethi inter anum et genitalia in utroque sexu 1, propria apertura folliculi, distincta ab ano & vulva, prominens, ambrosiaca.

Anatome. Bartholin. cent. 4. n. 1. et cent. 5. n. 49.

Castellus. P. Hyæna odorifera. Francof. 1698. 8.

herma- 20. V. cauda elongata apice atra, striis tribus dorsalibus
phrodita. nigris. *Schreber Sæugth. III. p. 426. n. 6.*

Habitat in Barbaria.

Magnitudo inter civettam et genetam media. Rostrum ab apice ad et ultra oculos, gula, mystaces, pedes nigri. Infra oculos et inter mystaces macula alba. Pili longi, ad cutem cinerei, apice nigri. Cauda corpore longior. Ungues lutei. Inter penem et anum regio calva, cute tenera plica duplici. Pallas.

Genetta. 6. V. cauda annulata corpore fulvo-nigricante maculato. *Schreber Sæugth. III. p. 423. t. CXIII.*

Mustela cauda ex annulis alternatim albidis et nigris variegata. Briss. quadr. p. 186.

Genette. Belon obs. p. 73. Gesn. quadr. p. 549.

Genette. Buffon hist. nat. IX. p. 343. t. 36.

Genethkaze, Chat d'Espagne. Ridinger illuminirte Thiere. t. Q. D. S. XXVIII.

Habitat circa Constantinopolin, in Asia occidentali & Hispania, mitis & facile mansuescens, ut felis, venatur mures, olet moschum, odore tamen debiliore & fugace.

Ad Zibethum prope accedit, rostrum tamen magis acutum, pedes breviores, cauda longior. Longitudo corporis sine cauda 5 pollicum ultra pedem; cum cauda $2\frac{1}{2}$ pedum. Dentes molares utrinque 6. Pili cinerei, apice spadicci aut nigri.

Fossat. 21. V. cauda annulata, corpore cinereo nigro maculato. *Erzl. syst. mamm. p. 498. Schreber Sæugthiere, III. p. 424. t. CXIV.*

Fossane. Buffon hist. nat. XIII. p. 163. t. XX. Penn. quadr. p. 237. n. 272. t. 22. f. 2.

Habitat in Madagascar, forsitan quoque in continente Africa. Magnitudine & forma ad genettam accedit; neque tamen zibethum olens. Ne folliculus quidem hactenus inventus.

nigrina. 22. V. cauda annulata apice fusca, corpore cinereo fusco-maculato, stria a capite ad caudam producta nigra. *Schreber Sæugthiere, III. p. 425. t. CXV.*

Chat-bizzam. Vosmaer descr. d'une espèce singul. de chat africain. Amst. 1771.

Habitat in capite bonæ spei.

Magnitudo cati domestici; satis mitis; carnis præsertim avium amans; Zibethum non olet; an a fossa vere distinda?

caudivolvula. 23. V. flava nigro-mixta, cauda unicolore prehensili. *Schreber Sæugthiere, III. p. 453. t. CXXV. B. et l. p. 145. t. XLII.*

Yellow maucauco. Penn. quadr. p. 138. n. 108. t. 16. f. 2.

Habitat in Jamaica, mansuetus & lepidus scandit arbores. Corpus longitudine 19 circiter pollicum. Cauda vix brevior, apice prehensilis, castanea atq. mixta. Pedes breves et crassi.

mellivora. 24. V. dorso cinereo, fascia laterali nigra, abdomine nigro, unguibus longis subtus cavis, fossoriis. *Blumenbach Naturg. p. 97.*

Ratel. Sparrmann ad. Stockh. 1777. t. IV. f. 3.

Habitat ad caput bonæ spei, victitans melle ceraque apium sylvestrium in caveis hystricis, dipodis, cuniculi, canis aurei, etc. nidulantium, quos volantes observat, aut cu-

MAMMALIA FERÆ. Viverra. Mustela.

culo indicatore duce quærit. Vellus villosum, cute robustâ, laxè corpus ambiens.

- fasciata. 25. V. caudæ pilis longis nigris et rufescentibus, corpore griseo fasciis 6 nigris longitudinalibus vario, subtus albo. Chat sauvage à bandes noires des Indes. Sonner. it. 2. p. 193. t. 90.

Habitat in India, 2 pedes et 9 pollices longa.

Dentes primores in utraque maxilla 2, canini 14 (sec. Sonnerat) pedes pentadactyli, unguibus fortibus uncinatis; oculi vividi.

- malaccen- 26. V. cauda nigro annulata elongata, corpore griseo supra nigro-guttato, maculis quatuor rotundis supra oculos, fasciis colli dorſique tribus nigris.

Civette de Malacca. Sonner. it. 2. p. 144. t. 91.

Habitat in Malacca, cati magnitudine et moribus, ferox, prædans, agilissima, ab arbore in arborem salit, odorem moschi spargens, liquorem ejus æmulum continens, cujus virtutem aphrodisiacam et ventriculum roborantem prædicant Malaii.

Corpus margaritaceum, serie guttarum nigrarum 6, septuplici in dorſo; caput supra, pedes et femora nigra; auriculæ exiguæ, rotundæ; oculi nigricantes parvi; pedes pentadactyli; unguibus acutis, uncinatis, retradilibus; an ideo felis? Rostrum elongatum, corpus productum vetat.

15. MUSTELA. *Dentes primores superiores VI erecti acutiores distincti. inferiores VI obtusiores conferti: duo interiores.*

Lingua lævis.

* *plantis palmatis, Lutræ.*

- Lutris. 1. M. plantis palmatis pilosis, cauda corpore quadruplo brevior.

Lutra marina plantis pilosis, cauda pilosis, cauda corpore quadruplo brevior. Erzl. mamm. p. 445. Schreber Sæugth. III. p. 465. t. CXXVIII.

Lutra marina. Steller nov. comment. Petrop. Tom. II. p. 367. t. 26.

Brafilien- β . L. atri coloris, macula sub gutture flava. *Briss. quadr.*
fis. p. 202.

Lutra brasiliensis. Raj. quadr. p. 189. Klein quadr. p. 91.

Lutra nigricans, cauda depressa et plana, Barrer. Fr. equin. p. 155.

Jiya, quæ et carigueibeiu a Brasiliensibus. Marcgr. brasil. p. 234. Jonst. quadr. t. 66.

Saricovienne. Buffon hist. nat. XIII. p. 319.

Habitat in oceano Asiam et Americam inter medio, β in fluviis Americæ meridionalis.

Caput depressum. Auriculæ minima, villosæ, subrotundæ.

Os obtusissimum. Mystaces copiosæ, rigidulæ: supra supercilia; pone oculos; pone sinum oris; ad latera labii inferioris; sub gula. Dentes primores superiores 6 æquales; inferiores 6: duobus alternis interioribus et duobus bilobis lateralibus. Pedes 5-5, palmati omnes. Cauda depressa, corpore paulo brevior. An hujus varietas, an propria species mustela felina, ad littus Chilense obvia, plantis palmatis pilosis, cauda tereti elongata conspicua? Molina hist. nat. Chil. L. IV. p. 252.

Lutra. 2. M. plantis palmatis nudis, cauda corpore dimidio brevior. *Fn. suec. p. 12. S. G. Gmelin it. III. p. 285. 373.*

Lutra plantis nudis, cauda corpore dimidio brevior. Erzleb. mamm. p. 448. n. 2. Schreber Sæugth. III. p. 457. t. CXXVI. A. B.

Lutra digitis æqualibus. Faun. suec. I. n. 10.

Lutra. Gefn. quadr. p. 775. fig. p. 776. Gefn. aquat. p. 608. Aldrov. digit. p. 292. f. 295. Jonst. quadr. p. 150. t. 68. Raj. quadr. p. 187.

Loutre. Buffon hist. nat. VII. p. 134. t. 11. XIII. p. 323. t. 45.

Otter. Penn. quadr. p. 238. n. 173.

Fischotter. Ridinger wilde Thier. t. 28.

Multijs quidem notis conveniunt lutræ cum mustelis, corpore elongato, æqualis crassitie, pedibus brevibus, pilis nudentibus, unguibus immobilibus; in antris degunt, noctu præsertim vagantur & prædantur; æst lutræ in aquis perpetuo degunt, supra et infra aquam nant, piscibus præsertim videntur; non scandunt, aut incurvato corpore, et protensa cauda saliant, uti mustelæ; caput ipsis est crassius et majus, lingua mollibus aculeis instructa; lutris in utraque maxilla molares dentes utrinque 3, mustelis $\frac{3}{2}$ aut $\frac{4}{2}$; an ideo removenda a mustelis proprium genus constituent lutræ?

MAMMALIA FERÆ. Mustela.

Habitat in Europæ, septentrionalis Americæ et ad Persiam usque Ahiæ aquis dulcibus, fluviiis, stagnis, piscinis, non in mari. Vidit piscibus, ranis, cancris; piscinas devastat. Nidus sub terra, supra aquæ superficiem, aditu sub aqua; coit Februario; advocat feminam sono lento susurrando; parit Majo pullos 3-4. Astutum & mordax animal, ut tamen cicurari possit.

Anatome. E. N. C. d. 1. a. 3. obs. 195. & dec. 2. a. 10. obs. 112. & cent. 10. app. 468.

Lutreola. 3. M. plantis palmatis hirsutis, digitis æqualibus, ore albo.
Fn. succ. 12. Lepechin it. I. p. 176. t. 12.

Lutra minor, plantis hirsutis, digitis æqualibus, ore albo.
Erxleb. mamm. p. 451. n. 3. Schreb. Sæugth. III. p. 462. t. CXXVII.

Viverra fusca ore albo. *Leohe Að. Holm. 1759. P. XXI. p. 292. t. 11.*

Viverra Lutreola. *Pallas spicil. vol. XIV. p. 46. t. III. f. 1. Noerz. Agric. de anim. subterræ. p. 39.*

Lesser otter. *Penn. quadr. p. 239. n. 174. t. 21. f. 2.*

Habitat in Germaniæ (parcius), Poloniæ, Finlandiæ, Russiæ, Sibirix aquosis, visitans piscibus, ranis. Pedem longitudine viz excedit. Cum spec. 1. viverris adjungit vult Pallas.

Vison. 5. M. plantis palmatis, corpore saturate castaneo unicolore.
Schreber Sæugth. III. p. 463. t. CXXVII. B.

Mustela pilis coloris saturate castanei in toto corpore vestita.
Briss. quadr. p. 178. n. 6.

Vison. *Buffon hist. nat. XIII. p. 304. t. 43.*

Minx. *Lawson Carol. p. 121.*

Mink. *Kalm. it. III. p. 22.*

Habitat in America septentrionali ad aquas; piscibus, avibus, muribus vescitur, aliquando pagos frequentans.

* * pedibus fissis, Mustelæ.

barbara. 4. M. pedibus fissis, atra, collo subtus macula alba triloba.
Mustela maxima atra moschum redolens, Tayra. Barrere Fr. équin. p. 155.

Guinea weasel. *Penn. quadr. p. 225. n. 161.*

Habitat in Guiana & Brasilia.

Corpus statura martis, nigrum pilis rigidioribus. Auriculæ rotundæ villosæ. Area cinerascens ante oculos. Macula sub medio collo, non sub gula, albida. Mammæ 4 pone umbilicum.

An huc spectat Cuya Chilensium, cauda mediocri, pilis mollibus, labio superiore subtruncato conspicua? Molina hist. nat. Ch. p. 258.

- Galera.** 12. *M. tota fusca, pedibus fissis. Erzl. mamm. p. 453.*
Galera subfusca, cauda elongata, oculis nigris, auribus subnudis appressis, the Guinea fox. Brown. jamaic. p. 485. t. 29. f. 1.
Vanfire. Buffon hist. nat. XIII. p. 167. t. 21.
Tayra ou Galera. Buffon hist. nat. XV. p. 155.
Madagascar weesel. Penn. quadr. p. 224. n. 158.
Guinea weesel. Penn. quadr. p. 225. n. 160.
Habitat in Guinea & Madagascar.

- Canada-** 13. *M. pedibus fissis, corpore fulvo nigricante, pectore*
fis. macula alba. Erzl. mamm. p. 455. Schreber Saeguth.
III. p. 492. t. CXXXIV.
Pekan. Buffon hist. nat. XIII. p. 304. t. 42.
Habitat in Canada, absque cauda bipedalis.

- Foyna.** 14. *M. pedibus fissis, corpore fulvo nigricante, gula alba.*
Erzleb. mamm. p. 458. Schreber Saeguth. III. p. 472.
t. CXXIX.
Mustela pilis in exortu albidis castaneo colore terminatis
vestita, gutture albo. Briss. quadr. p. 178.
Martes domestica. Gefn. quadr. p. 765. Aldrov. dig. p.
332. Jonst. quadr. p. 156.
Martes, aliis Foyna. Rej. quadr. p. 200.
Fouine. Buffon hist. nat. VII. p. 161. t. 18.
Martin. Penn. quadr. p. 215. n. 154.
Marder. Ridinger kleine Thiere, t. 85.
Habitat in Anglia, Germania, Gallia & Europa austr-
liore. Noctu vagatur, quadrupedibus minoribus, ranis,
avibus victitat, gallinarum et ovorum precipue amans,
fructus etiam horzorum vorat, cati insensissimus hostis;
mansuecit, si junior captus fuerit; femina 3-4, adulta
ad 7 pullos parit.

- Martes.** 6. *M. pedibus fissis corpore fulvo nigricante, gula flava. Erzl.*
mamm. p. 455. Schreb. Saeguth. III. p. 475. t. CXXX.
Mustela pilis in exortu e cinereo albidis castaneo colore
terminatis vestita, gutture flavo. Briss. quadr. p. 179.
Martes silvestris. Gefner quadr. p. 766.
Martes abietum. Raf. quadr. p. 200.
Martes. Aldr. dig. p. 331.

MAMMALIA FERÆ. *Mustela*.

Marte. *Buffon hist. nat.* VII. p. 186. t. 22.

Pine Martin. *Penn. quadr.* p. 216. n. 155.

Marder. *Ridinger wild. Thier.* t. 30.

Habitat in Americæ, Asiæ & Europæ septentrionalis; rarius in Angliæ, Galliæ, Germaniæ, Hungariæ incolitis; noctu vagatur, interdum in cavis arboribus, nidis sciurorum, etc. degens; his præsertim, muribus, aviculis, baccis, fructibus etiam horæis & melle viçitat, hieme etiam columbas & gallinas venatur; coit Februario, per 9 menses gravida 7-8 pullös parit. Capite brevior, et pedibus paulo longioribus a Foina distincta.

Zibellina. 9. *M. pedibus fissis, corpore obscure fulvo, fronte exalbida, gutture cinereo. Schreb. Saeguth. III. p. 478. t. CXXXVI.*

Pallas spicil. zool. XIV. p. 54. t. III. f. 2.

Mustela obscure fulva, gutture cinereo. Briss. quadr. p. 180.

Mustela sobella. Gessn. quadr. p. 768.

Mustela Zibellina: Aldr. dig. p. 335. Jonst. quadr. p. 156.

J. G. Gmelin nov. comm. Petrop. T. V. p. 338. t. 6.

Zibeline. Buff. hist. nat. XIII. p. 309.

Sable & Fisher Weasel: Penn. quadr. p. 217. & 223. n. 156. 157.

Habitat in Asia et America septentrionali, olim quoque in Lapponia, in Asia ad 58^{um}, in America ad 40^{um}, latitudinis gradum, cati infesta; mustelis, sciuris, leporibus hieme avibus præcipue tetraonibus, autumnö baccis viçitat; noctu prædatur, interdum dormiens; coit Januario; sub finem Martii parit femina 3-5 pullos.

Proxime ad Martem accedit, a quo tamen capite magis porrecto, auriculis longioribus, margine flavescente oindis, pilis longioribus et splendidissimis, pedibus magis hirsutis, et caudâ præsertim, quæ brevior est pedibus posticis extensis, differt.

Varietas alba rarissima, vix frequentior ea, quæ macula collari albida aut flava insignitur.

Putorius. 7. *M. pedibus fissis, corpore flavonigricante, ore auriculisque albis. Schreber Saeguth. III. p. 485. t. CXXXI. Faun. suec. 16.*

Mustela pilis in exortu ex cinereo albidis colore nigricante terminatis vestita, oris circumferentia alba. Briss. quadr. p. 186.

Mustela flavescente-nigricans, ore albo, collari flavo. Syst. nat. VI. p. 5. n. 3.

Putorius

Putorius. *Gesn. quadr. p. 767. Aldr. dig. p. 329. fig. p. 330.*

Jonst. quadr. p. 154. t. 64. Raj. quadr. p. 199.

Putois. *Buffon hist. nat. VII. p. 199. t. 23.*

Polecat. *Penn. quadr. 213. n. 152.*

Htnis. *Ridinger wild. Th. t. 20.*

Habitat inter Europæ, etiam aliquando Russiæ asiaticæ rupes, lapidum acervos, rudera, in stabulis, horreis, domibus, arboribus cavis; interdiu dormit, noctu prædatur cuniculos, mures, talgas, gallinas, alias aves, hieme ranas & pisces; ova rapit; alvearia devastat; ano, ut 7, 9, 14, habitum fortissimo.

Capite crassiore, rostro acutiore, cauda brevior; pilorum potissimum colore a marte differt; in desertis Russiæ asiaticæ nonnunquam alba. Mas plerumque subflavus ore albido. Femina albido-subflava.

Furo. 8. *M. pedibus fissis, oculis rubicundis.*

Mustela corpore pallide flavo. Erxl. mamm. p. 465. Schreb. Sæugth. III. p. 488. t. CXXXIII.

Mustela viverra mas, pilis subflavis, longioribus castaneo terminatis vestita, & Mustela viverra femina, pilis ex albido subflavis vestita. Briss. quadr. p. 177.

Mustela silvestris. Aldr. dig. fig. p. 327. Jonst. quadr. p. 154.

Mustela silvestris, viverra dicta. Raj. quadr. p. 198.

Furo. Gesn. quadr. p. 762.

Furet & Furet putois. Buffon hist. nat. VII. p. 209. t. 26. 25.

Ferret. Penn. quadr. p. 214. n. 153.

Habitat in Africa, domestica & venatui adaptata in temperatioribus Europæ; bis coit per annum, per sex hebdomadas gravida, 5-8 rarius 9 pullos parit.

Putorio minor, a quo etiam capite angustiore, rostro acutior, trunco magis elongato & gracili, colore differt.

farmatica. 15. *M. pedibus fissis, corpore supra ex luteo & fusco vario.*

Pallas it. I. 453. & spic. zool. XIV. p. 79. t. IV. f. 1.

Erxleb. mamm. p. 460. Schreber. Sæugth. III. p. 490.

t. CXXXII.

Mustela peregusna, pedibus fissis, capite & corpore subtus aterrimis, corpore supra brunneo luteoque vario, ore fascia frontali auriculisque albis. Gùldenstaedt nov. comm. Petrop. XIV. p. 441-445. t. 10.

Mustela præcincta & Perewiaska. Rzaczynski hist. nat. Pol. p. 328. & 222.

Vormela (germanice Wormlein). Gesn. quadr. p. 768.

MAMMALIA FERÆ. Mustela.

Habitat in Polonia, præsertim Volhynia, & desertis inter Wolgam & Tanaim sitis; voracissima muribus, dipodibus, avibus, vescitur; femina 8 mammis gaudet, vere coit, & per 8 hebdomadas gravida 4-8 pullos parit. Ad putorium accedit, a quo tamen capite angustiore, corpore magis elongato, cauda longiore, & pilis, si pedes caudamque excipias, brevioribus, distat.

fibrica. 16. *M. fulva*, palmis plantisque hirsutissimis fissis. *Pallas it. II. 701. & spic. zool. XIV. p. 89. t. IV. f. 2. Erxleb. mamm. p. 471.*

Habitat in Sibiria silvosis, vorax, carnes etiam & butyrum ex rusticorum culinis prædatur.

Magnitudine ad sarmaticam, moribus ad zibellinam, habitu ad ermineam propius accedit, ab hac tamen cauda & pedibus longioribus discrepat. Cauda villosa, corpore dimidio brevior. Pili longiores & tenuiores, quam putorio & furo.

erminea. 10. *M. pedibus fissis, caudæ apice atro. Fn. suec. 17. Houttuyn nat. III. p. 206. t. 14. f. 5.*

Mustela hieme alba, æstate supra rutila infra alba, caudæ apice nigro. Briss. quadr. p. 176.

æstiva. α. *Mustela caudæ apice atro. Schreber Sæugth. III. p. 496. t. CXXXVII. A.*

Rosalet. Buffon hist. nat. VII. p. 240. t. 31. f. 1.

Stoat. Penn. quadr. p. 212. n. 151.

Wiesel. Ridinger jagdb. Th. t. 19.

hyberna. β. *Mustela candida in extrema cauda nigricans. Aldrov. dig. p. 310. Schreber Sæugth. III. p. 496. t. CXXXVII. B.*

Mustela candida f. animal ermineum recentiorum. Raj. quadr. p. 198.

Hermine. Buffon hist. nat. VII. p. 240. t. 29. f. 2.

Hermelin. S. G. Gmelin it. II. p. 192. t. 23.

Habitat in Europa & frigidioribus America atque Asia ad borealem Persiam & Sinam usque in domibus, lapidum acervis, fluviorum ripis, cavis arboribus, silvis, præsertim betulatis; sciuris & lemmis viçitat, viçtu

An ad hanc speciem spectat Mustela javanica, Seb. mus. I. p. 77. t. 48. f. 4. utrum ad hanc, an ad vulgarem Boccamele Sardonum, Cetti hist. nat. Sardin. I. t. 5. caudæ apice atro, trunco longiore ad ermineam accedens, hominem sequitur, vegetabilibus & carne recentis vescitur, mel amat, vineas infestat.

ceterum & moribus ad vulgarem, facie & habitu ad martem accedit; ab hoc tamen trunco brevior, nunquam 10 pollices æquante, cauda longiore 4 pollicum, pilis brevioribus & minus splendentibus distat. Corpus in borealibus regionibus hyeme album, excepta cauda, quæ dimidia extrorsum nigra. Pellis pretiosa, & olim magni æstimata.

vulgaris. II. M. pedibus fissis, corpore ex rufo fusco, subtus albo, cauda concolore. *Erxl. mamm. p. 471. Schreber Sæugth. III. p. 498. t. CXXXVIII.*

æstiva. α. Mustela supra rutila, infra alba. *Briss. quadr. p. 175. Mustela vulgaris. Aldr. dig. p. 307. Jonst. quadr. p. 152. t. 64. Raj. quadr. p. 195. Mustela. Gefn. quadr. p. 752. Belette. Buffon hist. nat. VII. p. 225. t. 29. f. 1. Common Weasel. Penn. quadr. p. 211. n. 150. Wiesel. Ridinger wilde Thier. t. 30.*

nivalis. β. Mustela corpore albo, caudæ apice vix pilis ullis nigris. *Syst. nat. XII. p. 69. n. 11. Mustela cauda truncato-abbreviata corpori concolore. Hellenius aḡ. Stockh. 1785. trim. 3. n. 9. t. 1. Habitat in temperatiore & frigida Europa & Asia ad borealem Persiam usque; in septentrionalibus v. g. Westrobothnia, Russia, &c. hyeme albescent; erminea dimidio minor, ut vix longitudinem 7 pollicum æsequatur; edit pisces, carnes, mures, ova, fungos, non alia vegetabilia; avarissima, fœtida, immunda, siticulosa, noctu prædatur, muribus pessima, quos totos relictis solis dentibus consumit, eorum foramina intrat; a fele non facile occiditur; recurrens accurrensque continuo prospicit; terrefacta epilepsia convelli fertur; cicurata lepida; vere 6-8 pluresve pullos parit.*

Quiqui. 17. M. pedibus fissis, corpore fusco, rostro cuneiformi. *Molina hist. nat. Chil. L. IV. p. 258. Habitat in regno Chilensi infra terram, muribus vicitans, ferrox.*

16. URSUS. *Dentes primores superiores VI, intus excavati alterni.*

inferiores VI : laterales 2 longiores lobati; secundarii basi interiores.

laniarii solitarii.

molares V-VI : primo laniariis approximato.

Lingua lævis.

Membrana nictitans.

Nasus prominens.

Penis scatens osse curvato.

Arctos. 1. U. fusco nigricans, cauda abrupta. *Erzl. mamm. p. 156.*
 Ursus niger, cauda unicolore. *Briss. quadr. 184.*
 Ursus. *Gesn. quadr. 14. Aldrov. dig. 117. Jonst. quadr. p. 123. t. 55. Raj. quadr. p. 171. Klein quadr. p. 82.*
 Black bear. *Penn. quadr. p. 190. n. 138.*
 Baer. *Ridinger wilde Thier. t. 32.*

niger. α. corpore nigro minore. *Schreb. Saeugth. III. p. 502. t. CXL.*

fuscus. β. corpore fusco vel ferrugineo. *Schreb. Saeugth. III. p. 502. t. CXXXIX.*

Ours brun des Alpes. *Buffon hist. nat. VIII. p. 248. t. 31.*

albus. γ. corpore nigro pilis albis admixtis.

Ours blanc terrestre. *Buffon hist. nat. VIII. p. 248. t. 32.*

variegatus. δ. corpore verficoloro.

Habitat γ & δ in Islandia, α in uliginosis silvaticis frigidis Europæ & Asiæ septentrionalis, β etiam in alpihus pyrenaicis, sabaudicis, helveticis, carpathicis, caucasicis, in Polonia, Græcia, Palæstina, Ægypto, Barbaria, Zeylona, India, Japonia, Sina, Persia; videtur α) radicibus, baccis, aliisque vegetabilibus; β) quoque insectis, e. g. formicis, alvearibus apum, cadaveribus & laniena pecorum, cervorum, equorumque; prædam mox inflat, reliquam in paludibus defodit; escam lubenter lavat; manus cubans continuo lambit; β fine Junii coit & initio Ja-

MAMMALIA FERÆ. Ursus.

101

nuarii parit unum plerumque pullum; coit, & fine Octobris, uterum gerit 112 diebus; hybernat abstemius a medio Novembri in initium regelationis; obambulat plerumque, segnis nisi laceffatur, tum agilissime erectus ambabus pugnat; sine injuria hominem non adoritur; ante pugnam pullos adscendere arbores cogit; descendit præeunte cauda, quam valde metuit; pediculis caret; cantum fugere perhibetur. Pedibus posterioribus insistit; natat. Hispidus membrana nidiante torvus. Pollex reliquis digitis angustior. Mamma 4. Cranium, non cerebrum, leonis minus. Tendines præstantissimi pro filis Lapponum. Caro esitata. Fel amarissimum epilepticis commendatum; pinguedo in cosmetica recepta.

maritimus. 5. U. albus, cauda abrupta, capite colloque elongatis. Erzl. syst. mamm. p. 160. Schreber Sæugthiere, III. p. 513. t. CXLI.

Ursus marinus. Pallas it. III. p. 691. & spicil. zoolog. XIV. p. 1-24. t. 1.

Ursus albus, cauda unicolore. Briss. quadr. 188.

Ursus maritimus albus major arcticus. Martens spitzb. 73. t. O. f. C.

Ursus albus. Jonst. quadr. p. 126. Mus. Worm, p. 319. Klein quadr. p. 82.

Ours blanc, Buffon hist. nat. suppl. III. p. 200. t. 34.

Polar bear. Penn. quadr. p. 192. n. 139. t. 20. f. 1.

Weisse Baer, Ridinger Baeren, t. 3.

Habitat intra polum arcticum, frequens in glacie ipsoque mari; caloris impatientissimus, piscibus, phocis, balænis, rarius, nec nisi famelicus armentis viciat; Femina per 6-7 menses gravida Martio plerumque binos parit ætulos, Mores & usus iidem, qui arcto. Caput majus, quam huic, cranium magis convexum, rostrum crassius.

americanus. 6. U. niger, gula genisque ferrugineis, Pallas spicil. zool. XIV. p. 6. 26.

Habitat, terra Chilensi & Patagonia excepta, in omni America; vegetabilibus & piscibus præsertim viciat. Caro esitata.

Caput magis elongatum. Auriculæ longiores; pili fortiores, molles, recti, longiores, aterrimi, teneriores, magis splendentes.

Animalia sub hoc genere militantia, pedibus pentadactylis, pollice non remoto talis incedunt, scandunt, palmis quædam manuum instar utuntur.

- Meles. 2. U. cauda concolore, corpore supra cinereo, subtus nigro, fascia longitudinali per oculos aureſque nigra. *Fn. ſuec.* 20. *Schreber Saeugth.* III. p. 516. t. CXLII.
 Meles unguibus anticis longiſſimis. *Syſt. nat.* VI. p. 6.
 Meles pilis ex fordide albo & nigro variegatis veſtita, capite tæniis alternatim albis & nigris variegata. *Briff. quadr.* 183.
 Meles. *Gefn. quadr.* 687. fig. p. 686.
 Taxus. *Aldr. dig.* p. 263. fig. p. 267. *Jonſt. quadr.* p. 146. t. 63. *Raj. quadr.* 185. *Klein quadr.* 73.
 Blaireau. *Buffon hiſt. nat.* VII. p. 104. t. 7. 8.
 Common badger. *Penn. quadr.* p. 201. n. 142.
 Tachs. *Ridinger jagdb. Thier.* t. 17.

alba. β. ſupra alba, infra ex albo flavicans. *Briffon quadr.* 185.

maculata. γ. alba maculis ex flavo rubicundis & fufcis. *Ridinger allegl. Thier.* t. 24.

Habitat in Europa & boreali Aſia ad Perſiam borealem & Sinam uſque, in ipſa quoque Japonia; β) in provincia Americæ Noveboraceni; γ) rariſſimus, inter rimas rupium & lapidum in ſilvis, monogamus coit Novembri aut Decembris initio, poſt novem ſeptimanas femina pariente catulos 3-5; viduat inſectis, ovis, foliis ſecalis, lathyrique, aliis cum vegetabilibus, quibus corraſtis hybernāt, admodum pingueſcit; noctu venatur cuniculos, antra fodit inhabitatque; ſtercus in diſtincto & determinato loco deponunt inhabitantes extra antrum ſinguli; die latet; folliculum putorium ſupra anum haurit hybernans. Cicurari poteſt.

Membrana nictitans alba totum oculum tegens. Mammæ 6, 2 peſtorales, 4 abdominales. Pedes breves pentadactyli. Longitudo pluſquam bipedalis, β) 21 modo pollicum. Anatome. E. N. C. d. 2. a. 5. obſ. 32. & d. 3. a. 3. obſ. 163.

labrado- 7. U. cauda apice villoſa ex luteo ſubfuſca, gula, peſtore & rijs. abdomine albis, palmis tetradactylis. *Schreber Saeugth.* III. p. 520. t. CXLII. B.

American badger. *Penn. quadr.* p. 202. n. 143.

Carcajou. *Buffon hiſt. nat. ſuppl.* III. p. 242. t. 49.

Habitat in terra Labrador & ad ſinum Hudſonis, mele paulo minor, pilis mollioribus longioribus. Auriculæ breves albæ, nigro marginatæ. Caput album, tæniis duabus nigris pone naſum per oculos produciſ. Pili dorſi initio caſtanei, tum ex luteo fuſci, poſtea nigri, apice albi. Pedes fuſci.

Lotor. 3. *U. cauda annulata*, fascia per oculos tranſverſali nigra. *Schreber Sæugth.* III. p. 321. t. CXLIII.

Urfus cauda elongata. *Ad. Stockh.* 1747. t. 9. f. 1. *Houttuyn nat.* 2. p. 237. t. 15. f. 1.

Urfus cauda annulatim variegata. *Briff. quadr.* p. 189.

Mapach. Fernand. anim. n. II. p. 1. *Nieremb. hiſt. nat.* p. 175. *Jonſt. quadr.* t. 74.

Vulpi affinis americana, *Coati Braſilienſibus.* *Raj. quadr.* 179. *Catesb. carol. app.* p. 29.

Raccoon. *Kalm it.* 2. p. 228. 327. & 3. p. 24. *Laws carol.* 121. *Penn. quadr.* p. 199. n. 141.

Coati. *Worm muſ.* 319. *Major mosh.* 30. *Raj. quadr.* 179.

Wilde zibethartige Kaze. *Müller delic. nat. ſel.* 2. p. 99. t. K. I. f. 2.

Habitat in Americæ præſertim borealis, etiam inſularum utrinque Americæ oppoſitarum maritimis, ut plurimum in cavis arboribus, Majo 2-3 pullos pariens. Edit lubenter ova, gallinas, conchas; cibum lavat, manibus ori admovet; odoratu taſtueque excellit; mentis tenaciſſimus; dormit a 12 noctis ad 12 diei; pellitur ſetis porcinis. Lubenter ſcandit.

Corpus cinereum, pilis erectis, ferrugineis apice nigris, unde inſpectus umbra nigra cingitur. Caput fuscum, fronte alba; fascia nigra trans oculos in medio interrupta linea nigra perpendiculari interjecta. Cauda pilis nigris annulata. Penis offe incurvato ſcater.

luſcus. 4. *U. cauda elongata*, corpore ferrugineo, roſtro fuſco, fronte plagaque laterali corporis.

Urfus caſtanei coloris, cauda unicolore, roſtro pedibusque nigris. *Briffon quadr.* p. 168.

Quickhatch or Wolverene. *Edw. av.* 2. p. 103. t. 103. *Ellis hufſon.* I. p. 40. t. 4.

Wolverene. *Penn. quadr.* p. 195. n. 140. t. 20. f. 2.

Habitat ad ſinam Hudſonis; magnitudine ad lupum, capite ad gulonem accedit. Pili longi & aſperi; cauda caſtanea apice obſcurior; pedes anteriores tetradaçyli, poſteriores pentadaçyli.

Gulo. 8. U. cauda concolore, corpore rufo-fusco, medio dorsi nigro. *Schreber Saeugh.* III. p. 525. t. CXLIV. *Georgi it.* p. 160. *Pallas spicil.* 1001. XIV. p. 25. t. 2.

Mustela pedibus fissis, corpore rufo-fusco, medio dorsi nigro. Syst. nat. XII. p. 67. *Fn. suec.* 14. *Houtt. nat.* II. p. 189. t. 14. f. 4. *Gunner aët. Nidros.* III. p. 123. t. 3. f. 5.

Gulo. *Gesn. quadr.* p. 554. *Aldrov. dig.* p. 178. *Jonst. quadr.* p. 131. t. 57. *Scheff. Lappon.* 339. *Raczynsk. polon.* 218. *Klein quadr.* p. 83. t. 5. *Penn. quadr.* p. 196. *Zimmerm. spec. 1001. geogr.* 309.

Glouton. Buffon hist. nat. suppl. III. p. 240. t. 48.

Rossmak. Nieremb. hist. nat. p. 188.

Jarf. Genberg aët. Stockh. 1773. p. 222. t. 7. 8.

Habitat in Americæ, Asiæ & Europæ terris quam maxime borealibus, rarius in Polonia & Curonia, rarissime in Germania, in montosis præsertim & vastissimis silvis. Coit Januario, parit ut plurimum Majo pullum 1-3 in abditissimis silvarum; astutus & vorax viçitat leporibus, muribus, rangiferis, avibus, cadaveribus, etiam piscibus, caseo aliisque cibis; facillime scandit; homines nunquam sponte adoritur; contra canes fœtore horrendo se defendit, post mortem tamen debiliore. Junior cicurari potest. Pellis egregia.

Mele Major, plus quam bipedalis, ast gracilior. Artus, quam u. a. breviores crassissimi, robustissimi, villosi, pentadactyli. Cauda cruribus posticis brevior villosa. Mammæ 6. Dentes primores superiores intermediæ æquales utroque latere quasi lobati, extimi vero longiores conici robusti, altero latere lobati: Inferiores 6. retuso-truncati, 2 alterni interiores, medii minores, extimi crassiores. Laniarii teretes conici, robustissimi, obtusiusculi, superiores paulo majores, antice remoti, extus rugosi, inferiores utrinque approximati. Molares superiores utrinque 5, inferiores 6; omnes lobati, primo ultimoque minuto.

Anatome. Barth. cent. 4. obs. 30.

17. DIDELPHIS. *Dentes primores* minuti rotundati,
Superiores X, interme-
diis 2 longioribus.
Inferiores VIII, inter-
mediis 2 latioribus
brevissimis,
laniarii longi.
molares denticulati,
Lingua papillis ciliata.
Folliculus (plerisque) abdominalis
mammarum.

marfupia- 1. D. mammi 8 intra abdomen. *Schreb. Saeugth.* III. p. 536.
lis. t. CXLV.

Philander (amboinensis) atro-spadiceus in dorso, in ven-
tre ex albido cinereo flavicans, maculis supra oculos
obscure fuscis. *Briss. quadr.* 201.

Philander maximus orientalis. *Seb. mus.* I. p. 64. t. 39.
Klein quadr. p. 59.

Habitat in Surinamo.

Corpus melis, magnitudo cati majoris aut martis. Nares
perpendiculares, lunares; vibrissæ 5 ordinum longæ;
setæ pone oris rectum 8, sub gula 5. Auriculæ ovales,
laxæ, atræ, apicibus albis. Dentes molares lobati; an-
teriores simplices; primi minimi. Tibiæ nigrae laeves,
pilis brevibus. Cauda longitudine corporis.

Philan- 2. D. cauda basi pilosa, auriculis pendulis, mammi qua-
der. ternis. *Schreber Saeugth.* III. p. 541. t. CXLVII.

Philander (brasiliensis) pilis in exortu albis, in extremi-
tate nigricantibus vestitus. *Briss. quadr.* 210.

Tlaquazin f. Tai- ibi brasiliensibus dicta. *Seb. mus.* I.
p. 57. t. 36. f. 4.

Faras ou Ravale. *Gumilla Orin.* 3. p. 238.

Habitat in omni meridionali America.

Longitudo corporis 9 pollicum, caudæ fere 14 pollicum.

Vibrissæ 6 ordinum; margo orbitarum ferrugineus; pe-
des albi; caudæ pars nuda albida, maculis fuscis.

Opossum. 3. D. cauda semipilosa, superciliorum regione pallidior.
Schreber Saeugth. III. p. 537. t. CXLVI. A. B.

MAMMALIA FERÆ. Didelphis.

Magnitudo *Ratti*; orbitæ *marginē fusco*; cauda *albida*, *maris maculis fuscescentibus prælonga, nuda*; *palmarum ungues obtusi, plantarum acuti*. Auriculæ *nitidæ, nudæ*. *An eadem cum murina?*

carnivora. 7. D. cauda squamosa fere calva; corpus prope æquante, plantarum ungue pollicari plano.

Crabier. *Buff. hist. nat. suppl.* III. p. 272. t. 54.

Habitat in Cayennæ paludosis, interdum in rhizophoris, cancris brachyuris videtur, porcelli instar grunnit, pinguescit, & cicuratur; femina in cavis arboribus 4 - 5 pullos parit.

Longitudo fere 17 pollicum. Pili instar lanæ crispæ, interstitis tamen setis, quæ a medio dorso ad caudam usque jubæ fuscae speciem constituunt. Caput, humeri, collum, crura ex flavo rubent, latera & abdomen flavescent; pedes ex fusco nigri. Margo orbitarum niger. Auriculæ brevæ, ovales, calvæ.

brachyura. 8. D. cauda pilosa & auriculis calvis brevissimis, marsupio nullo corpore rufo. *Schreber Saeguthiere*, III. p. 548. t. CLI. *Pallas ad. ac. Petrop. pro ann. 1780.* II. p. 235. t. V.

Philander obscure rufus in dorso, in ventre helvus, cauda brevi & crassa. *Briss. quadr.* p. 213.

Philander mammis extra abdomen, cauda brevi crassa pilosa. *Gronov. zoophyl.* I. p. 9. n. 35.

Muris silvestris americani femina. *Seb. mus.* I. p. 50. t. 31. f. 6.

Short-tailed opossum. *Penn. quadr.* p. 208. n. 147.

Habitat in Americæ australis silvis. Femina 9-10 pullos parit.

Longitudo corporis a 3 pollicibus & 2 lineis ad 5 pollices, & 6 lineas, caudæ ab 1 pollice & 8 lineis ad 2 pollices & 4 lineas. Capite accedit ad D. Cayopollin; rostrum minus productum quam D. Oposso, minus acutum, quam D. murinæ, cui tamen reliquo corpore, marsupio defectu, pene postice infra scrotum exserendo satis similis est. Cauda a crassa basi sensim attenuata; vellus molliissimum, nitidum, per latera capitis & trunci pulcherrime rufum.

orientalis. 9. D. cauda ad medium fere pilosa, prehensili, corpore longiore, folliculo abdominali, plantarum digitis duobus intermediis coadunatis. *Pallas misc. zoolog.* p. 59. *Erxleb. mam. p. 79, Schreber Saeguth.* III. p. 550. t. CLII.

Surinam opoffum. Penn. quadr. p. 209. n. 148;

Coefcoes. Valent. ind. 3. p. 272.

Phalanger. Buffon hist. nat. XIII. p. 92. t. 10. II.

Habitat in insulis Moluccis, forsan quoque in nova Hollan-
dia. Comedendi modo & voce ad sciurum aequat, per-

quam timida; femina 2 - 4 mammae, tot etiam pulli.

Capite magis convexo, rostro magis robusto, auriculis & pe-
dibus brevioribus, unguibus longioribus & magis curvatis
diversa.

Brunii. 10. D. cauda brevi calva, pedibus posticis longioribus trida-
ctylis. Schreber Saeugth. III. p. 551. t. CLIII.

Filander. le Brun voy. I. p. 347. f. 213.

Habitat in...

Capite vulpem refert, magnitudine & pilis leporem, pe-
dibus dipodem, folliculo abdominali didelphidem.

gigantea. II. D. cauda longa crassa, pedibus posticis triplo fere longio-
ribus, tridactylis. Schreber Saeugthiere, III. p. 552.
t. CLIV.

Kanguruh. Hawkesworth voy. 3. p. 174. t. 51.

Habitat in nova Hollandia; salit, fodit, comedit instar di-
podis, a quo tamen dentibus mire differt; hi enim sunt
didelphidis. Adultum animal ovem magnitudine aequat;
color ex flavesciente cinereus; caput magis obtusum, quam
aliis didelphidis speciebus; auriculæ longæ; truncus
anterior gracilis, posterior torosus; palmarum ungues
atro nitidi; plantarum digitus medius prominens.

macro- 12. D. cauda gracili nuda apice subfloccosa, plantarum talis
tarsus. elongatis nudis ungue pollicari plano. Schreber Saeugth.
III. p. 554. t. CLV.

Tarfier. Buffon hist. nat. XIII. p. 87. t. 9.

Woolly Jerboa. Penn. quadr. p. 298. n. 225.

Habitat...

Inter lemures, dipodes, & didelphides ambiguum animal
mure domestico paulo major dentibus recedit ab omnibus
aliis mammalibus; habet enim primores acutos in utra-
que maxillabinos, lanarium utrinque unum, superiores
breves, inferiores longos; molarum utrinque 6. Pedibus
calvis manuum ad instar utitur. Pili crispi, molles, lon-
gi, basi ex atro cinerea, apice ferrugineo; caput rotun-
dum; rostrum breve & acutum; auriculæ longæ, tenues,
calvæ; cauda prælonga; pedes posteriores anterioribus
multo longiores.

18. TALPA. *Dentes primores inæquales superiores VI, inferiores VIII. lanii I. superiores majores. molares superiores VII. inferiores VI.*

europæa. i. T. cauda brevi, pedibus pentadactylis. *Erzl. mamm. p. 114. Schreber Sæugthiere, III. p. 558. t. CLVI.*

Talpa caudata, pedibus pentadactylis. *Syst. nat. XII. p. 73. Fn. succ. 23.*

Talpa caudata nigricans, pedibus anticis & posticis pentadactylis. *Briff. quadr. 204.*

Talpa caudata. *It. scan. 332.*

Talpa. *Gesn. quadr. 931. Aldr. dig. 45. Raj. quadr. 236.*

Taupe. *Buffon hist. nat. VIII. p. 81. t. 12. suppl. III. p. 193. t. 32. Gautier observ. 1. part. 3. p. 155. t. B.*

Mole. *Penn. quadr. p. 311. n. 241.*

variegata. β. pelle maculis albis varia. *Briff. quadr. 205.*

Talpa maculata oostriata. *Seb. mus. 1. p. 68. t. 41. f. 4. Spotted mole. Edw. glean. 2. p. 122. t. 268.*

alba. γ. pelle alba. *Briff. quadr. 205. Seb. mus. 1. p. 51. t. 32. f. 1.*

flava. δ. pelle flava. *Penn. quadr. p. 311. n. 241. β.*

cinerea. ε. pelle cinerea. *Hübisch Naturf. 3. p. 98.*

T. cinerea palmis angustioribus. *Richter Abhandl. über die phys. Beschaff. von Boehmen. Prag & Dresd. 1786. 4. p. 82.*

Habitat in omnis Europæ, borealis quoque Asiæ & Africæ Apricis humosis, evertens prata hortosque; viditans lumbricis & larvis, nec plantis; expellitur ricino, optime aqutione, quamvis ex locis inundatis in arbores fugiat; hybernât; pellis delicatula, pilis mollibus, subtili-

Talpæ infra terram degunt, tubos cylindricos fodiunt, vermibus potissimum viditant. Caput crassum rostratum. Oculi minimi tedi; auriculæ nullæ. Corpus crassum. Pedes breves. Palmæ latæ, magnæ, breviores, quam plantæ, & unguibus longioribus instructæ.

MAMMALIA FERÆ. Talpa.

III

bus, dense appressis; coit vere pene omnium longissimo, ut videtur monogama; femina parit pullos 4-5.

Anatome. E. N. C. d. 1. a. 2. obs. 51. & d. 2. a. 1. obs. 130.

Sepultura. Gleditsch oper. miscell. 3. n. 5.

Paulinus C. F. Talpa. Francof. 1689.

de la Faille Naturgesch. des Maulwurfs. Francof. 1778.

longicauda. 3. T. cauda mediocri, pedibus pentadactylis posticis squamosis. Erxleb. mamm. p. 118.

Long-tailed mole. Penn. quadr. p. 314. n. 244. t. 28. f. 2.

Habitat in America boreali, externa facie ad europæam accedens, differt tamen cauda longiore bipollicari, & pilo spadiceo; plantis squamosis parum pilosis, ungibus longioribus; corpus 4-6 pollices longum.

rubra. 4. T. cauda brevi, palmis tridactylis, plantis tetradactylis. Erxl. mamm. p. 119.

Talpa (americana rufa) caudata ex dilute cinereo rufa, pedibus anticis tridactylis, posticis tetradactylis. Briss. quadr. p. 206.

Talpa rubra americana. Seb. mus. 1. p. 51. t. 32. f. 2.

Red mole. Penn. quadr. p. 315. n. 246.

Habitat in America, europææ satis similis, paulo tamen major, cauda initio crassior.

asiatica. 2. T. ecaudata, palmis tridactylis.

Talpa aurea. Schreber Sæugth. III. p. 562. t. CLVII.

Talpa (sibirica aurea) ecaudata ex viridi aurea, pedibus anticis tridactylis, posticis tetradactylis. Briss. quadr. p. 206.

Talpa sibericus verficolor, Aspalax dictus. Seb. mus. 1. p. 51. t. 32. f. 4. 5.

Siberian mole. Penn. quadr. p. 313. n. 242.

Habitat in capite bonæ spei. Palms.

Rostrium brevius, quam europææ; nares calvæ. Pili fusci; ut tamen aureo nitore in viroreth & rubedinem vergant.

19. SOREX. *Dentes primores superiores II longi bifidi.*
inferiores II - IV ; interme-
diis brevioribus.
laniarii utrinque plures.
molares cuspidati.

- cristatus.* 1. S. naribus carunculatis, cauda brevi.
 Radiated mole. *Penn. quadr. p. 313. n. 243. t. 28. f. 1.*
Habitat in America boreali, facie externa & rostri longi-
tudine ad talpam accedens, radicibus vicinat.
Pili breves, teneri, dense appressi, atrii, palmis niveis,
plantis squamosis. Dentes primores inferiores 4, laniiarii
utrinque 4. Nares singula caruncula stellato-palmata
radiis 10 f. 15 subulatis nudis, ut in erinaceo; cauda
subnuda concolor vix ultra 1 1/2 pollicem longa; corpus
ipsum fere 4 pollicum.
- minutus.* 2. S. rostro longissimo, cauda nulla. *Schreber Saugth. III.*
p. 178. t. CLXI. B.
Sorex (pygmæus) rostro longissimo, pedibus pentadactylis,
cauda nulla. Laxmann sibir. Brief. p. 72.
Minute shrew. Penn. quadr. p. 108. n. 237.
Habitat in Sibiria, in dumetis humidiusculis sub arborum
radicibus, nido e lichenibus confecto; colligit semina;
cito currit & fodit; mordet; sonus vespertilionis.
Post exilem omnium mammalium mihiimum, 3j ponderis,
pilis tenerrimis nitidum, griseum, subtus albicans. Ca-
put magnitudine fere corporis: rostro attenuato, subtus
exarato. Mystaces oculos attingentes. Oculi parvi, re-
tracti. Auriculæ dilatatæ breves nudæ. Pedes 5 - 5.
- aquatilis.* 3. S. Plantis palmatis, palmis caudaque brevioris albis,
Schreber Saugthiere, III. p. 566. t. CLVIII.
Talpa virginianus niger. Seb. mus. 1. p. 51. t. 32. f. 3.
Brown mole. Penn. quadr. p. 314. n. 245.
Habitat in America boreali: P. Kalm.
Statura cristati, vel talpæ. Pili nitidi, obscure cinerei,
apice fusci. Corpus 5, cauda 1 pollicem longum. Den-
tes primores inferiores 4.

Moschatus. 6. S. pedibus palmatis, cauda compresso-lanceolata. *Pallas* it. I. p. 156. *Lepechin* it. I. p. 178. t. 13. *Erxl. mam.* p. 127. *Schreber Sæugth.* III. p. 567. t. CLIX.

Castor (moschatus) cauda longa compresso-lanceolata, pedibus palmatis. *Syst. nat.* XII. I. p. 79. *Fn. suec.* p. 11. n. 28.

Castor (mus moschiferus) cauda verticaliter plana, digitis omnibus membrana ipse se connexis. *Briss. quadr.* p. 92.

Mus aquaticus. *Clus. exot.* p. 375. *Jonst. quadr.* p. 169. t. 73.

Mus aquatilis. *Aldrov. dig.* p. 447. fig. p. 448.

Mus aquaticus exoticus. *Raj. quadr.* p. 217. I. G. *Gmelin nov. comm.* *Petrop.* IV. p. 383. fig. V. tab. 13.

Desman. *Buff. hist. nat.* X. p. 1. t. 1. *Güldenstedt berlin. Naturfr.* Besch. III. p. 107. t. 2.

Long nosed beaver. *Penn. quadr.* p. 260. n. 192.

Bisamraze. S. G. *Gmelin* it. I. p. 28. t. 3. 4. *Güldenstedt Besch. der berl. naturf.* Fr. III. p. 107. t. 2.

Habitat in regionibus Wolgæ & Tanai interjacentibus inter 50 & 57^m latitudinis gradum ad lacus, in quorum ripis antra sibi fodit, quorum introitus sub ipsa aqua; videtur acoro.

Maximo criceto major; caput talpino simile, rostrum valde mobile, cartilagineum. Mystaces albidæ 12 ordinum. Oculi minimi. Auriculæ nullæ. Truncus planus, præter cutem panniculo carneo obductus. Pellis castoris. Pedes calvi, supra squamosi, cum cauda nigricantes. Dentes primores inferiores 4, laniarii utrinque 6, molares superius 4, inferius 3. Ad initium caudæ folliculi 7-8 tela cellulosa conjuncti, flavescens, ex quibus materia fluida flavescens, penetrantissimo odore Zibethum simulans prodit, cujus singula animalia scrupulum circiter continent.

fodiens. 7. S. cauda mediocri subnuda, corpore nigricante subtus cinereo, digitis ciliatis. *Erzleb. mam.* p. 124. *Schreber Sæugth.* III. p. 571. t. CLXI.

Musaraneus dorso nigro ventreque albo. *Merret. pin.* p. 167.

Sorices capite ad talpæ, reliquo habita ad mares accedunt; fodiunt & ut plurimum insectis vermibusque videntur; sub terra, quædam species ad aquas habitant; corpus crassum, pedes pentadactyli; caput productum, conico rostro tenui-macrum. Oculi minimi.

MAMMALIA FERÆ. Sorex.

Musaraigne d'eau. *Buffon hist. nat. VIII. p. 64. t. II. f. 1.*
 Watershrew. *Penn. quadr. p. 308. n. 236.*

Habitat in Anglia, Burgundia, Germania, Borussia, Sibiria ad fontes & rivos, araneo rarior; natat; semina 10 mammis instructa vere parit 9 pullos.

Corpus tres, cauda ultra duos pollices longa; rostri apex, quam in araneo, latior; pedes longiores; dentes primores inferiores 1, laniarii $\frac{1}{2}$, molares $\frac{3}{4}$.

marinus. 4. *S. cauda mediocri, corpore fusco, pedibus caudaque cinereis.*

Habitat in Java.

Corpus magnitudine muris masculi. Rostrum elongatum subtus canaliculatum, cinereum vibrissis longis. Auriculæ rotundæ nudiusculæ. Dentes primores 2 acuti, paralleli. Pedes pentadactyli, unguiculati. Cauda corpore paulo brevior, minus pilosa.

Aranens. 5. *S. cauda mediocri, corpore subtus albedo. Fn. suec. 24. Schreber Sæugth. III. p. 573. t. CLX.*

Musaraneus supra ex fusco rufus, infra albicans. Briss. quadr. p. 126.

Mus araneus. Gefsn. quadr. p. 747. Aldrov. dig. p. 441. fig. p. 442. Jonston p. 168. t. 66. Raj. quadr. p. 239.

Musaraigne. Buffon hist. nat. VIII. p. 57. t. 10. f. 1. Foetid shrew. Penn. quadr. p. 307. n. 235.

Habitat in omni Europa & boreali Asia, in acervis lapidum, circa pagos in terra, fimeis, stabulis, horreis, humidis habitaculis, ad aquas, grans etiam videtur; moschi odore infesta præsertim cutis, qui occidunt quidem, sed non coquedunt; cursus lentior, quam muri musculo; vox subtilis sibilans; vere & æstate femina parit 5-6 pullos. Longitudo nunquam tres pollices, pondus vix 3 drachmas superat. Dentes, ut in fodiente.

**furina-
mensis.** *8. S. cauda corpore dimidio brevior, corpore supra spadiceo, infra ex albo cinereo flavescente.*

Habitat in Surinamo.

Auriculis ad graneum, magnitudine corporis, capite, rostro, dentibus, oculis, pedibus ad fodientem propius accedit. Cauda brevissimis pilis dense appressis tecta, supra cinerea, infra albida; os album.

pustillas. 9. *S. auriculis rotundatis, cauda brevi subdifticha. Erxleb. mamm. p. 122. S. G. Gmelin it. 3. p. 499. t. 75. f. 1. Habitat in borealis Perfiæ desertis in antris, quæ ipse fodit.*

Dentibus ad araneum accedit, cetera propius ad surinamensem, paulo tamen major, ut $3\frac{1}{2}$ pollices longitudine æquet. Color dorfi obscure griseus, ventris cinereus.

brasiliæ. 10. *S. fuscus, dorso striis tribus nigro. ErxL. mamm. p. 127.*

6c. Musaraneus figura muris. Marcgr. bras. p. 229.

Musaraigne de Brésil. Buffon hist. nat. XV. p. 160.

Brazilian shrew. Penn. quadr. p. 309. n. 239.

Habitat in Brasilia, minus timida, ut ipsum catum non timeat. Longitudo corporis 5, caudæ 2 pollices æquat,

exilis. 11. *S. minimus, cauda crassissima tereti.*

Habitat in Sibiria, ad fluvium Jenisei; omnium mammalium minimus, ut drachmam dimidiam pondere non superet; color magis in fuscum vergit, quam in araneo.

20. ERINACEUS. *Dentes primores superiores II. distantes.*

inferiores II. approximati.

laniarii superiores utrinque V.

inferiores utrinque III.

molares utrinque supra & infra IV.

Dorsum spinis rectum.

europæus. 1. *E. auriculis rotundatis, naribus cristatis. Fn. suec. p. 8.*

n. 22. Schreber Sæugthiere, III. p. 580. t. CLXII.

Erinaceus auriculis erectis. Briss. quadr. p. 128.

Erinaceus parvus nostras. Seb. mus. 1. p. 78. t. 49. f. 1. 2.

Echinus terrestris. Gesn. quadr. p. 368. Aldrov. dig. p. 459.

Jonst. quadr. p. 171. t. 68. Rāj. quadr. p. 231.

Hérifson. Buffon hist. nat. VIII. p. 28. a 6.

Common Hedge-hog. Penn. quadr. p. 316. n. 247. t. 28.

f. 3.

Igel. Knerr delit. tom. II. tab. H. f. 3.

Habitat in Europæ, frigidissima tamen excepta, (etiam ad Jaici superioris ripas, in deserto Kirgifico, & aliis regionibus apricis Sibiricæ australioris) dumetis & sepibus, nidificans e musco, in fruticibus hybernans, nocturnus; viditans bufonibus, vermibus, coleopteris, cancris, conchis, fructibus, aviculis, cadaveribus; muscos fodit; natat facile; monogamus incedit; meticulous iratusque in globum decussatis spinis se contrahit; compressis pedibus ejukat; ambrosiacus; Calmuccis loco felis domesticus. Femina, 5 mammis, 3 pectoralibus, 2 abdominalibus instructa, vere coit, & initio æstatis 3-5 pullos parit. Caro non esculenta.

Longitudo 10 circiter pollicum. Rostrum acutum; labium superius fissum. Auriculæ latæ, breves, pilosæ; oculi parvi & nigri. Præputium propendens. Pili capitis ex albido fulvi, albis mixti, colli, pedum, spinis interstiti fulvi, caudæ obscuriores, gulæ ex albo cinerei, pectoris & ventris iidem, sed fulvis mixti: Spinæ utroque sine ex flavesciente cinereæ, medio fuscæ.

mauris. 2. *E. auriculis nullis. Briss. quadr. 184.*

Erinaceus americanus albus. Seb. mus. 1. p. 78. t. 49. f. 3.

Habitat in America, modo non varietas prioris.

malac- 3. *E. auriculis pendulis. Briss. quadr. 183.*

centis. *Hystrix brachyura. Syst. nat. X. 1. p. 57.*

Porcus aculeatus f. Histryx malaccensis. Seb. mus. 1. p. 81. t. 51. f. 1.

Habitat in Alia; ex hoc pretiosus lapis f. piedra del porco. Facies cum Brissono suadent erinacei speciem; an vere distincta hujus hystriçisne species?

auritus. 4. *E. auriculis ovalibus longis, naribus cristatis. Pallas nov. comment. Petropol. XIV. p. 573. t. 21. f. 4. S. G. Gmelin nov. comm. Petrop. XIV. p. 519. t. 16. Schreber Sacugthiere, III. p. 582. t. CLXIII.*

Habitat ad fluviorum Wolgæ & Uralis partem inferiorem, etiam orientem versus ultra lacum Baikal, europæo moribus & habitu satis similis, paulo tamen minor, oculis paulo majoribus, mystacum 4 ordinibus, pedibus paulo longioribus & gracilioribus, cauda brevior, conica, annulata, & fere calva, pilis tenerioribus. Femina ad 7 pullos, aliquando bis per annum parit.

- fetosus. 5. E. auriculis brevioribus, occipite satis tecto, cauda brevissima spinosa. *Schreber Saeugth.* III. p. 583. t. CLXIV. Tendrac. *Buffon. hist. nat.* XII. p. 438. t. 57. Petit Tendrac de Madagascar. *Sonner. it.* 2. p. 146. t. 93. *Habitat in Madagascar forsan & in India, europæo & aurito minor, ut longitudo vix 6 pollices æquet; rostrum tamen longius, mystaces longæ; pedes breves; spinæ albidæ, medio ex castaneo rubicundæ; pili albi. An forsan idem cum inauri?*

- ecaudatus. 6. E. cauda nulla, rostro longissimo acuto. *Schreber Saeugth.* III. p. 584. t. CLXV. CLXV*. Tanrec, & le jeune Tanrec. *Buffon hist. nat.* XII. p. 438. t. 56. & *suppl.* III. p. 214. t. 37. *Habitat in Madagascar, priori longior, ut 8 pollices fere æquet. Os oulque parvi; auriculæ rotundatæ, longiores tamen, quam fetoso; spinis medio nigris, vetera flavescentibus modo teguntur vertex, occiput, collum humerique, reliqua dorfi pars setis longis, ejusdemcoloris, ut tamen albæ & nigræ intercurrent. Pili flavescentes, pedum fulvi.*

IV. GLIRES.

*Dentes primores bini supra & infra approximati, a molaribus remoti.
laniarii nulli.*

21. *HYSTRIX. Dentes primores II oblique scissimolares VIII.*

Digiti pedum IV-V.

Corpus spinis pilisque tectum.

cristata. 1. *H. palmis tetradactylis, plantis pentadactylis, capite cristato, cauda abbreviata. S. G. Gmelin it. III. p. 107. t. 21. Schreber Saeugth. IV. p. 599. t. CLXVII.*

Hystrix capite cristato. Briss. quadr. 125.

Hystrix orientalis cristata. Seb. mus. 1. p. 79. t. 50. f. 1.

Hystrix. Gesn. quadr. p. 563. Aldrov. digit. p. 471. fig. p. 474. Jonst. quadr. p. 163. t. 68. Raj. quadr. p. 206.

Porc-épic. Buffon hist. nat. XII. p. 402. t. 51. 52.

Crested porcupine. Penn. quadr. p. 262. n. 193.

Stachelschwein. Ridinger. kl. Th. t. 90.

Stachelschwein mit dem Kopfbusch aus Africa. Knorr delic. II. tab. K. II. f. 2.

Habitat in Asiæ australioris, Africa, Hispaniæ, Italiæ antris, quæ ipsa fodit, amplis, & in multas cameras partitis, unico tamen introitu; noctu victum quærit in fructibus, radicibus, herbis, buxo præsertim delectata; hostibus infestata in globum se contrahit; femina vere 2-4 pullos parit, qui facile cicurantur.

Longitudo aliquando 2 pedes superat; caput elongatum, compressum; rostrum breve obtusum; labium superius ad nares usque fissum; oculi parvi, nigri; auriculæ ovales, latæ, breves; cauda conica; pedes breves, crassi. Pili spinis interstiti cinerei; spinæ ipsæ longæ, robustæ, læves, nigro & albido annulatæ, quas animal prouti longissimas illas & robustas nuchæ setas, musculi subcutanei vi erigere & reclinare valet. Cystis fellea non raro lapidem porcinum continet. Caxo esculenta.

prehensilis. 2. *H. pedibus tetradactylis, cauda elongata prehensili seminuda. Schreber Saeugth. IV. p. 603. t. CLXVIII.*

MAMMALIA GLIRES. Hystrix.

119

Hystrix (americanus) cauda longissima tenui, medietate extrema aculeorum experto. *Briff. quadr.* 129.

Hystrix americanus, Cuandu Brasiliensibus, Lusitanis Ourico cachieño. *Marcgr. bras.* p. 233. *Jonst. quadr.* p. 60. *Raj. quadr.* p. 208.

Hystrix minor leucophæus. *Barrer. Fr. equin.* p. 153.

Cuandu. *Pis. Ind.* p. 99.

Coendou. *Buffon hist. nat.* XII. p. 418. t. 54.

Brasilian Porcupine. *Penn. quadrup.* p. 264. t. 24. f. 1.

β. Hystrix americanus major. *Briff. quadr.* p. 131.

Hystrix longius caudatus, brevioribus aculeis. *Barrer. Fr. equin.* p. 153.

Cuandu major. *Pis. Ind.* p. 324. f. p. 325.

γ. Hystrix (novæ Hispaniæ) aculeis apparentibus, cauda brevi & crassa. *Briff. quadr.* 127.

Hoitzlacuatzin, seu Tlacuatzin spinosus, hystrix novæ Hispaniæ. *Hernand. mexic.* p. 322.

Hoitzlacuatzin. *Nieremb. hist. nat.* p. 154.

Habitat in Brasiliæ, Guianæ & novæ Hispaniæ silvis; arborescendit, earumque fructibus, nec non aviculis victitat; grunnit instar suis; contrahitur in globum; interdum dormit; cicurari potest; caro edulis.

Longitudo corporis tribus fere pollicibus pedem superat; caudæ 7 pollices æquat.

dorsata. 3. H. palmis tetradactylis, plantis pentadactylis, dorso solo spinoso. *Schreber Sæugth.* IV. p. 605. t. CLXIX.

Hystrix (Hudsonis) aculeis sub pilis occultis, cauda brevi & crassa. *Briff. quadr.* p. 128.

Hystrix pilosus americanus. *Catesb. Carol. app.* p. 30.

Cavia Hudsonis. *Klein quadr.* p. 51.

Porcupine from Hudson's bay. *Edw. av.* I. p. 52. t. 52.

Urson. *Buff. hist. nat.* XII. p. 426. t. 55.

Habitat in Canada, nova Anglia, sinu Hudsonis, nova terra; fodiendo infra radices arborum degit, eas adscendit, earumque fructibus & cortice, præsertim juniperi victitat; aquam lambit canis instar, ejusque loco hieme comedit nivem.

Corpus ferrugineum. Cauda apice subtus alba. Aculei inter pilos occultati.

macroura. 4. H. pedibus pentadactylis, cauda longissima, aculeis clavatis. *Schreber Sæugth.* IV. p. 607. t. CLXX.

Hystrix (orientalis) cauda longissima aculeis undique obsita, in extremo paniculata. *Briff. quadr.* 131.

MAMMALIA GLIRES. CAVIA.

Porcus aculeatus filvestris feu *hystrix orientalis singularis.*
Seb. mus. I. p. 84. t. 52. f. 1.

Hystrix. Bont. jav. 54.

Habitat in insulis oceani indici in silvis.

Auriculæ breves, calvæ; cauda longitudine corporis apice fasciculo pitorum longorum nodosorum argenteorum coronata. Corpus breve torosum. An forsan hujus varietas Hystrix torosa, descripta a Cl. Merrem, apud Leske Magaz. zur Naturk. und Oekonomie 1786. fasc. II. p. 197. 198.

CAVIA. *Dentes primores II cuneati.*
molares VIII.

Digiti plantarum III - V.
palmarum IV - V.

Cauda abbreviata aut nulla.

Claviculæ nullæ.

Paca. 1. *C. caudata, pedibus pentadactylis, lateribus flavescente-lineatis. Erxl. mamm. p. 356. n. 7. Schreber Saeguth. IV. p. 609. t. CLXXI.*

Mus (Paca) cauda abbreviata, pedibus pentadactylis, lateribus flavescente-lineatis. Syst. nat. XII. I. p. 81. n. 6.

Cuniculus (Paca) caudatus auritus, pilis obscure fulvis rigidis, lineis ex albo flavescentibus ad latera distinctis. Briss. quadr. p. 144. n. 4. Gronöv. zooph. I. p. 4. n. 15.

Cuniculus minor palustris, fasciis albis notatus, Pak. Barr. Fr. équ. p. 152.

Mus brasiliensis magnus porcelli pilis & voce Paca dictus. Raj. quadr. p. 226.

Paca. Marcgr. bras. p. 224. Pis. ind. p. 201. Jonst. quadr. t. 63. Buffon hist. nat. X. p. 269. t. 43. suppl. III. p. 203. t. 35.

Laubba. Bancroft Guian. p. 76.

Spotted Cavy. Penn. quadr. p. 244. n. 178.

Habitat in Guianâ, Brâsilia, & omni forsan calidiore America ad fluvios, ad quos antra fodit mundissima, tribus singula, per quos evadere possit, cuniculis instructa; pinguescit & junior cicurari potest; femina non nisi unum pullum parit. Caro sapida.

Longitudo circiter bipedalis; corpus supra fuscum, seriebus quinque macularum albarum fere coadunatarum ad latera

insignitum ; collum, pedes & abdomen sordide alba ; oculi magni fusci ; auriculæ ovatae, testæ, minus acutæ ; verruca superciliorum, temporum, gulæ ; collum breve, cauda non nisi 2-3 lineas longa ; pedes posteriores, inter quos mamma 2 jacent, anterioribus longiores.

Acufchy. 2. C. caudata, corpore olivaceo. *Erzl. mamm. p. 354. Schreb. Sæugth. IV. p. 612. t. CLXXI. B.*

Cuniculus minor caudatus olivaceus, Akouchy. *Barr. Fr. équin. p. 153.*

Acouchy. *Buffon hist. nat. XV. p. 58. suppl. III. p. 211. t. 36.*

Olive Cavy. *Penn. quadr. p. 246. n. 180.*

Habitat in Guianæ silvis, Aguti similis, cuniculo semestri æqualis ; & tum colore, tum cauda longiore ab Aguti distincta. Facile cicuratur ; femina 1-2 pullos parit. Caro edulis.

Aguti. 3. C. caudata, corpore ex rufo fusco, abdomine flavescente. *Erxleb. mamm. p. 353. Schreber Sæugth. IV. p. 613. t. CLXXII.*

Mus (Aguti) cauda abbreviata, palmis tetradactylis, plantis tridactylis, abdomine flavescente. *Syst. nat. XII. I. p. 80. n. 2.*

Cuniculus (Agouti) caudatus auritus, pilis ex rufo & fusco mixtis rigidis vestitus. *Briff. quadr. p. 143. Gronov. zooph. I. p. 4. n. 14.*

Mus major fusco-cinereus, cauda truncata. *Brown. jam. p. 484.*

Mus silvestris americanus, cuniculi magnitudine, parcelli pilis & voce. *Raj. quadr. p. 226.*

Cuniculus omnium vulgatissimus, Aguti vulgo. *Barr. Fr. équin. p. 153.*

Aguti vel Acuti Brasiliensibus. *Marcgr. brasl. p. 224. Pif. brasl. p. 102. Jonst. quadr. t. 63.*

Agouti. *Buffon hist. natur. VIII. p. 375. t. 50. Linn. Ad. Holm. 1768. p. 27.*

Long nosed cavy. *Penn. quadr. p. 245. n. 179.*

leporina. β. C. caudata, corpore supra rufo subtus albo. *Erzl. mamm. p. 355.*

Caviae, inter mures & cuniculos quasi mediæ saliendo lente currunt, non scandunt in arboribus cavis, aut sub terra degunt, vegetabilibus victitant.

MAMMALIA GLIRES. - *Cavia*.

Mus (leporinus) cauda abbreviata, palmis tetradactylis, plantis tridactylis abdomine albo. *Syst. nat.* XII. 1. p. 80. n. 3.

Cuniculus (javenfis) caudatus auritus rufescens, fusco admixto. *Briss. quadr.* p. 142.

Java hare. *Catesb. carol. app.* t. 18.

Java cavy. *Penn. quadr.* p. 246. n. 181.

america- *γ*. *Cavia*.

na.

Cuniculus (americanus) caudatus auritus pilis rufis rigidis vestitus. *Briss. quadr.* p. 144.

Cuniculus americanus. *Seb. mus.* 1. p. 67. t. 41. f. 2.

Habitat in Brasilia, Guiana, insulisque Antillis in arboribus cavis, aut antris, quæ ipsa fodit; interdum videtur quarit ex vegetabilibus, quæ colligit et asservat, pedibusque posterioribus insidens anterioribus ori admovet; salit potius, quam currit; celeriter crescit; facile cicuratur; coit per totum annum; femina 3-5 Pullos parit. Caro eadem, quæ leporis cuniculi.

Longitudo circiter sesquipedalis. Cauda conica calva, brevissima. Pedes subpalmati.

Aperea. 4. *C. ecaudata*, corpore ex cinereo rufo. *Erxleb. mamm.* p. 348.

Cuniculus (brasiliensis) ecaudatus auritus ex cinereo rufus, *Briss. quadr.* p. 149. n. 8.

Cuniculus brasiliensis, *Aperea* dictus *Marcgr. Raj. quadr.* p. 206.

Cuniculus indicus femina. *Aldrov. dig.* p. 393.

Aperea Brasiliensibus. *Marcgr. bras.* p. 223. *Jonst. quadr.* t. 63. *Piso brasil.* p. 103. *Buffon hist. nat.* XV. p. 160.

Rock cavy. *Penn. quadr.* p. 244. n. 177.

Habitat in Brasiliæ rupestrium antris. Caro sapida.

Color dorfi, qualis in lepore timido; auriculæ breves. Palmæ tetradactylæ. Plantæ tridactylæ.

Cobaya. 5. *C. ecaudata* ex albo & rufo vel nigro variegata. *Schreber Sæugth.* IV. p. 617. t. CLXXIII.

Mus (Porcellus) cauda nulla, palmis tetradactylis, plantis tridactylis. *Syst. nat.* XII. p. 79. n. 1. *Mus. Ad. Fr.* p. 9. *Amœn. acad.* 4. p. 190. t. 2. it. *Westgoth.* 224.

Cuniculus (indicus) ecaudatus auritus albus aut rufus aut ex utroque variegatus. *Briss. quadr.* p. 147. n. 7. *Gronov. zooph.* 1. p. 4. n. 16.

Cuniculus indicus. *Nieremb. hist. nat.* p. 160. *Aldr. dig.* p. 390. 391. *Jonst. quadr.* p. 162. t. 63. 65.

MAMMALIA GLIRES. Cavia. 123

Muscu cuniculus americanus & guineensis; porcelli pilis & voce, cavia cobaya brasiliensibus dictus Marcgr. *Raj. quadr. p. 223.*

Mus major albo fulvoque varia, cauda nulla. *Brown. jam. p. 484.*

Cavia cobaya. *Marcgr. bras. 224. Pis. bras. 102. Pallas spic. 1001. 2. p. 17.*

Guinea-pig. *Edw. av. t. 294. f. 2.*

Cochon d'Inde. *Buffon hist. nat. VIII. p. 1. t. 1.*

Restless cavy. *Penn. quadr. p. 243. n. 176.*

Habitat in Brasilia, hospitatur in Europa. Pipiens, loquax, inquieta, sequax, calcitrans, attentus, comans, masticans edit vegetabilia variata, potat lympham puram, calorem amat; femina mammis duabus, parit pullos perfectissimos, mox coit; mas bombylans juniores masculos mordet paraplegicos.

Longitudo pedalis. Color varius. Pili duri, colli paulo longiores. Corpus torosum; collum brevissimum. Auriculæ breves, latae, extrinsecus calvæ. Oculi magni, fusci, prominuli.

Capybara. 6. C. ecaudata, plantis tridactylis palmatis. *Schreber Saeugth. IV. p. 620. t. CLXXIV.*

Sus (Hydrochaeris) plantis tridactylis, cauda nulla. *Syst. nat. XII. p. 103.*

Sus maximus palustris, Cabiai, Cabionara. *Barr. Fr. équin. p. 160.*

Hydrochoerus. *Briss. quadr. p. 117.*

Cavia Capybara. *Pallas spic. 1001. 2. p. 18.*

Capybara brasiliensibus. *Marcgr. bras. p. 230. Pis. bras. p. 99. Jonst. quadr. t. 60. Raj. quadr. p. 126.*

Capivard. *Froger voy. p. 123.*

Cabiai. *Buffon hist. nat. XII. p. 384. t. 49.*

Thicknoed tapir. *Penn. quadr. p. 83. n. 61.*

Habitat in Americæ australis parte occidentali; in regionibus silvosis paludosis ad magnos fluvios; saccharo aliisque vegetabilibus, piscibus quoque vescitur, quos nodu capit; natat, pinguescit, mitis, monogama; femina non nisi unicum parit pullum.

Longitudo 2½ pedibus major; caput oblongum; rostrum angustum; nares nigricantes, subrotundæ; labium superius fissum; mystaces nigrae; oculi magni, nigri; auriculæ breves, rectæ, calvæ, nigrae; collum breve, crassum;

pedes breves; plantæ tetradactylæ; pili setosi, dorso longissimi, plurimi utroque sine nigri, medio flavescentes.

23. CASTOR. *Dentes primores superiores truncati, angulo transverso excavati.*

inferiores apice transversii.

molares utrinque IV.

Cauda longa depressa squamosa.

Claviculæ perfectæ.

Fiber. 1. C. cauda ovata plana calva. *Fn. suec. n. 27. Mus. Ad. Fr.*

1. p. 9. *Schreber Saeugth. IV. p. 623. t. CLXXV.*

Castor castanei coloris, cauda horizontaliter plana. *Briss. quadr. p. 133.*

Castor. *Gens. quadr. p. 309. aquat. p. 185. Rondel. aquat. p. 236. Aldrov. digit. p. 276. Jonst. quadr. p. 147.*

t. 68. *Raj. quadr. p. 209. Buff. hist. nat. VIII. p.*

282. t. 36. *Penn. quadr. p. 255. n. 190.*

Fiber. *Bellon. aq. 30.*

Beaver. *Catesb. carol. app. p. 29.*

Biber. *Ridinger kl. Th. t. 84.*

β. Castor albus, cauda horizontaliter plana. *Briss. quadr. 135.*

Habitat hodiernum in Europæ, Asiæ, Americæ borealibus ad ripas fluviorum lacuumque solitarias silvas, vicinitas corticibus sorbi, salicis, potissimum populi, ligno magnoliæ glaucæ, radice acori & al. vix piscibus. Lente graditur, at dexterrime natat, interdiu quietus, profunde dormit, mundissimus; junior facile cicuratur, mitis; monogamus coit hieme erectus; femina 4 mammis instructa per 4 menses gravida 2 parit pullos, rarius 3-4.

Architectura in construenda ad ripas domo superat, excepta humana, omnium animalium. Ad. Stockh. 1756. p. 207.

Corpus 2½-3 pedes longum, cauda dimidio brevior, quarta sui parte corpori proxima pilosa; pedes pentadactyli, plantæ palmatæ; oculi parvi, auriculæ breves crinatæ; collum crassum & breve; corpus torosum, dorso convexo; pili molliores breviores ferruginei, longiores durioresque castanei, quo magis borealem terram inhabitat, eo obscuriores, ut aliquando nigri; alias albi, aut albi ma-

MAMMALIA GLIRES. Castor. Mus.

123

culis cinereis, aut albi interstitis rubris; rarissime flavescentes. Glandulæ salivales insignes, & ad dextram cardiacæ alia adhuc glandula, quæ per 18 patula orificia humorem suum largiter in ventriculū effundit. Prope genitalia externa & anum inter binas magnasque glandulas sebaceas medii hærent duo folliculi cellulosi graveolens castoreum, singuli circiter 3ij continentes; russicum & borussicum canadensi melius.

Marius J. Castorologia. Wien. 1685.

Anatome. Wepfer. Eph. N. C. d. 1, a. 2. obs. 251. Sarrafin aâ. Paris. 1704. p. 48. Aâ. Petrop. T. II. p. 415.

huidobrius. 2. C. cauda compressa lanceolata pilosa, palmis lobatis, plantis palmatis. Molina hist. nat. Chil. p. 253.

Habitat in Chilenfium fluviorum lacuumque profundissimis. Animofum animal piscibus cancrisque videtur, diu sub aqua manet; neque architectura fibri, neque castoreum; femina 2-3 pullos parit.

Corpus circiter tripedale; caput fere quadratum; rostrum obtusum; oculi parvi; auriculæ breves rotundæ; pili similiter duplicis generis; qui teneriores, mollitie superant pilos cuniculi, ut pelliariis magni æstimetur pellis in dorso cinerea, in ventre albida.

24. MUS. *Dentes primores superiores cuneati. molares utrinque III, rarius II. Claviculæ perfectæ.*

* cauda apice compressa.

Coypus. 1. M. cauda mediocri subcompressa pilosa, plantis palmatis. Molina hist. nat. Chil. p. 255.

Habitat in aquis Chilenfibus, lutra facie & colore, dentium numero muri accedens, ut tamen non nisi 2 molares ad utrumque primorum latus habeat. Cauda crassa; pedes pentadactyli; auriculæ rotundæ. Femina 5-6 pullos parit.

zibethicus. 2. M. cauda longa compresso-lanceolata, pedibus fissis. Schreber. Sæugth. IV. p. 638. z. CLXXVI.

Castor zibethicus. Syst. nat. XII. 1. p. 79.

Castor (mus moschiferus canadensis) cauda verticaliter plana, digitis omnibus a se invicem separatis. Briss. quadr. 136.

Rat musqué. *Sarrafin ad. Paris. 1725. p. 323. t. II. f. 1. 2.*

Desmans rottor. *Kalm it. 3. p. 19.*

Ondatra. *Buffon hist. nat. X. p. 1. t. 1.*

Musk beaver. *Penn. quadr. p. 259. n. 191.*

Habitat in America boreali ad aquas lentiores, ad quarum ripas domus exstruit, simpliciores tamen, quam castor fiber; videtur etiam conchis, æstate præsertim herbis & fructibus, hieme radicibus, potissimum acori & nymphææ; monogamus coit æstate; femina 6 mammis gaudens abdominalibus 3-6 pullos parit, ut nonnulli volunt, terquater per annum; dexterrime natat & mergitur; in terra tamen incedens vacillat.

Cauda apice ancipiti ad castorem, eadem longiore ipsaque magnitudine ad murem decumanum, facie & auriculis crinitis satis brevibus ad amphibium propius accedit; longitudo circiter pedalis, pondus trium librarum; cauda corpore paulo brevior, fusca; digiti plantarum ordinibus pilorum longorum alborum densis ciliati, unguibus rubicundis. Pili molles ex atro fusci. Glandulæ sebaceæ ad anum humore oleoso moschum æstate potissimum graviter olente plenas.

* * myofuri, cauda tereti calva.

Pilonides. 3. M. cauda longiuscula squamata truncato-æbtusa, corpore albido. *Pallas glir. p. 91. n. 38.*

Mus (albus zeylonicus) albus, cauda longissima. *Briss. quadr. (ed. bat.) p. 122. n. 8.*

β. Castor cauda lineari tereti. *Brown. jam. p. 484.*

Rat musqué. *Rocheff. antill. p. 140.*

Piloris. *Buffon hist. nat. X. p. 2.*

Musk Gavy. *Penn. quadr. p. 247. n. 183.*

Habitat in India, β) in insulis Antillis in antris, quæ ipse fodit, etiam in domibus, moschato odore infestus. Magnitudine ad cobayam accedit; auriculæ magnæ, calvæ; cauda 4 pollicum; palmæ tetradaçylæ, ut pollicis locum nodus suppleat; plantæ pentadaçylæ.

Caraco. 4. M. cauda longa squamosa obtusiuscula, corpore griseo, plantis subsemipalmatis. *Fall. glir. p. 91 n. 39. p. 335. t. 23. Schreber Sæugth. IV. p. 643. t. CLXXVII.*

Habitat in Sibiria quàm maxime orientali ad aquas, ad cujus ripas cuniculos fodit; egregie natat; domus etiam frequentat.

Corpus 6, cauda $4\frac{1}{2}$ pollices longitudine superat; pondus 6-7 uncias aequat. Caput angustum, elongatum; oculi auriculis propiores, quam naribus; palmæ tetradactylæ, ut verruca pollicis vices suppleat; plantæ pentadactylæ; digitis plica cutis connexis.

Color dorſi, ut in decumano, fuscus cinereo mistus, ventris ex albedo in cinereum vergens, pedum fordide albus.

decuma-
nus.

6. M. cauda longissima squamata, corpore fetoso griseo subtus albedo. *Pallas glir.* p. 91. n. 40. *Schreber Saeugth.* IV. p. 645. t. CLXXVIII.

Mus (norwegicus) cauda elongata, palmis tetradactylis cum unguiculo pollicari, corpore rufo. *Erzl. mamm.* p. 381. n. 1.

Mus (silvestris) cauda longissima, supra dilute fulvus, infra albicans. *Briss. quadr.* p. 170. n. 3.

Mus aquaticus. *Gesn. aquat.* p. 732.

Surmulot. Buff. hist. nat. VIII. p. 206. t. 27.

Norway rat. *Penn. brit. zool.* p. 47.

Brown rat. *Penn. quadr.* p. 300. n. 227.

Habitat in India & Persia, unde hoc demum seculo in Europam devenit, ad aquarum ripas antra sibi fodiens, urbes etiam, aquæductus, cloacas, stabula, horrea, hortos, campos, domus frequentans, cato detestatus, lepori cuniculo cedens, a mustelis domatur; præter vegetabilia carne quoque, gallinis, ipsisque congeneribus viçitat; audacissimus; per hiemem non dormit; aquam non metuit, & dexterrime natat; migrat gregatim; femina ter per annum 12-15, imo 18 & 19 pullos parit. An forsitan mus caspius Æliani?

Pondus animalis ab 3 viij ad libram unam; corpus adulti longitudine vix superat 9, cauda $7\frac{1}{2}$ pollices; hæc ex 200 fere annulis constata; digiti distinctissimi; mystaces capite producto longiores; oculi magni nigri prominuli.

Rattus.

12. M. cauda longissima squamosa, corpore atro subtus canescente. *Pallas glir.* p. 93. n. 41. *Schreber Saeugth.* IV. p. 647. t. CLXXIX.

Mus (Rattus) cauda elongata subnuda, palmis tetradactylis cum unguiculo pollicari, plantis pentadactylis. *Syst. nat.* XII. p. 83. *Fn. succ.* 2. p. 12. n. 33. *Müll. prodr.* p. 5. n. 31.

Mus (Rattus) cauda longissima, obscure cinereus. *Briss. quadr.* p. 168. n. 1. *Grænov. zoon.* p. 4. n. 18.

Mus domesticus major, quem vulgo rattum vocant;

Gesn. quadr. p. 731.

Mus domesticus major sive rattus. *Raj. quadr. p. 217.*

Rattus. *Aldrov. dig. p. 415.*

Glis. *Jonst. quadr. t. 66.*

Sorex. *Hufnagel archetyp. p. 3. t. III.*

Rat. *Buffon hist. nat. VII. p. 278. t. 36.*

Common rat. *Penn. Brit. zool. i. p. 97.*

Black rat. *Penn. quadr. p. 299. n. 226.*

Habitat in Persia & India, nunc etiam, boreali parte excepta, in Europa, ex qua per naves in Africam & Americam delata esse fertur; in Tahiti tamen frequens, rarius in reliquis maris australis insulis. Cautus & animosus, parum bibit; sed voracissimus omnia, quæ occurrunt, comedit, domibus pessimum animal, cibis & utensilibus infestum omnibus; ne suæ quidem ipsius speciei parcens; prædatur a bubone aliisque strigibus, a mustelis, non semper a catis. Femina 10 mammis instructa aliquoties per annum 5-6 pullos parit.

Pondus rattu aliquando ad 3vj accedit, rarissime modo 6-7 drachmas æquat. Longitudo corporis vix 8 pollices æquat; cauda æqualis 250 circiter annulis conspicua, tenuis. Color ut plurimum supra nigricans, infra cinereus; varius supra in fuscum aut cinereum vergens, aut cinereus maculis albis, aut totius animalis albus, oculis rubris.

Musculus.

13. M. cauda elongata subnuda, palmis tetradactylis, plantis pentadactylis: pollicis mutico. *Fn. suec. 34.*

Mus cauda longissima squamosa, corpore fusco subtus cinerascens. *Pallas glir. p. 95. n. 43. Schreber Saecul. IV. p. 654. t. CLXXXI.*

Mus cauda longa nudiuscula, corpore cinereo fusco, abdomine subalbescens. *Fn. suec. i. p. 11. n. 31. Mus. Ad. Frid. i. p. 9.*

Mus (Sorex) cauda longissima, obscure cinereus, ventre subalbescens. *Briss. quadr. p. 169. n. 2. Gronov. zool. i. p. 4. n. 19.*

Mus domesticus minor, cauda longa subnuda, corpore fusco-cinerascens, abdomine albicante. *Brown. jam. p. 484.*

Mus domesticus vulgaris s. minor. *Raj. quadr. p. 219. Sloan. jam. 2. p. 330.*

Mus domesticus minor. *Aldr. dig. p. 417.*

Mus domesticus. *Jonst. quadr. p. 165. t. 66.*

Mus.

Mus. *Hufnagel archetyp. p. 1. tab. 3. 10. p. 2. t. 8. p. 4. t. 2.*

Souris. *Buffon hist. nat. VII. p. 309. t. 39. suppl. III. p. 181. t. 38.*

Common moufe. *Penn. quadr. p. 302. n. 229.*

Habitat in domibus Europæ & Asiæ mediæ, nunc etiam Americæ; polyphagus consumit cibaria, cerealìa, carnes, cadavera, quæ colligit; parum bibit; salax omni anni tempore coit, & fertilissimus, ut semina semper 5-6 pullos pariat; mîsis, tintidus; cursu celerrimus, vix in carcerandus; prædatur a ratto, cato, mustela, erinaceo, strige; in horreis pellitur ebulo & solano nigro. Longitudine $3\frac{1}{2}$ pollices non superante; & ungue pollicari palmarum nullo a ratto differt.

Varietas nigra, flavescens, albo-maculata, alba maculis cinereis, & nitidissima tota alba oculis rubris rarior.

Alvaticus. 17. *M. cauda longa squamosa; corpore griseo lutescente subtus lateribusque abrupte albo. Pallat glir. p. 94. n. 42. Schreber Sæugth. IV. p. 651. t. CLXXX.*

Mus cauda mediocri, palmis tetradactylis, plantis pentadactylis, corpore griseo pilis nigris, abdomine albido. Syst. nat. XII. 1. p. 84. Fn. suec. 2. p. 12. n. 36.

Mus cauda longa, supra e fusco flavescens, infra ex albo cinerascens. Briss. quadr. p. 174. n. 9.

Mus (campestris major) cauda longissima, fuscus ad latera rufus. Briss. quadr. p. 171. n. 4.

Mus agrestis minor. Gesn. quadr. p. 733.

Mus domesticus medius. Raj. quadr. p. 218.

Mulot. Buff. hist. nat. VII. p. 325. t. 41.

Field-rat. Penn. quadr. p. 302. n. 230.

8. *Harvest-rat. Penn. quadr. p. 302. n. 231.*

Habitat in omnis Europæ silvis, campis, hortis, dumetis, hieme quoque in horreis & domibus; vidit at cerealibus, arborumque seminibus, quæ colligit, aviculis quoque, congeneribus, & defectu aliorum propria specie; assers durissimos sæpe uno die perforat; prædatur ab accipitribus, vulpe, putorio, marte.

Mures in antris latebrisque habitant, celerrime currunt & scandunt, nonnulla species etiam natant; noctu præsertim vidum quærunt, potissimum vegetabilem, quem palmis ori admovent. Femina 8 circiter mammis gaudet, & plures simul eosque sæpili per annum pullos pariunt. Nonnulla species migrant. Auriculæ breves rotundæ. Palmarum digiti plerisque modo 4, ut pollicis lacum verruca suppleat.

MAMMALIA GLIRES. Mus.

Magnitudinem musculum aequat; cauda longitudine corporis supra nigricans, infra alba; pedes splendide albi. Huius etiam datur varietas tota alba oculis rubris.

- agrazius.** 7. *M. cauda longa squamosa, corpore lutescente, striga dorsali nigra. Pallas it. 1. p. 454. glir. p. 91. n. 44. & p. 341. t. 24. A. Schreber Saeugt. IV. p. 638. t. CLXXXII. Mus rubeus. Schwenckf. ther. Siles. p. 114. Muris alia species. S. G. Gmelin it. 1. p. 151. t. 29. f. 2. Habitat in Russia a Tanai ad Jenisei fluvium, in Silesia, rarius in Germania, gregarius & migratorius. Longitudo vix 3 pollices, pondus vix $\frac{3}{8}$ assequitur. Abdomen cum pedibus album, palmarum pollex ungue exiguo.*

- minutus.** 8. *M. cauda longa squamosa corpore supra ferrugineo subtus albido. Pallas it. 1. p. 454. n. 4. glir. p. 96. n. 45. & p. 345. t. 24. B. Schreb. Saeugth. IV. p. 660. t. CLXXXIII. Habitat in imperio Russico, in Sibiria pulchrior, ut supra eleganter flaveat, infra niveus sit. Musculo dimidio minor; cauda fere bipollicaris. Femina mare minor minusque pulchra*

- torcinus.** 10. *M. cauda mediocri subpilosa, rostro producto, auriculis orbiculatis vestitis, velleris dorso flavicante griseo, abdomine albido. Schreb. Saeugth. IV. p. 661. t. CLXXXIII. B. Habitat Argentorati. Hermann. Longitudo vix ultra 2 pollices, & 3 lineas; mystacum ordinis 7. Ungues brevissimi; cauda unicolor flavescens, cinereo intermixto, subtus magis pilosa. Abdomen album,*

- vagus.** 14. *M. cauda longissima nudiuscula, corpore cinereo, fasciâ dorsali nigra, auribus plicatis. Pallas glir. p. 90. n. 36. p. 327. t. 22. f. 2. Schreber Saeugthiere, IV. p. 663. t. CLXXXIV. f. 2. Mus subtilis. Pallas it. 2. p. 705. n. 11. 8. Habitat in desertis inter fluvios Ural, Irtysch & Ob positus satis frequens, in fissuris rupium, infra lapides, truncos arborum; videtur praesertim seminibus, minoribus etiam animalibus; per hiemen dormit; gregatim migrat. Pondus 3ij non inferius; longitudo paulo major, quam foricino; pedes tenerrimi albidî; cauda corpore paulo longior, supra cinerea, infra albicans prehensilis. Dentes primores flavi; molares in superiore maxilla 2. Feminae mammae 8. Ungues longi.*

MAMMALIA GLIRES. Mus.

131

betulinus. 15. M. cauda longissima nudiuscula, corpore fulvo fascia dorsali nigra, auriculis plicatis. *Pallas glir. p. 90. n. 35. p. 332. t. 21. f. 1. Schreber Saeugth. IV. p. 664. t. CLXXXIV. f. 1.*

Mus subtilis. *Pallas it. 2. p. 705. n. 11. β.*

Habitat solitarius in betuleis deserti Ischimenfis & Barabensis, etiam inter fluvios Ob & Jenisei; vago satis similis moribus & facie, paulo tamen minor. Cauda supra fusca, infra albida.

pumilio. 18. M. cauda mediocri nudiuscula, corpore ex fusco cinereo, fronte nuda & lineis quatuor dorsalibus nigris. *Sparrmann. dñ. Stockh. nov. ai. 1784. p. 239. tab. VI.*

Habitat in silvis Siticamæ pone Caput bonæ spei; pondus 5iv.

striatus. 19. M. cauda longiuscula subnuda, corporis striis plurimis parallelis albo-guttatis. *Pallas glir. p. 90. n. 37.*

Mus cauda elongata subnuda, palmis tetradactylis, plantis pentadactylis, corpore striis punctatis. *Syst. nat. XII. 1. p. 84.*

Mus cauda longa, striis corporis longitudinalibus ex punctis albis. *Mus. Ad. Frid. 1. p. 10.*

Mus (orientalis) cauda longa, rufus, lineis in dorso albicantibus margaritarum æmulis. *Briff. quadr. p. 175. n. 10.*

Mus orientalis. *Seb. mus. 22. t. 21. f. 2.*

Oriental rat. *Penn. quadr. p. 304. n. 232.*

Habitat in India, musculo dimidio minor, fuscescens, 12 seriebus punctorum albarum insignitus, infra albicans, auriculis brevibus calvis, cauda fere calva longitudine corporis. An vera propria species?

barbarus. 20. M. cauda mediocri, corpore fusco striis decem pallidis, palmis tridactylis, plantis pentadactylis. *Syst. nat. XII. Tom. 1. P. 2. add.*

Habitat in Africa boreali, musculo minor; supra fuscus lineis decem longitudinalibus albidis, infra albicans; cauda calva annulata, longitudine corporis. An forsitan ad caviam releganda?

* * * cunicularii cauda terete, pilosa.

saxatilis. 21. M. cauda longiuscula, auribus vellere majoribus, palmis subtetradactylis. *Pallas glir. p. 80. n. 19. p. 255. t. 23.*

B. Schreber Saeugth, IV. p. 667. t. CLXXXV.

MAMMALIA GLIRES. Mus.

Habitat in Sibiria parte quam maxime orientali in fissuris rupium.

Longitudine 4 pollices, pondere 9 drachmas æquat. Rostrum acutum & auriculæ ovales fusca. Dorsum fuscum flavescens mistum; venter albicans; pedes nigricantes; cauda sesquipollicaris; superius fusca, inferius alba.

Cyanus. 12. *M. cauda mediocri subpilosa, palmis tetradaetylis, plantis pentadaetylis, corpore cæruleo subtus albido. Molina hist. nat. Chili. p. 266.*

Habitat in regno Chilensi, silvatici facie & magnitudine, sed pilis cæruleis; auriculis rotundis, perquam timidus; magnam in caveis suis, in plures cameras partitis, radicum tuberosarum penum colligit, quam incolæ crebro auferunt.

amphibius. 11. *M. cauda longitudine dimidia corporis, auribus vix velle-reprominulis, pedibus subtetradaetylis. Pallas glir. p. 80.*

n. 20. Schreber Sæugth. IV. p. 668. t. CLXXXVI.

Mus cauda elongata pilosa, plantis palmatis. Syst. nat. XII. p. 82. Fn. succ. 2. p. 12. n. 32.

Mus cauda mediocri, palmis tetradaetylis cum unguiculo pollicari, corpore nigricante. Erxl. mamm. p. 386. n. 3.

Mus (aquaticus) cauda longa, pilis supra e nigro & flavescente mixtis, infra cinereis vestitus. Briss. quadr. p. 175. n. 11.

Mus agrestis major. Gesn. quadr. p. 733.

Mus major aquaticus sive rattus aquaticus, & Mus agrestis major macrourus Gesneri. Raj. quadr. 217. & 219.

Rat d'eau. Buffon hist. nat. VII. p. 368. t. 43.

Water-rat. Penn. quadr. p. 301. n. 228.

Eide Maëuseart. S. G. Gmelin it. 1. p. 151. t. 29. f. 1.

terrestres. β. *Mus cauda mediocri subpilosa, palmis subtetradaetylis, plantis pentadaetylis, auriculis vellere brevioribus. Syst. nat. XII. p. 82. n. 10. Fn. succ. 2. p. 11. n. 31.*

Mus agrestis capite grandi brachyurus. Raj. quadr. p. 218.

paludosus. γ. *Mus cauda mediocri pilosa, palmis subtetradaetylis, plantis pentadaetylis, auriculis vellere brevioribus, ater. Mant. plant. 2. p. 522.*

niger. δ. *Mus amphibius niger.*

maculatus. ε. *Mus amphibius macula magna alba dorsali, & linea alba pectorali.*

Habitat in omni Europa & septentrionali Asia ad mare usque glaciale in aquosis præsertim ripis aquarum præcipitibus, in humido quoque lutoſoque agrorum, pratorum, hortorum solo, radices, arborum quoque, rodit, herbarum effodit, hisque præcipue viſitat; mordax & animoſus; natat & aqua mergitur. Caro Jacutis deliciosa, a quibus etiam pellis adaptatur. Femina mare minor, & magis flaveſcens, mammis 8, 4 pectoralibus, 4 abdominalibus instructa, coitus tempore moſchum olet, & Aprilis ad 8 usque pullos parit.

Pondus inter 3ij & 3iij intermedium; longitudo corporis 6½, caudæ 3 pollicum. Roſtrum, prouti truncus, breve & crassum; auriculæ ovata, margine crinita.

- gillarius. 23.** *M. cauda unciali, auribus majusculis subpilosis, corpore cinereo subtus albido. Pallas glir. p. 80, n. 18. p. 252. t. XIV. C. Schreber Sæugth. IV. p. 671. t. CLXXXVII. Habitat in Sibiria ad fluvios Jenisei, Kaſ & Angara, alliorum bulbis viſitans, quorum magnam penum colligit. Muri arvali affinis, ut tamen capite, mysticibus & auriculis ad musculum propius accedat. Palmæ tetradaſtylæ. Cauda 1½ pollicem longa, alba, striâ dorsali fusca. Corpus 4½ pollices longum. Mammæ 8.*

- rutilus. 24.** *M. cauda unciali, auriculis vellere longioribus, palmis subtetradaſtylis, corpore supra fulvo, subtus cano. Pallas glir. p. 79. n. 17. p. 246. t. XIV. B. Schreber Sæugth. IV. p. 672. t. CLXXXVIII.*

Habitat in Sibiria, varietas minor forsan quoque in Germania; in antris congenerum, arboribus cavis, hieme in acervis frumentis, horreis, domibus; hieme per nivem currit; carnem amat.

Arvali satis affinis; pedes tamen magis pilosi, albi; cauda vix ultra pollicem longa, præter striam fuscâ supra flaveſcens, subtus alba. Corpus pondere ad 3ß ad 3vij, longitudine tres pollices 7½ lineas æquat.

- gregalis. 25.** *M. cauda sesquiunciali, auriculis vellere longioribus, palmis subtetradaſtylis, corpore cinerascens. Pallas glir. p. 79. n. 16. p. 238. Schreber Sæugthiere, IV. p. 674. t. CLXXXIX.*

Mus socialis. Georgi it. p. 162.

Habitat in Sibiria orientalis ficcis; sub cespite nidum, multis foraminibus pervium, & cameris pro penâ radicum.

præsertim lili pomponii & alii tenuissimi condenda cindum fodit.

œcono- mus, sociali longior, ut femina sex linearum ultra 4 pollices longitudinem assequantur, maribus pollice brevioribus.

- œcono- 26. *M. cauda subsefquiunciali, auriculis nudis in vellere molli mus,* latentibus, palmis subtetradactylis, corpore fusco. *Pallas glir. p. 79, n. 15, p. 225. t. XIV. A. it. III. p. 692, n. 4. Georgi it. p. 161. Schreber Sæugth. IV. p. 675. t. CXC.* *Habitat in Sibiria a fluvio Irtysh ad oceanum orientalem usque, in humidis præsertim & profundis vallibus, in quibus sub cespite nidum multiplici exitu, & ad ejus latera cameram aut plures cameras pro condenda insig- ni, quam colligit, radicum præsertim tuberosarum penu excavat; veris initia coit, quo tempore femina mos- chum olet, probabiliter pluries per annum, femina ta- men non nisi 2-3 pullos semel parit; gregatim migrat linea recta, & aquas in hoc itinere tranat, ab avibus, piscibus, apris, vulpibus aliisque feris turbatur; ab ipsis hominibus non penu modo sua spoliatur, sed ipsum a Jakutis animal quoque comeditur.* *An huc spectat mus glareolus, a b. O. F. Müller in in- sula Lalandia repertus, & a Schrebero Sæugth. IV. t. CXC. B. depictus?*

- laniger. 27. *M. cauda mediocri, palmis tetradactylis, plantis penta- dactylis, corpore cinereo lanato. Molina hist. nat. Chil. p. 267.* *Habitat in terræ Chilensis borealibus sub terra, mundus, docilis, mitis & facile cicurandus, vidit bulbis, cepæ potissimum; femina bis per annum 5-6 pullos parit. Longitudo 6 pollicum; auriculæ exigua acuta; rostrum breve, pili longissimi, telæ aranearum in modum tene- ri, ut Peruviani olim lanæ optimæ in locum adhiberent.*

- arvalis. 16. *M. cauda unciali, auriculis vellere prominulis, palmis subtetradactylis, corpore fusco. Pall. glir. p. 79 n. 14. Schreb. Sæugth. IV. p. 680. t. CXCI.* *Mus (gregarius) cauda corpore triplo brevior subpilosa, corpore griseo subtus pedibusque albis. Syst. nat. XII. 1. p. 85.* *Mus (terrestris) cauda mediocri, auriculis vellere brevioribus, corpore supra ferrugineo, subtus cinereo. Erxleb. mamm. p. 395. n. 7.*

Mus (campestris minor) cauda brevi, pilis e nigricante & sordide luteo mixtis in dorso, & saturate cinereis in ventre vestitus. *Briss. quadr. p.* 176. *n.* 12.

Mus campaignolo. *Gesn. quadr. p.* 733.

Campaignol. Buff. hist. nat. VII. p. 369. *t.* 47.

Short-tailed rat. *Penn. quadr. p.* 305. *n.* 233.

Habitat in omni Europæ, ipsiusque Sibiriz & Hircaniæ dumetis, campis, pratis & hortis, præcipue ad aquas; victitat frumento, nucibus, glandibus, quas in suis antris colligit; a vulpe, putorio, mustela, cato, mure filvatico prædatur; femina aliquoties per annum semper 8-12 pullos parit. Infestatur acarie minutis.

Longitudo 3 circiter pollicum; pondus maris 3v-3vj, femina ad 3xj. An hujus forte varietas Mus (agrestis) cauda abbreviata; corpore nigro fulco, abdomine cinerascete. Fn. succ. ed. 2. p. 12. n. 30?

Socialis. 28. *M.* cauda semunciali, auriculis orbiculatis brevissimis, palmis subtetradaçtylis, corpore pallido subtus albo. *Pallas glir. p.* 77. *n.* 13. *p.* 218. *t.* XIII. *B. it. 2. p.* 705. *n.* 10. *Schreb. Sæugth. IV. p.* 682. *t.* CXCI.

Mus alius & *mus microurus*. *S. G. Gmelin it. 2. p.* 173. *t.* 11. & 3. *p.* 500. *t.* 97. *f.* 2.

Habitat frequens in sicca arena deserti inter fluvios Wolga & Ural siti; circa mare caspium & in montibus Hircaniæ, par mas & femina, aliquando cum pullis in antris; tulipæ præsertim bulbis victitat, a mustelis, putoriis, lutris, cornicibus comeditur.

Pondus circiter 3vj, longitudo 5 lineis superat 3 pollices.

Lagurus. 29. *M.* brachyurus, auriculis vellere brevioribus, palmis subtetradaçtylis, corpore cinereo linea longitudinali nigra. *Pallas glir. p.* 77. *n.* 12. *p.* 210. *t.* XIII. *A. it. 2. p.* 704. *Schreb. Sæugth. IV. p.* 684. *t.* CXCI.

Habitat in solo arenaceo lutofo desertorum flaviis Ural, Jenisei & Irtysch adjacentium, singula animalia in nido rotundo angusto; gregatim migrat; victitat potissimum iride pumila, muris quoque aliis speciebus; motu lentiore, & situ, dum dormit, ad arctomyas accedit; hieme tamen non obrigescit; salax a primo vere pluries per annum coit, quo tempore femina moschum olet, quæ semper 5-6 pullos parit.

Pondus maris 3viß, longitudo 7½ lineas ultra 3 pollices æquat; cauda maris sesquilinea longior quam femina.

torquatus.

30. *M. brachyurus*, auribus vellere brevioribus; palmis pentadactylis, corpore ferrugineo vario, torque interrupta albida, linea spinali nigra. *Pallas glir. p. 77. n. 11. p. 206. t. XI. B. Schreb. Saeugth. IV. p. 686. t. CXCIV. Habitat in parte quam maxime boreali montis Ural & uliginosis mari glaciali conterminis; lichene rangiferino & nivali, bulbisque polygoni vivipari victitat; migrat. Arvali magnitudine, lemno habitu propius accedit; cauda obtusa fusca.*

Lemmus. 5. *M. brachyurus*, auriculis vellere brevioribus, palmis pentadactylis, corpore fulvo nigroque vario subtus albo. *Pallas glir. p. 77. n. 10. p. 186. t. XII. A. B. Schreb. Saeugth. IV. p. 687. t. CXCIV. α. β.*

Mus cauda abbreviata, pedibus pentadactylis, corpore fulvo nigro-vario. *Syst. nat. XII. 1. p. 80. Fn. suec. p. 11. n. 29. ad. Stockh. 1740. p. 75. f. 45.*

Mus Lemmus. *Fabric. it. norw. p. 191.*

Mus norwegicus, vulgo Leming. *Raj. quadr. p. 327. Worm. mus. p. 321.*

Cuniculus (norwegicus) caudatus auritus ex flavo rufo & nigro variegatus. *Briss. quadr. p. 145. n. 5.*

Lemmus. *Gesn. quadr. p. 731. Olaus Magn. sept. p. 617.*

Bestiola Leem dicta. *Aldrov. digit. p. 436. Jonst. quadr. p. 168.*

Lemming. *Pontappid. hist. nat. Norweg. 2. p. 58.*

Leming. *Buffon hist. nat. XIII. p. 314.*

Lapland marmot. *Penn. quadr. p. 274. n. 202. t. 25. f. 2.*

Habitat in montibus nivalibus Scandinaviae, & parte quam maxime boreali catenae montium Uralensis, ut tamen posterior ambitu corporis multo minore, ungibus pilisque multo brevioribus, & colore minus vario potissimum subvo divergat, eo etiam, quod in antris suis penum pabuli colligat. Victitat betulae nanae amentis, lichene rangiferino & aliis; mordax, sibilat, hieme sub nive currit; femina aliquoties per annum 5-6 pullos parit, quo facto, singulis circiter 10 annis, insigni gelu praesertim imminente, universus animalium exercitus autumnum, nodu praesertim linea recta, a qua nullo obstaculo deflecti se sinunt, aut versus mare, aut in planities migrat; quo itinere tamen multa aqua submersa, feris accipitribusque occisa pereunt, & sequente aestate, pauca tamen, in montes redeunt. W. raimti historia animalis: Norwegia. Hassn. 1653. 4. hunc sedit.

Anatome. *Bartholin. cent. 2. p. 301.*

- hudsonius. 31. *M. brachyurus*, auriculis nullis, plantis pentadactylis, vitta dorsali ex luteo fuscescente, pectore & abdomine albis. *Pallas glir. p. 209. Schreber Saeugth. IV. p. 691. t. CXCVI.*

Habitat in terra Labrador.

Mas femina longior, ut 5 pollices assequatur; color potissimum cinereus; cauda pilis longis rigidis sordide albis vestita. Pedes breves.

- maulinus. 32. *M. cauda mediocri pilosa, auriculis acuminatis, pedibus pentadactylis. Molina hist. Chil. p. 268.*

Habitat in provincia Chilenis Maule silvis, marmota colore & longitudine pilorum affinis, duplo tamen major, rostro elongato, mystacum ordinibus 4, pedibus pentadactylis, cauda longiore pilosa distans. An ad ardeomyas relegandus?

* * * * buccati, buccis sacculiferis.

- Acredula. 33. *M. buccis sacculiferis, auriculis sinuatis, corpore griseo subtus albedo. Pall. glir. p. 86. n. 22. p. 257. t. XVIII. A. Schreber Saeugth. IV. p. 695. t. CXCVII.*

Mus migratorius. Pallas it. 2. p. 703. n. 5.

Habitat in districtu Sibiriae Orenburgensi ad fluvium Ural. Longitudo corporis 4 pollices, caudae annulatae supra fuscae, ceterum cum pedibus albae 8 lineas aequat.

- Cricetus. 9. *M. buccis sacculiferis, corpore subtus aterrimo, cicatricibus lumbaribus detonsis. Pall. glir. p. 83. n. 21. Schreber Saeugth. IV. p. 695. t. CXCVIII. A.*

Mus cauda mediocri, auriculis rotundatis, corpore subtus nigro, lateribus rufescentibus: maculis tribus albis. Syst. nat. XII. 1. p. 82.

Glis Cricetus. Klein quadr. p. 36.

Glis (Marmota Argentoratensis) ex cinere rufus in dorso, in ventre niger, maculis tribus ad latera albis. Briss. quadr. p. 166.

Porcellus frumentarius. Schwenckf. thr. p. 118.

Cricetus Agricol. subterr. p. 486. Gefn. quadr. p. 738.

Raj. quadr. 221. Clavier E. N. C. dec. III. n. 5. p. 376.

Hamster. Buffon hist. nat. XIII. p. 117. t. 14. Meyer Thiere, Norib. 1748. fol. t. 81. 82. S. G. Gmelin it. 1. p. 33. t. 6. Sulzer Versuch einer Naturgeschichte des Hamsters. Gotha 1773.

German marmot. Penn. quadr. p. 271. n. 200.

- β. Cricetus totus niger.** *Lepechin* it. 1. p. 192. t. 13. *Pallas* it. 1. p. 128. *Georgi* it. 2. p. 851. *Sulzer Naturg. des Hamsters*. fig. in titulo. *Schreb. Saeguth*. IV. t. CXCVIII. B. *Habitat* in Sibiria & Russia australi, Polonia, Slavonia, Hungaria, Silesia, Bohemia, & Germania transrhenana, praesertim Thuringia; Cavernas fodiunt singula animalia sub terra plurimis concamerationibus, duplici foramine: altero obliquo aditu, in quo etiam sterquilinum deponunt, altero perpendiculari specula; victitat per aestatem herbis, radicibus & fructibus, rarius carne & animalibus; colligit pro autumno hiemisque initio frumentum, fabas, pisa, vicia, lini semina, pinguis per alteram hiemis partem dormit; Aprili coit; femina 8 mammis instructa per mensem circiter gravida aliquoties per annum, prima vice 3-4, post 6-9 pullos parit. Lente currit, nec scandit, ast celerrime fodit, pedibus posterioribus insistere potest; interdum ut plurimum latet, mordicus se defendit, & brevi asserem sesquipollicarem perforat; a putorio, mustelis, canis, canibus, vulpibus, accipitribus occiditur, homini ob noxas arvis illatas detestatus, ob pellem frumentisque penum, rarius ob carnem aestimatus, occiditur arsenico, aut veratri pulvere cum farina & melle in pulvem cocto. Mas femina duplo major, ut $1\frac{1}{2}$ libram medicam pondere, longitudine 10 pollices aequet. Color variat, rarissimi sunt criceti toti candidi aut flavescetes, viz frequentiores albi nigris maculis, aut nigri albis in dorso maculis, aut rostro albo fronteque cinerascete, aut maxilla inferiore alba conspicui. Cauda $2\frac{1}{2}$ pollicum, pilis longis tecta; Pedes breves, anteriores tetradaactyli cum verruca pollicari ungue rotundata instructa, posteriores pentadaactyli.

arenarius. 34. M. buccis sacculiferis corpore cinereo lateribus subtusque albo, cauda pedibusque albis. *Pallas glir.* p. 36. n. 24. p. 265. t. XVI. A. it. 2. p. 704. n. 7. *Schreb. Saeguth*. IV. p. 707. t. CXCIX.

Habitat in deserto arenoso Baraba ad fluvium Sibiriae r. tytsch; mordax, & noctu praecipuus, agilis, amat potissimum legumina astragali tragacanthoidis.

Pondus 3 vij, *longitudo* $3\frac{1}{2}$ pollicum; *pili* tenerrimi; *palmarum* tetradaactyla; *mylatae* capite magno longiores.

phaeus. 35. M. buccis sacculiferis, corpore caudaque fusco-cinerascens, tibus subtus albis. *Pall. glir.* p. 86. n. 23. p. 261. t. XV. A. *Schreber Saeguth*. IV. p. 708. t. CC.

Mus alpinus. *Habli* apud S. G. *Gmelin* it. IV. p. 172.

Habitat in deserto Sibiriae prope Zarizyn, & in montibus Persiae sunamificis, campis oryza confitis damnosus; hieme non dormit.

Pondus 2vj, longitudo 5 lineas ultra 3 pollices, cauda 9-9½ lineas aequat; auriculæ & stria caudæ longitudinalis fuscescunt.

Songarus. 36. M. buccis sacculiferis, dorso cinereo, linea spinali nigra, lateribus albo fuscoque variis, ventre albo. *Pallas glir. p. 86. n. 25. p. 269. t. XVI. B. it. II. p. 703. n. 6. Schreber Saeugth. IV. p. 709. t. CCI.*

Habitat in Sibiriae deserto arenoso Baraba ad fluvium Ir-tisch, cum reliquis hujus tribus antra pro colligendo vidu fodiens.

Pondus 3v-3vß; longitudo corporis 3 pollicum, cauda crassæ, obtusæ, pilosæ 4½ linearum; verruca pollicaris absque ungue; mystacæ capite breviores; auriculæ longiores.

Furunculus. 37. M. buccis sacculiferis, corpore supra griseo, striga dorsali nigra, subtus albedo. *Pallas glir. p. 86. n. 26. p. 273. t. XV. A. Schreb. Saeugth. IV. p. 710. t. CCII.*

Mus barabensis. Pallas it. II. p. 704. n. 8.

Furunculus myodes. Messerschmid Mus. Petrop. p. 343. n. 109.

Habitat in Dauria, deserto Sibiriae Baraba ad fluvium Ob & inter fluvios Onon & Argun; astragalorum atripli-cumque seminibus viditans, arenario affinis, 3 pollices longus; auriculæ magnæ, ovales, pilis nigris, margine albo; cauda pollicaris, tenuis & acuta; verruca pollicaris ungue instructa.

* * * * subterranei, auriculis nullis, oculis minimis, cauda abbreviata aut nulla.

talpinus. 38. M. brachyurus fuscus, dentibus primoribus supra infraque cuneatis; auriculis nullis, palmis pentadactylis fossoriis. *Pallas glir. p. 77. n. 9. p. 176. t. XI. A. & nov. comm. Petrop. 14. p. 368. t. 21. f. 3. Schreber Saeugth. IV. p. 711. t. CCIII.*

Spalax minor. Erxl. mamm. p. 379.

Habitat in Russiae temperatoris planitiibus, in humo, quam criceti in modum perforat; singula animalia cavernam sibi fodiunt; lathyri tuberosi, phlomidis tuberosæ tæberibus, tulipæ bulbis præsertim vidit; per hiemem

non dormit; per diem visus debilis; coit initio Aprilis, quo tempore libethum olet; femina 3-4 pullos parit. Muri amphibio affinis.

Pondus 3ij aliquando, longitudo 3 pollices & 9 lineas æquat.

Capensis. 39. *M. brachyurus*, dentibus primoribus supra infraque cuneatis, auriculis nullis, palmis pentadactylis, ore albo. *Pallas glir.* p. 76. n. 8. p. 172. t. VII. *Schreber Saeguth.* IV. p. 713. t. CCIV.

Hamster. *Kolbe Vorgeb. d. gut. Hofn.* p. 158.

Taupe du Cap de bonne-espérance. *Buffon hist. nat. Amst. Suppl. V.* p. 22. t. 9.

Habitat in Capite bonæ spei, hortis infestus;

Longitudo $5\frac{1}{2}$ pollicum. Caput rotundatum.

Maritimus. 40. *M. brachyurus* dentibus primoribus superioribus sulcatis, auriculis nullis, pedibus pentadactylis, corpore supra albedo flavescente mixto, ad latera & subtrus ex albo cinereo. *Schreber Saeguth.* IV. p. 715. t. CCIV. B. Zand-moll. *Mason. act. angl. Vol. 66. P. 1. p. 304.*

Taupe du cap. la Caille *journal.* p. 299.

Taupe des dunes. *Allamand apud Buffon hist. nat. Amst. Suppl. V.* p. 24. t. X.

Habitat in Capitis bonæ spei, collibus arenariis maritimis, quos cuniculis suis excavat; lente currit, celerius fodit; mordax; viciat radicibus bulbisque ixiarum, antholyrarum, gladiolorum, iridum.

Capensis affinis, capite tamen magis conico; longitudo pedalis; cauda pilosa; dentes primores inferiores longiores pro arbitrio animalis removeri a se invicem possunt.

Aspalax. 41. *brachyurus*, incisoribus supra infraque cuneatis, auriculis nullis, unguibus palmarum elongatis. *Pallas glir.* p. 76. & 165. t. X. & it. III. p. 692. *Schreber Saeguth.* IV. p. 716. t. CCV.

Mus myospalax. *Laxmann fibr. Brief.* p. 75. ad. Stockh. 1773.

Habitat in Dauria, & ultra fluvium Irtysch inter Alei & Tscharysch in humo nigra aut arena compacta, quam naribus pedibusque fodiendo cuniculos sibi longissimos parat; lili pomponii & erythronii, aliis quoque radicibus bulbisque viciat.

Longitudo a 5-8 $\frac{1}{2}$ pollices. Cauda teres obtusa calva. Color supra ex flavo cinerascens, subtus ex albo cinereus.

Typhlus. 42. *M. ecaudatus*, palmis pentadactylis, incisforibus supra infraque latis, oculis auriculisque nullis. *Pallas glir.* p. 76. n. 6. p. 154. t. VIII. *Schreber Saeugthiere*, IV: p. 718. t. CCVI.

Mus oculis minutissimis, auriculis caudaque nullis, corpore rufo cinereo. *Lepechin. it.* I. p. 238. & *nov. comm. Petrop.* XIV. p. 504. t. XV. f. 1.

Spalax microphthalmus. *Güldenstaedt nov. comm. Petrop.* XIV. p. 409. t. 8. 9.

Spalax major. *Erxl. mamm.* p. 377.

Slepež. S. G. Gmelin it. I. p. 131. t. 22.

Habitat in Russia australi, in cespite humum nigram contingente antrum (singula animalia sibi proprium) dentibus; capite, pedibus, ipsoque ano fodiens; radicibus, praesertim chærophylli bulbosi victitat; cum loco oculorum bulbillos tantum cute velatos habeat, cæcutit, tanto acutius auditu tactuque gaudens; mordicus se defendit; vere & æstate coit; femina 2 mammis instructa 2-4 pullos parit.

Pondus 3viij superat, longitudo 8 pollices vix aequat; pili molles, dense appressi, ferruginei cinereo admixto. Dentes primores rugosi.

ARCTOMYS. Dentes primores cuneati, 2 in utraque maxilla.

molares superiores utrinque 5, inferiores 4.

Claviculae perfectæ.

Marmota. I. *A. capite auriculato, corpore fusco subtus rufescente.* *Schreber Saeugth.* IV. p. 722. t. CCVII.

Mus capite gibbo auriculato, cauda villosa brevi, palmis tetradactylis, corpore fusco subtus rufescente. *Pallas glir.* p. 74. n. 1.

Mus cauda abbreviata subpilosa, auriculis subpilosis, buccis gibbis. *Syst. nat.* XII. p. 81. n. 7.

Mus alpinus. *Gesn. quadr.* p. 743. fig. p. 744. *Aldr. dig.* p. 445. *Jonst. quadr.* t. 67. *Raj. quadr.* p. 221.

Mus montanus. *Matthiol. comm.* p. 368.

Glis (Marmota alpina) pilis e fusco & flavicante mixtus vestitus. *Briss. quadr.* p. 165. n. 6.

Glis (Marmota) corpore supra fusco-cinereo, subtus cinereo-flavescente. *Erxl. mamm.* p. 358. n. 1.

MAMMALIA GLIRES. *Arctomys*.

Glis Marmota Italis. Klein. quadr. p. 56.

Marmotte. Buffon hist. nat. VIII. p. 219. t. 28.

Alpine Marmot. Penn. quadr. p. 268. n. 594.

Habitat in alpinis Sabaudicis, Helveticis, Rhaeticis, Noricis, Pysenaicis, arboribus denudatis, siccis, apricis summis; vidit radices, herbas, gramine tenerrimo, & potissimum mutellina; cicurata, quicquid offertur; parum bibit; solem amat; per tribus 5 + 9 - 12 - 14 habitat, cussode adventum hostis per sibilum indicante, quem fugiunt omnes, & si non amplius possint, mordicus se defendunt; alias cavernas, multis cuniculis instructas & aditibus, per quos effugit, sibi pro æstate, alias in quibus ore allatum fenum pro læto colligit, & à fine Septembris ad Martium usque alto summo sepulta jacet, pro hieme; manibus cibum ori admovet; talis incedit, sæpe erecta; facilius in planitie, quam sub terra capitur; facile cicuratur, caloris amantissima, rebus cibariis, vestimentis, suppellectili noxia, viz in conclavi calido somni hyberni oblita; coit Aprili & Majo; femina per 6-7 septimanas gravida 2-4 pullos parit, Am Stein.

Pondus marmotæ, autumnio ipso, 9 libras, longitudo pedum & tres pollices non excedit. Caput crassum, vertice plano, rostro crasso atque obtuso, dum sedet animal, sæpe erectum; maxillæ inferioris partes binæ mobiles; auriculæ pilosæ cineræ; genæ pilis longioribus tectæ & cinctæ. Mystaces utrinque serie 6plici; verruca nigra supra oculos setis 6, infra oculos setis 7. Corpus breve, crassum; futura a gula ad anum. Pedes breves; palmarum pollex conicus, ungue plano obscuro; cauda recta, 6 pollicum, longis pilis vestita, apice ex atro fusco. Caro sapida, tenera. Pinguedo & ipsa pellis monticolis usitatum remedium.

Monax. 2. *A. capite auriculato, rostro cærulescente, cauda longiuscula villosa, corpore griseo. Schreber Sæugth. IV. p. 737. t. CCVIII.*

Mus capite gibbo auriculato, rostro cærulescente, cauda longiuscula villosa, palmis tetradactylis, corpore griseo. Pallas glir p. 74. n. 2.

Mus cauda mediocri pilosa, corpore cinereo, auriculis subrotundis, palmis tetradactylis, plantis pentadactylis. Syst. nat. Ed. XII. p. 81. n. 8.

Glis (Marmotta americana) fuscus, rostro & cinereo cærulescente. Briss. quadr. p. 164. n. 5.

Glis (Monax) corpore fusco, lateribus ventreque pallidioribus. *Erzl. mamm. p. 361.*

Monax. *Edw. av. 2. t. 104. Buffon hist. nat. XIII. p. 136. suppl. III. p. 175. t. 28.*

Maryland Marmot. *Penn. quadr. p. 270. n. 198.*

Habitat in America septentrionali paulo calidiori ad insulas Bahamicas, cavernas in rupibus fodit, sub arboribus cavis hybernans.

Lepore cuniculo paulo major; rostrum magis acutum, quam marmota; auriculæ subrotundæ; ungues longi & acuti; cauda corpore dimidio brevior, nigricans. Cl. Alstroemer.

Bobac. 3. *A. capite auriculato, cauda villosa, palmarum ungues pollicari, corpore griseo subtus luteo.* *Schreb. Sæugth. IV. p. 738. t. CCIX.*

Mus (Arctomys) capite gibbo auriculato, cauda brevi villosa, palmarum ungues pollicari, corpore griseo subtus luteo. *Pallas glir. p. 75. 97. 98. t. 5.*

Glis (Marmotta polonica) flavicans, capite rufescente. *Briff. quadr. p. 165.*

Bobak. *Rzacinski hist. nat. Pol. p. 235. Buffon hist. nat. XIII. p. 136. t. 18. Forster æd. angl. Vol. 57. p. 343. Penn. quadr. p. 268.*

Habitat in siccis & apricis montium planitiebus a Borythenis ripis per mediam & temperatiorem Asiæ partem ad Sinam & Camſchatcam usque; cavernas quoque profundissimas sibi fodiens, in quibus 20-24 habitant; mane & meridie prodit, custode tamen sollicite circumſpiciente & socios monente; timidum animal, excepta humo pluviis madente, solis vegetabilibus viſitat; palmis se defendit; facile cicuratur, plantis insidet, manibusque cibum ori admovet; æstate vorax, hieme dormit. Caro esculenta; pinguedo coriariis & pellionariis adhibita.

Pondus animalis libras 14 medicas, longitudo 16 pollices vix excedit. Oculi parvi. Auriculæ ovatæ; cauda annulata, apice atra, 4 pollices & 4 lineas longa, recta. Mammæ femina 8.

Empetra. 4. *A. capite auriculato, cauda villosa, corpore supra vario, subtus rufo.* *Schreber Sæugth. IV. p. 743. t. CCX.*

Mus (Empetra) capite gibbo auriculato, cauda villosa brevi, palmis tetradaſtylis, corpore supra vario, subtus rufo. *Pall. glir. p. 75. n. 4.*

MAMMALIA GLIRES: *Arctomys*.

Glis (canadensis) corpore griseo, ventre cruribusque aurantiis. *Erzl. mamm.* 363.

Quebec marmot. *Penn. quadr.* p. 270. n. 199. t. 24. f. 2.

Canadian marmot. *Forster ad. angl.* LXII. p. 378.

Habitat in Canada, & reliqua boreali America, similiter sibilans; lepore cuniculo vix major, ut longitudo alii quando vix II pollices superet; cauda 2½ pollicum.

peruinosa. 5. *A.* capite auriculato, cauda pedibusque nigris; dorso, laterum & abdominis pilis duris, longis; basi cinereis; medio nigris, apice albidis.

Hoary Marmot: *Penn. hist.* p. 398. n. 261.

Habitat in borealibus Americæ septentrionalis, habitu monacis; nasi apex niger; auriculæ ovatae; genæ albidae; vertex & ungues fusci.

Citellus. 6. *A.* auriculis nullis, cauda villosa, corpore vario. *Schreb. Saeguth.* IV. p. 746. t. CCXI. *A. B.*

Mus capite gibbo, auriculis nullis, cauda brevi villosa; corpore vario. *Pallas nov. comm. Petrop.* XIV. p. 549. t. 21. f. 1. 2. & *glir.* p. 76. 119. t. VI. VI. B.

Mus cauda abbreviata, corpore cinereo, auriculis nullis: *Syst. nat.* XII. I. p. 80. n. 4.

Mus *Suslica*: *Güldenst. nov. comm. Petrop.* XIV. p. 389. t. 7.

Mus *noricus* f. *Citellus*. *Agric. subt.* p. 485. *Gesn. quadri.* p. 835. *Raj. quadri.* p. 220. *Rzacq. pol.* p. 235. *auct.* p. 327.

Citellus. *Schwenckf. Sil.* p. 86. *Aldr. dig.* p. 436.

Cuniculus (germanicus) caudatus, auriculis nullis; cinereus. *Briss. quadr.* 147. n. 6.

Glis (*Citellus*) auriculis nullis. *Erzl. mamm.* 366.

Orientalischer Hamster: *S. G. Gmelin it.* p. 30. t. 5.

Casan Marmot & Earle's Marmot. *Penn. quadr.* p. 273. & 276. n. 201. & 203. t. 25. f. 1.

Zifel & *Suslic*. *Buffon hist. natur.* XV. p. 139. 144. 195. *Suppl.* III. p. 191. t. 31.

Habitat in Russia australi ad Camtschatcamusque et insulas huic Americæque intermedias, Persiam & Sinam, rarius

Arctomyes hybernant, diurnam vitam agunt; radicibus granisque victitant; quæ interdum conquirunt, scandunt, sodiuntque antra sub terra, in quibus habitant. Caput ipsis gibbum, rotundatum; auriculæ breves aut nullæ; corpus crassum; cauda brevis, villosa; palmarum tetradactyla cum pollice brevissimo; plantarum pentadactyla; cæcum ampliatum.

hodie

hodie in reliqua Europa, in campis apertis, siccis, elatis incultis, in solo cespitoso & lutoſo, ad vias publicas, nunquam in ſilvis & paludibus; antra ſibi, ſingula ſingulis animalia, femina profundiora fodit, in quibus pro hiemis initio & ſine frumentacea, herbas teneriores, baccas, rarius mures & aviculas colligit; parum bibit; hybernat; a primis tamen veris auſpiciis cœlo ſereno interdum victum quærit, quem plerumque pedibus anterioribus ori admo- vet; ſalit; plantis inſidendo dormit; ſibilat; facillime cicuratur, inprimis mas; femina mordacior per 20-30 dies grvida Maji initio 3-4-6-8 pullos parit; a pu- toriis, muſſelis, ſatconibus, ipſiſque cornicibus & ardeis prædatur. Pellis vere bona. Caro nonnullis edulis.

Magnitudo colorque perquam variat; illa nunc marmotam aſſequitur, nunc murem amphibium viæ æquat; color plerumque ex cinereo flavus, ſubtus ſordide albus, ut ta- men aliquid undulati vel punctati interſit, cauda concolore; alias ſupra canus fulco aut flavo undulatiſſimus, ſubtus pallide flavescens, cauda longiori fere ſciuri; alias (leucopiæus) ſupra grifeus albo-maculatus, ſubtus ex albo flavescens, orbitarum albus, caudæ brevioris, & re- gionis a naribus ad oculos ſitæ ex flavo ſubfulvus. An mus ponticus Ariſtotelis & Plinii?

Gundi. 7. A. capite auriculato, corpore teſtaceo ruſefcente. Rothmann apud Schloetzer Briefw. I. p. 339. Pall. glir. p. 98. not. Gundi Marmot, Pen. hiſt. 2. p. 405. n. 264.

Habitat in Barbaria prope Maſſuſin verſus montum Atlas. Magnitudo L. Cuniculi. Auriculæ truncatæ meatu amplo.

25. SCIURUS. Dentes primores II, ſuperiores cu- neati. inferiores acuti.

molares ad utrumque latus ſu- periores V. inferiores IV.

Claviculæ perfectæ.

Cauda diſticha.

Myſtaces longæ.

* ſcandentes.

vulgaris. 1. S. auriculis apice barbatis, caudâ dorſo concolore. ErxL. manm. p. 411. Schreber Sæugth. IV. p. 757. t. CCXII.

MAMMALIA GLIRES. Sciurus.

Sciurus auriculis apice barbatis, palmis tetradactylis, plantis pentadactylis. Syst. nat. XII. 1. p. 86. n. 1. Faun. succ. 37.

Sciurus palmais folis saliens. Syst. nat. VI. p. 9. Mus. Ad. Fr. 1. p. 8.

Sciurus (vulgaris) rufus, quandoque griseo admixto. Briss. quadr. p. 150. n. 1.

Sciurus vulgaris rubicundus. Klein. quadr. p. 53.

Sciurus vulgaris. Raj. quadr. p. 214.

Sciurus. Gefn. quadrup. p. 845. Aldrov. dig. p. 396. fig. p. 398. Jonst. quadr. p. 163. t. 66. Schwenckf. theriotr. Sil. p. 121.

Ecureuil. Buffon hist. nat. VII, p. 253. t. 32.

Common squirrel. Penn. quadr. p. 279. n. 206.

Eichhoernlein. Ridinger jagdb. Th. t. 20.

Eichhoernchen. S. G. Gmelin it. I. p. 35. t. 7. Falck Beytr. 3. p. 311.

varius. *β. S. hieme cærulescenti-cinereus, æstate ruber, abdomine albō. Erxl. mamm. p. 414. α.*

Sciurus (varius) ex candido cinereus. Briss. quadr. p. 152. g. 4.

Sciurus varius, Vatus vulgo dictus. Aldr. dig. p. 403. fig. p. 405.

Sciuri, qui mures pontici & a colore varii dicuntur. Jonst. quadr. p. 163.

Mus ponticus s. venetus, quem vulgo varium vocant. Gefn. quadr. p. 741.

niger. *γ. Sciurus niger. Erxl. mamm. p. 415. β.*

albus. *δ. Sciurus totus albus, oculis rubris. Erxl. mamm. p. 416. γ.*

Sciurus albus sibiricus. Briss. quadr. p. 151. n. 2.

Sciurus albus. Wagn. Helv. p. 185. S. G. Gmelin it. I. p. 35. α. 8.

Habitat in Europæ; frequentissimus in omnis Russici imperii arboribus sylvaticis.

Æstate ruber, abdomine albo, hieme cærulescenti-cinereus.

Vidit at nucibus, strobilis, baccis, &c. manu cibum ori ad-movet; superfluum cibum defodit; parum bibit; hieme nivem; cortice lignoque insidens navigare fertur; nidus globosus e muscis; sedens se obumbrat cauda; a Marte prædatur; pellis hiberna æstimata, caro edulis. Coit Martio & Aprili; femina per mensem gravida 3-4-7 pullos parit, bis per annum.

Anatomæ. E. N. C. Cent. 10. app. 449.

MAMMALIA GLIRES: Sciurus:

147

- niger.** 2. *S. niger*, auriculis imberbibus. *Erxleb. mamm. p. 417.*
Schreber Saeugth. IV. p. 776. t. CCXV.
Sciurus niger. Syst. nat. XII. 1. p. 86. Klein. quadr.
p. 53. Briss. quadr. p. 151. n. 3.
Quauhstechalott. thliltic, Sciurus mexicanus. Hernand.
mex. p. 581. Fernand. nov. Hisp. p. 8.
Black squirrel. Catesb. Carol. 2. p. 73. t. 73. Penn:
quadr. p. 284. n. 210. t. 26. f. 2.
Ecuréuil noir. Buffon hist. nat. X. p. 121.
Habitat in America septentrionali ad novam Hispaniam
usque, gregarius, ræ infestus, cauda brevior.
- vulpinus.** 8. *S. rufus cinereo mistus magnus*, auriculis imberbibus:
Fox-squirrel. Lamson. Carol. p. 124.
Cat-squirrel Penn. hist. p. 411. n. 273. β.
Habitat in America septentrionali, cinereo major &
rarior, cetera satis affinis; pili duriores, quam vulgaris;
caudæ auricularumque apex rufus. Schoepf.
- cihereus.** 3. *S. cihereus*, ventre albo; auriculis imberbibus *Erxleb.*
mamm. p. 418. n. 3: Schreber Saeugth. IV. p. 766.
t. CCXIII.
Sciurus virginianus cinereus major. Syst. nat. XII. 1. p.
86. Raj. quadr. p. 215. Klein quadr. p. 53.
Sciurus (virginianus) cinereus, auriculis ex albo flavican-
tibus. Briss. quadr. p. 153. n. 6.
Sciurus major griseus, cauda extrema comosa, pilis diffusis.
Browne jam. p. 483.
Grey squirrel Catesb. Carol. 2. p. 74. t. 74. Penn. quadr.
p. 282. n. 209. t. 26. f. 3.
Petit gris. Buffon hist. nat. X. p. 116. t. 25.
Habitat in Americæ septentrionalis arboribus silvaticis,
nidificat in cavis arboribus, vulgari simillimus, sed
major, ut pedem longitudine æquet, ræ pariter ali-
quando infestus; a crotalo comeditur.
- hudsonius.** 12. *S. auriculis imberbibus, dorso glauco, ventre cinereo,*
cauda brevior ex rufescente glauca nigro marginatâ.
Forster ad. angl. Vol. LXII. p. 378. Pall. glir. p.
377. Schreber Saeugth. IV. p. 777. t. CCXIV.

Sciuri plerique agiles, structura delicatioris, facile cecurandi, scandunt in arboribus, pauci sub terra habitant; fructibus seminibusque vescuntur; alii saliendo currunt, alii quasi volando. Caput latum, auriculis ovalibus longius. Corpus satis crassum; pedes breves, anteriores digitis 4 cum vestigio pollicis, posteriores 5; cauda longa villosa.

Hudson's Bay squirrel. *Penn. quadr. p. 280. n. 206. n. t. 26. f. 1.*

Habitat in pinetis frigidioris Americae septentrionalis, colore per omnem annum eodem.

caroli- 13. S. ex cinereo, albo & ferrugineo mistus, subtus albus,
nensis. cauda fusca atro mista, albo marginata, auriculis imberbibus.

Lesser grey-squirrel. *Penn. quadr. p. 283. n. 209. a.*

Habitat in Carolina, vulgari minor, colore variabili.

perficus. 14. S. obscurus, lateribus albus, subtus flavus, auriculis imberbibus, cauda ex atro cinerea annulo albo. S. G. Gmelin it. III. p. 379. t. 43.

Habitat in alpinis Persiae hircanicis, colore constanti, vulgari facie moribusque similis; tarsi rubent.

anoma- 15. S. supra flavus fusco mistus, subtus obscure fulvus, cauda
lus. concolore, auriculis imberbibus rotundatis. Schreber *Saeguth. IV. p. 781. t. CCXV. C.*

Habitat in Georgia Asiae. Guldenshaedt.

Vulgari major, ore albo, narium apice nigro, genis fulvis; mystacibus orbitisque fuscis; auriculis flammis, intus magis albidis.

bicolor. 16. S. supra niger, infra fulvus, auriculis acutis imberbibus, palmarum ungue pollicari magno rotundato. *Sparrmann auct. Soc. Gothenburg. I. p. 70. Schreber Saeguth. IV. p. 781. t. CCXVI.*

Javan squirrel. *Penn. hist. p. 409. n. 269.*

Habitat in insula Java, 12 pollices longus, cauda ejusdem longitudinis; auriculæ crinitæ; palmarum ungues acuti, pollex brevissimus; plantæ nigra.

erythra- 17. S. supra ex flavo & fusco mistus, infra ex sanguineo
us. fulvus, auriculis ciliatis, cauda ex sanguineo fulva. *Pallas glir. p. 377.*

Rudly squirrel. *Penn. hist. p. 409. n. 271.*

Habitat in India, vulgari paulo major; stria caudæ longitudinalis nigricans; verruca pollicaris magna.

macrou- 18. S. cauda corpore duplo longiore grisea. *Ind. zool. t. 1. Erxleb. mamm. p. 420. Schreber Saeguth. IV. p. 783. t. CCXVII.*

Sciurus zeylonicus, pilis in dorso nigricantibus, Rukkaia dictus. Raj. quadr. p. 215.

Long-tailed squirrel. *Ind. zool. t. 1.*

Ceylon squirrel. *Penn. quadr. p. 281. n. 207.*

Habitat in insula Zeylon, vulgari triplo major, supra niger, infra pallide flavus, auriculis subbarbatis, narius incarnatis; genarum stria bifurca nigra; macula inter aures flava.

maximus. 19. *S. supra ex rubicundo fuscus, subtus niger, cauda nigra, auriculis subbarbatis. Schreber Saecugthiere, IV. p. 784. t. CCXVII. B.*

Le grand écureuil de la côte de Malabar. *Sonnerat voyag. 2. p. 139. t. 87.*

Habitat in regione Indiæ Mahé, & littore malabarico, cati magnitudine; vox sonora; visitat succo lacteo nuncum cocos. Auriculæ erectæ parvæ; pili longi; ungues robusti nigri; verruca pollicaris brevissima, ungue instructa. An vere differt a macrouro?

abessin- 20. *S. supra ex ferrugineo niger, subtus cinereus, cauda fescus.*
quipedali. Thevenot it. 5. p. 34.

Abessinian squirrel. *Penn. hist. p. 408. n. 268.*

Habitat in Abessinia, vulgari tripla major, obscurum adhuc animal.

indicus. 21. *S. cauda longitudine corporis apice aurantia. Erxl. mamm. p. 420.*

Bombay squirrel. *Penn. quadr. p. 280.*

Habitat in India circa Bombay, 16 pollices longus, supra sordide purpureus, subtus flavus; auriculæ barbata.

flavus. 4. *S. auriculis subrotundis, pedibus pentadactylis, corpore luteo.*

Sciurus cauda tereti, pilis brevibus, auriculis subrotundis. Amæn. acad. 1. p. 281.

Fair squirrel. *Penn. quadr. p. 285. n. 212.*

Habitat Carthagenæ in America, forsan quoque in Gurfurate Indiæ.

Magnitudine dimidio minor Sc. vulgari, luteus, apicibus pilorum albis. Pollex anticus solo fere exiguo ungue constat. Auriculæ imberbes. An vera sciuri species?

palma- 5. *S. subgriseus; striis tribus flavicantibus, caudaque albo-
rum. *nigroque lineata. Schreber Saecugth. IV. p. 802. t. CCXX.*
*Sciurus (palmarum, Mus palmarum valgo) coloris ex rufo & nigro mixti, tæniis in dorso flavicantibus. Briff. quadr. p. 156. n. 10.**

MAMMALIA GLIRES. Sciurus.

Mustela africana. *Clus. exot.* p. 112. *Nieremb. hist. nat.* p. 172. *Jonst. quadr.* p. 153. *Raj. quadr.* p. 216.

Le palmiste. *Buffon hist. nat.* X. p. 126. t. 26.

Palm.-squirrel. *Penn. quadr.* p. 287. n. 215.

Habitat in Africa & Asia regionibus calidioribus, nuncum cocos præsertim amans.

Longitudo corporis 2 pollicum & 10 linearum, caudæ erectæ, non obumbrantis vix minor; color subtus ex cinerascens vel flavescens albus; variat aliquando striis dorsalis 5. Auriculæ breves, latæ, subrotundæ, cristatæ.

getulus. 6. *S. fuscus*, striis quatuor albidis longitudinalibus. *Schreber Sæugth.* IV. p. 806. t. CCXXI.

Sciurus (getulus) coloris ex rufo & nigro mixti, tæniis in lateribus alternatim albis & fuscis aut nigris. Briss. quadr. p. 157. n. 11.

Sciurus getulus. Aldrov. dig. p. 405. fig. p. 406. *Gesn. quadr.* p. 112. *Jonst. quadr.* p. 163. t. 67. *Raj. quadr.* p. 216.

Barbaresque. *Buff. hist. nat.* X. p. 126. t. 27.

Barbarian squirrel. *Edw. av.* 4. t. 198.

Barbary squirrel. *Penn. quadr.* p. 287. n. 215. β.

Habitat in Barbariæ littore occidentali, præcedenti fasciis similis, 5 pollices longus, cauda striatâ; color corporis subtus albus; ungues nigri, verrucæ pollicaris palmarum nullus.

striatus. 7. *S. flavus*, striis quinque fuscis longitudinalibus, *Striped Dormouse. Penn. hist.* p. 422. n. 286.

asiaticus. α. *Sciurus striatus. Pallas glir.* p. 378. *Georgi it.* I. p. 163.

Sciurus major variegatus, Furunculus sciurionides Messerschmidii. I. G. Gmelin nov. comm. Petrop. 5. p. 344. t. 9.

Ecureuil Suisse. Buff. hist. nat. X. p. 126. t. 28.

Bomdoeskje. Le Bruyn it. p. 432. t. 254.

americanus β. *Sciurus pallidus*, striis quatuor fuscis longitudinalibus, *Mus. Ad. Frid.* I. p. 8. *Schreber Sæugth.* IV. p. 790. t. CCXIX.

Sciurus (carolinensis) rufus, tæniis in dorso nigris, tæniis ex albo flavescens intermixtis. Briss. quadr. p. 155. n. 9.

Sciurus a Cl. D. Lyfter observatus. Raj. quadr. p. 216.

Ground-squirrel. *Laws. Carol.* p. 124. *Catesb. Carol.* 2, p. 75. t. 75. *Brickell N. Carol.* p. 129. *Edw. av.* 4. t. 181. *Penn. quadr.* p. 288. n. 216.

Ecureuil Suisse. *Charlev. nov. Fr.* 3. p. 134.

Koesselvißla. *Kalm it.* 2. p. 419.

Habitat α) in omni Asia boreali ad fluvios europæos Dwina & Kama usque, β) in America septentrionali magis orientali minusque frigida ad novam Hispaniam usque, in silvis sub terra, in qua criceti more, cum quo communes etiam habet buccas sacculiferas, cavernas sibi fodit pro habitaculo condendaque victus penu, concamerationibus distinctis; vidit seminibus variis, α) pinus cembræ potissimum, β) et aliorumque cerealium, adeo ut segetibus infestus sit; γ) difficile circuratur.

Longitudo 6, β) 10 lineis 5 pollices superat; pondus nunquam 3ij. Caput magis oblongum, quam præcedentibus; auriculæ breviores, subrotundæ, calvæ; corpus magis attenuatum; pedes breviores; pili breves, asperi.

æstuans. 9. S. griseus subtus flavescens.

Sciurus (brasiliensis) coloris ex flavo & fusco mixti, æniis in lateribus albis. *Briss. quadr.* p. 154. n. 7.

Sciurus brasiliensis. *Marcgr. brasil.* p. 230.

Brasilian squirrel. *Penn. quadr.* p. 286. n. 213.

Habitat in Brasiliæ & Guianæ, 8½ pollices longus, cauda 10 pollices æquante, tereti, pilis nigris flavo annulatis; auriculæ subrotundæ, imberbes.

Dschin- 22. S. testaceus, fasciis lateralibus orbitisque albis, cauda
schicus. nigra. *Sonnerat it.* 2. p. 140.

Habitat in provincia Indiæ Dschinschi; vulgari paulo major.

variega- 23. S. corpore supra nigro albo fuscoque variegato. *Erxleb.*
tus. *mamm.* p. 421. *Schreber Sæugth.* IV. p. 789. t. CCXVIII.

Quauhrecallotlquapachtli aut Cozticoctequallin. *Fernand. nov. Hisp.* p. 9.

Coquallin. *Buff. hist. nat.* XIII. p. 109. t. 13.

Varied squirrel. *Penn. quadr.* p. 285. n. 211.

Habitat in nova Hispania, sub arborum radicibus aliisque in cavernis, in quibus etiam et aliorumque cerealium pro hieme penum colligit.

Longitudo fere pedalis; auriculæ breves, imberbes, una cum ore albæ; caput cetera nigrum aurantio mistum; mystaces cum unguibus nigri.

Degus. 24. *S. fusco-flavescens*, linea humerali nigra. *Molina hist. nat. Chil.* p. 269.

Habitat in Chili gregatim circa dumeta in cavernis, quæ consortium inter se alunt; viciat radicibus & fructibus, quorum penum colligit; non hybernatur, ceterum myoxo gliri satis affinis.

Mure ræto paulo major; caput breve, rostrum acutum; auriculæ rotundatæ; cauda apice floccosa, concolor.

mexica- 25. *S. cinereo-fuscus*, striis 5-7 albidis longitudinalibus.
nus. *Erxl. mamm.* p. 428. n. 12.

Sciurus (novæ Hispaniæ) obscure cinereus, tæniis in dorso albicantibus. *Briss. quadr.* p. 154. n. 8.

Sciurus rarissimus ex nova Hispania, tæniis albis. *Sebmus.* I. p. 76. t. 47. f. 2.

Tlamotl. Fern. an. p. 9.

Mexican squirrel. *Penn. quadr.* p. 286. n. 214.

Habitat in nova Hispania, 5½ pollices longus, cauda paulo longiore; auriculæ margo calvus; mas tæniis 7, femina 5.

madagaf- 29. *S. palmarum* digito medio calvo, valde elongato, plantarum pollice ungue rotundato.
carientis.

Aye-Aye. Sonner. it. 2. p. 137. t. 86.

Habitat in occidentali parte insulæ Madagascar; cauda longa non mensurata ultra 18 pollices longus, sub terra vivens, ignavus, timidus, somnolentus, vermibus victitans, quos digitorum ope ex arborum foraminibus extrahit, dubii generis, gressu moribusque bradypodi affinis, dentibus, cauda, pedibus pentadactylis sciuro propior.

Auriculæ amplæ, complanatæ, nigre, pilis longis horridæ; fasciculi pilorum supra oculos & nares, in genis & mento; lanugo ex albo fulva; pili longi nigri; facies & guttur ex albo fulvum; cauda sesquipedalis, complanata, pilis longis densis a basi ad medium albis, altera parte nigris tecta; digiti pedum longi, unguibus palmarum omnibus, plantarum 4 subulatis, uncinatis.

An Sciurus gujanensis Banerofri, ad vulgarem faciem & magnitudine accedens, supra ex paulo flavescens fuscus, lateribus subtusque albus, cauda longissima villosa maculata, & Sc. gujanensis de la Borde, mordax, facie tamen curandus, rufescens, ræto non major, solitarie in silvarum arboribus degens, maripæ, auræ, comæ seminibus victitans, semel per annum 2 pullos pariens, propriam constituens speciem, judicent autopta.

** volantes.

Volucella 26. *S. hypochondrii extensis volitans*, cauda elongata villosa.
la. Pallas glir. p. 353. 359. Schreb. Saeugth. IV. p. 808. t. CCXXII.

Mus (volans) cauda elongata villosa, palmis tetradaetylis, plantis pentadaetylis, hypochondriis extensis volitans. Syst. nat. XII. 1. p. 75. n. 21. Mus. Ad. Fr. 2. p. 10. Sciurus minimus, hypochondriis prolixis volans, ventre albido. Brown. jam. p. 438.

Sciurus americanus volans. Raj. quadr. p. 215.

Quimichpatlan. Fern. nov. Hisp. p. 8.

Flying squirrel. Catesb. Carol. 2. p. 76. t. 76. 77. Edw. av. 4. t. 191. Penn. quadr. p. 418. n. 283.

Écureuil volant. de Pratz Louisian. 2. p. 98.

Polatouche. Buffon hist. nat. X. t. 21.

Habitat in temperatiori & calidiori America septentrionalis parte in silvarum arboribus gregatim, fructibus seminibusque visitans, quæ vespere nocturne conquirit, interdum in nido ex foliis parato dormiens; facile & egregie cicurandus.

Corpus 5 pollices longum; caput paulo crassius; oculi maximi praeinuli nigri; auriculæ subrotundæ, pellucidæ, subcalvæ, ex griseo cineræ; mystaces nigrae, capite longiores; collum breve; pili tenerrimi, mollissimi, supra cinerei, apice flavi, subtus in medio albi, in ambitu cinerei; cauda teres, 4 pollicum. Cutis ab auribus ad brachia, & femora & caudam extensa, anterieus ad brachia ad digitos usque & ad proprium osculum, calcari simile & tarso affixum firmatum, posterius ad femora ad tarsum usque; quam cutem dum extensis brachiis & femoribus tendit, in aëre suspenditur, & recta via quasi volando movetur; natat etiam.

hudsonius. 27. *S. hypochondrii prolixis volitans*, supra ex rubicundo fuscus, subtus ex flavescente albidus, cauda villosa plana.

Sciurus volans major. Pallas glir. p. 354.

Greater flying squirrel. Forster ad. angl. 62. p. 379.

Severn River squirrel. Penn. hist. p. 418. n. 282.

Habitat in America septentrionali circa sinum Jacobi & fluvium Severn, vulgari vix major. Pili sat longi, basi ex atro cinerei, apice ex rubicundo fusci. Cutis sensilis, ut in Volucella, &c.

Volans. 10. S. hypochondrii prolaxis volitans, cauda rotundata.
Schreber Saecul. IV. p. 813. t. CCXXIII.

*Sciurus hypochondrii prolaxis volitans. Fin. succ. 2. p. 13.
n. 38. Musc. Ad. Fr. 1. p. 8.*

*Sciurus (volans) obscure cinereus cute ab anticis cruribus
ad postica membranæ in modum extensa volans, et
(sibiricus volans) dilute cinereus, cute ab anticis
cruribus ad postica extensa, volans. Brisson quadr.
p. 157. n. 12. et p. 159. n. 13.*

*Sciurus volans. Rzacq. aud. p. 316. Klein ad. angl. 1733.
t. 35. f. 1. Seb. mus. 1. p. 67. t. 41. f. 3. Pallas glir.
p. 355.*

Sciurus petaurista volans. Klein quadr. p. 24.

*Mus ponticus aut scythicus, Sciurusve, quem volentem
cognominant, licebit & Sciurum latum nominare. Gesn.
quadr. p. 743.*

*Quadrupes volatilis Russiæ. Duvernoi Comm. Petrop. 5.
p. 218.*

Polatouche. Buffon hist. nat. X. p. 95.

Flying squirrel, Penn. quadr. p. 293. t. 221.

*Habitat in betuleis Sibiria, praevalens Lapponia, Livonia,
Polonia, excepto coitus tempore foliarius, betulae gem-
mis, turionibus, amentis potissimum visitans; interdiu
latent, ceterum hieme etiam, temperatiori aëre nidum ex
muscis in arboribus cavis confectum relinquunt; membra-
nae inter femora expansa auxilio per altitudinem 20 &
plurium orgyiarum devolvitur; sibilat; mordax; difficile
circurandus. Femina Majo 2-3, rarius 4 pullos parit.
Differt a Sc. Volucella magnitudine plus tota tertia parte
excedente, colore non in flavum inclinante, sed supra
candide leucophæo subtus candidissimo, caudaque supra
vix fusco inumbrata; forma capitis brevioris & magis glo-
bosa; cauda brevioris ex paucioribus vertebrae composita,
vix dimidiam corporis longitudinem excedente; oculis
nafo propioribus, circulo magis atro cinctis, artubus
anterioribus brevioribus, at posterioribus tibiis longio-
ribus. Pallas.*

Sagitta. 11. S. hypochondrii prolaxis volitans, cauda plano-pinnata lanceolata.

Habitat in Java. Nordgren.

*Tota statura sciuri vulgaris, palmam longus præter cau-
dam, supra ferrugineo-fuscus, subtus ferrugineo-polli-
dus, Caput ovatum, Auriculæ ovatae obtusa vestitæ;*

Mystaces longitudine capitis. Seta una in mala. Labium superius fissum, inferius breve. Dentes fusi, obtusiusculi. Pedes 4-5. Manuum calcar cetaceum, carstilagineum, longitudine ipsius ulnæ intra cutem. Cutis extensa a capite ad carpum; a carpo ad genu in membranam tectam concolorem ciliatam. Femora postice ciliata pilis. Pedes subtestacei; digiti omnes ultimo geniculo supra prominuli. Ungues compressi. Scrotum ovatum; magnum, vestitum. Præputium elongatum vestitum. Cauda longitudine corporis, valde depressa, obtusa.

Petauri- 28. *S. hypocondriis prolixis volitans, supra saturatissime ex castaneo, subtus dilute ferrugineus, vel supra niger, sub-*

sta.

tus canus, cauda corpore longiore, villosissima, terete, nigricante, medio ferruginea. Pallas miscell. zoolog. p. 54. t. VI. f. 1. 2. Schreber Sæugth. IV. t. CCXXIV.

Sciurus maximus volans f. Felis volans. Briss. anim.

Lugd. B. 1762. p. 112. n. 15.

Civetta volans. Valent. Ind. 3. p. 269. 270.

Taquan, Hist. gen. des voyag. XV. l. 4. f. 9. p. 51.

Habitat in oceanî indici insulis, congeneribus major, at pedem & sex pollices longitudine æquet; caput magis globosum; mystaces unguetque nigri; femina mammæ 6 pectorales & abdominales, papilla longa, lineari.

MYOXUS. Dentes primores II. superiores cuneati, inferiores compressi,

Mystaces longæ,

Cauda villosa teres versus apicem crassior.

Pedes æqualis longitudinis, anteriores tetradactyli.

Glis, I. M. canus subtus albidus. Schreb. Sæugth. IV. t. CCXXV.

Sciurus canus subtus albidus. Syst. nat. XII. 1. p. 87. Erzl. mamm. p. 429.

Sciurus epilepticus, cinereus prussicus. Klein quadr. p. 54.

Mus cauda pilosa, corpore supra obscure cinereo, subtus exalbido. Briss. quadr. 160.

Mus Glis. Pall. glir. p. 88. n. 33.

Glis: Gefn. quadr. 619. Aldrov. dig. p. 407. fig. p. 409.

Jonst. quadr. p. 164. t. 67. Raj. quadr. p. 229.

MAMMALIA GLIRES. *Myoxus*.

Loir. *Buffon hist. nat.* VIII. p. 158. t. 24.
Fat squirrel. *Penn. quadr. p.* 289. n. 217.

Habitat in Europæ & Asiæ australis sylvis, Aris-
totelis, Mæzæ: Oppiani, glis Plinii, olim apud Roma-
nos ob carnem sapidam in glirariis nutrita; vidit
glandibus, nucibus, pomorum seminibus; nidificat in
cavis arborum, pullis 9-12; mordax; interdum latet;
autumno pinguescit; Octobri gregatim migrat in late-
bras subterraneas, ibique hybernat in finem Maji usque.
Pelles ob pilos mollissimos enduntur.

Longitudo corporis 6 pollicum, caudæ canæ 5; auriculæ
tenuēs nudæ; genæ albæ; mystaces capite longiores.
Mammæ 10, 6 pectorales, 4 abdominales.

Dryas. 2. *M. ex griseo rufus; subtus sordide albus, linea nigra recta,*
utrinque per oculos ad aurículas ducta. Schreber
Sæugth. IV. t. CCXXV. B.
Colore, cauda brevior, magis villosa, macula nigræ
pone aurículas defectu a Nitela diversus.

Nitela. 3. *M. rufus subtus ex albo cinereus, macula nigra circa ocu-*
los & pone aurículas. Schreb. Sæugth. IV. t. CCXXVI.
Mus (quercinus) cauda elongata pilosa, macula nigra
sub oculis. Syst. nat. XII. I. p. 84. n. 15.
Mus Nitedula. Pallas glir. p. 88. n. 32.
Sciurus canus subtus albidus, macula nigra sub oculis.
Erxl. mamm. p. 432. n. 15.
Glis supra obscure cinereus, infra ex albo cinerascens,
macula ad oculos nigra. Briss. quadr. 161.
Mus avellanarum. Gesn. quadr. p. 833. Jonst. quadr. p.
168. t. 66.
Mus avellanarum major. Aldr. dig. p. 439. Raj. quadr.
p. 419.

Lerot. Buff. hist. nat. VIII. p. 181. t. 25.
Garden-squirrel. Penn. quadr. p. 290. n. 218.

Habitat in Europæ & Sibirix australis præsertim hortis,
quorum fructus omnis generis destruit, præsertim per-
sica mala amar; nidificat in rimis murorum & cavis ar-
boribus; coit vere, parit æstate 5-6 pullos; fortem
ratti odorem spirat.

Corpus 5, cauda 4 pollices longitudine non excedit; oculi
majusculi, nigri; auriculæ oblongæ.

Muscardinus. 4. *M. rufus, gula albicante, plantarum pollicibus muticis.*
Schreb. Sæugth. IV. t. CCXXVII.

MAMMALIA GLIRES. Myoxus. Dipus. 157

- Sciurus avellanarius. Erxl. mamm. p. 433. n. 16.*
Mus (avellanarius) cauda elongata pilosa, corpore rufo, gula albicante, pollicibus posticis muticis. Syst. nat. XII. 1. p. 83. n. 14. Fn. succ. 35.
Mus avellanarius. Pall. glir. p. 89. n. 34.
Glis supra rufus subtus albicans. Briff. quadr. 162.
Mus avellanarum minor. Raj. quadr. 220. Jonst. quadr. p. 168. Aldrov. dig. p. 439.
Muscardin. Buffon hist. nat. VIII. p. 193. t. 26.
Dormouie. Edw. av. 119. t. 266. Penn. quadr. p. 291. n. 219.

Habitat in Europæ sepibus densis sylvisque, rarius in hortis. Colligit nuces, glandes, quas crectus edit, superfluas defodit; nidum parat e gramine, muscis, foliis in cava arbore minus alta vel frutice; femina 3-4 pullos parit; in Anglia altitilis. Musculo aequalis, ut vix 3 pollices longitudine attingat, at minus gracilis; oculi magni; prominuli, nigri, auriculæ breves, rotundatæ, nudæ, tenues; cauda corpore vix longior.

**26. DIPUS. Dentes primores utrinque II.
Pedes anteriores brevissimi.
posteriores longissimi.
Cauda elongata, apice floccosa.**

Jaculus. 1. D. pedibus tetradactylis, palmarum unguiculo pollicari. Schreber Sæugth. IV. t. CCXXVIII.

Jaculus orientalis. Erxl. mamm. p. 404. n. 1.

Mus (jaculus) cauda elongata floccosa, palmis subpentadactylis, femoribus longissimis, brachiis brevissimis. Syst. nat. XII. 1. p. 85. n. 20. Mus. Ad. Fr. 2. p. 9. Forsk. Fn. orient. p. IV.

Mus (jaculus vel ægyptius) pedibus posticis longissimis, cauda corpore longiore extremo villosa. Hasselq. it. Pal. 198. ad. Stockh. 1752. p. 123. t. 4. f. 1. ad. Upf. 1750. p. 17. Pall. glir. p. 87. n. 27. t. XX.

Mus montanus. Moncon. ægypt. 288.

Myoxi omnes hybernant & dipodes; hi incedunt vel potius saliant bipedes super pedum plantis, opitulante cauda elongata rigida ad 3-4 ve pedum distantiam; vescuntur foliis vegetabilibus, terram fodiunt subterranei; interdum dormiunt, noctu vigiles; cibum palmis ori admovent; aquam palmis digitis incurvatis hauriunt.

MAMMALIA GLIRES.- Dipus.

Cuniculus pumilio saliens, cauda longissima. *I. G. Gmelin*
nov. comm. Petrop. 1760. Vol. 3. p. 351. t. 9. f. 1.

Cuniculus minorcau datus dauricus. Mus. Petrop. i. p. 344.
n. 123.

Cuniculus f. Lepus indicus, *Utias dictus. Aldrov. quadr.*
395.

Ægyptii mures alii. Gesn. quadr. p. 837.

Agnus filiorum Israël. Pr. Alpin. Aeg. p. 232.

Jerboa or Gerboa; & Damari Israël. Shaw trav. p. 248.
376.

Ægyptian & Siberian Gerboa. Penn. quadr. p. 295. 296.
n. 222. 223. t. 25. f. 3.

Gerbua. Edw. av. t. 219.

Gerbo: le Brun it. 287. t. 210.

Gerbo ou Gerboise & Alagtaga. Buff. hist. nat. XIII. p. 141.

Erdhaafe. S. G. Gmelin it. 1. p. 26. t. 2.

Lepus cauda elongata. Syst. nat. Ed. IX. n. 4.

Habitat in Ægypto, Arabia, Calmuccia, & australi Sibi-
ria in solo firmo, campisque herbidis; quiescens plantas
abdomini applicat, & supra genua inflexa sedet, palmas
vero gulae admovet, ita ut vix conspiciantur; hominem
non valde metuit, neque tamen penitus cicuratur; vesci-
tur radicibus, gramine, tritico, sesamo, & certe, qui in
Sibiria habitat, scænum ante hiemem fecat; siccatumque
in cervos rotundiusculos coactum cuniculis importat.
Caro Calmuccis Arabibusque edulis.

Corpus ultra 7 pollices longum; facies leporis, pedes
posteriores una cum femoribus nudis anterioribus triplo,
corpore etiam longiores: Cauda 10. circiter pollicum,
pallide fusca, extremo nigro apice albo; mammae 8
remotissimæ; pili supra pallide fusci, subius candidi;
auriculæ pedesque carnei coloris.

Sagitta. 2. D. plantis tridactylis, ungiculo pollicari nullo. Schreber
Sæugh. IV. t. CCXXIX.

Mus Sagitta. Pallas it. 2. p. 706. glir. p. 87. t. XXI.

Habitat in Arabia & ad Irtim fluvium in arena mobili cam-
pisque arenosis aridissimis: corpore modo 5 pollices cum
11 lineis, cauda minore flocco terminata 6 pollices
cum 5 lineis, artubus posterioribus 6 circiter pollices
longa, horum femora minus crassa & carnosa, & digiti
subtus pilis longis hirsutissimis vestiti; auriculæ capite
magis globoso multo longiores.

- cafer. 3. *D. palmis pentadactylis*, plantis tetradactylis. *Schreber Saegthiere*, IV. t. CCXXX. *Pallas glir.* p. 87. n. 29. *Yerbua capensis*. I. R. *Forster & Sparrmann ad. Stockh.* an. 1778. 2. n. 3. & 4. t. 3. *Miller on various subj. of nat. hist.* t. XXXI. A. B.
Habitat in Capite bonæ spei, reliquis major 12 pollices longus, colore supra spadiceo, subtus ex flavescente albo; capite magis oblongo, rostro acutiore, auriculis longioribus, unguibus, palmarum potissimum, multo longioribus, cauda villosissima, 17 pollices longa, apice nigra distincta. Aqua in cavernas ducta pellitur. Caro sapida.
- meridia- 4. *D. palmis subtetradactylis*, plantis pentadactylis, cauda
 nus. concolore. *Schreb. Saegth.* IV. t. CCXXXI.
Mus meridianus. Pallas it. 2. p. 702. longipes. glir. p. 88. n. 30. t. XVIII. B.
Mus (longipes) cauda elongata vestita, palmis tetradactylis, plantis pentadactylis, femoribus longissimis. Syst. nat. XII. 1. p. 84. n. 19.
Mus cauda longa vestita, pedibus posticis longitudine corporis flavi. Mus. Ad. Fr. 1. p. 9.
Jaculus palmis tetradactylis, plantis pentadactylis. Erzleb. mamm. p. 409.
Torrid Jerboa. Penn. quadr. p. 297. n. 224.
Habitat in torridis regionibus, in deserto quoque areoso, versus mare caspium, Uralem fluvium & Wolgam interjacente, ubi pterococci astragolorumque quorundam seminibus vescitur; cuniculos trifores ulnam circiter profundos fodiens.
Corpus 4 pollices cum 9 lineis longum, supra pallide fulvum aliquando subgriseum, subtus lacteum postice incrassatum; caput magis oblongum, quam jaculo, rostro productiore; auriculæ insignes ovaes; os pedesque albi; horum volæ villosissima, anteriorum pollex vix unguiculatus; posteriorum femora carnosissima; cauda vix ultra 3 pollices longa, crassa, largiter pilosa.
- tamarici- 5. *D. palmis subtetradactylis*, plantis pentadactylis, cauda
 nus. obsolete annulata. *Schreber Saegth.* IV. t. CCXXXII.
Mus tamariscinus. Pallas it. 2. p. 202. glir. p. 88. n. 31. t. XIX.
Habitat in salis versus mare Caspium sitis, tamaricem & nitrarium ferentibus, quorum forsan vescitur fructibus, quorumque sub radicibus cuniculos agit profundissimos bifores.

Elegantissimus longitudine aequat sex pollices, sexque lineas; colore supra ex griseo lutescente subtus albo; oculi majusculi, superciliis orbitisque albis; auriculæ magnæ, ovoides, nudiuscula; palmarum verruca pollicaris insignis; cauda vix pollices 5 superans, pilosa, apice subfloccosa.

22. LEPUS. Dentes primores II, superiores duplicati; interioribus minoribus.

* *caudati.*

Viscaccia. 5. *L. cauda elongata fetosa. Molina hist. nat. Chil. p. 272. Alia species cuniculorum, quem vocant Vizcacha. Laët amer. p. 407.*

Viscacha. Nieremb. hist. nat. p. 161.

Les Viscachos. Feuillée obs. 3. p. 32.

Habitat in regni Peruani & Chilensis frigidioribus, ad montium radices & in planitie, cuniculo moribus facieque, vulpi colore & cauda, qua se adversus hostes defendit, similis, cavernas sibi fodiens in duas contignationes partitas, quarum una habitaculo inservit, inferior condendo victui, quem noctu conquirat. Pili tenerrimi mollissimi, ut telas ex iis contexerent sub Yncarum imperio Peruani, pileos hodiernum conficiant Chilenfes. Caro alba, tenera, sapida.

timidus. 1. *L. cauda abbreviata, auriculis apice nigris, capite longioribus. Faun. succ. 25. Schreber Sæugthiere, IV. t. CCXXXIII. A.*

Lepus. Gesn. quadr. 69. Aldr. digit. 247. Jonst. quadr. t. 65. Raj. quadr. 204.

Lepus cauda abbreviata, pedibus posticis longitudine corporis dimidii, auriculis apice nigris. Erxl. mamm. p. 325. n. 1.

Lièvre. Buffon hist. nat. VI. p. 246. t. 38.

Common Hase. Penn. quadr. p. 248. n. 184.

Hase. Ridinger jagdb. Th. t. 13.

β. cornutus, (nisi fabulosus). Schreber Sæugthiere, IV. t. CCXXXIII. B.

Lepores cornuti. Klein quadr. p. 52. t. 3.

Habitat ubique in Europa, in Bulgaria frequentissimus, in Oriente quoque, Persia boreali, Japonia, Zeylona, perque totam fere Asiam, in Ægypto, Barbaria, America boreali, ipsaque regno Chilensi; noctu pascitur; victitat rumi-

ruminans ramulis fruticum, cortice arborum; inermis timidusque auditu & visu excellit, atque cursu valet in primis montem ascensus, currit gyros. sensim breviores, retro deviat exsiliendo; capitur a canibus, felibus, accipitribus; projecto sub venatu in altum pilco sese occultat sub proximo frutice metu accipitris; mordet truncum transcendendum, cervice fragili; delectatur tympano, pulcibus obnoxius; urinā foetida non in cubile mittenda; mas in propriam sœvit prolem; adolescit primo anno, & octo annos non superat; immensus parturitione per totam æstatem, superfatatione haud rara; coit primum Februariō & Martio; femina clitoride magna instructa, per 30-31 dies gravida 3-4 pullos parit.

Longitudo circiter bipedalis; oculi magni exstantes, membrana nictitante; dormientis aperti. Mentum album; nares humidae; motitantes; labium superius fissum; pili faciei, dorfi, & laterum basi albi, medio nigri, apice rufi; gula cum pectore rufa; venter albus; cauda supra nigra, subtus alba; femora postica crassa; pedes lanati; cavitas utrinque e regione pubis.

Lagographia Waldungii W. Amberg. 1679. 4. & Paullini C. F. Vienn. 1691. 4. Anatomie E. N. C. d. I. a. 2. obs. 251. & ann. 3. obs. 93. & d. 3. ann. 5. obs. 225. Bartholiæ. a.d. Hafn. 1671. n. 136.

Variabilis. 6. L. cauda abbreviata, excepto auricularum capite breviorum apice nigro hieme totus albus. *Schreber Saeguth.*

IV. t. CCXXXV. B. *Pallas glir.* P. 1. T. IV. f. 1.

Lepus (albus) caudatus plane candidus. *Briss. an.* p. 139. n. 2.

Lepus albus. *Aldrov. dig.* p. 349. *Wagn. Helvet.* 177.

Lepus albissimus. *Klein. quadr.* p. 51.

Lepus candidus. *Jonst. quadr.* p. 160.

Alpine hare: *Forster ad. angl.* LXII. p. 375. *Penn. quadr.* p. 249. t. 23. f. 1.

niger. β. caudatus plane niger. *Briss. anim.* p. 139. n. 3.

Lepus niger. *Klein. quadr.* p. 52.

hybridus. γ. hieme lateribus tantum albescens. *Schreb. Saeguth.* IV. t. CCXXXV. C.

Habitat in alpinis & frigidioribus Europæ, Asiæ & Americæ regionibus; β) rariore colorem non mutans in Russia & Sibiria; γ) ex variabili & timido prognatus in Russia australi; in Sibiria & Russia aliquando in campestria migrans, vere in montes revertens.

Timido major, ut 4 pollicibus & ultra longitudine superes duos pedes; ast caro durior, minus sapida; artus breviores; cauda minor ex paucioribus vertebrais composita, per totum annum penitus alba; velleris color æstivus in γ) ad timidi satis accedit; β) fuscus, niger, aliquando ater-rtmus nitidus, uti per integrum annum; α) in capite ex griseo rufescens, aurium dorsique fuscus, cervicis e fusco cinerascens, laterum sensim incanescens; ventris canus.

americanus. γ. L. cauda abbreviata, pedibus posticis corpore dimidio longioribus, auricularum caudæque apicibus griseis.

Erxl. mamm. p. 330. n. 2. Schoepf. Naturf. XX. p. 32.

Lepus (hudsonius) apice aurium caudæque cinereo.

Pallas glir. p. 30.

Hudson's bay quadruped. *Barrington aḡ. angl. LXII. p. 11.*

American Hare. *Forster. aḡ. angl. LXII. p. 376.*

Habitat in America boreali nocturnus sub arborum radicibus inque cavis arboribus, nec fodiens; femina semel vel bis in anno 5-7 pullos parit.

Color idem, qui timidi; magnitudo inter variabilem & cuniculum media; pedes posteriores longiores, quam huius. Caro bona.

Tolai. 8. L. cauda abbreviata, auricularum margine summo nigro.

Pallas glir. p. 17. t. 4. f. 2. Schreb. Saecugthiere, IV. t. CCXXXIV.

Lepus (dauricus) cauda elongata, gula nigra. *Erxl. mamm. p. 335.*

Cuniculus insigniter caudatus coloris leporini. *I. G. Gmelin nov. comm. Petrop. V. p. 357. t. II. f. 2.*

Tolai. *Buff. hist. nat. XV. p. 138.*

Baikal-Hare. *Penn. quadr. p. 253. n. 188.*

Habitat trans lacum Baikal Sibiriae in deserto Gobeensi ad Tibetum usque, major praecedentibus speciebus, aestate colore fere eodem; quo variabilis, hieme tamen vix mutato paulo dilutiori; pedes, quam huic graciliores, femora posteriora longiora; cauda longior quam cuniculo & variabili, brevior autem, quam timido, huius ad caudam area quoque illa nigra accedit. Pondus hibernum adulti 7 fere librarum russicarum; feminae gravidae Aprilis 8½.

Leporibus pedum anteriorum digiti 5, posteriorum 4.

minimus. ♀. L. cauda abbreviata, auriculis pilosis contoloribus.

Molina hist. nat. Chil. p. 272.

Habitat in regno Chilensi, mare arvensi vix major; corpore fere conico, auriculis parvis; acutis, rostro oblongo, palmis tetradaçylis, plantis pentadaçylis, pilis tenerrimis; at brevibus, carne alba, sapida, Chilensibus domesticus; cuniculo colorum varietate, fertilitate; qua femina singulis fere mensibus 6, 7 & plures pullos parit, & hostibus, felibus scilicet rarisque similis; sed eum abhorrens.

Cuniculus: 1. L. cauda abbreviata, subconcolore, auriculis apice atris, cruribus posticis trunco brevioribus. *Pallas glir. p. 30. Erxleb. mamm. p. 331. n. 3. Schreber Saength. IV. t. CCXXXVI. A.*

Lepus cauda abbreviata, auriculis nudatis. Syst. nat. XII. 1: p. 77. Fn. suæc. 2. p. 10. n. 26.

Lepus cauda abrupta, pupillis rubris. Syst. nat. II. p. 46. VI. p. 9: n. 3. Mus. Ad. Fr. 1: p. 9:

Lepus (Cuniculus nostras) caudatus obscure cinereus. Briss. regn. anim. p. 140. n. 4.

Cuniculus. Plin. hist. mund. VIII. c. 29. 55 & 58. Agric. anim. sub. p. 16. Gesn. quadr. d. 394. Aldrov. dig. p. 382. fig. p. 385. Jonst. quadr. p. 161. t. 65. Raj. quadr. p. 205.

Lapin, Lapin sauvage. Buff. hist. nat. VI. p. 303. t. 50.

Rabbit. Penn. quadr. p. 251. n. 186.

domesticus. ♂. C. oculis pulchre rubris.

Lapin domestique. Buffon hist. nat. VI. t. 51.

a. colore nigro. *Schreb. Saength. IV. t. CCXXXVI. B.*

b. colore albo.

c. colore variegato.

argenteus. d. pilis ex argenteo cinereis, pedibus fuscis.

Lepus caudatus dilute cinereus. Briss. regn. an. p. 191. n. 5.

Le Riche. Buffon hist. nat. VI. t. 52.

Silver-haired Rabbit. Penn. quadr. ind.

angorensis. γ. C. pilis longioribus undulatis sericeis. *Schreber Saength. IV. t. CCXXXVI. C.*

Lepus (Cuniculus angorensis) caudatus pilis tenuissimis & longissimis toto corpore vestitus. Briss. regn. an. p. 141. n. 6.

Lapin d'Angora. Buffon hist. nat. VI. t. 53. 54.

Angora-Rabbit. Penn. quadr. p. 252. n. 186. ~~β~~.

sufficus. *L. cinereus* capite auticulisque fuscis, pelle dorſi gulæque ſaccata.

Ruſſian rabbit. Penn. quadr. p. 252. t. 23. f. 2.

Habitat in temperatis & calidioribus Europæ, inque calidioribus Aſiæ & Africæ, e. g. in Madera, hoſpitatur quoque in frigidiſſimis; cuniculos agit in arenofis, interdum latens; capitur a falconibus, mele, putorio; ad octo vel novem uſque annos vivit; femina per 30-31 dies grvida, ſepties per annum 4-8 pullos parit, ſexto vitæ menſe adultos. Pellis, præſertim βd, & γ, bona; caro alba paſſim eſculenta.

Lepore timida minor, circiter ſeſquipedalis; auriculæ capite breviores; feri calor ex fuſco cinereus, cauda ſupra nigra ſubtus alba.

Anatome. Perv. obſ. 10.

capenſis. 3. *L. cauda longitudine capitis, pedibus rubris.*

The cape Hare. Penn. quadr. p. 253. n. 189.

Habitat ad Caput bonæ ſpei; fodiens, cauda ruſſa.
A. Burmannus.

* * ecaudati.

braſilienſis. 4. *L. auritus, collari albo, cauda nulla. Pallas glir. p. 30.*

Lepus cauda nulla. Syſt. nat. IX. n. 1. XII. 1. p. 78. n. 4.

Cuniculus braſilienſis. Tapeti. Marcgr. braſ. 223. Piſ. braſ. 102. Raj. quadr. 205.

Tapeti. Buffon hiſt. nat. XV. p. 162.

Braſilian Hare. Penn. quadr. p. 252. n. 187.

Habitat in America meridionali; non fodiens, facie cuniculi, magnitudine & colore timidi.

paſſillus. 10. *L. ecaudatus, fuſco grifeoque mixtus, auribus ſubtriangularibus albo marginatis. Pallas glir. p. 30-45. t. 1. & 4.*

f. 3-9. & nov. comm. Petrop. XIII. p. 334. t. 14. & it.

1. p. 155. 2. p. 333. 3. p. 498. Schreber Saugth. IV. t. CCXXXVII. Lepechin it. 1. p. 260.

Lepus cauda nulla, auriculis rotundatis. Mant. II. p. 322.

Lepus cauda nulla, auriculis brevibus rotundatis. Erxleben mamm. p. 338. n. 8.

Habitat in Auſtraliſſimis montium Uraleſium promontoriis, herbidiſſis collibus & convallibus apricis, paſſim quoque ad Irtiſ & inter apricos montes regionis metalliferæ ſub alpi-

bus altaicis sitæ, cytisi supini, robinia frutescentis, cerasti pumila, mali sylvestris flores, frondes, corticem potissimum amans, in locis siccis cuniculos fodiens, voce quam maxime sonora per omnem annum, excepta hieme, se prodens, mitis, & facile cicurandus; parum dormit, sed sæpius potat; elumbis & quasi subsultans, non tamen celeriter incedit, nocturnus vigil; inter calidissima animalia; femina Maji fine parit pullos 3-6.

Pondus nunquam 3 livß, hieme vix 3 iiiiß, longitudo 6 pollices 9 lineas excedit; color vix mutatur; pilis rigidiusculis supra pallide griseis & apice nigrescentibus, ad ima latera pedesque extremos pallide lutescentibus, subtus ex canescenti albidis, ad gulam canis; caput magis oblongum, quam prægressis; truncus gracilis agitabundus, exilis; oculi murini; artus breves; vellus molliissimum, prolixum, lanugine tenerrima ex fuscescente plumbea,

alpinus. II. L. ecaudatus rufescens, auriculis rotundatis plantisque fuscis. Pallast. II. p. 569. & 701. t. A. glir. p. 30. & 45-59. t. 2. & 4. f. 10-12. Schreber Sæugthiere, IV. t. CCXXXVIII.

Lepus cauda nulla, auriculis elongatis, corpore lutescente.

Erzl. mamm. p. 337. n. 7.

Mustela daurica cauda carens corpore brevior & crassior, pilis in dorso rufescentibus, Ochodona daurica anurinaq, Catal. mus. Petrop. p. 343. n. 114. 115.

Habitat in magni jugi altaici ad ultimum usque Asiae angulum, montiumque ultra Jeniseam Lenam sitorum asperrimis & inaccessis scopulis, ubi inter saxa cuniculos agit, aliquando in cavis arborum truncis degens, interdum, nisi cælo turbido latens; vocem acutam, quasi fistulæ edit; Augusto gramina potissimum silvatica molliissima & tenerrima aliasque herbas secatur, & siccata Septembri in acervos fere conicos compingit, hieme nive oblectos, tramite cum antris conjunctos, venatorum equis in pabulum cessivos; capitur a mustela xibellina & sibirica, infestatur qestro leporino.

Pondus a 3 liv ad 1½, longitudo a 7 pollicibus ad 9 & 7 lineas variat; facies magis stupida & fera, quam pusillo; caput magis oblongum & tenuius; rostrum minus obtusum; oculis satis exigui, nigri; auriculæ magnæ; corpus mi-

Leporibus omnibus, excepto Molina fide minimo, palma pentadactyla, planta tetradactyla.

MAMMALIA GLIRES. *Lepus*.

nus elongatum & magis ventricosum. Mammarum 2 inguinales, 4 thoracicae. Color subtus magis obsoletus; gula summa cinerascens.

Ogotona. 12. *L. ecaudatus, griseo-pallidus, auriculis ovalibus subacutis concoloribus. Pall. glir. p. 30. 59-70. t. 3. & 4. f. 14-16. Schreber Saeugth. IV. t. CCXXXIX.*

Mustela mungalica, cauda carens, corpore breviorē, Ochodona mungalica Messerschmidii. Cat. Mus. Petrop. 1. p. 343. n. 112.

Habitat in montosis ultra lacum Baikal sitis, & per omne Mongolorum, praesertim Gobeense desertum, in rupes-tribus quidem inter lapidum acervos in arenosis in cuniculis bi-vel triforis, quorum plures aliquando uni inserviunt; noctu potissimum vagans; voce acutissime stridula, pyri baccatae corticem, ulmique pumila virgulta amans, vere etiam alias in arena nascentes herbas comedit, quas autumno in acervos colligit; agilissimus vix cicuratur; capitur a mustelis variis, fela manal, falconibus minoribus, picis caudatis, strigibus.

Differt ab alpino & pusillo, quibus satis similis videtur, magnitudine, pondus enim in feminis aliquando vix 3iv, in masculis nunquam 3viii aequat, longitudo 6 pollices 7 lineas vix excedit, a posteriore, cui similior, colore per omnem annum pallidissimo, pedibus robustioribus, auricularum figura & fusco colore.

HYRAX. *Dentes primores superiores II lati distantes. inferiores IV contigui lato-
plani, bis crenati.
molares magni ubique IV.*

Palmae digitis IV.

Plantae digitis III.

Cauda nulla.

Claviculae nullae.

capensis. 1. H. palmarum unguibus planis, plantarum unico subulato. Schreb. Saeugth. IV. t. CCXL.

Cavia capensis. Syst. natur. XII. 3. p. 223. Pallas miscell. zoolog. p. 34. t. 3. & 4. f. 5-13. spicil. zool. fasc. 2. p. 16. t. 2. 3.

Cavia (capensis) ecaudata, dentibus primoribus infra quatuor. *Erxl. mamm. p.* 352. *n.* 3.

Marmotte du Cap de bonne espérance. *Buff. hist. nat. Suppl. ed.* 12. *Tom. V. p.* 293.

Cape cavy. *Penn. quadr. p.* 247. *n.* 182.

Klipdas. *Gr. a Mellin Schrift. der berl. naturf. Ges.* III. *p.* 271. *t.* V.

Habitat ad Caput bonæ spei.

Vox acuta, auditus acris, incessus reptabundus, victus vegetabilis; agilis, mundus, parum bibit, salit, caloris amantiſſima. Pediculi & teniæ. Magnitudo circiter marmotæ, ut adulta tribus pollicibus tribusque lineis pedem superet: Caput breve; roſtro brevissimo obtuſo, occipite craſſo; oculi mediocres; auriculæ ovaſes patulæ, ſemi-abſconditæ, lanuginosæ, fuſcæ; artus brevissimi, humeris femoribusque intra pellem latentibus. Corpus breve, trunco contracto, abdomine ventricofiſſimo. Vellus lanugineum intus caneſcens, extus griseum, ad latera ſordide ex griseo album; in dorſo longitudinaliter ſub-fuſcum, pilis longioribus rudioribus nigris exſtantibus, præter ſetulas longiores paſſim in vellere ſparſas. Palmæ quadrilobæ, loborum apice ungue plano orbiculato notato; plantæ ex binis lobis & digito unguiculato compoſitæ.

Syriacus. 2. *H. pedibus unguiculatis. Schreber Sæugth.* IV. *t.* CCXI. *B.*

Habitat in Syria.

Corpus magis elongatum, dorſo ſetis ex acie prominentibus notato, ſupra fuſcum, infra exalbidum. Roſtrum magis elongum, Ungues brevissimi.

V. P E C O R A.

Dentes primores superiores nulli.

*inferiores VI aut VIII a molari-
bus remotissimi.*

Pedes unguati.

Mammæ inguinales.

27. CAMELUS. Cornua nulla.

*Dentes primores inferiores VI spa-
thiformes.*

*Ianiarii distantes, superio-
res III,
inferiores II.*

Labium superius fissum.

Drome-
darius.

I. C. topho dorsi unico. *Briss. quadr. 45. Raj. quadr. 143.
Forsk. Fn. orient. p. IV.*

Camelus vulgaris. Forsk. Fn. orient. p. IV.

*Camelus Dromas. Gesn. quadr. p. 171. fig. p. 172. Pr.
Alpin. ag. 1. p. 223. t. 1.*

Camelus. Jonston quadr. p. 95. t. 41. 42. 43.

*Dromedarius. Gesn. Thierb. p. 234. f. p. 234. Charlet.
exerc. p. 13.*

Arabian Camel. Penn. quadr. p. 60. n. 50.

*Habitat ferus in Asiæ temperatæ desertis, rarior ad utrum-
que montium Soongoricorum latus, ad fluvium Ili, mon-
tem Musart, & in Mongolia, Sibiria finitima; junior ci-
curatus & cultus in omni Oriente, Africa, ipsisque insulis
Jamaica & Barbados, varietate numerosissima, mitis, nisi
oestro agitur; pro itineribus in desertis arenosis siticulo-
sis portandisque oneribus utilissimus; portat enim ad
1200 libras; lente festinat, nec ultra adsuætum per-
currit spatium, nec plus instituto onere recipit; famem
fert patientissime, potuque per plures dies caret, stirpibus
desertorum spinosissimis, reliquis animantibus detestatis
contentus. Pellis pretiosa; caro Arabibus in deliciis,
lac potulentum.*

*Pili molliores, coloris ex rufo cinerei, in collo & topho lon-
giores; altitudo 6½ pedum; caput parvum, auriculis bre-*

vibus, ore & gingivis cartilagine obductis; collum longum, gracile, curvatum; pedes bifidi, callis in anterioribus quatuor, in posterioribus duobus; cauda pedibus brevior, sternum collo unico; ventriculus secundus celululosus pro aqua pura in siticulosis desertis diutius aservanda Camelus Arabiæ Veterum.

baërianus. 2. C. tophis dorfi duobus. *Briss. quadr.* 53. *Forster aë. angl.* Vol. 57. p. 343. *Forsk. Fn. orient.* p. IV. *Raj. quadr.* p. 145.

Dromedarius. *Jonst. quadr.* p. 42. 43. 44. f. 1.

Camelus turcicus. *Pr. Alpin. æg.* I. p. 223. t. 13.

Camelus. *Gesn. quadr.* p. 162. f. p. 163. *Schwenckf. theatri.* p. 72. *Aldrov. bis.* 907. 889.

Chameau. *Buffon hist. nat.* XI. p. 211. 426. t. 22.

The baërian Camel. *Penn. quadr.* p. 63. n. 51.

Trampelthier oder Dromedar. *Knorr delic. nat. sel. tab.* K. 6.

Habitat ferus in India boreali & versus Sinam in desertis, cultus in Oriente & Africa, præcedenti rarior, pro magnatibus, major & cursu celerior, tophe posteriore majore, ceterum satis affinis; occiditur buxo; coit difficillime, mense Februario, femina per integrum annum gravida parit unicum pullum, per duos annos lactandum, & tertio anno adultum καμηλος & Camelus baërianus veterum.

Ex hoc & Dromedario hybridi.

Glama. 3. C. dorso lævi, tophe pectorali.

Camelus pilis brevissimis. *Briss. quadr.* 55.

Camelus peruvianus, Glama dictus. *Raj. quadr.* 145.

Pelon Ichiatl Oquitli, Ovis peruana. *Hernand mex.* p. 660.

Ovis peruana. *Charlet. exerc.* p. 9. *Jonst. quadr.* t. 46.

Cervocamelus. *Jonst. quadr.* t. 29.

Hirschcamel. *Gesn. Thierb.* p. 239

καμηλοκαμηλος. *Marcgr. brasil.* p. 243.

Llama. *Laët amer.* p. 405. *Ulloa voy.* I. p. 365. t. 24. f. 5. *Penn. quadr.* p. 64. n. 52.

Lama. *Buffon hist. nat.* XIII. p. 16.

Habitat in montibus regni Peruani altioribus, moribus, cursu, usu, ruminatione difficili coitu, faris sitisque tolerantia, habitu externo & fabrica interna præcedentibus similis; collum longum, caput parvum inerme, auriculæ mediocres, oculi magni, rotundi, nasus brevis, pedes

MAMMALIA PECORA. *Camelus*.

longiores, fissi, cauda brevis, pili longi, qui trahi in fila possunt; ventriculi 4, quorum secundus cellulosus; mari penis longus, tenuis, retro flexus, feminae, quae raro gemellos parit, vulva angusta; mitis, docilis, gressu firmo, securo, cicuratur.

At differt altitudine minore, vix $4\frac{1}{2}$ pedibus aequali; longitudine sexpedali; pinguedine multa subcutanea, auriculis acutis melius formatis, collo minus incurvato, dorso aequaliori, cauda pulchriore, pedibus elegantioribus, setis aequalibus, cursu celeriore, pilis longioribus mollioribus, ex albo, nigro & fusco variis, tubere pectorali, olco flavido continue madente. Vox hinniens. Arma pedes, dentes, saliva, quam in hostes expuit; salax, jam triennis, sub finem aetatis coit fere furens; femina per quinque aut sex menses gravida, mammis binis instructa, parit pullum unicum. Portat ad 150 libras, & per tres quatuorve dies continuos tria quotidie milliaria germanica, tunc per diem quiescens, fatigatus succumbit; compressis testiculis compellitur obstinatus. Caro vervecinae aemula.

Huanacus. 5. *C. corpore piloso, dorso gibbo, cauda erecta. Molina hist. nat. Chil. p. 281.*

Pernichat. Fernand. Chim. p. 11.

Guanaco, five Huānacu. *Laët amer. p. 406. Ovalle Chile. p. 44. Cieza Peru. p. 233. Ulloa voy. I. p. 366. t. 24. f. 5. Hawkesw. scer. I. p. 148.*

Habitat in montium catena, Cordilleras, hinc planities regni Peruviani & Chilensis frequentans, ad Glamam quidem moribus, usu, multisque notis externis accedens, sed nec ferus, nec cicuratus unquam cum ea coiens, de seculo præterea tophi pectoralis, dorso gibboso, pedibus posterioribus brevioribus, cursu magis subsultante satis distinctus; supra flavus, subtus exalbidus, septem circiter pedes longus, & tres pollices ultra quatuor pedes altus; cauda cervinae, auriculæ equinis similes. Caro juniorum sapida, adultiorum paulisper dura, nisi salita.

arcucanus. 6. *C. corpore lanato lævi, rostro superne curvo, cauda pendula. Molina hist. nat. Chil. p. 279.*

Aries moromorus. Nieremb. hist. nat. p. 182.

Sheep. Ovalle Chile. p. 44.

Sheep of Peru. Cieza Peru. 232.

Moutons. Feuillé journ. 3. p. 23.

Moutons de Perou. Frézier voy. I. p. 264. t. 22. f. A.

Habitat in regnis Chilenſi & Peruano, præter collum longum & pedes altos capite, roſtro, auriculis flaccidis penduliſque, oculis, cauda (breuiore tamen), lana (moliore tamen), arieti ſatis ſimilis, ſex circiter pedes longus, & poſterius, vix ultra quatuor pedes altus, nunc albus, nunc niger, nunc fufcus, nunc cinereus. Caro ſapida.

Olim ad portanda onera, azandaque arva adhibitus, & ex lana veſtimenta contexta, nunc pretioſiores modo tela, ſericeis nitore ſimiles.

Vicugna. 7. C. corpore lanato lævi, roſtro ſimo obtuſo, cauda erecta, *Molina hiſt. nat. Chil. p. 277.*

Vicuna, Vicunna, Vicunnaſ. *Laët amer. p. 406. Méremb. hiſt. nat. p. 184. f. p. 185. Cieſa Peru p. 233. Ulloa voyag. I. p. 506. 525. t. 24. f. 3.*

Vicognes ou Vicunas. *Fréz. voy. I. p. 266.*

Camelus (Vigogne) pilis prolaxis toto corpore veſtitus. *Briff. ann. p. 57. n. 4.*

Habitat in abruptis cacuminibus montium Cordilleras, præſertim in provinciis Chilenſibus, Coquimbo & Copiapo, gregarius, frigoris patientiſſimus, timidus, celerrimusque, ſunt adſtupet alligatis panniculis, diſſiculus cicurandus, carne ſapida, lana pileis & telis idonea, ad ſericeas accedentibus.

Capræ hircæ habitu caudaque aliquantum ſimilis, aſt collo viginti pollices longo, capite rotundo inermi, auriculis parvis erectis & acutis, roſtro brevi, pedibus duplo altioribus, lana egregia tenerrima, roſea, facillime tingenda, ab hac; corpore graciliore, roſtro lanaque brevior, hac autem teneriore a Paco diſtincta, cum qua non caſt. In ejus ventriculo bezoar.

Paco.

4. C. tophis nullis, corpore lanato, roſtro oblongo.

Camelus peruvianus laniger Pacos dictus. *Raj. quadr. 147. Klein. quadr. p. 42.*

Alia ſpecies Pacos dicta. *Hernand. Mex. p. 663.*

Paco. *Laët amer. p. 405. Buffon hiſt. nat. XIII. p. 16.*

Alpagne. *Fréz. voy. I. p. 267.*

Pacos. *Penn. quadr. p. 66. n. 53.*

Habitat in regni Peruani montibus altioribus, gregarius, præcedentibus minor, & oneribus 50-70. libras excedentibus portandis impar; carò minus bona, lana, quam vicugna, quidem longior, ſed minus tenera, ſupra in

*fero animali purpurea, subtus alba, in cicurato nigra;
albo rufoque variegata, ad parandas telas, semifericearum
similes, adhibita.*

28. MOSCHUS. Cornua nulla.

*Dentes primores inferiores VIII,
laniarii superiores solitarii
exferri.*

moschiferus. I. M. folliculo umbilicali. *Pallas spicil. zool. fasc. 13. t. 4-6, Schreber Saeugth. V. t. CCXLII.*

Moschus. *Schroeck histor. mosch. Vienn. 1682. 4. t. 44. Brun. it. 121. t. 121.*

Animal moschiferum. *Nieremb. hist. nat. p. 184. I. G. Gmelin nov. comm. Petrop. IV. p. 393. Raj. quadr. p. 127.*

Capreolus moschi, Bisamthier. *Gefn. quadr. p. 786. Thierb. p. 50. fig. p. 50. 51. Jonst. quadr. t. 29.*

Capra moschi. *Aldrov. bisulc. p. 743. f. p. 744. Jonst. quadr. p. 78. Charlet. exerc. p. 10.*

Tragus moschiferus, moschus. *Klein quadr. p. 18.*

Tragulus (moschus) ad umbilicum folliculum moschiferum gerens. *Briss. regn. anim. p. 97. n. 5.*

Musc. *Buff. hist. nat. XII. p. 361.*

Tibet-Musk. *Penn. quadr. p. 56. n. 46. t. 10. f. 1.*

Habitat in maximis & palmaribus Aëæ magis orientalis jugis alpinis, præsertim altissima totaque rupibus & montibus inclusa regione, inter Altaicas alpes easque, quæ Tibetanos ab Indis dirimunt, interposita, solitarius, rupestria prærupta, convalles altis frigidisque montibus inclusas, pineta intermontana, promontoria nivalium cacuminum quam maxime sequens; sexto jam seculo a Cosma dictus; saliendo, currendo, scandendo, nando agilissimus, timidissimus & difficulter cicurandus; Novembri & Decembri coit, maribus mordicus pro venere pugnantibus, mite ceterum animal. Caro edulis, juniorum sapida.

*Pecoribus ventriculi 4: Rumen, reticulum, omasus, abomasus; ideoque ruminantia phytiphaga & sebifera; ungulata etiam sunt, uti sucs, unguibus calceiformibus propriis geminis, præter*possicas 2 succenturiatas. Agagropila his frequens a pēlis deglutitis. Horum dentata dentibus laniariis carent cornibus, & cornuta carent laniariis, at mihi cranium capreoli cornutum cum laniariis.*

Magnitudo capreoli semestris; pondus ab 18-35 libras medicas; longitudo adulti vix infra duos pedes tresque pollices, vix excedens duos pedes cum 11 pollicibus; caput fere capreoli elegantissimum, vellus cervino grossius, sed levissimum, mollius, laxum, altissimum, colore pro ætate annique tempore variabili, potissimum ex fusco nigrescente, subtus canescente, rarius albido; junioribus virgis & maculis insignitum ætate increcente sensim evanidis, a peltionariis & cortariis adhibitum. Cauda brevissima. Ad præputii orificium folliculus moschiferus subovalis, hinc planus inde gibbus, orificio simplicissimo patulus, in hinnulis vacuus, in adultis sesquidrachma, imo duis drachmis ambrosiaca, in tibetanis quidem præstantioris, quam quidem in sibiricis, in quibus castoreum subolet, unguinosæ, grumosæ, friabilis, obscure brunneæ refertus.

- indicus.** 2. *M. supra rufus, subtus albidus unicolor, ungulis succenturiatis, caudâ longiore. Schreb. Saeguth. V. t. CCXLV. Tragulus (indicus) pilis brevibus, supra fulvis, infra albicantibus. Briss. regn. anim. p. 95. n. 1. Habitat in India, moschifero vix major; caput equino simile; auriculæ erectæ, oblongæ; pedes graciles.*
- pygmaeus.** 3. *M. supra fusco-rufus, subtus albus, ungulis succenturiatis nullis. Erzl. mamm. p. 322. n. 3. Moschus pedibus humano digito angustioribus. Syst. nat. XII. p. 92. Capra cornibus teretibus conicis obtusis curvis, latere anteriore rugoso. Syst. nat. X. p. 69. Tragulus (guineensis) pilis longissimis obscure fulvis. Briss. regn. anim. p. 96. n. 2. Cervus pusillus guineensis; Cervus parvulus africana, rubida sine cornibus; Hinnulus seu cervus juvenis pergracilis africanus; Cervus africanus pilo rubro. Seb. mus. I. p. 70. 73. t. 43. f. 1. 2. 3. t. 45. f. 1. Tragulus, Cervulus parva africana ex Guinea, e cornis; Tragulus, five Hinnulus aut Cervus juvenis pergracilis africanus; Tragulus guineensis pilo rubro longiore. Klein quadr. p. 22. Chevrotain des Indes orientales. Buffon hist. nat. XII. p. 315. 341. t. 42. 43. f. 1. 3-8. Guinea-Musk. Penn. quadr. p. 59. n. 49.*

An hujus etiam generis animal elaphi magnitudine et Formosa stags without horns
Ninh. Eastind. p. 209.

MAMMALIA PECORÆ. Cervus.

milliaria de die percurrit, corio globum plumbeum ferè eludens. Caro bona.

Elaphus. 3. *C. cornibus ramosis totis teretibus recurvatis. Fn. suæ. 401. Schreb. Sæugth. V. t. CCXLVII. A. B. C. D. E.*

Cervus cornibus teretibus ad latera incurvis. Briss. regn. anim. p. 86. n. 1.

Deas. Aristot. hist. an. II. c. 7. & 18. VI. c. 29. IX. c. 6. Aelian. anim. VI. c. 11. 13. VII. c. 39. XII. c. 18. Opian. cyneg. II. 176.

Cervus. Plin. hist. nat. VIII. c. 32. Gesn. quadr. p. 354. Schwenckf. theriotr. p. 81. Aldrov. bisulc. p. 769. fig. p. 774. Jonst. quadrup. p. 82. t. 32. 35. Mus. Worm. p. 338. Scheff. Lapp. p. 337. Charlet. ex. p. 11. Wagn. Helv. p. 173. Sibb. Scot. an. p. 9. Raj. quadr. p. 84. Ræck. Polon. p. 216.

Cerf, biche & faon de cerf. Buff. hist. nat. VI. p. 63. t. 9. 10. 12.

Stag. Penn. quadr. p. 49. n. 38.

Edler Hirsch, Wild oder Thier. Ridinger jagdb. Th. t. 4. 5.

Hippelaphus. 3. *C. pilis in collo longioribus major; senior. Erxl. mamm. p. 304.*

Cervus (germanicus) cornibus teretibus ad latera incurvis; collo infra jubato. Briss. regn. anim. p. 87. n. 2.

Ἰππελᾶπος. Aristot. hist. anim. II. c. 5.

Ἰππελᾶπος. Plin. hist. nat. VIII. c. 33.

Tragelaphus. Gesn. quadr. p. 1101. Charlet. exerc. p. 12.

Hippelaphus mas; Rothshirsch. Jonst. quadr. t. 35.

Brandhirsch & Pferdshirsch. Gesn. Thierb. p. 199. 210.

corficannus. 3. *C. minor fuscus. Erxl. mamm. p. 304.*

Cerf de Corfe. Buff. hist. nat. VI. p. 95. t. 11.

canadensis. 3. *C. cornibus amplissimis. Erxl. mamm. p. 305.*

Cervus (canadensis) cornibus teretibus ab imo ad summum cute pilosa tectis. Briss. regn. an. p. 88. n. 3.

Stag. Brick. North-carol. p. 109.

Stag in Virginia. Dale ad. angl. n. 444. p. 384.

Stag of Carolina. Lawson carol. p. 123.

Stag of America. Catesb. Carol. app. p. XXVIII.

Habitat in omni Europa, & boreali America atque Asia ad Japoniam usque gregarius mare duce; bene natus; triginta annos ætate vix superat; mitis cetera; Augusto & Septembri oestro furit; maribus de femina violenter pugnantibus; hæc raro cornuta; per octo menses gravida
unum

unum parit hinnulum, raro gemellos; sine Februarii Martioque cornua amittit, recuperat Julio. Pellis eximia. Caro sapida.

Pulcherrimum animal $3\frac{1}{2}$ pedes altum, supra ex rufo-fuscum, subtus albescens, rarius totum album, junius albo-maculatum; fossa lacrymali ante oculos distinctum. Cornuum rami numero quotannis crescunt.

Anatome. E. N. C. cent. 10 app. 448.

Grabä. Eleographia. Jenæ 1668. 8. I. G. Agricola cervi naturæ. Amberg. 1617. 4.

Tarandus. 4. C. cornibus ramosis recurvatis teretibus; summitatibus palmatis. *Fn. suec.* 41. *Amœn. acad.* 4. p. 144. t. 1. *Mus. Ad. Fr.* 1. p. 11. *Schreber Sacugth.* V. t. CCXLVIII. A. B. C. C.

Tarandus. *Plin. hist. nat.* VIII. c. 34. *Aldrov. bisulc.* p. 859. fig. p. 861. *Jonst. quadr.* p. 90. t. 37. *Charlet. exerc.* p. 12. *Scheff. Lapp.* p. 321. fig. p. 327.

regis. *Aelian. anim.* II. c. 16.

Rangifer. *Gesn. quadr.* p. 950. *Aldr. bisulc.* p. 863. *Jonst. quadr.* t. 37. *Mus. Worm.* p. 337. *Scheffer Lapp.* p. 338. *Charlet. exerc.* p. 12. *Klein quadr.* p. 23 t. 1 *Raj. quadr.* p. 88. *Olear. mus.* 16. t. 10. f. 3.

Renne. Buffon hist. nat. XII. p. 79. t. 10. II. 12.

Rein. Penn. quadr. p. 46. n. 36. t. 8. f. 1.

Rangifer. α. C. cornuum summitatibus omnibus palmatis. *Briss. regn. anim.* p. 92. n. 8.

Reinthier & Tharandthier. Gesn. Tierb. p. 206. 207. 208. 209.

Rennthier. Gr. v. Mellin Schr. der berl. naturf. Ges. Vol. I. n. 1.

groenlandicus. β. C. cornibus teretibus ab imo ad summum cutē pilosa testis, naso piloso. *Briss. regn. anim.* p. 88. n. 4.

Capra groenlandica. Raj. quadr. p. 90.

Greenland Deer. Catesb. Carol. app. p. XXVIII.

Greenland-Buck. Edw. av. 1. t. 51.

Caribou. γ. C. cornibus rectis, ad basin ramo unico antrorsum verso. *Briss. regn. anim.* p. 91. n. 6.

Caribou. Charlev. nouv. Franc. 3. p. 129. *Dobbs Hudf.* p. 20. 22.

Cervi cystide fellea carent; pedibus anterioribus calcitrant; sylvibus delectantur.

Habitat in alpihus Americæ, Europæ, Asiæ, maxime septentrionalibus ad Camtschatcam & Spitzbergen usque, tamen etiam in Russia magis australi, &, quamvis minor, in Sardinia; in Lapponia æstate alpes incolit, hieme in deserta plana descendit, vere culice pipiente, oestro & tabano tarandi ad alpes retropulsus; crepitantibus ungulis, vidit licheni rangiferino sub nive sepulto; mas cornua amittit mox a pruritu, fine Novembris, femina pariter cornuta, cornibus tamen minoribus, ad initium, retinens cornua, dum pariat; parit autem, per 33 hebdomadas gravida, circa finem Septembris jam pruriens, medio Maji sæpe gemellos; ætatem 16 annorum domesticus non superat; colitur enim frequenter in Lapponia, ad trahendam rhedam, ob lac, carnem, pellem, ex qua vela quoque conficiunt Samojedæ; castratus cornua raro amittit ante novum annum.

Corpus magnitudine damæ, domestici tres pedes altum, 4 pedes longum, feri majus, supra fuscum, ætate sensim canescens, tandem album, subtus cum ore, perinæ & cauda album; pili densissimi, colli subtus longiores; mari præputium propendens; femina mammæ 6, quarum 2 posteriores spurie.

Anatome. Bartholin. aḡ. Hafn. 1671. n. 135. Housten aḡ. Stockh. 1774. Vol. XXV. trim. 2. n. 4.

Dama. 5. C. cornibus ramosis recurvatis compressis; summitate palmata. *Fn. suec. 42. Schreber Sacugth. V. t. CCXLIX. A. B.*

Cervus (Dama vulgaris) cornuum unica & altiore summitate palmata. Briss. regn. anim. p. 91. n. 7.

Cervus palmatus, Dama, Dama-cervus. Klein quadr. p. 25.

Cervus platyceros. Raj. quadr. p. 85.

Platyceros. Plin. hist. nat. XI. c. 37.

Ελαφος κύων σπας & Ιορ. c. c. Oppian. cyneg. II. 293. 296.

Dama vulgaris. Gesn. quadr. p. 335. fig. p. 1100. Schwenckf. theriotr. p. 87. Aldrov. bisulc. p. 741. Jonst. quadr. p. 77. t. 31.

Dain & Daine. Buff. hist. nat. VI. p. 167. t. 27. 28.

Fallow-Deer. Penn. quadr. p. 48. n. 37.

Dann-Hirsch. Ridinger jagdb. Th. t. 7.

Damhirsch. Gesn. Thierb. p. 202. fig. p. 203. Gr. a Melin Schr. der berl. naturf. Ges. Vol. II. n. 9.

Habitat, elapho tamen rarior, & plerumque minor, in Europa ad Persiam borealem usque, Jachmur scripturæ

MAMMALIA PECORA. Cervus.

179

facra, rufus, fufcus, albo maculatus, rarius totus albus, gregarius, facile cicurandus; viginti annos vix fuperans; femina e cornis per 8 menses gravidam, unum, rarius binos, vix tres hinnulos parit. Arcetur filo horizontali. It. goth. 335. Caro proba.

Anatome hermaphroditi. *Journal encyclopéd. 1776. P. II.*

- Virginia- 8. C. cornibus ramosis antrorsum versis parum palmatis. Penn.
nus. *quadr. p. 51. n. 39. t. 9. f. 2.*
Dama virginiana. *Raj. quadr. p. 86.*
Cervus platyceros. *Sloam. jan. 2. p. 328.*
Chevreuil. *Du Prat Louis. 2. p. 69.*
Fallow-Deer. *Laws. Carol. p. 123. Catesb. Carol. app. p. XXVIII. Brickell North-carol. p. 109.*
Habitat in Carolina & Virginia, damæ satis affinis, est altior, cruribus & cauda longioribus, colore magis cinereo distinctus; ceterum gregarius, agilis, facile cicurandus, hieme muscis arborum visitans; vermibus in capite & gutture obnoxius; caro sicca; pellis eximia.
- Axis. 9. C. cornibus ramosis teretibus erectis: summitate bifida, corpore albo-maculato. *Erxleb. mamm. p. 312. Schreber Saeugh. V. t. CCL.*
Axis. *Plin. hist. nat. VIII. c. 21. Raj. quadr. p. 89. Buff. hist. nat. XI. p. 397. t. 38. 39. Penn. quadr. p. 51. n. 40.*
β. unicolor, cornuum summitate trifurcata. *Penn. hist. p. 106. n. 48.*
γ. cornibus insignibus albidis: apice trifurcato. *Penn. quadr. p. 52. n. 41.*
Habitat in India, & insulis oceani indici, facile cicuratur, olfactus acerrimi; caro salita edulis.
Magnitudo damæ, color pallide rufus; cauda supra rufa subtus alba.
- porcinus. 10. C. cornibus gracilibus trifurcis, supra fuscus, subtus cinereus. *Schreb. Saeugh. V. t. CCLI.*
Porcine Deer. *Penn. quadr. p. 52. n. 42. t. 8. f. 2.*
Habitat in India, 3 pedes cum 6 pollicibus longus, 2 pedes cum 4 pollicibus altus; cornua 13 pollices longa; corpus crassiusculum; cauda 8 pollicum; pedes graciles.
- Mexica- 11. C. cornibus apice trifurcatis antrorsum versis, rufus. Penn.
nus. *hist. of. quadr. p. 110. n. 52.*
Cervus major, corniculis brevissimis, *Biche des bois. Barrer. Fr. équiu. 151.*

MAMMALIA PECORA. Cervus.

Teutlal maçame. *Hernandez an. mexic.* 324.

Baieu. *Bancr. Gui.* 122.

Chevreuil d'Amérique. *Buffon hist. nat.* VI. p. 210. 243.
t. 37.

Habitat in nova Hispania, Guiana & Brasilia.

Cornua crassa, robusta 10 pollicum; magnitudo capreoli; junioris pellis maculata. Caput magnum; oculi magni splendidi; caro cervina deterior.

Capreo- 6. C. cornibus ramosis teretibus erectis: summitate bifida; corpore fusco-rufo. *Fn. succ.* 43. *Schreh. Saeugthiere*, V. t. CCLII. A. B. *Erxl mamm.* p. 313.

Cervus (Capreolus) cornibus teretibus erectis. *Briss. regn. an.* p. 89. n. 5.

Caprea. *Plin. hist. nat.* VIII. c. 53. 58. X. c. 72. XI. c. 37. *Aldrov. bisulc.* p. 738. *Jonst. quadr.* p. 77. t. 31. *Raj. quadr.* p. 89.

Capreolus. *Gesn. quadr.* p. 324. 1098. *Schwenckf. theriotr.* p. 78. *Jonst. quadr. t.* 33. *Mus. Worm.* p. 339. *Wagn. Helv.* p. 173. *Sibb. Scot. an.* p. 9. *Klein quadr.* p. 24.

Dorcas. *Charlet. exerc.* p. 12. *Rzacq. Polon.* p. 217.

Chevreuil & Chevette. *Buff. hist. nat.* VI. t. 198. t. 32. 33.

Roe. *Penn. quadr.* p. 53. n. 43.

Rehbock. *Gesn. Thierb.* p. 144. fig. p. 144. 145. *Ridinger jagdb. Th.* t. 9.

Habitat parvis gregibus in Europæ Asiæque silvis minoribus montosis; agilis, cornua deponit autumno, recuperat hieme; prurit Novembris initio; femina non cornuta per 20-22 hebdomadas gravida parit Aprili gemellos. Caro eximia.

Pedes fere 4 longus, 2 1/2 altus. Pili molles, æstate breves supra rufi apicibus griseis, hieme longiores subgrisei, dorso nigricante, subtus albi. Facies nigricans; cornua 6-8 pollicum, tri-raro quadrifurca; crura gracilia; cauda pollicaris.

Muntjac. 12. C. cornibus teretibus pilosis retroverfis trifurcis: apice superiori uncinato. *Schreb. Saeugth.* V. t. CCLIV.

Ribfaced Deer. *Penn. hist. of quadr.* p. 107. n. 50.

Hujus quoque generis esse videntur, an vere diversa a recensitis speciebus? Temamaçame Hernandez. mexic. p. 325. Cuguaca-Apara & Cuguacu-ete Martegr. brasl. 235. Pis. ind. p. 97. fig. p. 98. Biche des bois & Biche des paletuviers Barr. fr. t. 15. Maçames & Cariacou. Buff. zist. nat. XII. p. 317. 347. t. 44.

MAMMALIA PECORA. Camelopardalis. 183

Habitat per exiguas greges in insulis Java & Zeylon, porcini habitu, capreolo paulo minor; a cornibus costæ tres longitudinales ad oculos procedunt. Caro eximia.

- guineen- 7. C. griseus subtus nigricans. *Mus. Ad. Frid.* 1. p. 12.
 sis. Grey Deer. *Penn. quadr.* p. 55. n. 45.
Habitat in Guinea, an vere hujus generis?

CAMELOPARDALIS. Cornua simplicissima pelle
 recta, fasciculo pilo-
 rum nigro terminata,
Dentes primores inferiores
 VIII spatulati extimo
 externe profunde bi-
 lobo.

- Giraffa. 1. C. Schreb. *Saeughth.* V, t. CCLV. *Plin. hist. nat.* VIII. c. 18.
Oppian. cyneg. III, 461. *Gesn. quadr.* p. 160. *Aldrov. bisulc.* p. 927. fig. p. 931. *Jonst. quadr.* p. 98. t. 39. 45.
Charlet. exerc. p. 13. *Raj. quadr.* p. 90. *Pr. Alp. aeg.*
 1. p. 236. t. 14. f. 4. *Ludolfsæth.* 1. c. 10. n. 33. *comm.*
 p. 149.
 Cervus Camelopardalis. *Syst. nat.* XII. p. 92. n. 1. *Haf-
 selq. it. Pal.* p. 203. *ad. Ups.* 1750. p. 15.
 Orasius, Orasius. *Vincent. specul. doct.* 19. c. 97. *Albert.*
de anim. p. 223.
 Giraffa. *Nieremb. hist. nat.* p. 191.
 Camelus indicus, alius camelus, camelus indicus verfi-
 color. *Jonst. quadr.* t. 40.
 Gyraffa. *Bellon. obs.* p. 118. fig. p. 119.
 Giraffe. *Theven. cosmogr.* 1. fol. 388. b. fig. fol. 389. a.
Lobo abiss. 1. p. 292. *Buffon hist. nat.* XIII. p. 1.
 Giraffa. *Klein quadr.* p. 22. *Briss. quadr.* 61.
 Camelpard. *Gesn. Thierb.* p. 236. f. p. 237. 238. *Penn.*
quadr. p. 10. n. 12.
*Habitat in regione Sennar, inter Ægyptum superiorem &
 Æthiopiam, in Æthiopia ipsa Chic a Cosma jam visa) &
 Abissinia rara, rarissima in Africa magis meridional;
 in sylvis frondosis, mitis, timida, celerrima, elegans;
 prona cubat more cameli; gramine pascitur divaricatis
 pedibus anterioribus, vicitans tamen potissimum ar-
 borum foliis.*

MAMMALIA PECORA. Antilope.

Magnitudo cameli mediocris ; color ex albedo & rufo mixtus , maculis numerosis ferrugineis ; caput equinum , auriculis satis parvis ; collum erectum , compressum , ceterum cameli longissimum ; dorsum subconvexum , & ab occipite ad caudam usque jubatum ; cauda teres , lumborum dimidia longitudine , subsfloccosa ; cæura cylindrica , anteriora posterioribus multo longiora , ita ut animal antè 17, postè 9 pedes altitudine æquet.

ANTILOPE. Cornua concava fursum versâ teretia , annulata vel spiralia , persistentia.

Dentes primores inferiores VIII.
laniarum nulli.

leuco-
phæa.

1. A. cornibus recurvatis teretiusculis annulatis , corpore cærulescente. *Pallas misc. zool. p. 4. spicil. zool. I. p. 6. XII. p. 12. Schreber Sæugth. V. t. CCLXXXVIII.*
Blauer Bock. Kolbe Vorgeb. p. 141.
Blue Antelope. Penn. quadr. p. 24. n. 13.
Habitat ad Caput bonæ spei ; cervo dama major , subtus albus ; litura ante oculos pedesque albi ; cauda septem pollicum , apice subsfloccosa , albo ; cornua 20 pollices longa , annulis 20, apice lævi.

Lerwia.

2. A. cornibus recurvis rugosis , corpore rufescente , nucha barbata. *Pallas spicil. zool. XII. p. 12.*
Antilope (Kob) cornibus medio flexis basi annulatis , apicibus maxime approximatis. Erxl. mamm. p. 293. n. 23.
Kob. Buff. hist. nat. XII. p. 210. 267. t. 32. f. 1.
Fish-tall f. Lerwee. Shaw it. I. p. 313.
Gambian Antelope. Penn. quadr. p. 39. n. 34
Habitat in Africa magis boreali , ad fluvios potissimum Gambia & Senegal ; cervi damæ magnitudine ; fasciculo pilorum insigni in nucha , & scopis genuum anteriorum longioribus distincta. Cornua 13 pollicum , annulis 8-9, apice lævi.

Rupicapra.

3. A. cornibus erectis teretibus lævigatis , apice retrorsum uncinatis. *Pallas misc. zool. p. 7. spic. zool. I. p. 4. XII. p. 12. Schreb. Sæugth. V. t. CCLXXXIX.*
Antilope (rupicapra) cornibus erectis uncinatis , corpore supra ferrugineo. Erxl. mamm. p. 268. n. 1.

MAMMALIA PECORA. Antilope.

183

Capra (Rupicapra) cornibus erectis uncinatis. *Syst. nat.*

XII. p. 95. n. 4.

Nircus (Rupicapra) cornibus teretibus erectis rugosis, ad apicem lævibus & uncinatis. *Briss. regn. anim.* p. 66. n. 4.

Αἰξ οἰκίος. *Oppian. cyneg.* II. 338.

Rupicapra. *Plin. hist. nat.* VIII. c. 53. XI. c. 37. *Gensf. quadr.* p. 321. fig. p. 319. *Bellon. obs.* p. 57. *Aldrov. bis.* p. 725. fig. p. 727. *Jonst. quadr.* p. 74. t. 27. 32. *Charlet. exerc.* p. 9. *Wagn. Helv.* p. 183. *Raj. quadr.* p. 78. *Klein. quadr.* p. 17. *Scheuchz. it. alp.* I. p. 155. *Rzacz. Pol.* 223.

Chamois. *Perr. anim.* I. p. 201. t. 29. *Buffon hist. nat.* XII. p. 136. 177. t. 16. *Penn. quadr.* p. 17. n. 10.

Gems. *Gensf. Thierb.* p. 140. *Ridinger jagdb. Th.* t. 12.

Cemas Aeliani & Herodici. *Bochard hierozoi.* L. III. c. 22.

Habitat in alpidibus sabaudicis, valesiacis, helveticis, rhæticis, noricis, carpathicis, græcis, cretenfibus, italicis, delphinatus, pyrenæicis, caucasi, tauri, summis innaccesis gregaria, in dies rarior, viditans ramorum arbusculis, herbis, radicibus, potissimum mei athamantæ, ex quibus etiam ægagropilæ. Kram. austr. 320; *celerima, timida, visu, olfactu, auditu excellit, vocem sibilantem edit; hieme in speluncis rupium latens, coit Octobri & Novembri; & femina Martio & Aprili 2-3 pullos parit. Magnitudo hirci, cruribus tamen longioribus; pili, æstate inprimis, breviores ex rufo fusci, dorso linea nigricante, in fronte, vertice, gula, auricularum interna facie albi; cornua utrique sexui nigra, præter apicem rugosa; pone hæc sinus subcutaneus; labium superius subfissum; genua bartata. Cauda brevis, subtus etiam nigricans. Pellis eximia. Caro sapida.*

Dama. 4. A. cornibus antrorsum incurvis, corpore albo, dorso fasciæque oculari fulvis. *Pallas misc. zoolog.* p. 5. *spicil. zool. Fasc.* I. p. 8. XII. p. 13. n. 4. *Schreber Sæugth.* V. t. CCLXIV.

Dama. *Plin. hist. nat.* VIII. c. 53. XI. c. 37. *Gensf. quadr.* p. 334. *Aldr. bisulc.* p. 729. *Jonst. quadr.* p. 75. t. 27. *Raj. quadr.* p. 83.

Nangueur ou Nanguer. *Buffon hist. nat.* XII. p. 213. t. 32. f. 3. t. 34.

Swift Antelope. *Penn. quadr.* p. 30. n. 22.

Habitat ad Senegal, celerissima, facileque mansuescens, 4 fere pedes longa, 2 cum 8 pollicibus alta, supra fulva,

subtus alba, pectore albo maculato; cornua utriusque sexui, 8 pollices longa; dentes primores in maxilla inferiori tantum 6.

reduñca. 5. A. cornibus antrorsum recurvis, corpore rufescente subhirta. *Pallas misc. zool. p. 5. spicil. zool. I. p. 8. XII. p. 13. n. 5. Schreber Saeugth. V. t. CCLXV.*

Kemas. Aelian. hist. nat. I. 14. c. 4.

Nagor. Buffon hist. nat. XII. p. 326. t. 46.

Red Antilope. Penn. quadr. p. 30 n. 23.

Habitat ad Senegal fluvium, tota fere pallide rufa, 4 pedes longa, 2 pedes cum 3 pollicibus alia; auriculæ 5 pollices, cornua $5\frac{1}{2}$ longa.

Tragoca-melus. 6. A. cornibus antrorsum incurvis, cervice jubata, dorso gibbo, cauda longa floccosa. *Pallas misc. zool. p. 5. spicil. zool. I. p. 9. XII. p. 13. n. 6. Schreber Saeugth. V. t. CCLXII.*

Antilope cornibus in frontem reduncis, corpore supra cinereo, fronte macula rhombea nigra. Erxl. mamm. p. 279. n. 9.

Biggel. Mandelsl. it. I. p. 122.

Quadruped brought from Bengal. Parsons aḍ. angl. n. 476. p. 465. t. 3. f. 9.

Indostan Antelope. Penn. quadr. p. 29. n. 20.

Habitat in India, cameli more procumbens, quem etiam collo æmulatur; 5 circiter pedes alta. Pili in corpore & cauda breves, molles, cinerei, in cauda 22 pollices longa longiores; cornua 7 pollices longa; palæaria tauri cum pilis longioribus.

picta. 7. A. cornibus antrorsum incurvis, cervice colloque jubatis, cauda longa floccosa, pedibus albo nigroque annulatis. *Pallas spic. zool. XII. p. 14. n. 7. Schreber Saeugth. V. t. CCLXIII. A. B.*

Antilope (albipes) cornibus in frontem reduncis, maculis albis supra ungulas. Erxl. mamm. p. 280.

White-footed Antelope. Penn. quadr. p. 29. n. 21. t. 6. f. 1. 2.

Nyl-ghau. Hunter aḍ. angl. Vol. LXI. p. 170. Naturf. VII. p. 236. t. V.

Habitat in India, 4 circiter pedes alta; color obscure griseus, in femina e corni magis in fuscum vergens; cornua breviora; auriculæ magnæ; nigro striatæ; juba nigra;

feminæ pedes supra ungulas fasciis tribus nigris & quabus albis.

- Saiga.** 8. A. cornibus distantibus lyratis pallido-diaphanis, naso cartilagineo ventricoso. *Pallas misc. zool. p. 6. spicil. zool. XII. p. 14. n. 8. p. 21. t. I. & III. f. 6. 9. 10. 11. S. G. Gmelin it. II. p. 174. t. 12. & nov. comm. Petrop. Vol. XVI. P. I. p. 512. Forster ad. angl. LVII. p. 344.*
- Antilope (scythica), cornibus rectiusculis diaphanis, corpore albido. *Pallas spic. zool. I. p. 9. Erxl. mamm. p. 289. Penn. quadr. p. 35. n. 30.*
- Capra (tatarica) cornibus teretibus rectiusculis perfecto annulatis apice diaphanis, gula imberbi. *Syst. natur. XII. p. 97. n. 11.*
- Colus. *Strabo geogr. L. VII. Gese. quadr. p. 893. Jonst. quadr. t. 27.*
- Suhac. *Aldrov. bisulc. p. 763. Charlet. exerc. p. 11. Rzacq. Pol. p. 224. aud. p. 320.*
- Ibex imberbis. *I. G. Gmelin nov. comm. Petrop. V. p. 345. VII. summ. p. 39. t. 19.*
- Saiga. *I. G. Gmelin it. sib. I. p. 212. Buffon hist. nat. XII. p. 198. t. 22. f. 2.*
- Habitat in regionibus Russiæ minoris & Poloniæ, montibus Carpathicis, Danubialibus, Caucasæis, Cerauniis, maribus Pontico, Caspio, & Aralienfi, alpihus Altaicis interpositis desertis, aridis, apricis falsaginosi ad 55^{um} latitudinis gradum, autumno præsertim, gregaria, miræ pernicitatis, brevi tamen fatigata, timida, voce ovis, olfactu acri; junior mansuescens maxime sensibilis; sub finem Novembris coit, tunc mas pro feminis contrahostes pugnât, & austrum versus migrat; femina ecornis, molliori etiam pilo gaudens, ante medium Maji unum utplurimum pullum parit; erecta incedit; habitus minus elegans; sæpe retrograda pascitur, herbasque a latere carpit, oestro infestata, odoris balsamici; aliquando tricornis, raro unicornis; caro vix assata edulis.*

Antilopæ mediæ quasi inter cervos & capras habitu cervino, cornibus caprinis, cystide fellea gaudent, sinibus subocularibus satis insignibus, inguinum cavernis plica septis, scopis genuum, oculis pulcherrimis nigris gaudent, timida, agiles, & celeres, corpore pedibusque utplurimum graciliores, gregaria incedunt sæpe ad aliquot milia; vescuntur potissimum fruticulis; rarius plana & silvas, quam colles incolunt, in America, & Rupicapra Saigaque excepta, in Europa exules, calidiora præsertim Africa & Asia inhabitant. Caro sapias esculenta, alias moschum aut hircum redolet.

Magnitudo damæ ; longitudo 4 pedes excedens ; nares patentissimæ , osse nasali , septoque osseo nullo ; dentes molares utrinque sex ; collum artusque graciles ; vellus æstivum breve lævissimum per dorsum & latera ex griseo lutescens , artubus infra genua saturatius , collo corporeque subtus & artubus interius albi , infra oculos sensim albescens ; hybernium longius ad 2 pollices subhirtum , ex griseo pallidum , extrorsum albidum .

gutturo- 9. A. cornibus lyratis , corpore rufescente , scopis genuum
fa. nullis. *Pallas spic. zool. Fasc. XII. p. 14. n. 9. p. 46. t. II. & III. f. 14-17.*

Antilope. Bellon. it. I. p. 311. 319.

Capra flava. du Halde chin. 2. p. 253. 278. 290.

Capra gutturosa campestris hydrophobos , cornibus non ramolis circellatim undulatis , sinu gemino leniter inflexis. Mefferichm. mus. Petrop. I. p. 336. n. 12.

Caprea campestris gutturosa. I. G. Gmelin nov. comm. Petrop. V. p. 347. t. 9.

Habitat in desertis Mongoliæ , omnibusque inter Tibetum & Sinam ad austrum extensis , gregaria , colles , & pascua sicca , aprica , rupestria amans , plantis modo dulcibus vescens , cursu & saltu vix fatiganda , junior facile mansuescens ; multo serius Saiga prurit , femina demum Junii initio prolem pariente .

Magnitudo & forma cervicapra ; longitudo (maris) 4 pedum & 4 pollicum ; altitudo 2 pedes & 6 pollices excedens ; dentes molares ubique sex ; finus lacrimales minimi ; cornua rugis annularibus circiter 20 ; collum larynge maximo in medio colli fluctuante conspicuum ; loco scoparum in genubus pili vix elongati ; cauda brevis ; cavernæ inguinales maximæ ; color omni ætati idem , æstate supra potissimum ex griseo ferrugineus , subtus albicans ; mari folliculus insignis ad præputii orificium , vacuus , rarius ceruminis specie repletus .

subgutturo- 23. A. cornibus lyratis , corpore supra ex cinerascente brun-
rosa. neo , infra niveo , fascia laterali ex albidio lutescente .

Schreb. Sæugth. V. t. CCLXX. B. Gùldenstedt ad. Petrop. 1778. I. p. 251. t. 9-12.

Habitat in Persia inter mare caspium & nigrum , habitu & magnitudine capreolum simulans , gregaria , artemisa pontica potissimum victuans ; femina parit Maio ; caro sapida . Cornua ultra 13 pollices longa ; apice læ-

via ; caput *laryngis sub cute prominens* ; genua *scopis hirta*.

pygarga. 10. A. cornibus lyratis, collo sanguineo, tergore rufo-canefcente, fascia laterali faturata, clunibus albis. *Pall. spic. zool. I. p. 10. XII. p. 15. n. 10. Schreber Saeugthiere, V. t. CCLXXIII. Sparrmann act. Stockh. 1780. 3. 4.*

Antilope Dorcas. *Pallas misc. zool. p. 6.*

White-faced Antelope. *Penn. quadr. p. 34. f. p. 28.*

Cervicapra. *Houttuyn Linn. ed. belg. III. t. 24. f. 1.*

Mountain-antelope. *Russell alepp. p. 54 ?*

Koba. *Buff. hist. nat. XII. p. 210. 267. t. 32. f. 2 ?*

Habitat in Africa, forsan etiam in citeriore Asia, egregie saliens, hirco major, ut 5 pedes & 4 pollices altitudine æquet ; caro sapidissima ; cornua 16 pollicum, mari annulata, feminae lævia ; auriculae & cauda 7 pollicum ; facies alba.

Dorcas. 11. A. cornibus lyratis, corpore supra fulvo, subtus albo, fascia laterali fusca. *Pallas misc. zool. p. 6. n. 7. spicil. zool. I. p. 11. n. 8. XII. p. 15. n. 11. Schreber Saeugth. V. t. CCLXIX. Sparrm. act. Stockh. 1778. trim. 2. n. 4.*

Capra (Dorcas) cornibus teretibus perfecte annulatis recurvatis contortis. *Syst. nat. XII. I. p. 96. n. 10.*

Hircus (Gazella africana) cornibus teretibus arcuatis, ab imo ad summum fere annulatis, apice tantummodo lævi. *Briss. regn. anim. p. 69. n. 10.*

Gazelle. *Buffon. hist. nat. XII. p. 201. t. 23.*

Gazella africana cornibus brevioribus ab imo ad summum fere annulatis, & circa medium inflexis. *Raj. quadrup. p. 80.*

Aelian. hist. anim. XIV. t. 4.

Dorcas antiquorum, Tzebi biblica. *Shaw it. p. 152. 357.*

Barbarian Antelope. *Penn. quadr. p. 33. n. 26. f. in tit.*

Habitat in Africa, etiam boreali, Arabia, Syria, Dischon Moysis, cervo dama dimidio minor ; cornua 12 pollicum, annulis prope basin circiter 13 ; genua longis pilis hirta, Cauda supra nigra, subius alba.

Kevella. 12. A. cornibus lyratis, majusculis, compressis, tergore fulvescente, strigis pallidis, fascia laterali nigrescente. *Pallas misc. zool. p. 7. n. 9. spicil. zool. I. p. 12. n. 9. XII. p. 15. n. 12. Schreber Saeugth. V. t. CCLXX.*

Ibex capensis ? *Kolb. cap. I. p. 166.*

Ahu, *Kaempf. amæn. p. 408.*

MAMMALIA PECORA. Antilope!

Kevel. *Buff. hist. nat.* XII. p. 258. t. 26.

Flathorned Antelope. *Penn. quadr. p.* 34. n. 27.

Habitat in Africa, ad fluvium Senegal, & Persia, gregaria, facile mansuescens, moschum redolens, parvi capreoli magnitudine; cornua utriusque sexui annulis 14-18; caro, ut pterorumque congenerum, sapidissima.

Corinna. 24. A. cornibus sublyratis rectiusculis tenuibus lævigatis, corpore fulvescente subtus albo, fascia laterali capitis fusco-alba. *Pallas. misc. zool. p.* 7. n. 10. *spic. zool. I. p.* 12. XII. p. 15. n. 12. β. *Schreber Sæugth. V. t.* CCLXXI.

Habitat in Africa, capreolo minor; cornua gracilia, 6 pollicum, rugis circularibus annulata, an femina Kevelæ, cum qua colore moschato, summaque agilitate & velocitate convenit?

Bubalis. 13. A. cornibus crassis lyrato-contortis rugosis, apice directis, capite caudaque elongatis. *Pallas spic. zool. I. p.* 12. n. 10. XII. p. 16. n. 13.

Antilope cornibus medio flexis spiralibus, faciei linea nigra. *Erzleb. mamm. p.* 291.

Antilope Bufelaphus. *Pallas misc. zool. p.* 7.

Βουβαλός. *Oppian. cyneg. II. p.* 300. *Aristot. de part. anim. L. III. c.* 2.

Bubalus. *Plin. hist. nat. VIII. c.* 15. *Gesn. quadr. p.* 330.

Aldrow. bisulc. p. 363. 365. 735. *Jonst. quadr. p.* 52.

Bubalus antiquorum, Yachmur biblicus. *Shaw it. p.* 151. 358.

Bufelaphus Caji. *Gesn. quadr. p.* 121. *Raj. quadr. p.* 81.

Cervus Temamacama. *Seb. mus. I. p.* 69. t. 42. f. 4.

Capra Dorcas. *Houttuyn ed. Linn. belg. p.* 213. t. 24. f. 3.

Hartebeest. *Sparrmann ad. Stockh. 1779. 2. n.* 4. t. 5. f. 3. sup.

Vache de Barbarie. *Ad. parif. I. p.* 205. *Valent. amphith. zoot. p.* 88. t. 14.

Bubale. *Buffon hist. nat. XII. p.* 294. t. 37. 38. f. 1. 2.

Cervine Antelope. *Penn. quadr. p.* 37. n. 32.

Habitat in Africa, præsertim boreali, & Arabia; gregaria; caro tenera, sed sicca.

Altitudo 4 pedum; habitus corporis inter cervinum & vacinum intermedius; caput bovillum; cornua robusta nigra ad 20 pollices longa; cauda pedalis, floccosa, asinina

- Gau.** 25. *A. cornibus* basi antrorsum, versus medium retrorsum ver-
fis, corpore ferrugineo, cervice jubata cauda ex albo
cinerea. *Sparrm. ad. Stockh. 1779. I. n. 7. t. 3. Penn.*
hist. p. 62. n. 16.

*Habitat in planitiibus Africae pone Caput bonæ Spei a ma-
gnis Namaïquas occupatis, gregaria, ferox, cornibus
pugnans, habitu caudaque equinis, capite bovillo, femo-
ribus cervinis, pilis & sinibus lacrymalibus antilopes.*
*Altitudo 3 ½, longitudo aliquando 6 ½ pedes superans. Cor-
nua nigra in utroque sexu, 5 pollicibus pedem superantia.*
Color obscure fuscus; pedoris niger; jubæ cinereus.
Caro sapida.

- Oryx.** 14. *A. cornibus* rectissimis subulatis argute rugosis, corpore
griseo, striga dorsali nigricante, pilo postico contrario.
Pallas spic. zool. XII. p. 16. n. 14. & p. 61. Schreb.
Saewgthiere, V. t. CCLVII.

*Antilope (recticornis) cornibus teretibus rectissimis, basi
annulatis. Erxl: mamm. p. 272. n. 3.*

Antilope bezoartica. Pallas miscell. p. 8. spicil. zool. I.
p. 14.

Antilope recticornis. Pallas nov. comm. Petrop. XIII. p.
468. t. 10. f. 5.

*Capra (Gazella) cornibus teretibus longissimis: basi annula-
tis. Syst. nat. XII. 1. p. 96. n. 7. Briss. quadr. 67.*

Oryx. Agatharch. peripl. Plin. hist. nat. II. c. 40. VIII.
c. 33. X. c. 73. Columella rust. IX. c. 1. Martial. epigr.
I. 13. Macrob. saturn. l. 3.

*Gazella indica, cornibus rectis longissimis nigris, prope
caput tantum annulatis. Raj. quadr. p. 79.*

Capra Gazella africana. Hasselq. it. p. 283.

Pagan. Buff. hist. nat. XII. p. 212. t. 33. f. 3.

Ægyptian Antelope. Penn. quadr. p. 25. n. 14.

*Habitat ad Caput bonæ Spei, in Ægypto, Arabia, Indiæ
in planis, Zebi scripturæ sacre, magnitudine cervi
damæ, subtus alba, cornibus tripedalibus, cauda pedali
apice nigra.*

- Oreotra-** 26. *A. cornibus* rectissimis subulatis, basi parum rugosis,
gus. capite rufo, corpore ex flavo virescente subtus ex
albo cinereo, cauda brevissima. *Schreber Saewgth. V.*
t. CCLIX.

Habitat in Africa.

- Gazella.** 15. A. cornibus subulatis subarcuatis rugosis. *Pallas spicil. zool.* XII. p. 17. n. 15.
 Capra (bezoardica) cornibus teretibus arcuatis totis annulatis, gula barbata. *Syst. nat.* XII. p. 96. n. 9.
 Hircus cornibus teretibus arcuatis, ab imo ad summum fere annulatis. *Briss. quadr.* 69. n. 10.
 Hircus bezoardicus. *Aldrov. bisulc.* p. 756. *Major Ephem.* N. Cur. Dec. I. a. 8. p. 1. t. 1. *Mus. Bresl.* t. 10. f. 3. 4.
Valent. mus. muscor. ed. germ. I. p. 193. t. 36. f. 2. 4.
 Animal bezoarticum. *Raj. quadr.* 80.
Gazella. *Bell. obs.* 120. *Pr. Alp. ægypt.* p. 232. t. 14.
 Bezoar-Antelope. *Penn. quadr.* p. 26. n. 15.
 Animal ignotum. *Gesn. quadr.* p. 309. ic. p. 38.
Algazel. Buff. hist. nat. XII. p. 211. t. 33. f. 1. 2.
Habitat in India, Persia, ipsa boreali, Ægypto & Æthiopia, gregaria, colles celerrime adscendens, facile cicuranda, colore rufo, pectore albo, fugacissima, autumnopruriens, vere pariens. In hujus non raro, frequentius in maris & adulti abomaso bezoar genuinum orientale, virens & cærulescens, in patria sua odoratissimum, & quam maxime aromaticum.
- Leucoryx.** 16. A. cornibus subulatis rectis convexe annulatis, corpore lacteo. *Pallas spicil. zool.* XII. p. 17. n. 16.
 Oryx. *Oppian. cyneg.* II. vers. 445.
 Gazellæ indicæ cornu singulare. *Nov. comm. petrop.* XIII. p. 470. t. 10. f. 5.
 Antelope Leucoryx. *Penn. hist.* p. 68. t. 20.
Habitat in insula sinus Bassorici Gow Bahrein; nivea, faciei modo media parte, genis & artubus rubicundis. Nasus vaccinus; cornua longa, acuta, nigra, gracilia; cauda subfloccosa.
- Orcas.** 17. A. cornibus subulatis rectis carinato-contortis, corpore griseo. *Pallas spicil. zool. Fasc.* XII. p. 17. n. 17. *Schreber Sæugth.* V. t. CCLVI.
 Antelope Oryx. *Pallas misc. zool.* p. 9. *spicil. zool. Fasc.* I. p. 15.
 Mazame. *Seba mus.* I. p. 69. t. 42. f. 3.
 Africanisches Elendthier. *Kolb. Vorgeb. der gut. Hofn.* I. p. 145. t. 3. f. 1.
 Coudou. *Buff. hist. nat.* XII. p. 357. t. 46. b. 47.
 Indian Antelope. *Penn. quadr.* p. 26. n. 16.
 Eland. *Sparrm. ad. Stockh.* 1779. 2. n. 5. t. 5. fig. inf.

Habitat in Indiæ, Congo & Africæ meridionalis alpestribus, ut plurimum gregaria, parum pernix. Caro sapidissima; ex cornibus fistulas tabacarias faciunt Hotentottæ.

Altitudo 5-8 pedum; cornua ad 2 pedes longa, in utroque sexu ex atro fusca; corpus ex cærulescente cinereum, juba cervicis dorsique nigra; caput rubicundum; cauda subfloccosa apice nigra; sinus lacrymales nulli.

- Scripta.** 18. A. cornibus subulatis rectis contortis, corporis strigis albis decussatis. *Pallas misc. zool. p. 8. n. 14. spicil. zool. I. p. 15. XII. p. 18. n. 18. Schreb. Sæugth. V. t. CCLVIII. Guib. Buff. hist. nat. XII. p. 305. 327. t. 40. 41. f. 1. Harnessed Antelope. Penn. quadr. p. 27. n. 17. Habitat gregaria in campestribus & silvis, fluvio Senegal adjacentibus; color castaneus; pedum digiti albo-maculati; cauda 10, cornua 9 pollices longa.*

Grimmia. 19. A. cornibus conicis compressis rectissimis rugoso-friatis, hinc detritis, fossa suboculari atra. *Pallas misc. p. 8. 10. t. 1. 3. 4. f. 3. a. b. spic. zool. I. p. 38. t. 3. XII. p. 18. n. 19. Schreber Sæugth. V. t. CCLX.*

Antilope cornibus rectis basi subannulatis, inter cornua fasciculo tophoso. Erxl. mamm. p. 276. n. 7.

Moschus (Grimmia) capite fasciculo tophoso. Syst. nat. XII. I. p. 92. n. 2.

Tragulus (africanus) in medio capite fasciculum pilosum erectum gerens. Briss. regn. anim. p. 97. n. 4.

Capra (Grimmia) capite fasciculo tophoso, cavitate infra oculos. Syst. nat. II. p. 51. VI. p. 14. n. 10. X. I. p. 70. n. 10.

Capra silvestris africana. Grimm misc. nat. curios. dec. 2. a. 4. p. 131. f. 13. Raj. quadr. p. 80. Klein quadrup. p. 19.

Grimme. Buffon hist. nat. XII. p. 307. 329. t. 41. f. 2. 3. Guinea-Antelope. Penn. quadr. p. 27. n. 18.

Habitat in Guinea, magnitudine pulli bimestris cervi damæ; supra cinereo flavoque admixto fusca, subtus alba; cornua (femina nulla) nigra, 18 pollices longa, basi longitudine 3 pollicum leviter annulata. Cauda brevis, supra nigra.

pygmæa. 20. A. cornibus conicis brevibus convexis basi rugosis. *Pallas spic. zool. XII. p. 18. n. 20.*

Der Hirsche ihre Koenige. Boissm. guin. p. 252.

MAMMALIA PECORA. Antilope.

Cervus juvencus perpallidus. Seb. mus. 1. p. 70. t. 43. f. 3. Guevei-Cajor. Adanson apud Buffon hist. nat. XII. t. 43. f. 2.

Royal Antelope. Penn. quadr. p. 28. n. 19.

Habitat in Africa torrida; agilissima, 12 pedum altitudine saliens, mitis, 9 pollices altitudine non superans, ex rubicundo fusca. Cornua nigra, gagatæ ad instar lucida, 2 pollices longa, femina nulla.

Sylvatica. 27. A. cornibus subspiralibus annulatis carinatis, apice lævibus acutis, corpore supra fusco, postice albo-maculato, infra potissimum albo. *Spærm. aḡ. Stockh. 1780. 3. n. 7. t. 7. Schreb. Sæugth. V. t. CCLVII. B.*

Habitat pone Caput bonæ spei in silvis, scriptæ aliquantum affinis, sed minor, ut tres pedes altitudine vix superet, monogama, Cornua 10½ - 13 pollices longa, nigra, femina nulla; collum dorsumque subjugatum. Caro esculenta.

Strepticeros. 21. A. cornibus spiralibus carinatis subrugosis, corpore strigis transversis & spinali albis. *Pallas misc. zool. p. 9. spic. zool. I. p. 17. XII. p. 19. 67. Schreber Sæugthiere, V. t. CCLXVII.*

Cervus capensis. Collini aḡ. ac. Theod. Palat. I. p. 487.

Strepticeros. Gefn. quadr. p. 295. 323. ic. 31. Jonst. quadr. p. 54. t. 24.

Bos strepticeros. Aldr. bis. p. 368. f. p. 369.

Animal anonymum. Houttuyn. syst. nat. ed. belg. III. t. 26. f. 1. 2.

Condoma. Buff. hist. nat. XII. p. 301. t. 39. f. 1. 2.

Striped Antelope. Penn. quadr. p. 31. n. 24.

Africanischer Kudu. Knorr delic. II. t. K. 5. f. 1. 4. K. II.

Habitat ad Caput bonæ spei, 9 pedes longa, 4 alta; corpus gracile & griseo rubens; subtus griseum; collum jugatum; pectus cristatum; facies nigricans, lineis duabus albis; cornua pallide fusca, 3 pedes & 9 pollices longa; cauda 2 pedum, supra fusca, subtus alba, apice nigra.

Cervica. 22. A. cornibus spiralibus teretibus annulatis, corpore fulvescente adumbrato. *Pallas misc. zool. p. 9. spic. zool. I. p. 18. 19. t. 1. 2. XII. p. 19. n. 22. Schreber Sæugth. V. t. CCLXVIII.*

Antilope cornibus spiralibus annulatis, corpore supra fusco subtus albo. Erzt. mamm. p. 383. n. 15.

Anti-

MAMMALIA PECORA. Antilope.

193.

Antilope, & Antilope des Indes. *Buff. hist. nat.* **XH.**
p. 215. 217. t. 35. 36. fig. 1. 2.

Capra (Cervicapra) cornibus teretibus dimidiato-annulatis
flexuosis contortis. *Syst. nat.* **II.** p. 50. **VI.** p. 14. n. 7.
X. 1. p. 69. n. 8. **XII.** 1. p. 96. n. 8.

Hircus (Gazella) cornibus teretibus dimidiato-annulatis
bis arcuatis. *Briss. quadr.* 68. n. 8.

Capra bezoartica. *Aldrov. bis.* p. 256. *Olear. mus. gott.*
p. 13. t. 9. f. 7.

Strepticeros & Addax. *Plin. hist. nat.* **XI.** c. 37.

Gazella. *Jonst. quadr.* t. 29. *Añ. Paris.* 1. p. 84. *Valent.*
amphith. 700t. p. 105. t. 19. *Scheuchz. bibl. sac.* **IV.**
t. 576.

Gazella africana s. Antilope. *Charlet. exerc.* p. 67. *Raj.*
quadr. p. 79. n. 4. *Grew. mus.* p. 24.

Tragus Strepticeros. *Klein quadr.* p. 18.

Lidmee arabum. *Shaw. trav.* p. 243.

Common Antelope & brown common Antelope. *Penn.*
quadr. p. 32. n. 25.

Habitat in Africa magis boreali, & India, cerva dama paulo minor; cauda brevis, supra nigra, subtus alba; caput nigricans, orbitis albis, ore fusco; cornua erecta nigra, ut plurimum fere tota annulata, apicibus 16 pollices distantia, 14 circiter pollices longa, feminae uniparae per 9 menses gravidæ nulla.

30. CAPRA. Cornua concava sursum versa, erecta.
compressa, scabra.

Dentes primores inferiores VIII.
laniarii nulli.

Mentum barbatum.

Ægagrus. 1. C. cornibus carinatis arcuatis, gula barbata. *Pallas spicil.*
zool. **XI.** p. 45. t. 5. f. 2. 3. *S. G. Gmelin it.* **III.** p. 493.

Capricerva. *Kaempf. amœnit. exot.* p. 398. t. 4. n. 1.

Steinbok. *Ridinger jagdb. Th.* t. 11.

Chèvre sauvage. *Tavernier it.* 2. 143.

Caucasian ibex. *Penn. hist.* p. 52. n. 14.

Hircus. β. C. cornibus carinatis arcuatis. *Syst. nat.* **XII.** p. 94. n. 1.
Fn. suec. 44. *Forster añ. angl.* **LVII.** 344.

Hircus cornibus interioribus cultratis exterioribus rotundatis, infra
carinatis arcuatis. *Briss. regn. an.* p. 62. n. 1.

Tragus domesticus. Klein quadr. 15.

Capra domestica. Sloan. jam. 2. p. 328.

Hircus domesticus. Charlet. exerc. p. 9.

Caper hispanicus. Jonst. quadr. t. 26.

Capra, hircus, hoedus. Plin. hist. nat. VIII. c. 50. Gestn. quadr. p. 270. 301. f. 302. 314. Aldrov. his. p. 619. fig. p. 635. Jonst. quadr. p. 65. t. 26. 27. Sibb. Scot. an. p. 8. Raj. quadr. p. 77. Rzacz. Pol. p. 239. Schwenckf. theriotr. p. 97. 98. 100. 101.

τράγος & αιγίς. Aristotel. hist. anim. V. c. 11. VI. c. 15.

VIII. c. 13. IX. c. 4. Oppian. cyneg. II. 326.

Bouc & Chevre. Buff. hist. nat. V. p. 59. t. 8. 9.

Geyls & Bock. Gestn. Tierb. p. 127. fig. p. 128. 135.

Domestic goat. Penn. quadr. p. 14.

angorensis. γ. C. pilis longissimis crispis toto corpore vestita. *Briss. regn. an. p. 64. n. 2.*

Αἰξ ἢ λύμα. Ælian. an. XVI. c. 30.

Capra angorensis. Hasselq. it. 206. Olear. mus. t. 10. f. 2. Forster act. angl. LVII. p. 344.

Chevre d'Angora. Tournes. it. 2. p. 185. Buffon hist. nat. V. p. 71. t. 10. 11.

Angora goat. Penn. quadr. p. 15.

mambrica. δ. C. cornibus reclinatis, auribus pendulis, gula barbata. *Syst. nat. XII. p. 95. n. 3.*

Capra syriaca cornibus minimis erectis, parumper retrorsum incurvis, auribus longissimis pendulis. Briss. regn. an. p. 72. n. 13.

Capra indica, & Capra indica aut mambrina, aut syriaca potius. Gestn. quadr. p. 1097. 1098.

Capra auribus oblongis. Pr. Alp. ag. 1. p. 229.

Capra auribus demissis. Aldr. bisulc. p. 769. f. p. 768.

Capra mambrina; indica & mambrina syriaca. Jonst. quadr. p. 81. t. 26.

Capra mambrina s. syriaca Gesneri. Raj. quadr. p. 81.

Geyssen mit hangenden Ohren. Rauwolf it. 3. p. 26.

Chevre mambrine ou chevre du Levant. Buffon hist. nat.

XII. p. 152. 154.

Other kind of goats. Russel. alepp. p. 51.

Syrian Goat. Penn. quadr. p. 15. t. 5. f. 1. 2.

Angorensia animalia: Capra, Ovis, Caprus, Lepus, cur lanata pilis longioribus, tenerioribus, mollioribus?

depressa. 1. C. cornibus depressis incurvis minimis cranio incumbenti-
bus. *Syst. nat.* XII. 1. p. 95. n. 5.

Hircus (Capra parva americana) cornibus depressis incurvis
minimis cranio incumbenti-*bus. Briss. regn. an. p. 65. n. 4.*

Autre petite chevre à cornes rabattues, Bouc d'Afrique,
Chevre naine. *Buff. hist. nat.* XII. p. 154. t. 18. 19.

African goat. *Penn. quadr. p. 16.*

reversa. 2. C. cornibus erectis apice recurvis. *Syst. nat.* XII. 1. p. 95.
n. 6.

Ibex parvus americanus. *Briss. regn. an. p. 65. n. 5.*

Petite chevre à cornes droites & recourbées à la pointe;
Bouc de Juda; Chevre de Juda. *Buffon hist. nat.* XII.
p. 154. 186. t. 20. 21.

Whidaw. goat. *Penn. quadr. p. 16.*

Capricornus. 3. C. cornibus brevibus apice antrosum versus ad latera
annulatis.

Capricorne. *Buff. hist. nat.* XII. p. 146. t. 15.

Capricorne Goat. *Penn. quadr. p. 16.*

Habitat ferus in Caucasii Taurique præsertim, in aliis etiam
Persiæ; Indiæ; Japoniæ; forsan quoque Candiæ, Afri-
cæ, ipsiusque Europæ alpebus inferioribus, cervum agi-
litate, aliquantum etiam habitu simulans, varietatibus
omnibus major, cornibus femina quidem nullis aut exi-
guis, at mari longe majoribus, robustis, raris, ex fusco
cinerascens; cervice artubusque robustissimis; capite
crasso duro; arunco insigni castaneo, sinu ante oculos mi-
nuscule antroque inguinali nullo, cauda brevissima atra;
colore ex griseo vel cinereo rufescente, linea spinali ni-
gra; vellere hirsuto; ventriculo bezoar continente; β) hospi-
tatur per omnem Europam, & reliquas telluris partes,
visitans ramulis arborum frondibusque variis, licheni-
bus, ipsa cicuta; euphorbiis aliisque impune venenatis &
medicatis; loca montosa amat, albo nigroque colore va-
riat, ætatem 10-12 annorum assequitur, raro e cornis
aut quadricornis; ferus iterum factus ex cicure in insula
Juan Fernandez reperiri fertur; pecus insidum, petulans,
bellicosum, saliens, salax; capra per 3 menses gravida I
aut 2 rarius 3-4 hædos pariente; hircum olens, frigoris
impatiens; arbores decorticans; corio tenaci indutum,
lana caprina tectum; lacte, quoque & caseo utile. γ) hos-
pitatur circa Angoram, lana ad pedes dependente nivea,
ferici æmula, camelina dicta; cornua torta ad latera
protrahenda, ut ovibus hispanicæ; auriculæ planæ lanceola-

æ, declinata, nec erecta canaliculata. δ) habitat in Syria, hirco paulo major, cornibus nigris, pilis fulvis. γ) habitat in Africa, culta hodiernum in America meridionali hædi magnitudine, pilis longis pendulis, cornibus triangulis lunatis crassis vix digitum longis, cranio ita appressis, ut cutem fere perforent. ζ) habitat in regno africano Juda, hædi annui magnitudine, pilis brevibus cervinis, cornibus vix digitum longis, cum 1 coiens.

Ibex.

2. C. cornibus supra nodosis in dorsum reclinatis, gula barbata. *Briss. regn. an. p. 64. n. 3.*

C. cornibus lunatis rotundatis, supra rotundatis in dorsum reclinatis. *Erxl. manim. p. 261. n. 2.*

Capra (alpina) cornibus longissimis subtriangularibus supra nodosis, in dorsum reclinatis. *Girtanner apud Lichtenberg Magazin IV. 2. p. 30.*

Ibex alpium sibiricarum. *Pallas spic. zool. XI. p. 31. t. 3. & V. f. 4.*

Ibex. *Plin. hist. nat. VIII. c. 53. Gesn. quadr. p. 331. & 1099. Aldrov. bisf. p. 730. f. p. 732. Jonst. quadrup. p. 75. t. 25. 28. Charl. exerc. p. 10. Wagn. Helvet. p. 176. Raj. quadr. p. 77. Klein quadr. p. 16.*

Hirci feri quoddam genus. Cretæ familiare. *Bell. obsf. p. 20.*

Bouquetin. *Buff. hist. nat. XII. p. 136. t. 13.*

Wild Goat. *Penn. quadr. p. 13. n. 9.*

Steinbock. *Gesn. Thierb. p. 148. Knorr delic. II. t. K. 5. f. 2.*

Habitat in Camtschaticis, sibiricis, arabicis, cretensibus, italicis, penninis, helveticis, rhæticis, noricis (in posterioribus hodiernum in dies rarior) alpibus præruptis inaccessis, gregarius, agillimus, perniciosissimus, saliendo dextrinimus, junior cicurandus; femina 1-2 hædos pariente; ægagro major, mare tamen feminam superante, cui etiam aruncus & cornua minora, mammae duæ.

Caput breve, rostro crasso compresso; oculi minusculi; cornua vassissima, aliquando tripedalia, 8-10 libras ponderantia, infra rotundata, magis quam Ægagro arcuata, carinata, ex griseo nigricantia. Crura gracilia; caudabrevis, subius nuda, supra & apice atra; pili corporis longi, fulvi vel cani, in junioribus sordide grisei, dorsali linea nigricante, macula magna atra supra & infra

Capra cornibus digladiant. montesa amant; an vere genere diffinā ab ovis?

genua anteriora, quæ ceterum alba. Pellis tenuis. An
sibiricus specie diversus?

caucasica. 3. C. cornibus retrorsum & extrorsum arcuatis, apice denno
introrsum vergentibus obsolete triquetris antice nodosis.
Güldenstedt ad. Petrop. 1779. P. 2. p. 273. t. XVI. XVII.
Habitat in Caucasi summis jugis schistosis nudis, circa sum-
mas origines fluviorum Terek & Cuban, in Cachetia
quoque & Ossetinæ tractu, Novembri (nunquam cum
capra domestica) coiens & Aprili pariens.

Cornua mari, quam hirco longa majora per arcum 28
pollicum, feminae tanto minora; huic ex griseo fusca,
illi sordide nigra. Color animalis supra ex brunneo
cervinus, subtus albidus, extremitatibus nigris, fascia
spinali angusta fuscescente; pili basi cinerei, rigidiusculi,
lanugine cinerea interposita; magnitudo hirci, habitus
tamen latior & brevior.

31. OVIS. Cornua concava retrorsum versa intorta rugosa.

Dentes primores inferiores VIII.
laniarii nulli.

Aries. 1. O. cornibus compressis lunatis. *Fa. suec. 45. Amæn. ac.*
IV. p. 169.

Aries laniger cauda rotunda brevi. *Briss. regn. an. p. 74.*
n. 1.

Ovis domestica, cujus mas aries dicitur, foetus agnus. *Sloane*
jam. 2. p. 328.

Ovis domestica *Raj. quadr. p. 73.*

Περὶ θηρίων. Aristot. hist. anim. V. c. 11. VI. 19. VIII. c. 13.
IX. c. 4. Ælian. anim. VII. c. 27.

Pecus, Aries, Ovis, Vervex, Agnus. *Plin. hist. nat. VIII.*
c. 47. 48. Gesn. quadr. p. 872. 912. 925. 927. Aldrov.
bisulc. p. 370. Jonst. quadr. p. 54. t. 22. Charlet. exerc.
p. 8. Sibb. Scot. an. p. 8. Rcacz. Polon. p. 242. Schwenckf.
theriotr. p. 56. 60.

Brebis & Belier. *Buffon hist. nat. V. p. 1. t. 1. 2.*

Ram. *Penn. quadr. p. 10. n. 8.*

Schaaf, Widder, Hammel, Lamb. *Gesn. Thierb. p. 320.*
321. 327. 329.

anglica. α. O. mutica, cauda scrotoque ad genua usque pendulis.

Ovis anglicana. *Amæn. a. a. l. IV. p. 174.*

Hornless Sheep. *Penn. hist. p. 34. C.*

- rustica. β . O. cornuta, cauda lanæque brevior, hac rigidior.
Ovis rustica. Amæn. ac. IV. p. 174.
Ovis brachyura; Ovis rustica. Pallas spic. zool. XI. p. 59. 61.
- hispanica. γ . O. cornuta, cornuum spiræ extrorsum tracta, lana molliore, copiosior.
Ovis hispanica. Amæn. acad. IV. p. 174.
- polycerata. δ . O. e. Gotlandia 248. *Pall. spic. zool. XI. t. 4. f. 1. c. f. 2. b. t. 3. f. 5.*
Ovis polycerata. Amæn. ac. IV. p. 174.
Ovis sexcornis & tricornis. Aldr. bisulc. p. 397.
Brebis à plusieurs cornes, Béliet d'Islande; Brebis d'Islande. Buffon hist. nat. XI. p. 354. 387. t. 31. 32.
Many-horned Sheep. Penn. quadr. t. 3. f. 2. 3.
- africana. ϵ . O. pilis brevibus.
Ovis africana. Amæn. acad. IV. p. 173. Raj. quadrup. p. 75.
Aries pilosus, pilis brevibus vestitus. Briss. regn. an. p. 76. n. 4.
Ovil africana, pro vellere lanoso pilis brevibus hirtis vestita. Sloan. jam. 2. p. 328.
Ovis æthiopica. Charlet. exerc. p. 9.
- guineensis. ζ . O. auribus pendulis, palearibus laxis pilosis, occipite prominente. *Syst. nat. XII. 1. p. 98. n. 2.*
Aries (Ovis guineensis) pilosus, pilis brevibus vestitus, juba longissima, auriculis longis pendulis. Briss. regn. an. p. 77. n. 5.
Aries guineensis f. angolensis. Marcgr. bras. p. 234. Jonst. quadr. t. 46. Klein quadr. p. 14.
Ovis guineensis f. angolensis Marcgravi. Raj. quadr. p. 75. Sloan. jam. 2. p. 328.
Adim-mayn. Marmol. afr. 1. p. 59.
Moutons. Adens. Seneg. p. 37.
Moutons de Guinée. Des Marches it. 1. p. 129.
Béliet du Sénégal, Béliet des Indes, autre Béliet des Indes, Brebis des Indes. Buffon hist. nat. XI. p. 359. 392. t. 34-36.
Sheep of Sahara. Shaw. it. p. 241.
African sheep. Penn. quadr. p. 12.
- latiaquidatæ. η . O. arabica platyura. *Russ. alepp. 51. t. 52.*
Ovis arabicus. Alian. anim. X. c. 4.
Arabia oves. Aldrov. bisulc. p. 404. f. p. 405.
Ovis turcica. Charlet. exerc. p. 9.

Ovis cauda obesa. *Ludolf æth. I. c. 10. n. 14.*

Ovis laticauda. *Raj. quadr. p. 74.*

Aries f. ovis. *παραρκεσιν* orientalis. *Klein quadr. p. 14.*

Ovis laticauda, platyceros f. arabica. *Amæn. ac. IV. p. 173.*

Ovis laticauda. *I. G. Gmelin nov. comm. Petrop. V. p. 343. t. 8.*

Aries (ovis laticauda) laniger, cauda latissima. *Briff. regn. an. p. 75. n. 2.*

Ovis steatopyga, Aries kirgificus. *Pall. spic. XI. p. 63. t. 4. f. 1. 2. a. b.*

Moutons de Barbarie ou à grosse queue. *Chardin it. 3. p. 37.*

Mouton de Barbarie, mouton d'Arabie. *Buff. hist. nat. XI. p. 355. t. 33.*

Broad-tailed sheep. *Shaw it. p. 241. Penn. quadr. p. 4. t. 1.*

Schaaff, deren Schwaentz gar feißt. *Rauwolf it. 3. p. 26.*

Arabisches Schaaf. *Gesn. Thierb. p. 326.*

Die hiesige Schaafe. *Osb. Ostind. p. 188.*

buchari- 3. O. auriculis magnis pendulis, pulvinari adiposo minore,
ca. *Pallas spic. zool. XI. p. 78.*

longi- 1. O. cauda longissima.

cauda. Alterum genus. *Raj. quadr. p. 74.*

Ovis arabica. *Jonst. quadr. t. 23.*

Aries (ovis longicauda) laniger, cauda longissima. *Briff. regn. an. p. 76. n. 3.*

Ovis dolichura five tscherkessica. *Pall. spic. zool. XI. p. 60.*

Schaaffe. *Olear. it. p. 567.*

Ein ander arabisch Schaaff. *Gesn. Thierb. p. 326.*

capensis. x. O. auriculis magnis pendulis, cauda magna ex adipe vix prominente.

Cape-sheep. *Penn. quadr. t. 4. f. 2.*

Hospitatur in omni tellure, sicca, salsa, aprica, calida amat, stupidissimum & maxime imbecille forte omnium quadrupedum, anno secundo jam adolescens, annorum 14 ætatem vix superans, ætate dentes mutans, parum brabeus, balans, timidum minatur hosti calcitrando mingen-
doque, pellit eum arietando; comedit in primis festucam ovinam, in arvis bursam pastoris, læditur a pruno spinosa, equifeto, ranunculo, flammula, antherico ossifrago, kalmia, myosotide palustri, anemone nemorosa; in-

MAMMALIA PECORA. Ovis.

festatur hippobosca ovina, pediculo ovis, astro ovis, atzoricino, fasciola hepatica, hydatide in cerebro nidulante, laborat hinc vertigine, hepatitide, ictero, phthisi, hydrope, scabie, variolis; aries unus sufficit 20 ovisibus, quæ per 23 hebdomades gravidæ, 1, 2 raro 3 agnos pariunt. α) vulgaris per Angliam, maxima in provincia Lincolnshire; β) vulgarissima per omnem Europam, maxime borealem, lana rigidiore, brevior, minus crispa, cornibus spiraleriter retortis, introrsum angulatis planis, apice complanatis, aliquando nullis; oculis subcæruleis glaucis in prominentia syncipitis ovali, pupilla oblonga, cavitate ante canthum anteriorem profunda glutem secernente, caudæ terete, genua non attingente; velleris color plerumque albus, aliquando niger aut maculatus. γ) vulgatiores in Hispania, ex qua etiam in alias Europæ partes delata, cornuum spiræ extrorsum dilatata; δ) in Islandia terrisque borealibus crebro occurrit, neque inter numerosas nomadum tataricarum greges infrequens, cornibus 3, 4, 5, 6, intermedio, aut intermediis erectis, exterioribus extrorsum revolutis, cauda plerumque brevi, & lana duriuscula brevi. ε) in Africa, ζ) similiter in deserto Saharæ & Guinea obvia, in Americam quoque translata, colore varia, magnitudine rusticam æquans, cornibus parvis, deorsum usque ad oculos incurvatis, cauda genua attingente. η) frequentissime alba, aliquando atra, brunnea, maculata, rarius cana, hospitatur inter gentes nomadicas Asiæ fere omnes, præsertim Kirgisos, porro in Persia, Sina, omni Oriente, Syria, Arabia, Ægypto, caudæ loco, cujus nihil fere superest, nisi coccyx, pulvinari adipis crassissimo, 30 aliquando libras pondere superante instructa. θ) Bucharis domestica, hybrida, ut videtur, ex η & ι, cauda oblongata, depressa, pingui, subtus nuda, apice tenui, lanato, vellere lacteo, atro, cano, & ex albo argenteo pretiosissimo, in Persia quoque, Syria, Palæstina, variisque Africæ regionibus obvia. ι) in Capite bonæ spei culta.

Ammon. 2. O. cornibus arcuatis semicircularibus subtus planiusculis, palæaribus laxis pilosis. *Erxl. mamm. p. 250. n. 2.*

Capra (Ammon) cornibus arcuatis semicircularibus subtus planiusculis, palæaribus laxis pilosis, gula imberbi. *Syst. nat. XII. 1. p. 97. n. 12.*

Hircus (Capra orientalis) cornibus supra rotundatis, infra planis, semicirculum referentibus. *Briss. regn. an. p. 71. n. 12.*

Mufmon & Ophion. *Plin. hist. nat. VIII. c. 49. XXVIII. c. 9. & 15.*

Mufmon f. Mufimon. *Gefn. quadr. p. 934.*

Tragelaphus. *Bellon obs. p. 54.*

Mufimon & Tragelaphus Bellonii. *Raj. quadr. p. 75. 82.*

Tragelaphus, Mouffon. *Klein quadr. p. 20.*

Kameuni Barani oder Mufimons. *Steller Camtschatc. p. 127.*

Stepnie Baranni. *I. G. Gmelin it. fibir. 1. p. 368.*

Rupicapra cornibus arietinis. *I. G. Gmelin nov. comm.*

Petrop. IV. p. 388. summ. p. 53. t. 8. b. f. 2. 3.

Ovis fera fibirica, vulgo Argali dicta. *Pall. spic. zool. XI.*

p. 3. t. 1. 2.

Mouffon. *Buff. hist. nat. XI. p. 352. t. 29. Cetti flor. nat. of Sard. 1. t. 3.*

Siberian goat. *Penn. quadr. p. 18. n. 11.*

Das wilde Schaaf, & der Weifsars der Alten. *Gefn. Thierb. p. 154. 155.*

Orientalisches Schaaf. *S. G. Gmelin it. III. p. 486. t. 55.*

Habitat parvis gregibus in apricis rupestribus & desertis tractus alpini Asiæ mediæ, in Camtschatca, insulis Kurilis, forte etiam in California reliquaque America occidentali, certius in Barbariæ, Sardinia, Corsicæ, Græciæ montibus altissimis, celerrima, agilis, fera, cornibus pessime feriens, arietem ferum simulans, altero anno jam adulta, ætatem 14 annorum non superans; Martio unum vel duos agnos pariens, carne & adipe delicata.

Magnitudo cervæ minoris; color æstate potissimum ex cinereo fuscescens admisto griseo, subtus e cinereo albidus; hieme supra ex ferrugineo griseus, subtus e griseo albicans; cauda brevissima alba, apice fuscescens; pili hieme sesquipollicares, vere depositi; auriculæ acutæ erectæ; oculi magni, iride fusca s. cærulea; cornua, tertio jam anno progerminantia, albida, annulata, reflexa, compressa, femina minora, potius falcata; aliquando nulla. Pedes posteriores anterioribus longiores.

Pudu. 4. O. cornibus teretibus lævibus divergentibus.

Capra (Pudu) cornibus teretibus lævibus divergentibus; gula imberbi. *Molina hist. nat. Chil. p. 273.*

Habitat gregaria in montibus America Cordigliæ, nive ingruente in valles australes descendens, facile tum capienda & cicuranda, docilis, magnitudine hædi semestris, habitu capræ hirci, at cornibus extrorsum incurvatis

MAMMALIA PECORA, Bos.

parvis, feminae nullis, mento imberbi differt; color obscurus.

- Strepti- 3. O. cornibus rectis carinatis flexuoso-spiralibus.
ceros. Hircus (Capra cretenensis) laniger cornibus teretibus erectis, ab imo ad summum spiraliter intortis. *Briss. regn. an. p. 73. n. 15.*
Ovis cretensis, Oppian. cyneg. 2. p. 376.
Streptificeros. *Plin. hist. nat. XI. t. 37. Buff. hist. nat. XI. p. 358.*
Cretensis aries, streptificeros nominatus. *Bellon. obs. p. 20. f. p. 21.*
Cretenses arietes. *Aldrov. bifulc. p. 406. f. p. 407.*
Ovis cretenensis. *Jonst. quadr. t. 45. Besch. der berl. Naturf. IV. p. 624. t. XX.*
Ovis streptificeros cretica Bellonii. *Raj. quadr. p. 75.*
Aries streptificeros. *Klein quadr. p. 14.*
Cretan Sheep. *Penn. quadr. p. 11. t. 3.*
Wilde Straubengeys. *Gesn. Thierb. p. 151. fig. p. 152.*
Habitat in Candia & insulis Archipelagi, frequenter culta in Hungaria & Austria; an parens arietis, cui magnitudine aequalis, figura corporis similis est?

32. BOS. Cornua concava, antrorsum versa, lunata, lævia.

Dentes primores inferiores VIII. laniarii nulli.

- Taurus. 1. B. cornibus teretibus extrorsum curvatis, palearibus laxis.
Fn. suec. 46.
ferus. α. a. Urus. *Cæs. Gall. VI. c. 28. Gesn. quadr. p. 157. Aldrov. bifulc. p. 347. fig. p. 348. Jonst. quadr. p. 50. t. 20.*
Raj. quadr. p. 70. Klein quadr. p. 11. Bell. it. I. p. 211. Rzacz. Pol. p. 228.
Bos ferus. *Plin. hist. nat. VIII. c. 15.*
Bos silvestris. *Charlet. exerc. p. 8.*
Bos (Urus) cornibus crassius brevibus sursum reflexis, fronte crispa. *Briss. regn. an. p. 80. n. 3.*
Auerochs. *Gesn. Thierb. p. 299. Buff. hist. nat. XI. p. 284. Ridinger wilde Th. t. 37.*
b. Bonafus. *Plin. hist. nat. VIII. c. 15. Gesn. quadr. p. 145. Aldrov. bifulc. p. 358. f. p. 361. Jonst. quadr. p. 51. t. 18. 19. Charlet. exerc. p. 8. Raj. quadrup. p. 71. Buff. hist. nat. XI. p. 284.*

Bovae. *Aristot. hist. anim.* II. c. 5. 7. XI. c. 71.

Movw-ſ. *Ælian. anim.* VII. c. 3.

Bos (Bonafus) cornibus deorsum inflexis, juba supra collum longissima. *Briff. an.* 84.

Bos cornibus in se flexis, juba longissima. *Syst. nat.* XII. I. p. 99.

c. Bifon. *Plin. hist. nat.* VIII. c. 15. *Gefn. quadr.* p. 143. *Aldr. bif.* p. 353. 357. fig. p. 355. 356. *Jonst. quadr.* p. 51. t. 16. 17. *Charlet. exerc.* p. 8. *Sibb. Scot. an.* p. 7. *Raj. quadr.* p. 71. *Rzacq. Polon.* p. 214. *Buff. hist. nat.* XI. p. 284.

Bos cornibus divaricatis, juba longissima, dorso gibbofo. *Syst. nat.* XII. I. p. 99. n. 3.

Bos (Bifon albus) cornibus sursum reflexis, juba longissima, & Bos (Bifon) cornibus sursum reflexis, dorso gibbofo, juba barbaque longissima. *Briff. regn. an.* p. 82. n. 5. 6.

Bovae. *Oppian. cyneg.* 2. p. 159.

Wyfent. Gefn. Thierb. p. 296.

domestici-
cus. β. Bos, Taurus, Vacca, Vitulus. *Plin. hist. nat.* VIII. c. 45. 46. *Gefn. quadr.* p. 24. 25. 103. 124. *Schwenckf. the-riotr.* p. 63. 65. 70. *Aldr. bif.* p. 13. fig. p. 36. *Jonst. quadr.* p. 13. 15. *Wagn. Helv.* p. 167. *Sibb. Scot. an.* p. 7. *Rzacq. Polon.* p. 37. *Sloan. jam.* 2. p. 327.

Bos domesticus. *Jonst. quadr.* p. 36. t. 14. *Charlet. exerc.* p. 8. *Raj. quadr.* p. 70.

Bos (domesticus) cornibus teretibus inflexis. *Muf. Ad.* Fr. I. p. 12.

Bos (domesticus) cornibus lævibus teretibus, sursum reflexis. *Briff. regn. an.* p. 78. n. 1.

Taurus domesticus cum vacca. *Klein quadr.* p. 10.

Bœuf. *Buff. hist. nat.* IV. p. 437. t. 14.

a. B. indicus major, rufus, cornibus brevissimis, gibbo adiposo humerali. *Penn. histor. of quadrup.* p. 16. n. A. t. 1. fig. inf.

b. B. indicus minor, cornibus fere erectis antrorsum versis, gibbo adiposo humerali. *Penn. hist. of quadr.* p. 17. t. 1. f. sup.

Bos (indicus) cornibus aure brevioribus, dorso gibbo, juba nulla. *Syst. nat.* XII. p. 99. n. 6.

Bos scythicus gibbosus. *Charlet. exerc.* p. 8.

Zebu. *Buff. hist. nat.* XI. p. 285. 439. t. 42.

Little indian Buffalo. *Edw. av.* 200. t. 209.

MAMMALIA PECORA. Bos.

- c. Bos abessinicus, tophis dorsalibus, cornibus cuti adhaerentibus pendulis. *Penn. hist. of quadr. p. 17. n. C.*
 d. Bos madagascariensis niveus, cameli magnitudinae, auriculis pendulis, gibbosus. *Penn. hist. of quadr. p. 17. n. D.*
 e. Bos Tinianensis niveus, auriculis nigris. *Penn. hist. of quadr. p. 17. n. E.*
 f. Bos africanus niveus celer, cruribus gracilioribus, cornibus elegantioribus, ungulis splendide nigris. *Penn. hist. of quadr. p. 17. n. F.*

g. Bos europæus. *White ad. litt. & philos. Macul. i. c. 27.*

Habitat in silvis uliginosis Poloniæ, Prussiæ, Lithuanicæ, montium Carpathicorum, Caucasi, Patagoniæ, (Æ. c. 1200. Cæc. Nicetæ) hospitatur ubique, pro ratione climatis, pabuli vitæque generis magis minusve a primo statu declinans, β. a. in India & insula Madagascar, b. in India, Persia, China, c. in Abessinia & insula Madagascar, d. in regno Africæ Adel & insula Madagascar, e. in insula Tinian, f. in Africa, nomine lant vel dant. g. maximus in Polonia, Holsatia, Belgio, minimus in Scotia boreali, in qua, quemadmodum etiam in Islandia & passim in Anglia uterque sexus aliquando e cornis occurrit, animosus, iracundus, furibundus cornibus hostem petit, fronte torva, crispa validaque, utilissimus labore suo agris colendis, stercore latificandis, carne, lacte, caseo, butyro, sebo, cornibus; lui magis obnoxius aliis animalibus domesticis; infestatur oestris bovis, tabanis, conope calcitrante, pediculis; læditur a cicuta, aconito, anemone; vivit ad 14-15 annos; vacca uterum gerit per 9 menses.

America- 2. B. cornibus divaricatis, juba longissima, dorso gibboso. *Syst. nat. XII. 1. p. 99. n. 3. β.*

Bos (Bison americanus) cornibus sursum reflexis, dorso gibboso, capite pilis longissimis obrito. *Briss. regn. an. p. 83. n. 7.*

Taurus mexicanus. *Hernand. mex. p. 587.*

Tauri vaccæque Quiviræ regionis. *Fernand. an. p. 10.*

Armenta. *Laët. amer. p. 303.*

Taurus Quivirensis & tauri novi orbis. *Nieremb. hist. nat. p. 181. 182.*

Boves cornu feriunt, pascua depressa amant; difficile genus, cujus species vix certis limitibus circumscriptæ, prouti in ovibus & capræ generibus, facillè varietates pro speciebus habentur, & vice versa.

MAMMALIA PECORA. Bos.

209

Bison ex Florida allatus. *Raj. quadr. p. 71. Klein quadr. p. 13.*

Bœuf de Canada. *Charley. nouv. Fr. 3. p. 131.*

Bœuf sauvage. *du Pratz Lowis. 2. p. 66.*

Bison d'Amérique. *Buffon hist. nat. XI. p. 303.*

Buffelo. *Lawf. Carol. p. 115. Brick. Northcar. p. 107.*

Buffalo. *Catesb. Carol. app. p. XXVII. t. 20.*

American Oxen or Beeves. *Dobbs Hudf. p. 41.*

American Bull. *Penn. quadr. p. 8. n. 6. t. 2. f. 2.*

Wilde Ochsen und Kühe. *Kalm. it. 2. p. 350. 425. 3. p. 351.*

Habitat gregarius in nova Hispania, & interioribus America borealis partibus in uliginosis inter altas arundines; quamvis ferox, junior tamen cicurari potest; pondus 1600 - 2900 librarum acquirit; an vere distincta a tauro species, cum quo coit?

Cornua brevia, nigra, teretia, basi multum distantia; gibbus magnus & altus carnosus; pectus crassum & robustum; posteriora trunci gracilia & debilia, æstate nuda. Cauda pedalis, stoccofa. Pili capitis & gibbi longissimi lanati, undulati, ferruginei.

moscha- 3. B. cornibus approximatis basi latissimis introrsum deorsum-
tus. que, apice extrorsum flexis acuminatis. *Penn. hist. of quadr. p. 27. n. 9. t. 2. f. 2.*

Bœuf musqué. *Jeremia apud Charley. nouv. Franc. 3. p. 131.*

Musk Ox. *Dobbs Hudf. p. 18. 25.*

Habitat in America boreali a regno novo Mexicano ad terram Cristinos, ossibus per maris fluctus in Sibiriam delatis; cervæ magnitudine. Cornua in apice frontis, duos pedes longa, basi duos similiter pedes amplitudine æquante, ad 60 libras ponderantia. Pili longissimi aricei obscuri. Caro moschum olet.

grun- 4. B. cornibus teretibus extrorsum curvatis, vellere propen-
niens. dente, cauda undique jubata.

Vacca grunniens villosa, cauda equina. I. G. Gmelin nov. comm. Petrop. V. p. 339. t. 7.

Bubalus cauda equina. Pallas ad. Petrop. I. p. II. p. 332.

Bœuf velu. *le Brun it. I. p. 120. t. 129.*

Vache de tartarie. *Buff. hist. nat. XV. p. 136.*

An other species of oxen, called bubuls by the Tartars:
Bell. trav. I. p. 212.

Grunting bull. *Penn. quadr. p. 5:*

Tangutischer Büffel mit dem Pferdeschweife: *Pallas nord. Beytr. I. p. 1. t. 1.*

Habitat, hodiernum rarior; in regno Tibetano, hospitatur & colitur numerosa varietate magnitudinis, pilorum, coloris; in Sibiria, China, India, Persia, jam Æliano; Cosma, Guil. de Rubriquez; Marco Polo aliisque notatus; ferox, potissimum vulneratus aut alio modo irritatus; æstus impatiens, colorem rubrum atiosve serenorum ægre fert; dum irascitur, corpus concutit, caudam erigit, oculis minatur, & subito ac inopinato in hostem fertur; domesticus tamen, rescædis ut plurimum cornibus, onera portat & jugum, aratrum trahit & currus. Vox grunniens; vacca frequentior; coit cum vacca domestica; an parens bubali, cum quo interna structura convenit?

Magnitudo varia, feri spectabilior; caput breve, nasus latus, labia crassa & pendula; auriculæ amplæ, inferius acutæ, pilis asperis hirtæ; cornua brevina, gracilia, valde acuminata; basi distantia, medio inter utrumque fasciculo pilorum longo; pilis in medio frontis radiatis. Cervix jubata, juba alba, aliquando ad caudam usque protensa; caput una cum reliquo corpore nigrum, ut tamen domesticus colore quoque multum variet, pilis inferioribus longissimis, reliquis hircinis; ungulæ latæ; cauda lata, ad 6 pedes longa, ex pilis longis sericeis argentei vel nivei coloris constata, Sinenfibus, Indis, Turcis magni æstimata. Ventriculo nonnunquam inest species lapidis bezoar: Caro vix edulis, nisi vitulorum.

Bubalus. 5. B. cornibus resupinatis intortis, antice planis.

Bos (Bubalus) cornibus compressis, sursum reflexis, resupinatis, fronte crispata. *Briss. regn. an. p. 81. n. 4.*

Bos indicus. *Plin. hist. nat. VIII. c. 45.*

Βόας ἀγρίος καὶ Ἀπαχάτος. *Aristot. hist. an. L. 2. c. 1.*

Bubalus. *Gesn. quadr. p. 139. Jonst. quadr. t. 20. Raj, quadr. p. 72.*

*Buffelus. Aldr. bis. p. 365. fig. p. 366. Jonst. quadr. p. 53.
Charlet. exerc. p. 8. Klein quadr. p. 10.*

Buffalus. Pall. nov. comm. Petrop. XIII. p. 460. t. 11. 12.

*Boves inusitatae magnitudinis, Taurelephantes. Ludolf
Æthiop. I. c. 10. n. 1.*

Buffle. Buffon hist. nat. XI. p. 284. t. 25.

Buffalo. Barbert Guin. p. 209. 486. Penn. quadr. p. 7. n. 5.

Büffel. Gefn. Thierb. p. 58.

Büffelochsen. Kolbe Vorgeb. p. 143. t. 5. f. 2.

*Habitat in Asia, cultus in variis ejus Africaeque provinciis,
nec non in Hungaria & Italia in quam posteriorem im-
perante Longobardis Agilulfo primum delatus, in calidis
simis plagis fere pilis nudus, iracundo mugitus fortis;
annulo oris regitur, onera portat, aratrum currumque
trahit, lacte etiam, quamvis magis sebaceo utilis;
coit cum vacca vulgari. Tauro major, corpore crassiore,
robustiore, cute durissimo, pilis nigris aut rubris, capite
parvo, fronte crispa. Cornua nigra, crassa, paulisper
compressa, sursum reflexa, parum resupinata.*

caffer.

6. B. cornibus basi latissimis & approximatis, tum divaricatis deorsum, post sursum apice introrsum curvatis, juba brevi. *Sparrmann ad. Stockh. 1779. I. n. VIII. t. 3. f. inf.*

Cape ox. Penn. hist. of quadr. p. 28. n. 9. Masson ad. angl. LXVI. p. 296. Forster it. I. p. 83.

- ♂ Bos (Bubalus africanus) cornibus teretibus sursum reflexis, in sese recurvis. *Briss. regn. an. p. 79. n. 2.*

Elegans & parvus africanus bos, quem veteres Græci bubalum appellarunt. Bellon. obs. p. 119.

*Juvenca sylvestris. Pr. Alp. Æg. I. p. 233. t. 14. f. 2.
Africanus bos. Raj. quadr. p. 73. Aldr. bis. p. 363. fig. p. 364. Jonst. quadr. p. 52.*

Bubalus africanus. Jonst. quadr. t. 18.

Exiguus africanus bos, Klein quadr. p. 11.

Petit bœuf de Belon. Buff. hist. nat. XI. p. 299.

Africanischer Büffel. Gefn. Thierb. p. 60.

Dwarf ox. Penn. hist. p. 30. n. 10. t. 2. f. 3.

MAMMALIA PECORA. Bos.

Habitat gregarius in Africa, præsertim in silvis pone Caput bonæ spei versus septentrionem sitis, etiam in Guinea, ferox (β. tamen mitior), callidus & atrocissimus, ne homini quidem parcens, celer, ut tamen equum montem ascendendo non assequatur, & robustus; corno volutatur, crassior & rudior reliquis; 8 circiter pedes longus, 5½ altus, ater; cornua nigra, basi angusto canali intermedio separata, eadem 13 pollices lata; ut magnam capitis partem tegant, ultra pedem nonnunquam longa, & 25 libras pondere aliquando æquantia; auriculæ pendulæ; pili pollicem circiter longi, rigidi, adultiori bovi læves, ante genua & subtus longiores, undulati. Cutis tenax, crassa; caro rudis, sed succulenta & ferini saporis.

VI. BELLUÆ.

*Dentes primores obtuse truncati.**Pedes ungulati.*

33. EQUUS. *Dentes primores superiores VI erecto paralleli.*
inferiores VI prominentiores.

laniarii solitarii inclusi utrinque remoti.

Mammæ II inguinales.

* *pedibus bifulcis.*

- bifulcus. 6. E. pedibus bifulcis. *Mölin. hist. nat. Chil. p. 284.*
Habitat in America australi, præsertim præruptis rupibus montium Cordilleras, pedibus ad pecora, dentibus, magnitudine, habitu, ad equi genus accedens, ut quasi medium inter utrumque constituat, ferox & celer, hinnitu & auriculis caballo, structura interna, figura externa, magnitudine, pilis, colore, rostro, oculis, collo, dorso, cauda, pedibus, genitalibus asino similior, ut tamen crux nigra humeralis desit.

** *pedibus solidungulis.*

- Caballus. 1. E. pedibus solidungulis, cauda undique setosa.
 Equus cauda undique setosa. *Syst. nat. XII. 1. p. 100. n. 1.*
 Equus auriculis brevibus erectis, juba longa. *Briss. regn. an. p. 100. n. 1.*
Imroc. Aristot. hist. an. I. c. 5. 7. II. c. 5. 8. 18. III. c. 10. V. c. 11. VI. c. 22. VII. c. 17. VIII. c. 11. IX. c. 5. Aelian. anim. III. c. 2. IV. c. 6. 7. 8. 11. Oppian. cyneg. I. 166.
 Equus, Equa, Equiferus. *Plin. hist. nat. VIII. c. 42. X. c. 63. XI. c. 37. XXVIII. c. 10. 11. Gesn. quadr. p. 442. fig. p. 443. Schwencckf. theriotr. p. 89. Aldr. solidung. p. 2. fig. p. 21. Jonst. quadrup. p. 1. t. 1-14. Charler. exerc. p. 3. Wagn. Helv. p. 174. Sibb. Scot. an. p. 6. Raj. quadr. p. 62. Rzacq. Polon. p. 217. 240. Sloane jamaic. II. p. 327.*
 Cheval. *Buff. hist. nat. IV. p. 174. t. 1.*

Horfe. Penn. quadr. p. I. n. I.

Rofs. Gesn. Thierb. p. 306. f. p. 307.

ferus.

α. Equus ferus. Hasselq. paläst. p. 282.

Wild horses. Bell. it. I. p. 212.

Wilde Pferde. I. G. Gmelin it. I. p. 211. III. 2. p. 510.

S. G. Gmelin it. I. p. 44. t. 9. Pallas it. I. p. 211.

Tarpany. Rytschk. Orenb. I. p. 233.

domesti-
cus.

β. Equus domesticus. Klein quadr. p. 4.

Habitat gregatim ferus in campis Bessarabicus, inque desertis circa Tanain, & per omnem Tatariam magnam obviis, hospitatur ubique, per Hispanos quoque in Americam delatus, varietate innumera; ex domestico ferus iterum factus reperitur hodie, potissimum in Tauria, passim gregarius, mare duce, minor, vix domandus.

Animal herbivorum, rarissime carnivorum, generosum, superbum, fortissimum in currando (ut visus sit equus, qui minuti secundi tempore 82½ pedes anglicos cucurrit) portando, trahendo; aptissimum equitando, cursu furens, silvis delectatur; posteriora curat; cauda conopes tabanosque abigit, alterum scalpit; pullum injuriæ obnoxium reponit; hinnitu sociam vocat. Calcitrando pugnat; sudans se volutat; vegetabilia edit bove proptus, semina disseminat; ventriculo exiguo simplici, intestino colo caecoque maximo, cystide fellea nulla, non vomit; sterqus incalescit. Equuleus hippomane natus pedibus elongatis. Læditur globulo auris, acicula pedis, nisi capistro, dentibus sebo illitis, padi herba, phellandrii curculione? conope irritante. Bælt impune aconitum. Utero gerit 290 dies. Laniarios dentes anno quinto acquirit; primores mutat anno secundo, tertio quarto. Tartaris caro esculenta, lac, etiam fermentascens, potulentum, pellis in corium versa.

Hemionus. γ. E. unicolor, pedibus solidungulis, cauda calva extremitate pilosa, cruce nulla. Pallas it. III. p. 217. n. nord. Beytr. II. p. I. t. I. nov. comm. Petrop. XIX. p. 394. t. 7.

Habitat in desertis inter fluvium Onon & Argun interpositis (hodiernum rarius), gregarius in desertis mongolicis, potissimum derferto Gobi ad Sinæ regniq. Tibetani fines usque, apricos, salfos, planos, herbosos campos amans,

Equi pedibus posticis calcitrant; mares mammas in penis glande habent.

*Silvas montesque nive candidos abhorrens, timidus provi-
dusque, cursu celerrimus, hæcenus non cicuratus, auditu
& olfactu acutissimo, hinnitū magis sonoro, quam equi;
infectatur lue in caballos & boves propaganda; mordendo
& calcitrando pugnat; prurit Augusto; parit equa vere
pullum, ut plurimum unicum. Caro Mongolis Tungusif-
que deliciosa, pellis navium speciei adaptatur.*

*Magnitudine & habitu proxime accedit ad mulam, at pul-
chrior, auriculis caudaque ad zebam, ungulis & reliquo
corpore ad asinum, artubus ad equum; differt tamen ca-
pite magno, fronte plana antrosum angustata, collo gra-
ciliore quam reliquis speciebus, & magis terete, pilis hie-
me sesquipollicaribus, mollibus, basi pallide glaucis, cete-
ra pallidis Isabellæ colore, dorsi undulatis, ætate vix
3½ lineas longis; verticibus multis; cauda pene vaccina.
Pondus circiter 560 libris medicis æquale, longitudo 5
pedes superans; cauda pedem & 12 pollices longa, apice
floccoso nigro. Dentes 34.*

Asinus. 2. E. pedibus solidungulis, cauda extremitate setosa, cruce
nigra (mari) supra humeros.

Equus cauda extremitate setosa, cruce nigra supra humeros.

Syst. nat. XII. 1. p. 100. n. 2. Fa. suc. 1. n. 35.

Equus auriculis longis flaccidis, juba brevi. Briss. quadr. 70.

Æne. Buff. hist. nat. IV. p. 377. t. 11.

As. Penn. quadr. p. 3. n. 3.

Esel. Gesn. Thierb. p. 91.

ferus. a. Asinus silvestris. Plin. hist. nat. VIII. c. 30. Klein quadr.
p. 7.

Onager. Plin. hist. nat. VIII. c. 44. & 58. Ald ov.

solid. p. 352. Jonst. quadr. p. 20. t. 7. 8. Raj. quadr.

p. 63. Pallas ad. Petrop. ann. 1777. P. II. p. 258.

n. nord. Beytr. II. p. 22. t. 2.

Onager. Oppian. cyneg. III. 183.

Onagrus, Onager live Asinus silvestris. Gesn. quadr. p. 19.

Asinus. Charleton exerc. p. 4.

*Equus (Onager) auriculis longis, juba brevi, pelle tu-
berculis parvis scabra. Briss. regn. an. p. 104. n. 3.*

L'âne sauvage. Marmol. Afric. 1. p. 53.

Wild asses. Bell. it. 1. p. 212.

Wilder Esel. Pallas neue nord. Beytr. II. p. 22. t. 1.

Habliql n. nord. Beytr. IV. p. 88.

domesti- β. Asinus. Plin. hist. nat. VIII. c. 43. Gesn. quadr. p. 3. fig
ous. p. 4. Schwenckf. theriötr. p. 61. Aldrov. solid. p. 295.

MAMMALIA BELLUÆ. Equus.

Jonst. quadrup. p. 16. t. 6. Sibb. Scot. an. p. 6. Raj. quadrup. p. 63. Sloan. jamaic. 2. p. 327. Klein quadr. p. 6.

Osw. Aristot. hist. anim. I. c. 17. II. c. 18. V. c. 11. VI. c. 23.

Ane. Tavern. it. I. p. 344. Chardin it. 3. p. 33.

Esel. Osb. Ostind. p. 35.

mulus. γ. hybridus ex asino & equa, sterilis.

Equus (Mulus) auriculis longis erectis, juba brevi. Briss. regn. anim. p. 103. n. 4.

Osw. Aristot. hist. anim. I. c. 7. II. c. 5. VI. c. 24.

Mula, Mulus. Plin. hist. nat. VIII. c. 44. XI. c. 37.

Mulus. Gesn. quadr. p. 793. Schwencckf. theriotr. p. 62.

Aldrov. solid. p. 358. Jonst. quadr. p. 21. t. 6. Charlet.

exerc. p. 4. Raj. quadr. p. 64. Sloan. jama. II. p. 327.

Asinus biformis. Klein quadr. p. 6.

Grands mulets. Buff. hist. nat. IV. p. 401.

Maulesel. Gesn. Thierb. p. 108. Osb. Ostind. p. 35.

hinus. δ. hybridus ex equo & asina, sterilis.

Osw. Aristot. hist. an. I. c. 7.

Mula, Hinus. Plin. hist. nat. VIII. c. 44.

Hinus. Gesn. quadr. p. 18. Aldrov. solid. p. 358. Jonst.

quadr. p. 21. Charlet. exerc. p. 4. Raj. quadr. p. 64.

Petits mulets. Buffon hist. nat. IV. p. 401.

Habitat gregarius in desertis magnæ Tartariæ montosis, hieme post coitum in Indiam meridionalem & Persiam migrans, circa urbem Casbin frequentissimus, olim quoque in Natolia, Syria, Arabia & Africa, hospitatur cultus & degener fere ubique, frigoris, non æque plagarum & penuriæ impatiens, spinis victitans, piger, tardus, mansuetus, stupidus, rudens, libidinofus, auriculis magnis, flaccidis, juba brevi, colore cinereo, linea dorsali & transversali scapularum nigra; at α) celerrimus, agilissimus, structura elegantioris & altioris, quam β), feras venans, tigridi tamen vincendæ impar, non difficulter cicurandus, visu, auditu olfactuque acutissimo pollens, aquam plantasque salvas & amaras amans, coloris candidi in argenteum splendorem vergentis, vertice tamen, colli truncique lateribus pallide luteis; juba ex nigricante fusca; linea dorsalis coffeam colore æmulatur; pili equinis molliores. Caro Kirgisidis deliciosa; pellis egregium exhibet corium (chagrin), præparationis modo demum granulatum. Longitudo 4 pedum cum 10 pollicibus, β) optimus in

regionibus calidioribus, in Angliam non delatus ante regnum Elisabethæ; ad 30 annos vivit, post dies 290 parit pullum plerumque unicum; γ) rarissime fecundus, optimus hispanicus, maximus sabaudicus, ad equum habitu & magnitudine propius accedens. δ) multo minor & deterior, magis rubicundus, auriculis equi, juba & cauda asini.

Zebra.

3. E. pedibus solidungulis, dilute fuscus, fasciis fuscis.
 Equus fasciis fuscis vericolor. *Syst. nat.* XII. 1. p. 101. n. 3.
 Equus (Zebra) auriculis brevibus erectis, juba brevi, lineis transversis vericolor. *Briss. regn. an.* p. 101. n. 2.
 Equus indicus. *Jonst. quadr. t.* 5.
 Equus brasiliensis. *Jacob. mus. reg. p.* 3. t. 2. f. 1. *Laur. mus. reg. t.* 3. f. 18.
 Equus ferus genere suo, Zebra, Zecora. *Klein. quadr. p.* 5.
 Zebra. *Purch. pilgr.* 2. p. 1001. *Charlet. exerc. p.* 4. *Raj. quadr. p.* 64. *Barbot. guin. p.* 486. *Bancr. Guian. p.* 486. *Penn. quadr. p.* 2. n. 2.
 Male Zebra. *Edw. av. t.* 222.
 Zebra indica. *Aldrov. solidung. p.* 416. *fig. p.* 417. *Jonst. quadr. p.* 21. t. 5.
 Zecora. *Ludolf. aeth. I. c.* 10. n. 35. *comm. p.* 150.
 Zeura ou Zecora. *Lobo. abiss. I. p.* 291.
 Ane de beauté extraordinaire. *Thevenot it.* 2. p. 473.
 Espèce de fort beaux ânes. *Dampier it.* 2. p. 250.
 Zèbre. *Buff. hist. nat.* XII. p. 1. t. 1.
 Wilder Esel. *Kolbe. Vorgeb. p.* 146. t. 3. f. 2.
 Indianisch Maulthier. *Gesn. Thierb. p.* 120.
 Africanisches Tygerpferd oder Eselpferd. *Knorr. delic. II. tab. K.* 8.
Habitat in Africa meridionalis campis gregarius, pulcherrimus, celerrimus, malignus, indocilis, junior tamen cicurandus, cum asino coiens. Magnitudo muli; juba brevis erecta, una cum capite & corpore deorsum striata, cruribus digitisque transversim striatis; auriculæ erectæ; cauda asini. Femina ejusdem penitus coloris.

- Quagga.** 4. E. pedibus solidungulis, supra castaneus, fasciis fuscis, ad latera maculatus, subrus, pedibus cruribusque albus.
 Quacha. *Penn. hist. p.* 14. n. 3.
 Opuagha. *Masson. act. angl.* LXVI. p. 297.
 Zèbre. *Buff. hist. nat.* XII. p. 1. t. 2.
 Female Zebra. *Edw. av. t.* 223.

MAMMALIA BELLUÆ. Hippopotamus.

*Habitat in Africa meridionali gregibus separatis, crassior
& robustior Zebra, faciliusque cicuranda, ita ut currui
trahendo adaptari queat.*

34. HIPPOPOTAMUS. *Dentes primores in utraque
maxilla IV.*

*superiores per pa-
ria remoti.*

*inferiores promi-
nentes, interme-
diis longioribus.*

*laniarii solitarii, infe-
riores longissimi
oblique truncati,
recurvati.*

Pedes margine unguiculati.

amphi-
bius.

I. H. pedibus quadrilobis. *Syst. nat. X. p. 74. Houttuyn 3.
p. 405. t. 28.*

Behemoth. Job. c. 40.

*Ποταμιοε ινπος. Aristot. hist. anim. II. c. 7. 12. Aelian.
anim. V. c. 53.*

*Hippopotamus. Plin. hist. nat. VIII. c. 25. & 26. XI. c. 12.
37. & 39. XXXII. c. 11. Bel. poiss. p. 47. fig. p. 50. &
obs. p. 104. Gesn. aquat. p. 494. Column. aq. p. XXVIII.
fig. p. XXX. Alarov. dig. p. 181. 183 - 185. Jonst.
quadr. p. 108. t. 49. Charlet. exerc. p. 14. Ludolf Aeth.
I. c. 10. n. 1. p. 155. Raj. quadr. p. 123. Shaw it.
p. 427. Klein quadrup. p. 34. t. 3. Briss. quadr. p. 122.
Hasseltq. palæst. p. 280. Forsk. fn. orient. p. IV. Radzi-
vil it. hieros. 142. Sparrmann ad. Stockh. 1778. IV.
n. 12. Chemnitz Naturf. XXI. p. 84.*

Hippopotamo. Zerenghi monogr.

*Hippopotame ou cheval marin. Theven. it. I. p. 491. Mar-
mol. afr. I. p. 51. Dampier it. 3. p. 359. Jussieu ad.
Paris. 1724. p. 209. Lobo abiss. I. p. 258. Maillet æg.
2. p. 31. Adans. Seneg. p. 73. Buffon hist. nat. XII.
p. 22. t. 3. & 6. f. 1-3. Penn. quadr. p. 78. n. 59.*

*Cheropotamus & Hippopotamus. Pr. Alpin. I. V. 245.
t. 22-25.*

River-horse or Hippopotamus. *Grew. mus. reg. soc. p. 14. t. 1.*

Hippopotami or River - horses, Water-elephants, Kerkammonon. *Barbot Guin. p. 73. 117.*

Seekuh. *Kolbe Vorgeb. p. 168. t. 6. f. 1.*

Vasserochs. *Knorr delic. II. tab. K. 12.*

Habitat in fluviiis Africæ a Nigro usque a Caput bonæ spei, in lacubus Æthiopiæ, quos transtluit Nilus, in Nilo quoque superiore, olim etiam in inferiore, rarior ad ostia fluviorum, jam a Cosma in Æthiopia, & Ægypto observatus, polygynus, gregarius, aliquando sex miliaribus a littore vagatus, sacchari, colocasiæ; orizæ, milii plantationes devastat, pabulum quæsiturus, quod noctu fit; radicibus quoque arborum vescitur, nunquam piscibus; cicurandus utique & mixis, nisi irritatus aut vulneratus, quo factò naviculas adeo aquæ innatantes hominesque in iis inclusos summa audacia aggreditur; tarde incedit in ficco, & humiles aggeres non transcendit; velocissime autem natat, & in fundo aquæ ingreditur, ut tamen non diu infra aquam permanere possit; dormit in insulis fluviorum mediis arundine obsitis, ibique femina parit pullum unicum, quem tamen in aquis lactat. Vox inter mugitum bovis & elephantis intermedia valde sonora. Dentes albissimi durissimi ipso ebore duriores, nec tam facile flavescentes, ut ideo ad hominum dentes resarciendos adaptentur. Caro esculenta. Cutis clypeis adaptatur.

Magnitudo fere elephantis, ut 4000-5000 libras pondere, 17 aliquando pedes longitudine, 7 fere altitudine æquet; capite quamvis insigni, trunco & habitu bovem, pedibus ursum, cute tenacissima densissima rhinocerotem, laniariis, cauda, posteriore trunci parte, vitæ genere suem aliquantum refert; os amplissimum; auriculæ minutæ & acutæ, pilis brevibus, tenuibus ciliatæ; oculi naresque exigui; labia fasciculis pilorum; dentes laniarum aliquando 27 pollices longi, & 9 uncias ultra 6 libras ponderosi; dentes molares similiter albissimi, ad utrumque latus utriusque maxillæ 6-8. Cutis obscura, pilis albidis raris, in cervice paulo densioribus, tecta; cauda circiter pedalis, calva; crura breviora; crassa; lobi pedum non annexi.

TAPIR. *Dentes primores* in utraque maxilla X.
laniarii nulli.

Pedes anteriores ungulis IV.
posteriores ungulis III.

americana- I. T. Briff. *regn. an.* p. 119. *Buff. hist. nat.* XI. p. 444.
nus. t. 43. *Penn. quadr.* p. 82. n. 60.

Tapihires. *Thevet cosmogr.* II. fol. 937. b.

Tapiirete. *Marcgr. Bras.* p. 229. *Pij. Ind.* p. 101. *Raj. quadr.* p. 126. *Klein quadr.* p. 36.

Hippopotamus (terrestris) pedibus posticis trifurcis. *Syst. nat.* X. 1. p. 74. n. 2.

Beori animal. *Laët amer.* p. 328.

Danta. *Nieremb. hist. nat.* p. 187. *Jonst. quadr.* p. 216.
Cieza Peru. p. 20.

Antes. *Nicah. Bras.* p. 23.

Anta. *Marcgr. Bras.* p. 229. *Gum. Orin.* 1. p. 300. *Buff. hist.* XI. p. 444.

Vache montagnarde. *Dampier. it.* 3. p. 356.

Elan. *Condam. it.* p. 163.

Sus aquaticus multifurcus, Tapir, Maypoury. *Barr. Fr. eq.* p. 160.

Sus aquaticus musticulus. *Fermin Surin.* 2. p. 80.

Hydrochærus Tapir. *Exl. mamm.* p. 191. n. 1:

Wasserfchwein. *Knorr delic.* II. tab. K. 13.

Habitat gregarius in silvis & fluviis plagarum orientalium

*Americæ australis ab isthmo Darien ad Amazonum usque fluvium, dormit interdiu in silvis obscurissimis & densissimis, noctu cibum quærit, & gramine, saccharo, fructibus viçitat; mitis, facileque cicurandus, meticulo-
sus, salax, egregie natat, urinatur & in aquæ fundo incedit; timefactus etiam aquam intrat. Caro americana-
norum palato arridet. Animal eorum, quæ Americæ propria sunt, maximum, vacca minoris magnitudine, habitu suis; cutis tenax; vellus fuscum pilis brevibus, junioribus albo-maculatum; auriculæ subrotundæ, erectæ, majusculæ; oculi minuti; dentes molares supra & infra utrinque 5; maxilla utraque acuta; nasus (mari) elongatus in proboscidem tenuem, extensilem, lateribus sulcatam, ultra maxillam inferiorem prominentem; collum crassum, breve, cervice setis sesquipollicaribus jubata; dorsum arcuatum; pedes breves, ungulis nigris cavis; cauda brevissima nuda.*

35. SUS. *Dentes primores superiores* IV convergentes.
inferiores (plerisque) VI
 prominentes.

laniarii superiores II breviores.
inferiores II exserti.

Rostrum truncatum, prominens, mobile.

Pedes (ut plurimum) bisulci.

- Scrofa. I. S. dorso antice setoso, cauda pilosa. *Fn. suec.* 21. *Amæn.*
ac. V. p. 461.
- ferus. a. S. caudatus auriculis brevibus subrotundis, cauda pilosa.
Briss. quadr. 75.
Τε δυνος. *Aristot. hist. an.* I. c. 2.
Καυτος. *Aristot. hist. anim.* II. c. 9. & II. V. c. 13. *Op-*
pian. cyneg. III. 364.
Συς δυνος. *Aelian. anim.* V. c. 45.
Sus. *Charlet. exerc.* p. 13.
Sus ferus. *Plin. hist. nat.* VIII. c. 51.
Sus agrestis sive *aper.* *Raj. quadr.* p. 96.
Porcus. *Plin. hist. nat.* XVIII. c. 35. *Jonst. quadr. t.* 48.
Klein quadr. p. 25.
Aper. *Gesn. quadr.* p. 1039. *fig. p.* 1040. *Schwenckf. the-*
riotr. p. 54. *Aldr. bisulc.* p. 1013. *fig. p.* 1025. *Jonst.*
quadrup. p. 105. t. 47. 48. *Rzacq. Polon.* p. 213. *aud.*
p. 305.
Cochons sauvages, ou marrons, ou sangliers. *Des Marehr.*
it. 3. p. 296.
Sanglier & Marcastin. *Buff. hist. nat.* V. p. 99. t. 14
 & 17. f. 1.
Wild Hog. *Brown Jam.* p. 487.
Wild Schwein. *Gesn. Thierb.* p. 336. *Ridinger. Jagdb.*
Th. t. 6.
- domesticus. β. S. caudatus, auriculis oblongis acutis, cauda pilosa.
Briss. quadr. p. 74.
- vulgaris. a. *Sus*, *Verres*, *Scrofa.* *Plin. hist. nat.* VIII. c. 51. X. c. 63.
 & 73. XI. c. 37. & 39. *Gesn. quadr.* p. 982. *fig. p.* 983.
Schwenckf. theriotr. 123. *Aldr. bis.* 937. *fig. p.* 1006.
Jonst. quadr. p. 99. t. 47. *Sibb. Scot. an.* p. 9.
Tr. *Aristot. hist. an.* II. c. 5. & 7. V. c. 13. VI. c. 8.
 & 28. VIII. c. 9. *Aelian. an.* III. c. 3. X. c. 16.

Sues fodiunt naribus, orbiculo tendinibus affixo, radiceque evellunt.

MAMMALIA BELLUÆ. Sus.

Sus seu porcus domesticus. *Raj. quadrup. p. 92. Sloan. jam. II. p. 328.*

Porci. *Rzacq. Pol. p. 243. aud. p. 333.*

Cochon, Verrat & Cochon de lait. *Buffon hist. nat. V. p. 99. t. 16. & 17. f. 2.*

Schwein. *Gesn. Thierb. p. 331.*

monon-
gulus.

b. S. ungula indivisa. *Aristot. hist. an. II. c. 7. Plin. hist. nat. XI. c. 46.*

fenensis.

c. S. dorso subnudo, abdomine ad terram usque propendente. *it. Wyoth. 62. It. scan. 72.*

Habitat in Europa australiore, Persia boreali, Japonia, a Syria ad lacum Baical, in ipsa Africa boreali, hospitatur, zona frigida excepta, ubique, frigus enim non fert; odore pollet, naribus fodiens terram; quisquillas, stercus, succulenta; radices variaeque spurcata, ipsamque non raro prolem vdrans; multa feligena; pinguisimum, adipe inter cutem & panniculum carnosum collecto, stupidum, somnolentum, lente festinans, tempestatum prænuncium & impatiens animal; apricatur in solo, in carno se voluntat, immundum, grunniens accurrit clamanti affini adversus hostem spumante ore, dentibusque immanæ, erotalis infestum, quos sine noxa vorat; libidine subat; tardum venere; pene laxo longo, mammis numerosissimis, prole multa ad 20, quam per 4 menses utero gerit; dentes non amittit, & 25-30 annorum ætatem assequitur. Caro & multæ aliæ partes ganeæ numerosa materies. Infestatur pediculis, hydatidibus; laborat scrophulis, scabie; occiditur pipere.

α) nigro-canescens, junior striis longitudinalibus flavescens, & fuscis, lana inter setas profundius radicata; nulla; lardum nullum; rostrum & dentes lanarii longiores; auriculæ breviores subrotundæ; animal celerrimum parit Majo & Junio. β. a. in temperatioribus majus, frequentissime albicans, sed & luteum, nigrum, cinereum, rubrum, maculatum, in Tataria majore ex argenteo cinereum, auriculis longioribus, acutis, subpendulis; β. b. Upsalia frequens alibique; β. c. in Sina insulisque maris indici & australis, nunc atiam passim in Europa, cula varietas minor, ex albo nigroque variegata, aut ex nigro paululum canescens, magis munda, pedibus brevioribus, cauda brevissima, pendula; carne albidior & sapidiore.

- Porcus.** 2. S. dorso postice setoso, cauda longitudine pedum, umbilico cystifero.
 Sus (guineensis) caudatus, auriculis longis & acuminatis, cauda nuda. *Briss. regn. anim.* p. 109. n. 4.
 Porcus guineensis. *Marcgr. bras.* p. 230. *Jonst. quadr.* t. 46. *Raj. quadr.* p. 96. *Klein quadr.* p. 26.
 Cochon de Guinée. *Buff. hist. nat.* XV. p. 146.
 Guinea-Hog. *Brown. Ann.* p. 487. *Penn. quadr.* p. 69.
 β. Cochon de Siam. *Buff. hist. nat.* V. p. 99. t. 15.
Habitat in Guinea, inde in Brasiliam delatus, β. in regno Siamensi; scrofa affinis, an mera varietas? capite reliquoque corpore minor; cauda nuda; auriculæ elongatæ valde acuminatæ; corpus rufum, pilis brevibus rubris splendentibus, longioribus circa cervicem & supra clunes.

- Tajassu.** 3. S. dorso cystifero, cauda nulla.
 Sus (Aper mexicanus) ecaudatus, folliculum ichorofum in dorso gerens. *Briss. regn. an.* p. III. n. 6.
 Saes, quibus umbilicus in dorso. *Aldr. bis.* p. 939.
 Sus minor, umbilico in dorso, Tajacu, Cochon noir. *Barr. Fr. équin.* p. 161.
 Porcus americanus. *Charlet. exerc.* p. 14. *Seb. mus.* I. t. III. f. 4.
 Porcus moschiferus. *Klein quadr.* p. 25.
 Quauhila Coymatl, Quapizotl. *Hernand. mex.* p. 637.
 Coyamatl seu Quauhioyamatl. *Fernand. an.* p. 8.
 Tajassoub, Sanglier. *Thevet cosmogr.* II. fol. 936. b.
 Zamus. *Nieremb. hist. nat.* p. 170. *Jonst. quadr.* p. 107. t. 46. *Mus. Worm.* p. 340.
 Tajacu. *Marcgr. bras.* p. 229. *Pis. Ind.* p. 98. *Tyson ad. angl.* n. 153. p. 359. *Raj. quadr.* p. 97.
 Javaris. *Rochefort antill.* p. 138.
 Espèce de cochon qu'on appelle Peccary. *Waser. it.* p. 222.
 Sangliers appelés Pecaris. *des March. it.* 3. p. 296.
 Javalies o Paquiras. *Gumill. Orin.* I. p. 293.
 Pingo. *Fermin Surin.* 2. p. 79.
 Pecari ou Tajacu. *Buff. hist. nat.* X. p. 21. t. 3. 4.
 Picary. *Bancr. Guian.* p. 125.
 Mexican Hog. *Penn. quadr.* p. 72. n. 56.
Habitat gregarius in calidissimarum Americæ regionum, novæ Hispaniæ, Panamæ, Brasiliæ, Guianiæ, et insularum Antillarum silvis montosis, ferus, facile tamen curandus, cœni non amans, neque pinguescens, uti quidem scrofa; vidit fructibus, radicibus, serpentibus,

reptilibus; caro bona, modo statim a morte animalis excindatur cystis dorsalis.

Figura accedit ad scrofam sinensem, longitudine ad 3 pedes; dentes lanarii superiores ore clauso vix conspiciui; auriculæ breves erectæ, acuminatæ; oculi plani; collum breve crassum; setæ majores, quam scrofa, ad aculeos erinacei accedentes, ex nigro canescentes, albo annulatæ, cervicis & dorsi longissimæ; cystis versus clunes posita, liqore castoreum fere olente referta.

africanus. 6. S. dentibus primoribus duobus. Penn. hist. of quadr. p. 132. n. 6.

Sanglier de cap verd. Buffon hist. nat. XIV. p. 409. XV. p. 148.

Habitat in Africa a capite viridi ad Caput bonæ spei.

Corpus setis longissimis tenuibus tectum; caput elongatum; nasus gracilis; dentes canini lati, eboris duritie, superiores crassi, oblique truncati; molares in utraque maxilla utrinque VI, anteriores maximi; maxilla superior inferiori multo longior; auriculæ angustæ, erectæ, acuminatæ, apice setis longissimis barbata; cauda gracilis floccosa, primum crurum articulum attingens.

æthiopicus. 4. S. sacculo molli sub oculis. Syst. nat. XII. 3. p. 223. Aper æthiopicus. Pallas miscell. zool. p. 16. t. 2. spicil.

zool. II. p. 3. t. 1. XI. p. 84. t. 3. f. 7.

Engalla. Meroll. Cong. p. 667. Sorrento it. apud Church. I. 667.

Emgalo or Engulo. Barbot Guin. p. 487.

Porc sanglier. Flacourt Madag. p. 151.

Sanglier hideux. Damp. it. I. p. 405.

Sanglier du cap verd. Buffon hist. nat. suppl. III. p. 76. t. II.

African wild boar. Deslandes Martyn's mem. acad. V. 386.

Ethiopian hog. Penn. quadr. p. 70. n. 53.

Habitat in Madagascar & calidissimis Africæ interioris, ferox, lamium purpureum fere olens, celer, scrofa agilior, vivacior, astutior, cum qua non coit; nondum adultus 4 pedes, & 9 pollices longus.

Corpus crassum, latum, nudiusculum, setis fasciculatis effusco nigris, in dorso longioribus, in nucha longissimis; caput ingens; rostrum truncatum, deorsum flexum, fere corneum; os parvum; loco dentium primorum, quibus caret, gingivæ antè duræ, convexæ; laves; laniarii infra minores, supra majores, apice sursum verso;

molares utrinque VI. auriculæ subacutæ ; oculi in summo capite , parvi , sibi auriculisque propiores , quam in scrofa , sub his faccus mollis , cute laxa nigra , cum appendice duriore zygomatica utrinque. Cauda nuda.

Babyrus- 5. S. dentibus duobus caninis fronti innatis.

fa. Sus dentibus caninis versus frontem reclinatis. *Erzl. mamm. p. 188. n. 5.*

Sus (Aper orientalis) caudatus, dentibus caninis superioribus ab origine sursum versis arcuatis, cauda floccosa. *Briss. regn. an. p. 110. n. 5.*

Τὸ τετρακτιδὸς. *Aelian. anim. XVII. c. 10.*

Aper in India. *Plin. hist. nat. VIII. c. 52.*

Aper cornutus. *Calpurn. eclog. 7. v. 58.*

Aper indicus orientalis, Babi Raesa dictus. *Seb. mus. I. p. 80 t. 50. f. 2.*

Porcus indicus Babyroussa dictus. *Raj. quadr. p. 96. Klein quadr. p. 25.*

Strange Hogs, Hogs with horns. *Purch. pilgr. II. p. 1695. V. p. 566.*

Horned hog. *Grew mus. reg. soc. p. 27. t. 1.*

Indian hog. *Penn. quadr. p. 73. n. 57. t. 11. f. 1.*

Babyroussa, Babiroussa, Babyrussa, Babi-Roessa. *Bont. ind. or. p. 61. Jacob. mus. reg. p. 5. t. 2. f. 5. Laus. mus. reg. t. 3. f. 28. Valent. Amboin. 3. p. 268. Buff. hist. nat. XII. p. 379. t. 48.*

Eberhirsch oder Hirscheber. *Knorr. delic. II. t. K. 7.*

Habitat in insula Java, Celebes & Buero prope Amboinam, in reliquis insulis oceani indici hospitatur cicuratus, an Χοιριόφας Cosma? gregarius, olfactu acris; herbis foliisque visitans, bene natans & urinans; voce scrofae similis; carne bona; magnitudo cervi.

Corpus gracilius, quam congeneribus, ex fusco griseum, fere lanatum, dorso tamen adpersis setis mollibus; caput oblongum angustum, oculis minutis; auriculis parvis, erectis, acutis; dentes molares in utraque maxilla utrinque V; laniarii superiores perforantes maxillam superiorem, recurvati instar duorum cornuum, inferiores magni minus recurvi; crura longa gracilia; cauda longa, contorta, apice floccosa.

MAMMALIA CETE. Balæna.

- γ. Balæna major, laminæ corneas in superiore maxillâ habens, bipinnis, fistula carens Sibb. *Raj. pisc.* p. 16. (nisi fida sit.)

Habitat versus polum arcticum, potissimum circa Groenlandiam & Spitzbergen, timidum, velocissimum animal, quamvis omnium maximum, ut 50-60, imo secundum alios 70-80, aliquando 100 pedes longitudine æquet, β. tamen minor graciliorque varietas; videtur cancro pedato & oculato, Argonauta arctica & Clione bitentaculata, β. medusis clupeisque. Femina, mammis 2 parvis abdominalibus gaudens, 9-10 menses gravida, simplicem, raro duplicem parit prolem, ad 10 pedes longam, quam mire amat. Caro sicca, in cauda magis succulenta, mollior, edulis, parum tamen sapida. Laminæ corneæ frequentissimi usus, apice & margine fissæ in fetas, in unico animali circiter 700, media longissima 18-20 pedibus æquali. Lardum inter cutem & carnem copiosissimum, ut ex unica balæna ejus obtineantur 70-90 dolia, ex quo tunc excoquitur oleum; has propter partes capitur, captura jam Isidori & Vincentii tempore notissima, teste Guilhelmo Britone, poeta seculi duodecimi, eo tempore ad littora Galliæ lucrosa & vulgata.

Caput partem tertiam corporis efficit, supra planiusculum tecti instar cum tuberculo, in quo spiracula; os longum, forma literæ S curvatum, ad oculos usque protensum; maxilla inferior, medio præsertim, latissima; lingua mollis, maxillæ inferiori adhærens, alba, ad latera nigro-maculata; oculi bovillorum magnitudine, laterales, remotissimi supra aures; cutis crassitie pollicis; epidermis calami scriptorii, nitida, raro tota nigra vel nigro & flavo varia, rarius tot alba. Angulus subacutus a media cauda subbifida secundum dorso medium extensus, brevis. Penis vaginatus, 6-8 pedes longus.

Phyfalus. 2. B. fistula duplici in medio anteriore capite, dorso extremo pinna adiposa. *Fn. suec.* 50. *Art. gen.* 77. *fyn.* 107.

Balæna tripinnis, ventre lævi. *Briss. règn. an.* p. 352. n. 5.

Balæna edentula, corpore strictiore, dorso pinnato. *Raj. pisc.* 9. *Klein miss. pisc.* II. p. 13.

Phyfalus bellua f. Physeter. *Gesn. aquat.* p. 851.

Physeter. *Plin. hist. nat.* IX. c. 4. XXXII. c. 11. *Rondel. pisc.* p. 485. *Aldrov. pisc.* p. 689. *Jonst. pisc.* p. 217. *Charlet. exerc. pisc.* p. 47. *Sibb. Scpt. an.* p. 23. *Willughb. pisc.* p. 41.

Finne-

Finne-fiske. *Egede Groenl.* p. 48.

Finnfisch. *Mart: Spitzberg.* p. 125. *tab. Q: fig. c. Andersf. Isl.* p. 219. *Cranz Groenl.* p. 145.

Habitat in oceano americano & europæo æqualis cum mysticeto longitudinis, sed minus pinguis, triplo vel quadruplo gracilior; oris rictu ampliore, laminis cornæis brevioribus cæruleis, carne magis sapida; aquam majori vi ex fistulis ejicit, vescitur clupeis & scombris; corpus nitidum fuscum subius album. Pinna dorsalis recta acuta; 3-4 pedes longa.

Boops: 3. B. fistula duplici in rostro; dorso extremo protuberantia cornea. *Art gen.* 77. *syn.* 107.

Balæna tripinnis, ventre rugoso, rostro acuto. *Briss: regn. an.* p. 355. n. 7.

Balæna tripinnis nares habens cum rostro acuto & plicis in ventre. *Raj. pisc.* 16.

Jubartes. *Klein miss. pisc.* II. p. 13.

Jupiterfisch. *Andersf. Isl.* p. 220. *Cranz Groenl.* p. 146.

Habitat in Oceano septentrionali & meridionali 46 pedes longa; circa pinnas pectorales 20 pedes in ambitu crassa; lævissima; nigra; abdomine albo; secundum longitudinem rugoso. Caput oblongum; rostro subacuto; lingua 5 pedes longa; bovillæ similis; oculi prope angulos oris siti, bovillorum magnitudine.

gibbosa. 5. B. dorso gibboso, pinna dorsali nulla.

α. Balæna bipinnis, gibbis dorsalibus sex. *Briss: regn. anim.* p. 351. n. 4.

Balæna gibbis dorsalibus sex. *Erxl. mamm.* p. 610. n. 5.

Balæna gibbis vel nodis sex, balæna macra. *Klein miss. pisc.* II. p. 13.

Knotenfisch oder Knöbelfisch. *Andersf. Isl.* p. 225. *Cranz Groenl.* p. 146.

β. Balæna (novæ Angliæ) bipinnis, unico in dorso gibbo. *Briss: regn. anim.* p. 351. n. 3.

Balæna gibbo unico prope caudam. *Klein miss. pisc.* II. p. 12.

Pflockfisch. *Andersf. Isl.* p. 224. *Cranz Groenl.* p. 146.

Habitat β. circa novam Angliam, gibbo versus caudam sito caput humanum superante; α. figura mysticeti, laminis cornæis albis.

Muscu- 4. B. fistula duplici in fronte, maxilla inferiore multo latiore.
lus.

Art. gen. 78. syn. 107. spec. 106.

Balæna tripinnis, ventre rugoso, rostro rotundo. *Briffon regn. an. p. 353. n. 6.*

Balæna tripinnis, maxillam inferiorem rotundam & superiorem multo latiore habens *Sibb. Raj. syn. pisc. p. 17.*

~~Phæna~~, Balæna, Balæna, Baleine, Italis Capidolio. *Belk aquat. p. 4. 6.*

Balæna Bellonii. *Aldrov. pisc. p. 676.*

Habitat in mari scotico, viditans clupeis supra nigra, subtus alba, 78 pedes longa, ambitu 35 pedes superante; maxilla inferior semicircularis, superior apice acuta; nictus ingens; laminæ corneæ nigrae breves, ut longissimæ tres pedes non excedant; fistula pyramidalis, versus frontem posita, septo divisa; abdomen rugis plurimis; dorsum pinna adiposâ.

rostrata. 6. B. ore rostrato, dorsi pinna adiposa.

Balæna (rostrata) minima rostro longissimo & acutissimo. *Müller zool. dan. prodr. p. 7. n. 48. Chemnitz Besch. der berl. Naturf. IV. 183.*

Balæna ore rostrato, balæna tripinnis edentula minor, rostro parvo. *Klein miss. pisc. II. p. 13.*

Habitat in mari norwegico, Boopi satis similis, subpinguis, nigerrima, 25 pedes longa, celerrime natans, visu acuto; maxilla inferior superiore crassior; in superiore dentem lateralem solitarium, laminas corneas nullas observavit Chemnitz, an ergo hujus generis?

39. PHYSETER. *Dentes* in maxilla inferiore, nulli in superiore.

Fistula in capite s. fronte summa.

Catodon. 1. Ph. dorso impinni, fistula in rostro.

Catodon fistula in rostro. *Art. gen. 78. syn. 108.*

Cetus (minor) bipinnis, fistula in rostro. *Briss. regn. anim. p. 361. n. 4.*

Balæna minor, in inferiore maxilla tantum dentata, sine pinna aut spina in dorso *Sibb. Raj. pisc. p. 15.*

Habitat in Oceano septentrionali, 24 circiter pedes longus; capite rotundo; ridu parvo; fistula nasum referente in rostro.

macroce- 2. Ph. dorso impinni; fistula in cervice.

phalus. *Catodon fistula in cervice. Fn. succ. 53. Art. gen. 78. syn. 108.*

4. *Cetus bipinnis supra niger infra albicans, fistula in cervice. Briss. regn. an. p. 357. n. 1.*

Catodon fistula in nucha, dorso topho instructo, the Spermaceti Whale. Brown. jam. p. 459.

Cete Pot Walfish Batavis maris accolis dictum, & Balæna major, in inferiore tantum maxilla dentata macrocephala, bipinnis Sibb. Raj. pisc. p. 11. 15.

Balæna. Jonst. pisc. p. 215. t. 41. 42. Willughb. pisc. t. A. 1. f. 3.

Aliud cete admirabile. Clus. exot. p. 131.

Cete Clusio descriptum, Pot-Walfisch Batavis maris accolis dictum. Willughb. pisc. p. 41.

Cete Clusii. Klein miss. pisc. II. p. 14.

Cetus dentatus. Mus. Worm. p. 280. Charlet. exerc. pisc. p. 47. Sibb. Scot. an. p. 23.

Cachelot. Klein miss. pisc. II. p. 14. Egede Groenl. p. 54. Anderf. Ist. p. 232. Cranx Groenl. p. 148.

5. *Cetus (albicans) bipinnis ex albo flavescens, fistula in cervice, dorso lævi. Briss. regn. anim. p. 359. n. 2.*

Balæna albicans, Weisfisch Martenii & Zorgdrageri. Klein miss. pisc. II. p. 12.

Albus piscis cetaceus. Raj. pisc. p. 11.

Poisson blanc, Hvild-fiske. Egede Groenl. p. 55.

Weisfisch: Mart. Spitzb. p. 94.

7. *Cetus (novæ Angliæ) bipinnis, fistula in cervice, dorso gibbofo. Briss. regn. an. p. 360. n. 3.*

Dudleji Balæna. Klein miss. pisc. II. p. 15.

MAMMALIA CETE. Physter.

Habitat α) in oceano Europæo, β) in freto Davis, γ) circa novam Angliam; α) ad & ultra 60 pedes longus, 36 pedes in ambitu crassus, supra niger infra albus; caput crassissimum, maxilla inferiore minore cum dentibus 46 duplici serie 2-3 pollices ex gingiva exsertis, a totidem alveolis in maxilla superiori exceptis. *Mammae retractiles. Viçitat potissimum sepia octopodia.*

Ex hujus capite sperma ceti, propriae cavitati ossæ, cute communi obteçæ inclusum; ex intestinis ægri debilis-que ambra grisea, quæ non est, nisi ejus scybala, præter naturam indurata. Schwediamer act. angl. ann. 1783. P. 1. n. 15.

β. figura mysticeti, capite tamen acutiore; 15-16 pedes modo longus, ex albo flavescens; dentibus parumper incurvis, compressis, apice rotundatis.

γ. ex cinereo nigricans 60-70 pedes longus, 30-40 in ambitu crassus, gibbere dorsali pedem crasso, capite prægrandi, oculis exiguis; maxilla inferior superiore multo angustior dentibus plurimis munita, superior totidem alveolis.

microps. 3. Ph. dorso pinna longa, maxilla superiore longiore. *Art. gen. 74. syn. 104.*

α. Cetus tripinnis, dentibus acutis arcuatis falciformibus. *Briff. regn. an. p. 363. n. 6.*

Balæna major in inferiore tantum maxilla dentata, dentibus arcuatis falciformibus, pinnam seu spinnam in dorso habens. *Sibb. Raj. pisc. p. 15.*

Balæna major, in inferiore tantum mandibula dentata, dentibus arcuatis falciformibus, pinnam seu spinnam in dorso habens. *Klein miss. pisc. II. p. 15.*

Dritte Species der Cachelotte. *Anderf. Isl. p. 248.*

β. Cetus tripinnis, dentibus acutis, rectis. *Briff. regn. anim. p. 362. n. 9.*

Zweyte Species der Cachelotte. *Anderf. Isl. p. 246.*

Habitat in oceano septentrionali; caput maximum; maxilla superior tot alveolis exarata, quot dentibus armata inferior, oculi exigui; cutis lævissima. α) ad 70 pedes longus ex fusco nigricans, phocænas exagitat sæpe usque in

ipsam terram. Dentes 42 rotundi, parumper compressi, falcis instar curvati, medio crassiores; fistula paululum sub rostri medio; pinna dorsalis sat longa acuminata, ut spinam fere referat.

β) 80-100 pedes longus, supra nigricans, subtus albicans, gibbere altissimo in parte dorsi superiore, & pinna caudam versus posita; caput dimidia fere corporis longitudine; oculi splendentes, flavicantes; lingua parva, acuta; dentes crassi, recti, apice acuti, quasi serræ.

Tursio. 4. Ph. dorsi pinna altissima, apice dentium plano. *Art. Gen.* 74. *syn.* 104.

Cetus tripinnis, dentibus in planum desinentibus. *Brissø reg. anim.* p. 364. n. 7.

Balæna macrocephala tripinnis, quæ in mandibula inferiore dentes habet minus inflexos & in planum desinentes *Sibb. Raj. pisc.* p. 16.

Mular Nierembergii. *Klein miss. pisc.* II. p. 15.

Habitat in oceano septentrionali, 100 pedes longus & longior, pinna dorsi longissima, acuta, erecta, ut navis malum quasi referat, fistula in fronte posita, dentibus minus inflexis & apice planis; ceterum micropi similis.

40. DELPHINUS. Dentes in maxilla utraque.

Fistula in calvarie parte anteriore & superiore.

Phocæna. 1. D. corpore subconiformi, dorso lato, rostro subobtusato. *Fn. suec.* 51. *Art. gen.* 75. *syn.* 104.

Delphinus (Phocæna) pinna in dorso una, dentibus acutis, rostro brevi obtuso. *Brissø regn. an.* p. 371. n. 2. *Bloch Fisch. Deutschl.* 2. p. 119. t. 92.

Tursio. *Plin. hist. nat.* IX. c. 9. *Bellon aq.* p. 15. *Rondelet pisc.* p. 474. *Schonev. ichth.* p. 77. *Klein miss. pisc.* II. p. 26. t. 2. A. B. 3. B.

Phocæna, Tursio, Marfouin. *Bellon. aq.* p. 16.

Phocæna. *Rondelet pisc.* p. 473. *Gesn. aq.* p. 837. *Aldrov. pisc.* p. 719. fig. p. 720. *Jonst. pisc.* p. 221. t. 41. *Char-*

MAMMALIA CETE. Delphinus.

let. exerc. pisc. p. 48. Sibb. Scot. an. p. 23. Willughb. pisc. p. 31. t. A. 1. fig. 2. Raj. pisc. p. 13. Rzacz. Pol. aud. p. 245. Klein miss. pisc. I. p. 24.

Meerschwein oder Tunin. *Mart. Spitzb. p. 92. Anderf. Isl. p. 253. Cranz Groenl. p. 151.*

Nifer ou le Marfouin. *Eged. Groenl. p. 60.*

Delphin oder Nifen. *Gunner. ad. Nidros. II. p. 237. t. 4.*

Habitat in oceano Europæo & mari Balthico, 5-8 pedes longus, supra ex nigro carulescens, subtus albus; caput obtusiusculum; oculi perexigui; pone hos foraminulum auditorium, interque eos spiraculum lunatum, sinu antrorsum verso; dentes parvi acuti, in utraque maxilla 46; penis foramen lineare pone umbilicum sive sub pinna dorsali; anus medius inter penem & caudam subbifurcam.

Delphis. 2. D. corpore oblongo subtereti, rostro attenuato acuto. *Art. gen. 76. syn. 105.*

Delphinus pinna in dorso una, dentibus acutis, rostro longo acuto. *Briss. regn. an. p. 369. n. 1.*

Ant. Arist. hist. an. I. c. 5. II. c. 9. III. c. 1. 7. 16. IV. c. 9. 10. IX. c. 74. Aelian. an. I. c. 18. II. c. 6. V. c. 6. VIII. c. 3. X. c. 8. XI. c. 12. 22. XII. c. 6. 45.

Delphinus. *Plin. hist. natur. IX. c. 7. 8. XI. c. 37. Bellon. aquat. p. 7. fig. p. 9. 10. Rondel. pisc. p. 459. Gesn. aquat. p. 380. fig. p. 381. Aldr. pisc. p. 701. 703. 704. Jonst. pisc. p. 218. t. 43. Mus. Worm. p. 288. Charlet. exerc. pisc. p. 47. Willughb. pisc. p. 28. t. A. 1. fig. 1. Raj. pisc. p. 12. Rzacz. Pol. aud. p. 238. Klein miss. pisc. II. p. 24. t. 3. f. A.*

Porcus marinus. *Sibb. Scot. an. p. 23.*

Delphin. *Anderf. Isl. p. 254. Cranz Groenl. p. 152.*

Habitat in oceano Europæo, & mari pacifico, adhærens sæpius balænis, ut exsiliant; supra niger, subtus albus; major phocæna, minor orca, ita ut longitudine 9-10 pedes, crassitie, si diametrum metiaris, 2 pedes æquet, phocæna hinc gracilior; rostrum longius & magis acutum, supra cinctum fascia lata transversa; dentes subulati;

oris scissura magna ad thoracem usque; genitalia inter umbilicum & anum media; renes conglomerati.

- Orca. 3. D. rostro sursum repando, dentibus latis ferratis. *Mantiss. M. 2. p. 523. Fn. suec. 52. Art. gen. 76. syn. 106. Gunn. ad. Nidrosf. 4. p. 110.*

Delphinus (Orca) pinna in dorso una, dentibus obtusis. *Briss. regn. an. p. 373. n. 4.*

Balanæ minor utraque maxilla dentata *Sibb. Raj. pisc. p. 15.*

Orca. *Plin. hist. nat. IX. c. 6. XXXII. c. 11. Bellon. aquat. p. 16. fig. p. 18. Rondel. pisc. p. 483. Gesn. aquat. p. 748. Schonev. ichth. p. 53. Aldrov. pisc. p. 697. fig. p. 698. Jonst. pisc. p. 217. Charlet. exerc. pisc. p. 47. Wil-lughb. pisc. p. 40. Raj. pisc. p. 10. Klein. miss. pisc. II. p. 22. t. 1. f. 1. Steller Camtschatc. p. 104.*

Wagnhyalur vel Hualhund. *Mus. Worm. p. 279.*

Butskopf. *Mart. Spitzb. p. 93. Andersf. Isl. p. 252. Cranz Groenl. p. 151.*

Buts-kopper, *Egede Groenl. p. 56.*

- B. Delphinus pinna in dorso una gladii recurvi æmula, dentibus acutis, rostro quasi truncato. *Briss. regn. an. p. 372. n. 3.*

Delphinus (Orca) dorsi pinna altissima, dentibus subconicis parum incurvis. *Müll. zool. Danic. prodr. p. 8. n. 57.*

Schwerdtfisch. *Andersf. Isl. p. 255. Cranz Groenl. 152.*

Noch ein ander Art grosse Fische. *Mart. Spitzb. p. 94.*

Habitat in oceano Europæo, mari atlantico, ad polum antarcticum, in freto Davis, maximus congenerum, ut 24-25 pedes longitudine, 12-13 latitudine æquet, supra niger subtus albus, cum phocis, quas pinna dorsalis ope a lapidibus detrudit, continuum bellum gerens, has & balænas turmatim aggrediens, & una cum pleuronædis maximis occidens & devorans. Maxilla inferior superiore multo major; rostrum finum; dentes obtusi 40; oculi parvi; spiraculum planum biloculare. Pinna s. spina dorsalis β ensiformis, cute communi vestita, basi latior, sæpe sexpedalis.

Leucas, 4. D. rostro conico obtuso, deorsum inclinato, pinna dorsali nulla. *Pall. it. III. p. 84. t. IV.*

D. pinna in dorso nulla. *Briss. regn. an. p. 374. n. 5.*

Beluga. *Penn. quadr. p. 357.*

Bieluga. *Steller Camtschatc. p. 106.*

Wittfisch oder Weisfisch. *Anderf. Isl. p. 251.*

Weisfisch. *Cranz Groenl. p. 150.*

Habitat ad polum arcticum, rarius in fluvios ascendens, gregarius, glaberrimus, lubricus, albus, junior tamen parumper nigricans, 18 pedes nunquam excedens longitudine, medio crassior, versus utrumque finem magis attenuatus, celerrime natans. Caput oblongum, parvum; oculi exigui, rotundi, prominuli; spiraculum in fronte, in palato per septum divisum; dentes in utraque maxilla utrinque 9 breves, & satis obtusi. Pinnæ pectorales pingues, ossibus digitalibus 5. Cauda cartilaginea, biloba. Mammæ feminae 2 lacte albo refertæ; penis mari triuncialis brachii crassitie absque cartilagine aut osse.

CLASSIS II.

A V E S.

*Ipsi lætitia voces ad sidera mittunt
Intonsi montes, ipsæ jam carmina rupes,
Ipsa sonant arbuscula.*

VIRGIL. ecl. V. 62.

AEREÆ vocales Volucres pulcherrimæ, *Mandibulis protractis nudis, Corpore pennis imbricato. Alis duabus pennatis volitantes bipedes* dignoscuntur.

AVES levissimæ modici ponderis & magnitudinis, testæ pennis plumisque, destitutæ *Auriculis, Labiis, Scroto, Dentibus, Utero, Vesicâ urinaria, Epiglottide, Fornice, Corpore calloso, Diaphragmate.*

PENNÆ avibus propriæ imbricatim in quincuncem dispositæ, intertinctæ *Plumis*, distinctæ a *Remigibus Rectricibusque*, omnes supra convexæ, subius concavæ: latere exteriori angustiores; interiori latiores; anteriore laxiores; posteriore strictiores; scilicet e baseos cylindro tubuloso referto aërifero vase lymphaticis simili, *Rachii* elongatæ, bifariam radiis parallelis approximatis distinctis itidem pinnatis ancipites.

Colore ludunt, sed variant ætate, sexu, tempestate, climate; constantiores *Remiges & Rectrices*, quæ attente notandæ (*).

Nuda cutis utrinque ad colli latera a capite versus interscapulium, ab axillis per latera pectoris fere ad inguina & ad femora postica.

OVA his animalibus communia (p. 8. n. 4.) numero diversis vario, sed majora pro mora exclusionis siccæ, semper putamine calcareo oblecta, incubatu calido excludenda Parentis, in *Nido* artificioso. *Trachea* multis musculis munita, annulis constat mere cartilagineis, in nonnullis avibus ipsa adeo branchia.

Receptacula aëreâ per totum corpus dispersa, ad volatum cantumque summe necessaria cum pulmonibus aut ore commercium alentia, ut pro arbitrio aëre vel impleri vel evacuari possint; huc spectat tela cellulosa abdominalis subaxillaris aliaque subcutanea, potissimum vero (exceptis scolopacibus, fulicis, & anseribus) ossa intus cava &

(*) *Aff. Stockh.* 1740. p. 370. t. 1. f. 10. 12.

medullæ expertia, femoris, brachii, sterni, costæ, coræ, humeri, claviculæ, dorfi quoque spina, in paucioribus cranium aut maxilla inferior, in quæ posteriora per os aut tubum Eustachii intrat aer.

DIVIDITUR Avium corpus in *Caput*, *Truncum*, *Artus*.

Caput tegitur supra *Pileo* e *Vertice*, *Fronte* & *Occipite* unitis, cingens rostrum antice *Capistro*, in quo *Lora* e lineis duabus nudis a rostro ad oculos ducta; *Orbitæ* ambiunt oculos, supra quos *Supercilia*; inter oculos & aures *Tempora*; inter oculos vero & gulam *Genæ* sunt.

Rostrum in variis varium: *Rectum*, *Incurvum*, *Recurvatum*, *Teres*, *Compressum*, *Depressum*, *Conicum*, *Subulatum*, *Cylindricum*, *Angulatum*, *Cultratum*, *Fornicatum*, *Uncinatum*.

Mandibula nudæ edentulæ, quibusdam pone apicem *emarginata*, paucis *serrata*, exporrectæ in *Rostrum* corneum, *Naribus* pertusum, superioris basi quibusdam *Cera* nuda vestita, *Vibrissæ* pectinatim ciliatis ad faucis exterioris margines.

Lingua carnosæ, cartilaginea, emarginata, lacera, pennacea, ciliata, integra s. acuta.

Oculi laterales *Palpebris Membranaque* niditante detergendi; lente crystallina mobilissima, in oculis nigris, plicatis, conicis recondita. *Superciliorum* loco interdum linea picta, rarius carunculata.

Aures truncatæ absque auriculis, quarum loco pennæ strigibus longæ.

Barba Mystacea ad mandibulas inferiores, mobilis Momotæ, Pendulino; in ipso pectore pendula Meleagridi adulto; at *Capistrum* reversum regit basin rostri Corvis, Picis, Strigibus.

Crista pennacea pilei Frontalis, Verticalis, Occipitalis, Erecta, Recurvata, Deflexa, Plicatilis, Compressa; *Caruncula* vero carnosæ nudæque Frontis, Verticis, Nuchæ, Superciliorum, Gulæ, Juguli, sunt ornamenta capitis in variis.

Collum elongatum, erectiusculum, teres, supra incipit *Nucha*, continuatur *Cervice*; infra vero incipit *Gula*, continuatur *Jugulo*.

TRUNCUS ovatus constans *Dorso* coadunato macro, subtus supra *Sternum* magnum carinatum musculosissimo *Pedore*, *Claviculis* coadunatis in *Furcam*, *Abdomine* minore, postice sub uropygio perforato *Ano*, genitalibus communi, & terminato *Crisso*.

ARTUS sunt Brachiales *Alæ*, veri *Pedes*, Caudale *Uropigium*.

ALÆ compressæ, *Offium* articulis mobiles, testæ Pennis, demum *Tedricibus* primis secundisque, postice ciliatæ *Remigibus*, explicantur hæ in fornicatum ventilabrum volitanti; complicantur stabulanti primoribus subeuntibus secundariis, ut hæ latere anteriore

depingant specificum *speculum* nitidum Anatum; nec deficiunt, nisi in *Impennibus* pelagicis (Diomedea demersa, Alca impenni) vel volatui ineptis (Struthione, Dido).

OSSA α . *Brachii* 1 elongatum. β . *Cubiti* 2 elongata. γ . *Carpi* 2 brevissima. δ . *Metacarpi* 2 connexa mediocria. ϵ . *Digiti* 2 attenuata, altero majore biarticulato, compresso; altero minuto. ζ . *Pollicis* vero 1 minutum, infidens basi anteriori metacarpi, raro *spina* evadens (Parris, Charadrius, Struthioni) adjacente spina cetacea.

REMIGES *Primores* X: quorum 1-4 *Digiti*, 5-10 *Metacarpi*; *Secundarii* 10-20 f. 28 *Cubiti*, nulli vero *Brachii*; at *Alula* spuria pennis 3 f. 5 *Pollicis* infidet.

PEDES ex Femore, Tibia, Digitis, Unguibus.

FEMORA ex Osse Femoris Crurisque binis altero cetaceo, carnosa, pennistecta, præterquam cruribus denudatis in *vadantibus* Grallis; ceterum plerisque æquilibrio supposita, nisi in *Compedibus* ambulare nesciis, quibus intra commune abdominis tegmen recondita (Alcis, Colymbis); nonnullis *Armilla* supra genua cingunt colorata.

TIBIÆ ex osse Tarsi elongato, macres, angustæ, tendinosæ, nudæ, rariusve *villosæ plumosæve*, paucis postice *Spina calcareata*; inprimis masculis.

DIGITI e Metatarsi phalangibus, plerumque IV, quorum unus posticus breviorque, intermedius anterior vero longior, sed *Scanforiis* digiti antici 2, posticique 2; *Cursoriæ* vero postico destituuntur *tridactylæ* (Charadrius, Hæmatopus, Otis, Casuarius), rarissime *didactylæ* (Struthio Camelus). Sunt vero *Digiti* distincti *Fissipedibus* plerisque; vel intermedius adnatus laterali *Gressoriis*; vel anteriores intertexti membrana integra *Natatoriis*; quæ fissa in *Lobatis*, vel basi tantum intertexta *Semipalmatis* pedantibus, vel articulus membranula marginali *Pinnatis*.

UNGUIES, quibusdam obtusi, paucis marginati, paucissimis nulli.

UROPYGIUM sessile, cordatum, glandula gemina caudæ brevi adposita tumidum, supra pertusum Poro oleifero, cincto Penicillo, ambitu ciliatum Rectricibus Caudæ:

RECTRICES sæpe XII (1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1); plures (18) Gallinis; pauciores (10) Picis (Pico, Certhiæ, Cuculo, Yungi, Bucero, Ramphasto, Trochilo).

CAUDA inde vel *Pedibus* brevior *brachyuris*, vel longior *macrouris*; ex *Rectricibus* æqualibus *integra*, vel ad latera per gradus brevioribus *cuneata*, aut lateralibus longioribus *forficata*, in quibus omnibus *Rectricibus* complicatis subeunt laterales intermedix.

VOLATILES hæ, *Telluris* vigiles libidinofique musci, cantu tamen aut amorum interprete, aut adscitio; pleræque *Diurnæ*; paucæ *Nocturnæ* (e. g. *Striges*, *Caprimulgi*), quarum variæ noctu cantant (*Luscinia*, *Turdi*) & mane (*Tetraones*, *Gallinacei*), pleræque inermes sunt, cum *Alarum* remigibus se facile in æthera recipiant ab hostibus terrestribus, & *Caudæ* rectricibus aëreos diverso volatu eludant, nisi in terra negotiari necesse sit, quibus odor vel ingratus hostes arcet, vel abolitus occultat; dum aliæ speculantur hostem appropinquantem indicantque aliis: *Lanius*, *Yunx*, *Parra*, *Hæmatopus*, *Meleagris*, *Hirundo* *purpurea*, &c.

ARMA paucis, præter *Rostrum* & *Ungues* plerisque.

Cornua *Meleagridi* cornutæ, *Palamedææ*,

Calcaria *Pavoni*, *Phasiani*, *Tetraoni*.

Spina (pollicares) *Struthioni* *Camelo*, *Parræ*,

Charadrio spinoso, *Palamedææ*.

VENERE *monogama* junguntur pleræque *Aves*, *polygama* pauciores, ut *Gallinæ*, *Anates*. Illæ utriusque sexus conjunctis viribus struant nidum sæpe artificiosissimum (pendulam, natantem, concameratum, argillosum, foraminosum, nullumve) uteri succedaneum, incubant sedulæ ovis (1 *Alca*, 2 *Colymbus*, 3 *Larus*, 4 *Corvus*, 5-8 *Hirundo*, pluribus *Anates*, *Gallinæ*), pullos famelicæ alunt (ostendendo, porrigendo, regurgitando), fovent, curant, pro aris & focis defendunt, *) dum in his orientur mares. Nuptias celebrant vestitu, musica, ludibus pleræque.

MIGRATIONES annuas inter septentrionales æstivas & australes hybernas plagas arcticæ *Telluris* plures instituunt internuncii hî naturæ, ne hyeme demergerentur boreales omnes insectivoræ. Sic migrant plurimi *Passeres* inprimis *tenuirostres*, ob defectum insectorum; *Grallæ* ob denegatum glacie aditum; *) & amphibii: *Anseres* ob congelatas aquas includuntur *) &c. Revocant vero easdem Dies æstatis longiores, cibos, *) *Spina*, denfiores vestitus, nuptiæ paratæ. Pauciores hybernant.

HABITANT aliæ intra *Tropicos*, ut *Phaëton*; intra *Polos*, ut *Procellaria* glacialis; aliæ *alibi*, ad *Africæ* promontorium australe *Procellaria* capensis; in *India* *Paradisea*, *Pavones*; in *Africa* *Struthio* 1.

*) *Mos. Deuteron. XXII. 6. 7.*

Pelecanus 1. in *America* Palamedea, Psophia. In *Pelago* impen-
nes compedes; in *Mari* Procellariæ; in *Lacubus* Colymbi; in *Flu-
viis* Mergi; in *Cataractis* Cinclus; in *Littoribus* Charadrii; in
Paludibus Scolopaces, Tringæ; in *Campis* Otis, in *sylvis* *Lanius*
infaustus; in *Arboribus* Passeres; in *Rupibus* Bubo; in *Pagis*
Pica, *Hirundo*; in *Alpibus* *Turdus* roseus, *Emberiza* nivalis, &c.

VICTUS cuique suos. Aliæ Carnivoræ; vorant *Cadavera* *Accipitres*,
Corvi; *Pisces* Anferes; *Insecta* Passeres tenuirostres, & trochili;
larvas cochleasque cornix; *larvas Cerambycum* Pici; *Lepidopte-
rorum* Cuculus; *Ricinos* Crotophaga; *Oestros* Buphaga; *Oniscos*
Cinclus; *Phryganeas* Hirundines; *Conchas* Hæmatopus; *Caneros*
Myæria, *Cancroma*; *Squillas* Recurvirostra, *Lumbricos* Crex.
Aliæ Phytiphagæ: visitant *Plantis* Anferes; *Pomis* Psittaci;
Nucibus Caryocatactes; *Nucleis* Coccythraustes; *Strobilis* Cur-
virostra, Enucleator.

OPERA, nec sine fructu, peragunt sua singulæ: sedentes *Accipitres*
Cadavera auferunt, ut vivis parcant; incedentes *Picæ* Quisquil-
ias impuras verminosasque devorant; natantes *Anferes* Aqua-
rum nimios hospites minuunt; vadantes *Grallæ* inquirent in
Paludum animalcula; currentes *Gallinæ* decidua grana legunt;
salientes *Passeres* arbustorum herbarumque Semina insectaque car-
punt; eoque varia femina Piscium, Insectorum, Plantarumque
sæpius in remotissima loca deferunt naturæ disseminatores. Con-
quiruntur *Venatu*; *Falconaria*; *Aucupio*; instituuntur Falcones
ad *venatum*, Parræ ad *pastoritiam*, Pelecani ad *piscaturam*,
Passeres ad *muscam*. Mansuescunt *Gallinæ*, *Anates*, *Passeres*
que varii. In Ornithone s. aviario coluntur ob *carnes*, *ova*, *plu-
mas*, *pennas*, pulchritudinem, sonum.

HISTORIA Avium absolvitur *Descriptione*, *Habitatione*, *Volatu*,
Migratione, *Nuptiis*, *Nidificatione*, *Ovatione*, *Incubatione*,
Educatione, *Vidu*.

GENERUM Characteres desumendi a *Rostro*, *Lingua*, *Naribus*, *Ce-
ra*, *Caruncula*, reliquisque partibus denudatis.

ORNITHOLOGI eminentiores in Veteres & Recentiores dispeſcuntur.

VETERUM *Bellonius* 1557 & *Gesnerus* 1555 patres artis; horum
aves collegit & auxit 1599 *Aldrovandus*, Brasilienses novas ad-
dente *Marcgravius* 1648; has omnes digessit & auxit *Willughby*
cum suo *Rajo* 1713, iconesque varias dedit *Marfiglius* 1726.

RECENTIORES vivis *Coloribus* nova luce illustrarunt artem, Europæas
Albinus 1731, Europæ meridionalis (1772-1782) *Bernini*, Sar-
das (1776) *Cetti*, Germanicas *Frischius* 1734, belgicas (1770-1778)

Nozemannus & Seppit, suecicas nonnullas *Tengmalm*, borussicas *Bockius*, britannicas *Hages* 1775, has æque ac indicas 1768-1777. *Pennantus*, rariorum novarumque avium Centuriam unam *Cateby* 1731, tres & ultra centurias pulcherrimas *Edwards* 1745, centurias novem & ultra (ab anno 1775) *Daubentonius*, pauciores *Jos. Fr. Nobis* a *Jacquin* 1784, *Bl. Merrem* 1784-1786, & in musei Carlsoniani descriptione *Sparrmannus* 1786; ova variarum avium descripta a *Günthero* pinxit *Wirsingius* (1703):

Avium anatome & physiologia multa debet *Reaumurio*, *Hewsonio*, *Campero*, *Huntero*, *Blumenbachio*, *Merrem*, *Blochio*, *Vicq d'Azyr*, *Pallas*, *Göldenstaedtio*, *Silberschlagio*, *Malacarne*.

SYSTEMATICAM in formam aves reducere tentavit de suecicis *Fauna mea* 1746, *Systemaque Naturæ* 1758; omnes collegit & digessit *Brissonus* 1760, cui integrum exercitum & notarum & novarum obulere labores & museum magni *Reaumurii*. Nuperius idem tentarunt 1781 *Pennant* & 1785 *Latham*:

ASSERVANTUR vel in spiritu vini integræ, vel siccæ; vel exuviis integris *sardis* aut dimidiatis *gypso* fixato repletis, methodo *Schæfferi*.

ORDINUM Characteres.

I. ACCIPITRES.

ROSTRUM (*Uncus trahens*) subincurvatum. Mandibula superiore pone apicem utrinque dilatata s. dente armata : Naribus patulis.

PEDES infidentes, breves, robusti : *Digitis* sub geniculis verrucosis, Unguibus arcuatis acutissimis.

CORPUS Capite Colloque musculosis; Cute tenaci. Impurum.

VICTUS : Laniena Rapinaque e cadaveribus.

NIDUS in altis; Ova circiter 4; Femina præstantior. Monogamia. Analogi *Feris*.

II. PICÆ.

ROSTRUM (*Cuneus sarriens*) cultratum dorso convexo.

PEDES ambulantes, breves, validiusculi.

CORPUS tenaciusculum impurum.

VICTUS e Quisquiliis.

NIDUS in Arboribus; *Mas* alens feminam incubantem. Monogamia.

Analogæ *Primitibus*.

III. ANSERES.

ROSTRUM (*Cribrum colans*) læve, epidermide tectum, apice auctum.

PEDES natatorii digitis membrana palmatis : *Tibiis* compressis, brevibus.

CORPUS pingue, Cute tenaci, Plumis præstantioribus. Rancescens.

VICTUS in Aquis ex Plantis, Piscibus, &c.

NIDUS sæpius terrestris. Mater rarius porrigit pullis; frequentius Polygamia.

Analogi *Belluis*.

IV. GRALLÆ.

ROSTRUM (*Bacillus tentans*) subcylindricum.

PEDES vadantes Femoribus seminudis.

CORPUS compressum pelle tenuissima; *Cauda* brevi; *Sapidum*;
VICTUS in Paludibus ex animalculis.

NIDUS in terra sæpius; *Nuptiis* variis.

Analogæ *Brutis*.

V. GALLINÆ.

ROSTRUM (*Harpa colligens*) convexum: *Mandibula* superiore fornicata supra inferiorem; *Naribus* membrana cartilaginea fornicatis.

PEDES cursorii *Digitis* subtus scabris.

CORPUS sebaceum, musculosum. Purum.

VICTUS in Terra e Granis in ingluvie macerandis. Pulveratrices.

NIDUS in Terra absque arte; *Ovis* numerosis, *Pullis* cibus monstrandus. Polygamia.

Analogæ *Pecoribus*.

VI. PASSERES.

ROSTRUM (*Forceps excipiens*) conico-acuminatum.

PEDES salientes, teneri, fissi.

CORPUS tenellum; *Granivoris* Purum, *Insectivoris* Impurum.

VICTUS in arboribus e Seminibus aut Insectis.

NIDUS artificiosus; *Pullis* cibus inculcandus. Monogamia.
 Cantus.

Analogi *Gliribus*.

CHARACTERES AVIUM.

I. ACCIPITRES.

41. VULTUR. Rostrum *aduncum*. Caput *denudatum*.
 42. FALCO. Rostrum *aduncum basi Cera tectum*.
 43. STRIX. Rostrum *aduncum capistro reverso*.
 44. LANIUS. Rostrum *rectiusculum, emarginatum*.

II. PICÆ.

* *Pedibus ambulatoriis.*

66. TROCHILUS. Rostrum *incurvatum, apice tubuloso*.
 65. CETHIA. Rostrum *incurvatum, acuminatum*.
 64. UPUPA. Rostrum *incurvatum, obtusiusculum*.
 GLAUCOPIS. Rostrum *incurvatum, fornicatum. Lingua serrata;*
ciliata.
 48. BUPHAGA. Rostrum *rectum, quadrangulare*.
 60. SITTA. Rostrum *rectum, apice cuneato*.
 52. ORIOLUS. Rostrum *rectum, conicum acutissimum*.
 51. CORACIAS. Rostrum *cultratum, apice incurvo*.
 53. GRACULA. Rostrum *cultratum, æquale, basi calva*.
 50. CORVUS. Rostrum *cultratum, capistro reverso*.
 64. PARADISEA. Rostrum *subcultratum, capistro holosericeo*.

* * *Pedibus scanforiis.*

- RAMPHASTOS. Rostrum *ferratum. Lingua pennacea*.
 55. TROGON. Rostrum *ferratum, apice aduncum*.
 45. PSITTACUS. Rostrum *cera obductum. Lingua carnosæ*.
 49. CROTOPHAGA. Rostrum *rugosum, margine angulatum*.
 59. PICUS. Rostrum *angulatum. Lingua lumbriciformis*.
 58. YUNX. Rostrum *læve. Lingua lumbriciformis*.
 CUCULUS. Rostrum *læve. Nares marginatæ*.
 50. BUCCO. Rostrum *læve, emarginatum, aduncum*.

Nares capistri pennis recumbentibus obtectæ in Corvo, Pico, Buccone, Strige, Mandibulæ serrata in Ramphasto; Bucero, Trogone.

* * * *Pedibus gressoriis.*

47. BUCEROS. Rostrum *ferratum*, *fronte ossa*.
 62. ALCEDO. Rostrum *trigonum*, *rectum*.
 63. MEROPS. Rostrum *incurvatum*, *compressiusculum*.
 61. TODUS. Rostrum *lineare*, *depressum*, *rectum*.

III. ANSERES.

* *Rostro denticulato.*

67. ANAS. Rostrum *ungiculatum*, *denticulis membranaceis*.
 68. MERGUS. Rostrum *ungiculatum*, *denticulis subulatis*.
 74. PHAETON. Rostrum *cultratum*.
 73. PLOTUS. Rostrum *subulatum*.

* * *Rostro edentulo.*

78. RHYNCOPS. Rostrum *mandibula superiore brevior*.
 71. DIOMEDEA. Rostrum *mandibula inferiore truncata*.
 APTENODYTA. Rostrum *rectum*, *angustum ad latera sulcatum*.
 69. ALCA. Rostrum *rugis lateralibus transversis*.
 70. PROCELLARIA. Rostrum *naribus superincumbentibus*, *subcylindricis*.
 72. PELECANUS. Rostrum *cinctum facie nuda*.
 76. LARUS. Rostrum *sub apice subtus gibbum*.
 77. STERNA. Rostrum *subulatum*, *apice compresso*.
 75. COLYMBUS. Rostrum *subulatum*, *lateribus compressiusculum*.

IV. GRALLÆ.

* *Pedibus tetradactylis.*

79. PHŒNICOPTERUS. Rostrum *infractum*, *denticulatum*. Pedes *palmati*.
 80. PLATALEA. Rostrum *depressum*, *spatulatum*.
 81. PALAMEDEA. Rostrum *apice uncinatum*, *acutum*.
 82. MYCTERIA. Rostrum *mandibula inferiore crassiore* *ascendens*.
 85. TANTALUS. Rostrum *arcuatum*, *facco gutturi*.
 84. ARDEA. Rostrum *rectum acutiusculum*.
 CORRIRA. Rostrum *rectum*, *angustum*.

89. RECURVIROSTRA. Rostrum *subulato-attenuatum, depressum, recurvum.*
86. SCOLOPAX. Rostrum *rectum, teretiusculum, obtusiusculum.*
87. TRINGA. Rostrum *teretiusculum obtusum. Pollex vix insistent.*
91. FULICA. Rostri *basis fronte calva.*
92. PARRA. Rostri *basis fronte carunculis mobilibus.*
93. RALLUS. Rostrum *subcarinatum. Corpus compressiusculum.*
VAGINALIS. Rostrum *crassum, subconvexum, mandibula superioris apice vaginae corneae inclusio.*
94. PSOPHIA. Rostrum *subfornicatum. Nares ovatae.*
83. CANCROMA. Rostrum *ventricosum.*
- SCOPUS. Rostrum *crassum, compressum. Nares lineares, obliquae.*
- GLAREOLA. Rostrum *breve, rectum, apice uncinatum. Nares lineares, obliquae.*

* * *Pedibus cursoriis s. tridactylis.*

90. HÆMATOPUS. Rostrum *compressiusculum, apice cuneo.*
88. CHARADRICUS. Rostrum *teretiusculum, obtusum.*

V. GALLINÆ.

95. OTIS. Rostrum *subfornicatum. Lingua emarginata.*
96. STRUTHIO. Rostrum *conicum. Alæ non volitantes.*
97. DIDUS. Rostrum *medio coarctatum, rugosum, facie nudæ.*
98. PAVO. Rostrum *nudum. Vertex pennis revolutis.*
99. MELEAGRIS. Facies *nuda carunculis verrucosa.*
PENELOPE. Caput *pennatum, rostrum denudatum.*
100. CRAX. Rostrum *basi cera obductum.*
101. PHASIANUS. Genæ *nudæ laeves. Mas calcaratus.*
102. NUMIDA. Carunculæ *binæ, ad basin mandibularum.*
103. TETRAO. Supercilia *nudo, papilloso.*

VI. PASSERES.

* *Crassirostres.*

109. LOXIA. Rostrum *conico-ovatum.*
COLIVS. Rostrum *crassum, supra convexum, subtus angustatum.*

112. FRINGILLA. Rostrum *conicum*, *acutum*.

PHYTOTOMA. Rostrum *conicum*, *rectum*, *serratum*.

110. EMBERIZA. Rostrum *subconicum*, *mandibula inferiore latiore*, *coarctata*.

* * Curvirostres, *mandibula superioris apice incurvato*.

118. CAPRIMULGUS Rostrum *incurvum*, *depressum*, *ciliatum*. Nares *tubulosæ*.

117. HIRUNDO. Rostrum *incurvum*, *depressum*.

115. PIPRA. Rostrum *incurvum*, *subulatum*.

* * * Emarginatirostris, *mandibula superiore pone apicem emarginata*.

107. TURDUS. Rostrum *emarginatum*, *subulatum*, *basi compressum*.

108. AMPELIS. Rostrum *emarginatum*, *subulatum*, *basi compressum*.

111. TANAGRA. Rostrum *emarginatum*, *subulatum*, *basi conoideum*.

113. MUSCICAPA. Rostrum *emarginatum*, *subulatum*, *basi ciliatum*.

* * * * Simplicirostres, *rostro recto integro attenuato*.

116. PARUS. Rostrum *subulatum*. Lingua *truncata*. Capistrum *reversum*.

114. MOTACILLA. Rostrum *subulatum*. Lingua *incisa*. Unguis *posticus modicus*.

105. ALAUDA. Rostrum *subulatum*. Lingua *bifida*. Unguis *posticus elongatus*.

106. STURNUS. Rostrum *subulatum*, *apice depresso marginato*.

104. COLUMBA. Rostrum *subforficatum*. Nares *gibbosæ*, *membrana oblitterata*.

I. ACCIPITRES.

Rostrum e mandibula superiore angulum utrinque exferens.

41. **VULTUR**, *Rostrum rectum, apice aduncum.*
Caput impenne, antice nuda cute.
Lingua bifida.
Collum retractile.

Gryphus. 1. *V. maximus, caruncula verticali, longitudine capitis, gula nuda.*

Vultur Gryps Gryphus, *Klein av. 45.*

Cuntur. *Laët amer. 401. Raj. av. 11.*

Condor. *Fréz. it. 111. Condam. it. 175, Briss. ornith. 1. p. 473. n. 12. Buff. ois. 1. p. 184. Motin. chil. p. 236.*

Condur. *Latham syn. of birds. 1. 1. p. 4.*

Habitat in America australi, nidificans ad montes præruptissimos sub rupibus prominulis, ova bina alba ponens; famelicus ovibus, hædis, imo vitulis prædatur, & sunt, qui pueros decennes abripuisse, binas aves vaccam dilacerasse & vorasse tradunt; in terram devolans susurro attonitos & surdos fere reddit homines.

Avis maxima, femina tamen major, quæ crista quoque cervicali, colore fusco, torque nullo a mare differt.

Alæ maximæ, intra quarum extremitates, pedes 9-12, 13-16; Remex longitudine pedum $2\frac{1}{2}$, crassitie sesquipollicitis; corpus nigrum, dorso albo; collum torquatum pennis longioribus albis; gula rubens; caput fusca lanugine tectum; oculi nigri, iride spadicea; rostrum nigrum, apice albido. Pedes nigri, unguibus rectiusculis; cauda parva.

- bengalensis. 2. *V. fuscus, capite colloque anterieus denudato dilute castaneo, rostro plumbeo, apice nigro, Latham syn. of birds. 1. 1. p. 19. n. 16. t. 1.*

Vultures voracissimi cadavera potius appetunt, imo putrescentia, vix nisi famelicæ viva animalia; audaces, tardius volant, nisi certam altitudinem attigerint, & gregatim; olfactu pollent acutissimo; ex septentrionali Europa & Asia, & si Auram exceperis, ex boreali quoque America exules. Vix distinctæ specierum, varietatumque, imo generis ipsius a sequente limites.

AVES ACCIPITRES. Vultur.

Habitat in regno Bengalenſi, 2 pedes cum 6 pollicibus longus. Caput collumque poſterius lanugine fuſca teſtum; pedes ex atro fuſci, unguibus nigris. Ingluvies ſupra peſtus pendet.

Papa.

3. V. naribus carunculatis, vertice colloque denudato.

Vultur. *Albin. av. 2. p. 4. t. 4.*

Cozcaquauhli. *Hernand. mex. 319. Raj. av. 361.*

King of the Vultures. *Edw. av. 2. t. 2.*

Rex vulturum. *Briff. av. 1. p. 470. t. 36.*

Roi des vautours. *Buff. hiſt. natur, des oif. I. p. 169. t. 6. planch. enlum. 428.*

Habitat in America aſtrali, inſuliſque oceani americani; viſitans ſerpentibus, lacertis, rattis, &c. cadaveribus, hinc ſortens; alte volitat.

Magnitudo gallopavonis femina. Caput collique pars ſuperior quaſi excoriata; area oculorum nuda, crocea. Vitta nigricante lanugine ab occipite caput cingit. Corpus e ruſeſcente album. Remiges ex cineraſcente nigri. Pedes cum roſtri apice rubri. Cera aurantia, & pone hanc carunculæ dentate.

Monachus.

4. V. vertice gibboſo, corpore nigro.

Crested black Vulture. *Edw. av. t. 290.*

Vultur atabicus. *Briff. av. app. 29.*

Habitat in Araβia, melanaëto major.

Caput cum collo lanugine cinerea teſtum; orbita alba; roſtrum apice nigrum, cera pedesque caruleſcentes, unguibus nigris; humeri pennis laxis cinereis, coronati, intra quas dormiens avis caput retrahit.

Aura.

5. V. fuſco-griſeus, remigibus nigris, roſtro albo.

Tzopiloti f. Aura. *Hernand. mex. 331.*

Urubu, Tzopiloti or Aura. *Willoughb. orn. 68.*

Urubu Braſilienſibus. *Marcgr. braſil. 207.*

Gallinazo. *Ulloa it. 1. p. 60. 201.*

Turkey Buzzard. *Catesb. Car. 1. p. 6. t. 6.*

Carriion crow. *Sloan. jam. 2. p. 294. t. 254. Raj. av. p. 180.*

Vultur braſilienſis. *Raj. av. p. 10. Briff. av. 1. p. 468.*

Vultur pullus, capite implumi, cute craſſa rugoſa, ultra aperturas naſales laxata. *Brown. jam. 471.*

Vautour du Brésil. *Buff. hist. nat. des ois. I. p. 173. pl. enlum. n. 187. **)

Carrión Vulture. *Arch. zool. II, 191, Latham syn. I. 1. p. 9. n. 5.*

Iota. **β. V. niger**, remigibus fuscis, rostro cineraceo. *Molin. hist. nat. Chil. p. 235.*

Habitat in America, etiā boreali, insulisque adjacentibus, insulis quoque novi anni.

Privilegio munitus in America cadavera serpentisque vorans, eaque simul cum canibus, quasi germanis fratribus, summa concordia dilacerans; sæpe carnes e culina furans, ceterum haud difficulter cicurandus; foetidum stercoreis humani odorem spirat, captusque materiam adhuc foetidiorē evomit; noctu gregarie dormit in summis arborum cacuminibus: Jacquin.

Magnitudo circiter gallopavonis, quamvis varia. Corpus nigrum e purpureo & viridi micans. Irides ex croceo carulescentes. Pedes carnei. Caput rufescens.

β. similiter foetidissimus, iners vix nisi laceffitus vocifertur voce muris, nidum inter rupes aut in terra struit ex foliis pennisque, & ova elidit binā alba, quasi infumata. Junior totus albus, sensim autem nigrescit, ut tamen rostrum, apice excepto, albeat, remiges, pedes & irides fusca sint.

cinereus. 6. V. fusco-nigricans, remigibus & rectricibus in cinereum vergentibus, pedibus pennis fuscis vestitis. *Briss. ornith. I. p. 130. n. 1.*

Vultur cinereus. Raj. syn. p. 9. n. 1.

Vautour ou grand Vautour. Buff. hist. nat. des ois. I. p. 158. t. 5. planch. enlum. n. 425.

Cinereous or ash-coloured Vulture. Will. orn. p. 66. n. 1. Latham syn. p. 14. n. 8.

Habitat in Europa, frequens in montibus altis, sex pollicibus longitudinem tripodalem superans.

Caput, guttur, collique pars superior fusca teguntur lanugine; sub gutture prominent pennulae longae pilorum æmulae, ut barbam efficiant. Digni flavi, unguibus nigri. An percnopteri varietas?

**) Prodierunt quidem hæc tabulae cura Daubentonii junioris, sed consilio Buffoni, hinc ejus nomine semper allegata, quemadmodum alterum quoque de avibus opus, quamvis magna ejus pars B. Guérin de Montbeillard debeatur.*

ufcus. 8. V, fufcus, remigibus ex fulco nigricantibus, primariis apice albis fulco maculatis, reſtricibus ex grifeo fufcis, pedibus nudis. *Briff. ornith. p. 131. n. 2.*

Avoltojo Griſtone. *Cetti Ucc. di Sard. 3. G. 3.*

Vautour de Malte. *Buff. hiſt. nat. des oif. I. p. 161. pl. enlum. n. 427.*

Habitat in Europa, potiffimum in infula Malta.

Magnitudine inter phaſianum colchicum & gallopavonem intermedia. Caput fuſca lanugine teſtum; cervix pennis anguſtis; roſtrum nigrum; pedes ſlaveſcentes, unguibus obſcuris. *An ſpecie differt a percnoptero?*

niger. 9. V. niger, remigibus reſtricibusque fufcis, pedum pennis nigris. *Briff. ornith. p. 131. n. 4.*

Vultur niger. *Raj. ſyn. p. 9. n. 2.*

Avoltojo nero. *Cetti Ucc. di Sard. 9. G. 9.*

Swarthy Vulture. *Charl. ex. p. 71. n. 4.*

Black Vulture *Will. orn. p. 66, Lath. ſyn. p. 16. n. 10.*

Habitat in Ægypto & Sardinia, magnus.

Caput lanugine fuſca teſtum, colli pars proxima plane nuda, & cum orbitis pedibusque ad digitos uſque lanatis alba. Lingua lævis non ferrata. Roſtrum bipollicare initio reſtum, apice longius uncinato, naribus rotundis 3 lineas diametro æquantibus. *An mera varietas percnopteri?*

leucocephalus. 10. V. plumis niveis, remigibus reſtricibusque nigris, torque plumarum albo.

Vultur leucocephalus. *Briff. ornith. p. 134. n. 9.*

Vultur albus. *Raj. ſyn. p. 10.*

Petit Vautour. *Buff. hiſt. nat. des oif. I. p. 164.*

Vautour de Norwege. *Buff. pl. enlum. n. 449.*

White Vulture & Cinereous Vulture. *Willoughb. ornith. p. 67. n. 6. & 66. n. 1.*

Habitat in Sardinia & Norwegia, nigro minor, ut vix aliquot pollicibus tres pedes longitudine ſuperet, cauda aliſque mediocribus; borealis varietas fere tota nivea, capite colloque tamen impennibus rubicundis, roſtro flavo, puncto nigro notato; unguibus nigris; in ſarda varietate pennæ, reſtricibus remigibusque exceptis, ex cinereo, fuſco & grifeo miſtæ, caput & finitima pars colli lanugine alba

Vultures communes quoque in Candia, Cypro, reliſque Archipelagi & maris mediterranei inſulis, paucis ſpeciebus rite deſinitis; pelles præparatæ ab incolis pectori & ventriculi regioni appoſitæ digeſtionis promovendæ ergo portantur.

*vestita. Squamæ digiti medii a primo inde articulo II.
An mera perchopteri aut fulvi potius varietas?*

- fulvus. II. V. superne ex griseo rufescens, capite, collo & torque albis, remigibus rectricibusque nigris. *Briss. ornith. p. 133. n. 7. Hablitzl apud S. G. Gmelin it. IV. p. 179. & Pallas n. nord. Beytr. IV. p. 58.*
Vultur fulvus hætico congener. *Raj. syn. p. 10. n. 7.*
Griffon. *Buff. hist. nat. des ois. I. p. 151.*
Vulture. *Albin. av. III. p. 1. t. 1.*
Fulvous Vulture. *Will. orn. p. 67. n. 7. Lath. syn. I. 1.*

p. 17. n. II.

Habitat in montibus Persiæ quoque alpihus sunamificis, falcone fulvo major; Caput & collum alba lanugine tectum; rostrum cinereum, basi cute nigra tectum; irides obscure flavæ; colli infima pars multiplici serie pennarum longarum, acutarum, setacearum ex albo rufescentium cincta; in medio pectoris fovea lanugine alba vestita, & pennis longis angustis rufescentibus cincta. Pennæ subtus basi albæ, apice rusæ. Pedes plumbei, ultra femoris medium intus lanugine densa alba, extus pennis longis rufescentibus tecti, unguibus nigris.

- percnop- 7. V. remigibus nigris, margine exteriori (præter extimas) terus. canis.

Vultur (percnopterus) capite nudo, gula plumosa. *Hasselq. it. 209.*

Falco montanus ægyptiacus. *Hasselq. ad. Stockh. 1751. p. 196.*

Vultur aquilina. *Alb. av. 2. p. 3. t. 3.*

Vulturine Eagle of Aldrovand. *Will. orn. p. 64. t. 4.*

β. Vultur ægyptius. *Briss. p. 131. n. 3.*

Vultur sacer ægyptius. *Aldr. av. I. p. 378. t. 379.*

Sacre Egyptien. *Belon hist. d'oïf. p. 110. t. pag. III.*

Sacre d'Egypte. *Buff. hist. nat. des ois. I. p. 167.*

Habitat in Ægypto, Palestina, Syria, Caramania, Persia.

Purgat Cauri terram a cadaverum fœtore, stipendiis allectus. Hasselq. Palestina agri defererentur ob murium copiam, nisi hæ aves catervatim advolarent. Belon.

Olim hunc capitale occidere Ægyptiis. Herodot.

Mas totus albus. Remigibus atris, margine exteriori canis, exceptis duobus primis unicoloribus. Femina tota fusca. Remigibus quatuor extimis concoloribus. Rostrum atrum cera flavæ. Hasselq. Nares perpetuo stillant. Raj. Pedes nudi.

- cristatus*. 12. V. *cristatus*, ex rutilo nigricans, pectore magis ad rufum inclinante, pedibus nudis. *Briss. ornith.* p. 132. n. 6.
 Vultur leporarius Gesneri. *Raj. syn.* p. 10. n. 4.
 Vautour à aigrettes. *Buff. hist. nat. des ois.* I. p. 159.
 Hare Vulture. *Will. orn.* p. 67. n. 4. *Latham syn.* I. 1. p. 17. n. 12.

Habitat in densis & desertis silvis, in arboribus altissimis nidificans, celeriter ingrediens, & tum cursu, tum volatu aves, pisces, lepores, cuniculos, ipsas vulpes & hirculos persequens. Stans cristam, quasi cornua ex capite prominentia in volante ave non conspicua, erigit.

Alarum apices sex pedum intervallo distant; pedes flavi; ungues & rostrum nigrescunt; cauda longa & recta; an hujus, an sequentis generis, decident autoptæ.

- barbarus*. 13. V. ex atro fuscus, subtus albus in fuscum inclinans, pedibus lanatis, digitis plumbeis, unguibus fuscis.
 Vultur barbarus. *Briss. ornith.* p. 137. n. 13.
 Bearded Vulture. *Edw. av.* 106. t. 106. *Lath. syn.* I. 1. p. 11. n. 6.

Habitat in Africa, præsertim Barbaria, falconis fulvi magnitudine.

Rostrum ex purpurascens carneum; mandibula inferior fasciculo plumarum nigrarum pendularum barbata; supercilia rubra; irides flavæ; capitis maxima pars lanugine alba vestita, fronte tamen, genis, & oculorum area nigris; cervix pennis angustis acuminatis, longis, albicantibus recta.

42. FALCO. Rostrum aduncum, basi cera instructum, Caput pennis arte tectum. Lingua bifida.

* *Femoribus longissimis.*

- serpentarius*. 33. F. ater occipite cristato, rectricum apice albo, duabus intermediis longissimis. *F. Miller ill. of nat. hist.* t. XXVIII. A. B.
 Sagittarius. *Vossmaer monogr.* t. 8.
 Secrétaire. *Sonner. it.* p. 87. t. 50.
 Messager du Cap de bonne espérance. *Buff. planch. enl.* n. 721.
 Secretary or Sagittarius. *Ad. angl.* LXI. p. 175. *Latham synops.* I. 1. p. 20. n. 17. t. 2.

Habitat in interiori Africa, & insulis Philippinis, gliribus & amphibiiis viſitans, facile cicurandus.

Femorum longitudine ad grallas accedit, ceteris notis ad hoc genus ſpectat; altitudo tripedalis; roſtrum nigrum aquilæ; cera alba; area oculorum nuda aurantia; irides pallide cinereæ; cauda rotundata; femora fuſceſcentia, unguibus brevibus, nigris, uncinatis, non valde acutis. Criſta erigi & deprimi poteſt.

*** Gypaëti, roſtro apice demum adunco, baſi ſetis porrectis barbato.*

Harpyja. 34. F. capite pennis elongatis criſtato, ſubtus varius.

Vultur capite teſto pennis elongatis criſtato. *Syſt. nat. XII.*

I. p. 121. n. 2.

Aquila braſilienſis criſtata. Briff. av. I. p. 446.

Aquilæ criſtatæ genus. Raj. av. 161.

Yzquauhtli. Hern. mex. p. 34. Raj. av. p. 161.

Urutaurana. Marcgr. braſil. 203. t. 204. Raj. av. p. 7.

Crested Eagle. Will. orn. p. 63. t. 4.

Crested Vulture. Latham ſyn. I. 1. p. 6. n. 2.

Habitat in nova Hiſpania & America aſtrali. Fertur unico iſtu cranium hominis findere, quem ſæpius adoritur; erectus conſidet; pennas occipitis ſæpius erigit in formam coronæ.

Magnitudo arietis. Color ſubtus ex nigro, candido & fulvo miſtus, in collo, dorſo, cauda & criſta ſurrecta niger. Oculi membrana niſſitante. Sub ingluvie pennæ albæ, quas iratus demittit uſque ad pedum digitos. Alæ & cauda ſubtus albo & nigro punctata, in modum tigridis.

Jacquin. 35. F. pennis capitis elongatis plurimis, pedibus nudis, corpore ſubtus niveo.

Vultur (coronatus) capite teſto pennis elongatis plurimis, pedibus nudis. *Jacquin Beyr. zur Geſch. der Voeg. p. 15. n. XI.*

Habitat in montibus novæ Granadæ, junior cicurandus, Harpyjæ affinis.

Dum erectus ſedet, $2\frac{1}{2}$ pedum altitudinem monſtrat: Dorſum, alæ, colli maxima pars, & roſtrum nigreſcunt; caput ex ruſceſcente cinereum coronatum corona concolore pennarum plurium ſemipedalium fere decumbentium, quas avis irata erigit; cauda longa albida, tæniis tranſverſis nigris. Pedes digitique flavi, unguibus nigris.

- ambustus. 36. *F. pallide fulvus*, capistro nudo, cera ampla, pedibus cæruleiscentibus.
Tawny Vulture. Brown. Illustr. p. 2. t. 1. Lath. syn. I. 1. p. 19. n. 15.
Habitat in insulis Falkland, 4 pollices ultra 2 pedes longus, Rostrum breve, crassum, obscurum; cera setis hispida; mandibula inferior fasciculo pennarum tenuium longarum barbata; tectrices remigum ex pallide fulvo & fusco mixtæ; cauda sordide alba, fusco fasciata. Ungues longi, leviter curvati.
- angolen- 37. *F. albus*, cera cærulescente, orbitis carneis & nudis, sis. tectricibus alarum primariis, caudæque basi nigris.
Angola-Vulture. Penn. tour in Wales. p. 228. t. 19. Lath. syn. I. 1. p. 18. n. 14.
Habitat in Angola.
Rostrum albicans, longum, parum aduncum; irides stramineæ; tectrices alarum primariæ extimæ albo punctatæ; caudæ apex albus; pedes sordide albi & squamosi.
- barbatus. 38. *F. albido-rutilus*, dorso fusco, tænia nigra supra & infra oculos.
Vultur (barbatus) albidus, dorso fusco, gula barbata, rostro incarnato, capite linea nigra cincto. Syst. natur. XII. 1. p. 123. n. 6.
Gypaëtos grandis. Storr Alpenr. I. p. 69.
Pernopterus s. gypaëtos. Aldr. orn. 1. p. 216. t. 217. 219. Gesn. av. 199. Will. orn. 33. t. 4. Raj. av. 8. Alb. av. 2. p. 2.
Vultur alpinus. Briss. av. 1. p. 464.
Laemmergeyer. Andrea Brief. aus der Schweiz, p. 195. t. 12.
β. Vultur aureus. Gesn. av. 783. t. 781. Aldrov. av. 1. p. 277. t. 276. Briss. ornith. p. 132. n. 5. Hablitzl apud Pallas n. nord. Beytr. IV. 64. & S. G. Gmelin it. IV. p. 185.
Vultur boeticus. Aldrov. ornith. 1. 273. t. 274. Will. orn. 35. Raj. av. 10.
Vultur fulvus Gesneri. Raj. av. p. 10. n. 5.
Golden vulture. Latham syn. p. 18. n. 13.
γ. Falco (magnus) cera cærulescente, pedibus & corpore subtus castaneis albo mixtis, cauda cinerea. S. G. Gmelin it. III. p. 365 t. 38.
Habitat grægibus parvis in alpinis helveticis, rhæticis, noricis, β et γ perficis, Neschel sacra scriptura ex sententia Oedmani.

AVES ACCIPITRES. Falco.

233

Chrysaëto major, ut 4 pedes longitudine æquet, & distantia apicis alarum expansarum 9 pollicibus 8 pedes superet. Rostrum rectiusculum unco utrinque bifurco, cinereum, rubicundo mistum, ad latera cinctum & subtus munitum setis rigidis nigris; nares magnæ, ovales, similibus setis testæ. Remiges 28, splendide cinereæ; rectrices 12, medio cinereæ. Pedes ad digitos usque hirsuti; ungues nigri, robusti, minus curvati, quam aquilis.

Nidificat in antris ruptum inaccessarum, ova 3-4 ponens; vidit animalibus alpinis, ut ipsas rupicapras, capras, agnos prædetur, & ipsi adeo homini dormienti infestus esse dicatur; neque tamen cadavera ipsa respuit. Habitu externo, gregario volatu, cadaverum appetitu ad vul-turem, reliquo victu, capite & collo, audacia ad aquilas accedit.

Albicilla. 39. F. cera pedibusque flavis, rectricibus albis: intermediis apice nigris.

Vultur albicilla. *Syst. nat.* XII. 1. p. 123. n. 8. *Fn. suec.* 55. *Brünnich orn.* 12.

Aquila Albicilla. *Briss. av.* 1. p. 427.

Pygargus, Albicilla, Hirundinaria. *Bell. av.* 15. *Gesn. av.* 205. *Raj. av.* 7. n. 5.

Grand Pygargue. *Buffon hist. nat. des ois.* I. p. 99. pl. enlum. n. 411.

White-tailed Eagle. *Will. orn.* p. 61.

Cinereous Eagle. *Brit. zool.* 1. p. 170. t. 18. *Lath. syn.* I. 1. p. 33. n. 8.

Braunfahler Adler. *Frisch t.* 70.

Habitat in Europa, præsertim Scotia, & insulis adjacentibus; ferit pisces maximos, iisque vidit aucēps:

Magnitudo Gallopavonis; longitudo 2 pedum cum 9 pollicibus; caput & collum pallide cinereum; irides & rostrum pallide flava; hoc basi elongatum; frons inter oculos & nares nuda; setulis tantum adpersa, cærulescens. Corpus & alæ cinereæ, fusco intermixto. Cauda alba. Pedes infra genua lanati, splendide flavi. Ungues nigri.

*** Aquilæ, majores pedibus plerumque hirsutis.

coronatus. 1. F. cera ferruginea, pedibus lanatis albis nigro punctatis, pectore rufo, lateribus nigro fasciatis.

Aquila africana cristata. *Briss. av.* 1. p. 448.

Crowned Eagle. *Edw. av.* 3. p. 31. t. 224. *Lath. syn.* p. 27. n. 1.

AVES ACCIPITRES. Falco.

Habitat in Guinea, minor europæis.

Subtus albus, maculis nigris rotundis; pennæ in vertice capitis longæ, ut cristæ ad instar erigi & deprimi possint; rostrum ferrugineum; irides aurantiæ; area oculorum cum fronte albida. Cauda supra obscure cinerea, nigro fasciata; digiti aurantii; ungues nigri.

- Che-** 40. F. cera rosea, pedibus flavis corpore ferrugineo, capite
tiway. albedo, vertice cristato ferrugineo. *Jacquin Beyr. p. 17. n. XII. t. 4.*

Habitat in insula Amba, ad litus Verazuelæ sita.

Crista pennis longioribus constans, quas tamen avis non erigere videtur. Orbitæ albidæ; oculi flavi; rostrum cærulescens; remiges longissimæ nigrescentes. Cauda alis longior, pariter potissimum nigrescens; uropygium album; ungues nigri.

- Tharus.** 41. F. cera pedibusque luteis, corpore albo - nigrescente, vertice cristato. *Molin. hist. nat. Chil. p. 234.*

Habitat in Chili frequentissimus, nidum in altissimis arboribus ex furculis; lana; pilis, plumis struens, ova & ponens, visitans cadaveribus, & avibus domesticis.

Magnitudo capi grandioris. Capitis corona ex pennis nigris, quarum exteriores longiores; rostrum albidum. Remiges rectricumque apices nigri. Pedes squamati, unguibus robustis; mas albidus nigro maculatus; femina paula minor, grisea.

- Melanaë-** 2. F. cera lutea, pedibusque semilatis, corpore e ferru-
tos. gineo nigricante, stris flavis.

Melanaëtos s. aquila valeria. Gefn. av. 203. Aldr. orn. 1. p. 197. t. 199. 200. Raj. av. 7. n. 4. Alb. av. 2. p. 2. t. 2. Briff. av. 1. p. 434.

Aigle commune. Buff. hist. nat. des ois. 1. p. 86. pl. enlum. n. 409.

Black Eagle. Will. orn. p. 61. scd. 3. t. 2. Latham syn. 1. 1. p. 28. n. 2.

Habitat in Europa.

Longitudo 2 pedum & 10 pollicum; rostrum ex corneo in cæruleum colorem vergens; irides castaneæ; caudæ pars exterior alba, nigricantibus maculis, apex nigricans; crura sordide alba; digiti lutei; ungues nigri.

Glaucopis. 42. F. cera & pedibus semilatis citrinis, dorso & pectore fusco, capite & cervice ex flavicante albis, striis fuscis, remigibus nigris. *Merrem Beytr.* II. p. 25. t. 7.

Habitat in monte Dransberg prope Goettingam.

Longitudo 1 pedis, 9 pollicum, 3 linearum; rostrum glaucum; nares magna, ovata, pone has seta nigra; os interius & lingua rosea, hac carnosae margine magis cornea, apice vix bifida; irides canae, flavo permixta; frons lunulis fuscis insignita. Crura brevia, pennae mollioribus tecta; pedes antice semilati; unguibus nigris. Cauda supra ex rubicundo fusca, subtus sordide alba, utrinque tæniis 6 nigris.

leucocephalus. 3. F. cera lutea pedibusque semilatis, corpore fusco, capite caudaque albis.

Aquila leucocephalos. Briss. av. I. p. 423.

Pygargue. Buff. hist. nat. des ois. I. p. 99. pl. enlum. n. 411.

Bald Eagle. Catesb. Carol. I. p. 1. t. 1. Lath. syn. p. 29. n. 3.

White headed Eagle. Arct. zool. II. p. 196. n. 89.

Habitat in Europæ & Americæ silvis acerosis, porcis, agnis, piscibus victis, quos posteriores ab halidæto captos huic aufert; nidus amplius, fixatus, in insula Beringii rupibus innixus, ovis duobus.

Longitudo 3 pedum cum 3 pollicibus, pondus librarum 9. Rostrum luteum; irides; caput, collum, cauda candent; digitiflavent; ungues nigricant; reliquum corpus chocoladam colore æmulatur.

Ossifragus. 4. F. cera lutea pedibusque semilatis, corpore ferrugineo, rectricibus latere interiore albis.

Aquila ossifraga. Briss. ornith. I. p. 125. n. 9.

Ossifraga. Gessn. av. 263. Aldr. ornith. I. p. 222. t. 225. 228. Brunn. orn. 13.

Haliaetus f. Ossifraga. Raj. av. p. 7. n. 3.

Gypaëti, vultures inter & aquilas quasi medii, cadavera appetunt & viva venantur animalia; aquilæ & falcones nobiliore habitu cadavera abhorrent; illæ capiunt oves, lepores, sciuros, anseres, serpentes, pisces; hi potissimum aves; altissime volant, ut sæpe vix videantur; hærent quasi suspensi in aëre; visu excellunt; solitarii degunt, nisi tempore copulæ; jaculi instar cadunt prosequendo prædam; famem diu tolerant; pane ingesto moriuntur, ætate sexque variant; paciscuntur Inducias cum avibus inprimis domesticis, quamtiu cuculus cuculat, ut hæseriantur sub nidificatione, incubatione, pullitie. Succus gastricus acidus, acer.

Orfraie ou Ossifrague, Grand aigle de mer. *Buff. hist. nat. des ois.* I. p. 112. t. 3. pl. enlum. n. 112. 415.

Sea Eagle or Osprey. *Br. zool.* I. p. 167. t. 17. *Arct. zool.* 2. p. 194. n. 86. *Will. orn.* p. 59. t. 1. *Lath. syn.* I. 1. p. 30. n. 4.

Habitat in Europa & boreali America, in botanica quoque insula, piscibus potissimum viſitans, quos ipse capit.

Chrysaetos affinis, pedibus tamen vix infra genua lanatis.

Magnitudo Gallopavonis: Pennae basi albae, medio ferrugineae, apice nigrae. Remiges nigricantes; secundariae latere tenuiore albicantes. Rectrices latere interiori albae, rhachi niveae. Tectrices caudae fere albae. Pedes lutei. Femina obscure ferruginea.

Chrysaetos. 5. F. cera lutea, pedibusque lanatis luteo-ferrugineis, corpore fusco - ferrugineo vario, cauda nigra basi cinereo-undulata. *Fn. suec.* 54.

Chrysaetos f. Aquila aurea. *Briss. av.* I. p. 431.

Aquila germana. *Gesn. av.* 168.

Aquila chrysaetos. *Raj. av.* 6. n. 1. *Aldr. orn.* I. p. 111. 114. 115.

Grand aigle. *Buff. hist. nat. des ois.* I. p. 76. pl. enl. n. 410.

Golden Eagle. *Brit. zool.* I. p. 161. t. 16. *Alb. av.* II. t. 1.

Will. orn. p. 58. t. 1. *Lath. syn.* p. 31. n. 5.

Habitat in Europa & Sibiriae deserto Uralensi, sereno caelo altissima petens, instante tempestate terrae propior.

Pondus 12 librarum, longitudo 3 pedum, latitudo 7 pedum & 4 pollicum. Pedes ad digitos usque pennis tecti.

fulvus. 6. F. cera flava, pedibusque lanatis fusco-ferrugineis, dorso fusco, cauda fascia alba.

Aquila. *Briss. av.* 1. p. 419. *Aldr. orn.* I. p. 17. *Dodart ad.* 3. p. 89. t. 49.

Aquila fulva f. Chrysaetos, cauda annulo albo cincta. *Raj. av.* 6. n. 2.

Aigle commun. *Buff. hist. nat. des ois.* I. p. 86. pl. enlum. n. 409.

Golden Eagle, with a white ring about it's tail. *Will. orn.* p. 59.

Black Eagle. *Brit. zool.* I. p. 165. *Arct. zool.* 2. p. 195. n. 87.

Ring-tailed Eagle. *Latham syn.* I. 1. p. 32. n. 6.

canadensis. 6. F. cera flava pedibusque lanatis, corpore fusco, cauda alba apice fusco. *Syst. nat.* X. p. 88.

White tailed Eagle. *Edw. av.* I. t. 1. *Voy. huds.* 3. p. 54. t. 2. *Habi-*

Habitat in Europa, America & Asia septentrionali in rupibus altissimis nidificans, & docilis, ut varia Tatarorum tribus, Marco Polo jam notante, capiendis leporibus, antilopis, vulpibus, ipsisque lupis adaptent, qui etiam redrices arcubus suis accommodant.

Frons inter oculos & nares nuda. Pectus punctis trigonis maculatum; pedes ad digitos usque pennis hirsuti. An femina Melanaëti?

leucogaf-43. F. albus, dorso, alis, caudaque obscure fuscis, caudæ ter. apice albo, pedibus flavis.

White-bellied Eagle. *Lath. syn. I. 1. p. 33. n. 7. a.*

Longitudo 2 pedum cum 9 pollicibus. Rostrum amplum, ex fuscescente luteum; ungues nigri.

japonen-44. F. cera obscura, pedibus luteis, corpore fusco. *fs.* Japonese Eagle. *Lath. syn. I. 1. p. 33. n. 7. b.*

Habitat in insulis Japan, pedem & 11 pollices longus. Rostrum angustum, basi caeruleum, apice nigricans, subtus flavescens; frons bubali colore; reliqui capitis & corporis pennæ fuscae, apice ferrugineae; gula alba, nigro striata, lunula nigro cincta; pectoris ventrisque pennæ marginæ ex flavicante albo; ungues magni, nigri.

Plancus. 45 F. cera, area oculorum pedibusque aurantiis, occipitis crista nigra, pectore & corpore supra griseo nigro-undulato, subtus nigro, cauda alba, fasciis transversis nigris. *I. F. Miller Illustr. t. 17. Cook it. II. p. 184. t. 32.*

Plaintif Eagle. *Latham syn. I. 1. p. 34. n. 9.*

Habitat in terra del Fuogo, 25 pollices longus; alæ fuscae; caudæ apex, rostrum unguesque nigri.

america-46. F. cera pedibusque lanatis luteis, capite, collo & pectore obscure cinereis, genarum fascia transversa, dorso, ventre, alis, caudaque nigris.

Black-cheeked Eagle. *Lath. syn. I. 1. p. 35. n. 10. Arct. zool. 2. p. 196. n. 88.*

Habitat in America septentrionali, fulvum magnitudinis aquans. Rostrum caeruleum.

albus. 47. F. totus albus.

Aquila alba. *Briss. orn. p. 123. n. 3.*

Aquila alba cygnea. *Klein av. p. 42. n. 7.*

White Eagle. *Charl. onom. p. 63. n. 9. Latham syn. I. 1. p. 36. n. 12.*

AVES ACCIPITRES. Falco.

*Habitat in albis, & Rheni ripis, Chrysaëti magnitudinē;
an mera varietas?*

candidus. 48. F. albus, alarum apice nigro.

White Eagle. *Arch. zool.* 2. p. 197. du Prat. *Louisf.* 2. p. 75.

Louisiane white Eagle. *Lath. syn.* I. 1. p. 36. n. 13.

Habitat in Louisiana, incolis magni æstimata, qui pennis ejus symbolum pacis exornant, præcedente paulo minor.

nævius. 49. F. cera pedibusque lanatis luteis; corpore ferrugineo infra alas albo-maculato.

Aquila nævia. *Briss. orn.* p. 122. n. 4.

Petit aigle. *Buffon hist. nat. des ois.* I. p. 91.

Rough-footed Eagle. *Charl. onom.* p. 63. n. 6. *Lath. syn.* I. 1. p. 37. n. 14.

Steinadler. *Frisch Vög.* t. 71.

Habitat in Europa, gliribus præsertim victans.

Magnitudo galli grandis; longitudo 2 pedum cum $7\frac{1}{2}$ pollicibus; irides flavæ; tectrices caudæ secundariæ albæ; ungues nigri.

maculatus. 50. F. cera pedibusque lanatis luteis, corpore supra ferrugineo, subtus fusco.

Morphno congener. *Raj. av.* p. 7. n. 7. *Will. orn.* p. 63.

Spotted Eagle. *Latham syn.* I. 1. p. 38. n. 15.

Longitudo bipedalis. Rostrum magnum & ungues nigri; irides cineræ; pennæ scapularum & tectrices alarum apice macula ovali albicante insignitæ, dorso maculis coloris bubalini; venter similibus lineis striatus.

albicanus. 51. F. cera pedibusque nudis luteis, capite & collo ex cinereis in castaneum vergente, corpore supra obscure ferrugineo, subtus ferrugineo & nigricante, cauda alba.

Aquila Albicilla minor. *Briss. ornith.* p. 124. n. 6.

Petit Pygargue. *Buff. hist. nat. des ois.* I. p. 99.

Pygargus of Aldrovand. *Will. orn.* p. 62.

Fawn-killing Eagle. *Charl. onom.* p. 63. n. 4.

Lesser white-tailed Eagle. *Lath. syn.* I. 1. p. 39. n. 16. *Erne. Gesn. av.* p. 203.

Habitat in Europa.

Magnitudo galli grandis; longitudo 2 pedum & 2 pollicum; rostrum & irides flavicant; pennarum apices nigricant; ungues nigri.

AVES ACCIPITRES. Falco.

259

gallicus. 52. F. rostro cinereo, pedibus nudis flavicantibus, corpore ex griseo fusco, subtus (mari) albedo maculis rufescentefuscis.

Aquila Pygargus. *Briss. orn p. 127. n. 11.*

Pygargus. *Johnst. av. p. 4. t. 2.*

Jean le blanc. *Buff. hist. nat. des ois. I. p. 124. t. 4. pl. enlum. n. 413. Lath. syn. p. 39. n. 17.*

Habitat in Gallia, rarior in reliqua Europa, muribus, rattis, ranis visitans, in terra, rarius in arboribus nidificans, 3 ut plurimum ova grisea ponens.

Melanæto vix minor, 2 pedes & pollicem longus. Irides flavae. Rectrices albae striis transversis fuscis, margine & apice fusca. Ungues cinerei.

australis. 53. F. fuscus, cera flava, cauda nigra, apice punctis fordide albicantibus.

Statenland Eagle. *Latham syn. I. 1. p. 40 n. 19.*

Habitat in Statenland; vox gallinae; magnitudo & longitudo Planci. Forster.

niger. 54. F. cera pedibusque lanatis luteis, capite, cervice, ventre & tectricibus alarum ferrugineis, gula, pectore, dorso remigibusque nigris.

Black-backed Eagle. *Brown. Ill. p. 4. t. 2. Latham syn. p. 42. n. 22.*

Magnitudo Chrysaëti; rostrum & unguis nigri; cauda basi ad medium usque alba; reliqua parte dimidio nigra.

leucoryphos. 55. F. cera ex livido cinerea, pedibus pallide albicantibus semilanatis, corpore subalbulo fusco, verticis macula trigona & gula albis.

Aquila leucorypha. *Pallas it. I. p. 454.*

White-crowned Eagle. *Lath. syn. I. 1. p. 42. n. 23.*

Habitat in australioribus ripis fluvii Ural, haliaëto vix major, habituque simili. Lingua rotundata integra. Irides ex fusco griseae, alae obsolete nigrae, remigibus interius albis; cauda longiuscula, rigida, aequalis; unguis maximi, nigri.

Mogilnik. 56. F. cera lutea, pedibus lanatis & reliquo corpore obscure ferrugineis, dorso albo admisto.

Aquila Mogilnik. *S. G. Gmelin Nov. comm. Petrop. XV. p. 445. t. XI. b.*

Russian Eagle. *Lath. syn. I. 1. p. 43. n. 24.*

AVES ACCIPITRES. Falco.

Habitat in desertis ad Tanain sitis; fulvo minor, 2 pedes & 3 pollices longus, muribus & aviculis victitans.

Rostrum, pupilla, ungues, remiges nigra; palpebræ pal-
lide cæruleæ; irides luridæ; cauda æqualis; rectrices
nigræ, fasciis obsolete griseis, apice rufæ.

cristatus. 57. F. capite cristato, dorso, gula alisque nigris, ventre
albo, cauda fasciis 4 cinereis parallelis.

Crested Falcon. *Dillon it. per Hisp. p. 80. t. 3.*

Caracca Falcon. *Latham syn. I. 1. p. 81. n. 64.*

Magnitudo *Gallopavonis*; mandibula inferior potius recta.

lagopus. 58. F. cera pedumque lanatorum digitis nudis luteis, corpore
nigro albo-maculato, rectricibus albis, versus apicem
nigris. *Brünnich orn. bor. p. 4.*

Falco norwegicus. *Leemius de Lapp. p. 236.*

Graa falk. *Að. nidros. IV. p. 417. t. 13.*

Rough-legged Falcon. *Brit. zool. app. t. 1. Arct. zool. 2.*

p. 200. n. 92. Lath. syn. I. 1. p. 75. n. 54.

*Habitat in Europa Americaque septentrionali; 2 pedes
æque pollices longus. Caput, collum & pectus ex fla-
vicante alba, striis passim oblongis, fuscis.*

ferox. 59. F. cera viridi, corpore supra fusco, dorso, abdomine &
uropygio niveo, maculis castaneis vario, rectricibus
æqualibus fuscis, fasciis quatuor obsolete. *J. G. Gmelin
nov. Comm. Petr. XV. p. 442. t. X.*

Fierce Eagle. *Lath. syn. I. 1. p. 33. n. 7.*

*Habitat Astracaniæ, rapacissimus; nec ipsa cadavera
respuens.*

Longitudo 2 pedum, & 1 pollicis; rostrum ex plumbeo
nigrum; palpebræ cæruleæ; irides flavæ; caput & collum
ferruginea, admixto albido; remiges 26 nigræ, subtus
candidæ, versus apicem griseæ; rectrices 12 æquales,
subtus albæ; ungues acuti.

mariti- 60. F. cera pedibusque flavis, corpore caudæque apice albo,
mus. cruribus colore ex rubicundo & albo misto. *v. Wurm
apud Lichtenberg Magazin für das Neueste aus der
Phys. IV. 2. 6.*

*Habitat in Javæ maritimis, cadaveribus piscibusque victi-
tans, 4 pedes cum 2 pollicibus longus, 1 pedem, 3
pollices altus; rostrum flavum.*

- ♂ gyp- 61 F. cera pedibusque semilatis flavis supra cinereus, subtus
tius. ferrugineus; alis supra fuscis; cauda forficata, fusco
fasciata, longitudine corporis.
Habitat in Aegypto, hieme frequens, cubitum longus.
Rostrum flavum; remiges versus apicem nigrae; alae
subtus ex griseo fuscae; cauda longitudine corporis,
cinerea; unguis nigri.

Milvus. 12. F. cera flava, cauda forficata, corpore ferrugineo, capite
albidior. *Fn. suec.* 57.

Milvus regalis. *Briss. av.* 1. p. 414. t. 33.

Milvus. *Gesn. av.* 610. *Aldrov. orn.* 392. t. 368, *Raj.*
av. 17. *Günther Nest. u. Eyer.* t. 23.

Milvus royal. *Buffon hist. nat. des ois.* 1. p. 197. t. 7.
pl. enlum. n. 422.

Kite or Glead. *Brit. zool. n.* 53. *Will. orn.* p. 74. t. 6.
Albin. av. 1. p. 4. t. 4. *Hayes brit. birds* t. 5. *Lath.*
syn. 1. 1. p. 61. n. 43.

Hünereyger, v. *Wurmb* apud *Lichtenberg* *neustes aus der*
Physik und Naturgeschichte, IV. 2. p. 6.

β. Milvus vertice & gula castaneis. *S. G. Gmelin it. I.* p. 147.

γ. Accipiter Korschun. *S. G. Gmelin nov. comm. Petrop. XV.*
p. 444. t. 11. a.

δ. Milvus jaicensis, testricibus dorfi violaceis, pennarum
singularum apice stigmatē albo notato. *Lepechin it.*
II. p. 180. t. 2.

Habitat in Europa, Asia, Africa, quisquilias vorans & pul-
los, gallinaceos; pacatissime volans, tempestates praesagit,
supra nubes volitans serenitatem aeris, clamore pluvias;
ponit ova terna subrotunda albida, maculis sordide luteis
variā; migrat trans pontum euxinum in Asiam; ultimo
Aprilis die per 14 dies tot pontum euxinum praetervolan-
tes vidit, ut homines numero superarent, Bellonius it. 108.
Longitudo bipedalis, γ) in desertis ad Tanain obvii, 21½
modo pollicum, δ) 1 pedis & 10 pollicum; irides flavae;
cauda 12 pollicum; unguis nigri; crura pennae testacea;
pulmones pulchri. γ) rostrum ex plumbeo nigrum,
ceræ color in virorem vergens; area oculorum alba;
capitis latera dilute fusca; caput reliquum cum gula
& jugulo eleganter castaneum; remiges testricelque
nigrae apice vinaceae. δ) ad fluvium Ural obvii pennae
apice albae, remiges striis maculisque alternis albis &
cerasini coloris notatae, a medio ad apicem ex nigro
in viridem aut caeruleum colorem vergentes; testricelae
apice striis 2 angustis flavae & albae.

ater. 62. F. cera pedibusque flavis, supra ex fusco niger, capite & subtus albidus, cauda forficata.

Milvus niger. *Briss. ornith. p. 117. n. 34.*

Milan noir. *Buffon hist. nat. des ois. I. p. 203. pl. enlum. n. 472.*

Black Gled. *Sibb. Scot. ill. II. 3. p. 15.*

Black kite. *Lath. syn. I. 1. p. 62. n. 44.*

Braunermaldgeyer. *Kramer elench. p. 326. n. 5.*

Habitat in Europa, milvo minor; cauda parum forficata; crura gracilia; ungues nigri.

austria- 63. F. cera pedibusque semilanatis flavis, corpore supra castaneo, subtus testaceo fusco maculato, cauda forficata.

Austrian Kite. *Lath. synops. I. 1. p. 62. n. 45.*

Brauner Geyer. *Kramer elench. 327. n. 6.*

Habitat in Austria silvis, avibus viditans & vespertilionibus.

Magnitudo circiter milvi; rostrum flavum puncto nigro; oris anguli flavi; irides & ungues nigri; palatum caeruleum; frons & gula albida fusco-maculata; caput, pectus & alæ castaneæ; cauda parva, fasciis nigricantibus, pennis apice albis.

brasiliens- 64. F. pedibus flavis, corpore rufo, punctis albis & flavis
fis. vario, cauda ex albo & fusco varia.

Circus brasiliensis. *Briss. ornith. p. 116. n. 31.*

Milvus brasiliensis. *Raj. av. p. 17. n. 6.*

Caracara. *Buffon hist. nat. des ois. I. p. 222.*

Brazilian Kite. *Will. orn. p. 76. n. 9. Latham syn. p. 63. n. 47.*

Habitat in Brasilia, gallinis infestus.

Magnitudo milvi; rostrum & ungues longi acutissimi nigricant; oculi cum iridibus flavent; pectus & abdomen nonnunquam candent; cauda 9 pollices longa.

fuscatus. 25. F. cera obscura, pedibus flavescentibus, corpore supra fusco subtus albedo, cauda forficata longissima.

Milvus carolinensis. *Briss. ornith. p. 118. n. 36.*

Falco peruvianus, cauda furcata. *Klein av. p. 51. n. 14.*

Hirundo maxima peruviana, avis prædatoris calcaribus instructa. *Feuill. it. 2. p. 33.*

Milan de la Caroline. *Buffon hist. nat. des ois. I. p. 221.*

Swallow-tailed Hawk. *Catesb. carol. I. p. 4. t. 4.*

Swallow-tailed Falcon. *Arct. zool. p. 210. n. 108. t.*

X. Lath. syn. p. 60. n. 42.

Habitat in Carolina & Peru, victitans lacertis, serpentibus, insectis, quæ volando potissimum capit; milvo minor, tamen bipedalis.

Rostrum basi setis circumseptum; irides rubræ; caput collumque nivea; dorsum splendore purpureo & viridi.

Forskah- 121. F. cera pedibusque semilauatis flavis, supra cinereus, lii. subtus ferrugineus, alis supra fuscis, cauda forficata fusco-fasciata longitudine corporis. *Forsk. Fn. arab. p. 1.*

Habitat in Ægypto, hieme frequens, cubitalis.

Haliaë- 26. F. cera pedibusque cæruleis, corpore supra fusco, subtus to. albo, capite albido. *Fn. suec. 63.*

Haliaëtos f. aquila marina. *Briss. ornith. p. 126. n. 10.*

Haliaëtos. *Aldrov. orn. I. p. 188. 190.*

Morphnos. *Aldrov. orn. I. p. 211. Raj. av. p. 7. n. 6.*

Balbuzzard. *Buff. hist. nat. des ois. I. p. 103. t. 2. planch. enl. n. 414.*

Bald Buzzard. *Will. orn. p. 69. t. 6.*

Fisk Gjøe. *Leems 234.*

Osprey. *Brit. 1001. I. n. 46. Arch. 1001. 2. p. 199. n. 91.*

Lath. syn. I. 1. p. 43. n. 26.

arundina- 2. F. cera cinerea, pedibus pallidis, corpore supra griseo, ceus. infra albido, cauda æquali. *S. G. Gmelin it. II. p. 163.*

caroli- 7. F. cauda fusca concolore, vertice nigro, aut fusco albo nensis. variegato, ventre albo.

Falco piscator Antillarum & carolinensis. *Briss. orn. p. 105. n. 14. & 15.*

Piscator. *Raj. av. p. 19. n. 2.*

Faucon pêcheur de la Caroline. *Buff. hist. nat. des ois. I. p. 142.*

Fishing Hawk. *Catesb. Carol. I. t. 2.*

cayen- 1. F. corpore ex ferrugineo fusco, linea alba a mandibula nensis. superiore per utrumque oculum ad occiput similiter album ducta. *Lath. syn. I. 1. p. 47. n. 26. B.*

Habitat in Europa, America & Sibiria, in insula quoque maris pacifici Isle of Pines, inter arundines degens & nidificans, victitans anatibus & piscibus, potissimum majoribus, quos capiendo submergit.

Longitudo circiter 11 pollicum ultra pedem. Area fusca descendit ab utroque oculo per latera colli ad alas.

Antilla-
rum.65. *F. fuscus*, vertice nigro, ventre albo.*Falco Antillarum. Briss. ornith. p. 104. n. 13.**Mans fenny. Raj. av. p. 19. n. 1. du Tartre hist. des antill. 2. p. 252. Buff. hist. nat. des ois. 1. p. 144. Lath. syn. I. 1. p. 47. n. 27.**Habitat in Antillis; habitu & pennis ad aquilas spectat, falconibus tamen vix major; avibus & amphibis victians. Pedes & ungues duplo majores & validiores, quam falconibus.*Sinenfis. 66. *F. cera* pedibusque luteis, corpore supra fusco, subtus flavicante.*Chinese Eagle. Lath. syn. I. 1. p. 35. n. 11. t. 3.**Habitat in India.**Rostrum unguesque magni nigri; irides fusca; vertex obscurus; alarum tænia media valde obscura.** * * * *Falcones, minores, pedibus nudis.*Orienta-
lis.67. *F. pedibus* plumbeis, stria superciliari ferruginea, capite & corpore supra obscure fusco, subtus ex ferrugineo fusco, cauda albo-maculata.*Oriental Hawk. Lath. syn. I. 1. p. 32. n. 7. c.**Habitat in Japonia; 17 pollices longus; rostro amplè unguibusque nigris; mandibula inferior lutea; caput magis obscurum reliquo corpore; pennæ stria media nigra; tectrices alarum secundariæ albo maculæ; cauda 8 pollices longa.*

Indicus.

68. *F. cera* pedibusque luteis fronte & uropygio albis, corpore supra ex rufescente, ventre ex ferrugineo fusco, albido striato, cauda fusca, fasciis quinque nigris.*Javan Hawk. Lath. syn. I. 1. p. 32. n. 7. d.**Habitat in Java, 17 pollices longus.**Rostrum basi flavum, apice nigrum; tectrices alarum inferiores sordide ex rufescente albæ, ferrugineo undulæ; remiges striis transversis apicibusque nigris; tectrices caudæ albo-punctatæ. Gula & pectus ex rufescente fusca. Ungues nigri.*nova
Hollan-
diæ.69. *F. albus*, cera pedibusque luteis, ungue posteriore anterioribus duplo longiore.*New-Holland white Eagle. Lath. syn. I. 1. p. 40. n. 18.**Habitat in nova Hollandia, 20 pollices longus; orbitis flavis. Forster.*

Urubitinga.

70. F. cera pedibusque flavis, corpore fusco, alis nigricantibus cinereo mistis, cauda alba apice nigra albo punctata, Aquila brasiliensis. *Briss. orn. p. 128. n. 12.*
 Urubitinga. *Will. orn. p. 64. Raj. av. p. 8. n. 9. Buff. hist. nat. des ois. I. p. 141.*
 Brazilian Eagle. *Latham syn. I. I. p. 41. n. 20.*
Habitat in Brasilia, anseris semestris magnitudine. Rostrum crassum, nigrum; oculi magni.

pondice-
rianus.

71. F. cera cærulescente, pedibus luteis, corpore castaneo, capite collo & pectore albis, linea longitudinali pennarum media fusca.
 Aquila ponticeriana. *Briss. orn. p. 129. n. 15.*
 Aigle de Pondichery. *Buff. hist. nat. des ois. I. p. 136. pl. enlum. n. 416.*
 Pondichary - Eagle. *Lath. syn. I. I. p. 41. n. 21.*
Habitat in India, incolis sacer, pedem cum 7 pollicibus longus.
Rostrum cinereum, apice flavum; remiges sex priores parte media exteriore nigricantes; ungues nigri.

æquino-
ctialis.

72. F. pedibus luteis, capite, collo dorsoque ex atro fuscis, pectore rufis, alarum tectricibus & humeris colore succoladæ, cauda nigra, rectricibus, exceptis duabus intermediis, signo albo V notatis.
 Equinoctial Eagle. *Latham syn. I. I. p. 43. n. 25.*
Habitat in Cayenna, 21 pollices longus; rostrum unguetque pallidi, illius apex niger.

Buteo.

15. F. cera pedibusque luteis, corpore fusco, abdomine pallido, maculis fuscis. *Fa. succ. 60. Scop. ann. I. p. 15. n. 4.*
 Buteo vulgaris. *Gesn. av. 46. Aldr. orn. I. p. 369. 370. Raj. av. p. 16.*
 Buteo. *Briss. orn. p. 116. n. 32.*
 Bufe. *Buff. hist. nat. des ois. I. p. 206 t. 8. pl. enlum. n. 419.*
 Buzzard. *Brit. zool. I. p. 188. n. 54 t. 25. Arct. zool. 2. p. 207. n. 3.*
 Common Buzzard. *Will. orn. p. 70. Alb. av. I. t. I. Latham. syn. I. I. p. 48. n. 28.*
Habitat in Europa, avibus, reptilibus, mammalibus minoribus, insectis victitans; 8 pollicibus pedem longitudine superans, colore varius; rostrum plumbeum; irides obscuræ; ungues nigri.

- gallina-** 72. F. cera pedibusque flavis, corpore supra fusco, subtus
rius. rufo maculis ovalibus fuscis, cauda fusca fasciata.
Circus major, gros Buzard. *Briss. ornith. p. 114. n. 28.*
Hünerhabicht, Hüneregeyer. *Frisch. av. t. 72.*
- naevius.** β. Falco minor, alis magis variegatis. *Briss. ornith. p. 116.*
n. 28. A.
Habitat in Europa, 8-11 pollicibus pedem longitudine
superans: Rostrum unguisque nigri; irides croceæ.
- jamai-** 74. F. cera pedibusque luteis, corpore ex fuscescente bubali-
tenfis. no, subtus pallidior maculato, vertice obsoleto.
Cream-coloured Buzzard. *Lath. syn. I. 1. p. 49. n. 30.*
Habitat, rarior tamen in Jamaica, speciosa avis.
Rostrum unguisque nigri; irides flavæ; dorsi pennæ &
rectrices rachi medioque fusæ; pedes breves.
- borealis.** 75. F. cera pedibusque pallide flavis, corpore supra fusco,
subtus albo, cauda obsolete ferruginea versus apicem
stria transversa nigra.
American Buzzard. Lath. syn. I. 1. p. 50. n. 31.
Red-tailed Falcon. Arch. zool. 2. p. 205. n. 100.
Habitat in America boreali, potissimum Carolina, buteon-
æqualis.
Rostrum unguisque nigri; gula alba fusco admixto; jugu-
lum & pectus dorso pallidiora; uropygium album.
- Leveria-** 76. F. pedibus flavis, capite fusco & albo alternatim striato,
aus. corpore supra fusco, subtus albo, alis obscure fuscis.
Leverian Falcon. *Arch. zool. 2. p. 206. n. 101.*
Habitat in Carolina, buteonæ æqualis.
Rostrum obscurum, pennæ apice macula insigni alba nota-
ta; rectrices tæniis 9 albis, & totidem obscuris, mediæ
obscuris & cinereis.
- rufus.** 77. F. pedibus flavis, corpore rufo, supra in fuscum vergen-
te, cauda cinerea.
Circus rufus. Briss. orn. p. 115. n. 30.
Harpag. Buff. hist. nat. des ois. I. p. 217. pl. enl. n. 460.
Harpy. Lath. syn. I. 1. p. 51. n. 32.
Fischgeyer, Brandgeyer. Frisch. av. t. 78.
Habitat in Galliæ & Germaniæ humilioribus, præsertim
fluviorum ripis, pisces vivos ex aqua prædans.
Longitudo pedis & 8 pollicum; ungues rostrumque nigri-
cant; irides croceæ.

variegata-78. F. pedibus flavis, capite colloque albidis ferrugineo-maculatis, corpore supra fusco, subtus albo, cauda obscure fusca striis obsoletis decussantibus.

Speckled Buzzard. *Lath. syn. I. 1. p. 97. n. 83.*

Habitat in America boreali.

Habitus buteonis; longitudo 12 pollices excedens; rostrum obscurum; ungues nigri; an vere differt a sequente?

albidus. 79. F. pedibus flavis, corpore albo maculis magnis fuscis, cauda obscura striis punctisque albis.

Buzzardet. *Arch. zool. 2. p. 211. n. 109.*

Habitus buteonis, cruribus tamen longioribus. Longitudo 15 pollicum; maculae subtus rariores; tectrices minores fuscae.

apivorus. 28. F. cera nigra, pedibus feminaudis flavis, capite cinereo, caudæ fascia cinerea apice albo. *Fn. succ. 65.*

Buteo apivorus. Raj. av. 16. Briss. av. 1. p. 410.

Bondrée. Buffon hist. nat. des ois. 1. p. 208. pl. enlum. n. 420.

Honey Buzzard. Brit. zool. 1. n. 26. Will. orn. p. 72.

t. 3. Albin. av. 1. p. 2. t. 2. Lath. syn. I. 1. p. 52. n. 33.

Habitat in Europa, visitans muribus, aviculis, reptilibus, insectis, præsertim apibus.

æruginosus. 29. F. cera virescente, corpore griseo, vertice, gula, axillis pedibusque luteis. *Fn. succ. 66.*

Circus palustris. Briss. ornith. p. 113. n. 29.

Circus. Gesn. av. 49. Aldrov. orn. 1. p. 351.

Milvus æruginosus. Aldrov. orn. 1. p. 395. Raj. av. 17.

Nozeman niederdel. Vogel, t. 8. 9.

Busard. Buffon hist. nat. des ois. 1. p. 218, t. 10. pl. enlum. n. 424.

Moor Buzzard. Brit. zool. 1. n. 57. t. 27. Will. orn.

p. 75. t. 7. Lath. syn. I. 1. p. 53. n. 34.

Habitat in Europa in paludibus nidificans, avibus aquaticis, piscibus, tuniculis visitans.

javani-80. F. cera nigra, medio lutea, pedibus luteis, capite, collo & pectore castaneis, dorso fusco. v. *Wurmb apud Lichtenberg Magaz. IV. 2. 8.*

Habitat in maritimis Javæ, piscibus visitans.

cinereus. 81. F. cera pedibusque cæruleseentibus, linea supraoculari alba fusco-maculata, corpore supra ex cinereo-fusco albedo admisto.

AVES ACCIPITRES. Falco.

Falco freti Hudsonis. *Briss. orn. p. 103. n. 10.*

Faucon de la Baie d'Hudson. *Buffon hist. nat. des ois. I. p. 223.*

Ashcoloured Buzzard. *Edw. av. t. 53. Latham syn. I. 1. p. 55. n. 35.*

Habitat in freto Hudsonis, tetraonibus victitans.

Magnitudo gallinæ mediocris; cauda supra ex cinereo fusca, tæniis transversis griseis, subtus cinerea, tæniis albis. Irides flavæ. An mera buteonis varietas?

lineatus 82. F. cera pedibusque flavis, corpore supra obscure fusco, subtus rufo lineis albis & pallide ferrugineis, rectricibus obscure fuscis, apice striisque duabus transversis fordide albis.

Barred-breasted Buzzard. *Latham syn. I. 1. p. 56. n. 36.*

Red-shouldered Falcon. *Arct. zool. 2. p. 206. n. 102.*

Habitat in insula Longa, 20-22 pollices longus.

Rostrum caruleum; unguis nigri; caput & collum ex flavicante alba, lineis obscuris striata.

obsole- 83. F. corpore obscure fusco, subtus leviter albo-maculatus, rectricibus mediis obsolete fuscis.

Plain Falcon. *Arct. zool. 2. p. 208. n. 104.*

Habitat in freto Hudsonis bipedalis, rostrum nigrum.

rustico- 7. F. cera, palpebris, pedibusque luteis, corpore cinereo alboque undulato, collari albo. *Fn. succ. 56.*

Collared Falcon. *Arct. zool. 2. p. 222. G. Lath. syn. I. 1. p. 56. n. 37.*

Habitat in Suecia, Sibiria, Groenlandia, gallinæ magnitudine.

Rostrum plumbeum; corpus subtus album, maculis exiguis cordatis fuscis; cauda tæniis 12-13 alternatim albis & fuscis; unguis nigri.

novæ 84. F. cera pedibusque luteis, corpore ex atro fusco, subtus rufo-maculato, cauda alisque griseo-maculatis.

Seelandiæ, New-Zealand Falcon. *Lath. syn. I. 1. p. 57. n. 38. t. 4.*

Habitat in nova Seelandia, vulturi affinis, 18 pollices, femina 23 pollices longa; rostrum caruleum, apice nigrum; irides nudæque orbitæ caruleæ, femina flavæ; hinc collum & abdomen lineis albidis, cauda tæniis transversis albis notata.

palumba- 30. F. cera nigra, margine pedibusque flavis, corpore fulco,
rius. reſtrictibus faſciis pallidis, ſuperciliis albis. *Fn. ſuec.* 67.

Accipiter palumbarius. *Gefn. av.* 51. *Aldr. orn.* 1. p. 342.
t. 343. *Raj. av.* 18. n. 1.

Aſterias. *Aldr. orn.* 1. p. 336. *t.* 340. 341.

Aſtur. *Briff. orn.* p. 91. n. 3.

Autour. *Buff. hiſt. nat. des ois.* 1. p. 230. *t.* 12. *pl. enlum.*
n. 418. 461.

Foſhawk. *Brit. zool.* 1. n. 52. *Arch. zool.* 2. p. 204. n. 99.

Albin. *av.* 2. p. 8. *t.* 8. *Will. orn.* p. 85. *t.* 3. 5. *Luth.*
ſyn. 1. 1. p. 58. n. 39.

Groſſer geſperberter Falk, groſſer gepfeilter Falk. *Friſch.*
av. *t.* 82. (mas). 81. (fem). *Falck it.* III. *t.* 21.

Habitat in Europa, Calmuſcia, America boreali, gallinis
infeſtus, & ad venatum volucrum adaptandus; 10
pollicibus & ultra pedem longitudine excedens.

Roſtrum cæruleum, apice nigrum; irides flavæ; caput
fulcum; corpus ſubtus totum album nigro-undulatum;
cauda cinerea longa, apice alba; ungues nigri.

cayen- 85 F. pedibus cæruleis, capite & collo ex cæreſcente
nenſis. albis, dorſo aliſque obſcure cinereis, jugulo, peſtore
& abdomine albicantibus.

Cayenne Falcon. *Lath. ſyn.* 1. 1. p. 59. n. 40.

Habitat in Cayenna.

Roſtrum cæruleum; ungues & remiges primariae nigrae;
ſecundariae nigro-lineatae; caudæ apex albus, tæniæ
4-5 alternatim albæ & nigrae.

macrou- 85. C. cera pedibusque luteis, roſtro nigricante, corpore ſu-
rus. pra cinereo ſubtus albo, remigibus interioribus cinereis
apice albis. *S. G. Gmelin it.* 1. p. 48. *nov. comm. Petrop.*

XV. p. 439. *t.* 8. 9. *Lepechin it.* 1. p. 260.

Long-tailed Falcon. *Lath. ſyn.* 1. 1. p. 59. n. 41.

Habitat in Ruſſia lanarii magnitudine, 7 pollicibus pedem
longitudine ſuperans; cauda fere 9 pollicum; roſtrum
nigrum, baſi viride.

Falconaria ars, ſcilicet ars falcones columba Glanio capiendi, ad aucupium & vena-
um antiloparum, ardearum, avicularum, &c. inſtituendi, tataris nonnullis gen-
tibus familiaris, in Europa propriis artiſtibus commiſſa, in luxuriam magnatum,
transiit inſcientiam; omnes ſere falcones poſſunt ita inſtrui; v. d'Elſparon Fal-
conaria. Francoſ. 1617. 41

- gentilis. 13. F. *cera pedibusque flavis*, corpore cinereo maculis fuscis, cauda fasciis quatuor nigricantibus. *Fn. suec.* 58. *Scop. ann.* 1. p. 15.
 Falco gentilis. *Gesn. av.* 71. *Aldr. orn.* 1. p. 481. *Raj. av.* 13. *Briss. av.* 1. p. 339.
 Gentle Falcon. *Brit. zool. n.* 50. t. 21. 22. *Arct. zool.* 2. p. 203. n. 98. *Albin. av.* 2. p. 4. t. 6. *Will. orn.* 46. *Lath. synops.* 1. 1. p. 64. n. 48.
Habitat in alpinis Europæis, America boreali, ad Volgam, videns tetraonibus, palumbario major; rostrum plumbeum; irides flavæ; caput subferrugineum, maculis oblongis nigris; cauda albo punctata; ungues nigri.
- communis. 86. F. *fuscus*, pennarum margine rufo, cauda tenuis transversis saturatioribus, rostro ex cinereo cærulescente, cera, iridibus pedibusque luteis.
 Falco. *Briss. orn.* p. 92. n. 4.
 Faucon. *Buff. hist. nat. des ois.* 1. p. 249.
 Schwarzhrauet Falk. *Frisch. av.* t. 74.
- hornotinus. β. F. in cinereum vergens. *Briss. orn.* p. 93. n. 4. A.
 Faucon fors. *Buff. hist. nat. des ois.* 1. t. 15. pl. enlum. n. 470.
 Gearling Falcon. *Lath. syn.* 1. 1. p. 65. n. 49. A.
Annuus falco.
- gibbosus. γ. F. gibbosus. *Raj. av.* p. 14. n. 6. *Briss. orn.* p. 93. n. 4. B.
 Faucon haggard ou bossu. *Buff. hist. nat. des ois.* 1. t. 16. pl. enlum. n. 471.
 Haggard Falcon. *Will. orn.* p. 80. *Latham syn.* 1. 1. p. 66. n. 49. B.
Senex avis.
- leucocephalus. δ. Falco. *Briss. orn.* p. 93. n. 4. C.
 White-headed Falcon. *Lath. syn.* 1. 1. p. 66. n. 49. C.
 Rauh-kufs geyer; gelbbrauner Geyer. *Frisch. av.* t. 75.
- albus. ε. F. albus. *Raj. av.* p. 14. n. 7. *Briss. orn.* p. 94. n. 4. D.
 White Falcon. *Will. orn.* p. 80. n. 7. *Lath. syn.* 1. 1. p. 66. n. 49. D.
 Weiser Falk, weiser Geyer. *Frisch. av.* t. 80.
- ater. ζ. F. niger. *Briss. orn.* p. 94. n. 4. E.
 Falco columbarius Nebbi dictus. *Raj. av.* p. 161.
 Faucon passager. *Buff. hist. nat. des ois.* 1. p. 263. pl. enlum. n. 469.
 Black hawk or Falcon. *Edw. av.* 1. t. 4.

Black Falcon. *Lath. syn.* I. 1. p. 67. n. 49. E.
Schwarzbrauner Habicht. *Frisch. av.* t. 83.

- nævius. η. F. maculatus. *Briff. orn.* p. 95. n. 4. F.
Spotted Falcon. *Edw. av.* I. t. 3.
Spotted-winged Falcon. *Lath. syn.* I. 1. p. 68. n. 49. F.
- fuscus. θ. F. corpore supra fusco maculis obscurioribus, subtus albo maculis fuscis.
Falco fuscus. *Briffon orn.* p. 95. n. 4. G.
Brown Falcon. *Lath. syn.* I. 1. p. 68. n. 49. G.
Braunfahler Geyer. *Frisch. av.* t. 76.
- ruber. ι. F. maculis nigris & rubris. *Briff. orn.* p. 96. n. 4. H.
Falco rubens. *Raj. av.* p. 14. n. 10.
Red Falcon. *Will. orn.* p. 81. n. 10. *Lath. syn.* I. 1. p. 69. n. 49. H.
- indicus. κ. F. corpore subtus ex rubefcente fulvo.
Falco ruber indicus. *Briff. orn.* p. 96. n. 4. I.
Falco rubri indici Aldrovandi. *Raj. av.* p. 14. n. 11.
Will. orn. p. 81. n. 9.
Red Indian Falcon. *Lath. syn.* I. 1. p. 69. n. 49. I.
- italicus. λ. F. pectore luteo, maculis ferrugineis, alis versus apicem albo-maculatis.
Falco italicus. *Jonst. av.* p. 19. *Briff. orn.* p. 97. n. 4. K.
Italian Falcon. *Lath. syn.* I. 1. p. 70. n. 49. K.
- arcticus. μ. F. islandus. *Briff. orn.* p. 97. n. 4. L.
Arctic Falcon. *Lath. syn.* I. 1. p. 70. n. 49. L.
Habitat in Europa, ε) etiam in Sina, η) in freto Hudsonis, κ) in India venatui aptissimus.
- islandus. 87. F. cera pedibusque flavis, corpore fusco, subtus albo maculis cordatis nigris, cauda albo fasciata. *Brünn. orn. bor.* p. 2. n. 9.
- albus. β. F. albus, supra maculis exiguis cordatis nigris, caudæ albæ rectricibus duabus intermediis obsolete nigro fasciatis. *Brünn. orn. bor.* p. 2. n. 7.
- maculatus. γ. F. albus, maculis cordatis magnis, rectricibus albis, singulis nigro-fasciatis. *Brünn. orn. bor.* p. 2. n. 8.
Habitat in Islandia, 9 pollicibus pedem longitudine excedens; caput album, ferrugineo admixto; dorsum obscurum singulis pennis albidis, fusco-fasciatis, & albo marginatis; cauda rotundata, fasciis circiter 14 alternis fuscis & albis; ungues nigri, posterior prælongus.

barbarus. 8. F. cera pedibusque luteis, corpore cærulefcente fusco-
que maculato, pectore immaculato, cauda fasciatâ.

Falco barbaricus. *Briss. orn. p. 99. n. 6. A.*

Falco tunetanus. *Aldr. av. I. p. 483. Raj. av. 14. n. 9.*

Barbary Falcon. *Will. orn. p. 81. Alb. av. 3. p. 2. t. 2.*
Lath. syn. I. 1. p. 72. n. 51.

Habitat in Barbaria, magnitudine & colore ad lanarium accedens, 17 pollices longus. Rostrum nigrum; irides flavæ; alæ vix maculatæ; pectus ex flavicante album in cæruleum vergens; abdomen maculis oblongis nigris; cauda fasciis 7 transversis fuscis. An mera peregrini varietas?

peregrinus. 88. F. cera pedibusque luteis, corpore supra cinereo fusco-
fasciato, subtus ex rufo albo, tæniis nigricantibus, cauda albo-punctatâ.

Falco peregrinus. *Raj. av. p. 13. n. 1. Briss. orn. p. 98. n. 6.*

Faucon pelerin. *Buff. hist. nat. des ois. I. p. 249.*

Peregrine Falcon. *Brit. zool. n. 48. t. 20. Arct. zool. 2. p. 203. Will. orn. p. 76. t. 8. Latham syn. I. 1. p. 73. n. 52.*

tataricus. ̢. F. alis supra rufis, digitis prælongis. *Briss. orn. p. 100. n. 6. B.*

Faucon de Tartarie ou Barbarie. *Bel. hist. des ois. p. 116.*

Tatarian Falcon. *Lath. syn. I. 1. p. 73. n. 52. A.*

Habitat in Europa & boreali Asia & America.

Migratorius; an non nisi ætate deformis gentilis?

verficolor. 89. cera flava, capite & corpore supra albo, maculis ex rufescente dilute fuscis, subtus albo, pectore ferruginæo parumper maculato.

Spotted Falcon. *Brit. zool. n. 55. t. 26. Latham syn. I. 1. p. 74. n. 53.*

Habitat in Anglia, buteonis magnitudine. Rostrum nigrum; alæ fasciis cinereis; cauda dilutius & obscurius fuscis.

pennatus. 90. F. cera pedibusque luteis, corpore supra ex nigricante fusco, & sordide griseo variegato, subtus ex flavo fusco lineis longitudinalibus nigricantibus, pedibus ad digitos usque pennatis.

Faucon pata. *Briss. orn. VI. app. p. 22. t. 1.*

Booted Falcon. *Lath. syn. I. 1. p. 75. n. 55.*

Magni-

Magnitudo *Gyrfalconis*; longitudo pedis, & $7\frac{1}{2}$ pollicum; rostrum *nigricans*; palpebræ *luteæ*; caput & cervix ex *fulvo grisea*, lineis *nigricantibus*; cauda *fusca*, versus apicem *nigricans*, apice *grisea*, ad latera *albo-maculata*. Ungues *nigri*.

Spadi- 91. F. cera flava, corpore spadiceo ferrugineo admixto, infe-
ceus. rius ad latera albo, pedibus ad digitos usque pennatis.

Falco Spadiceus or Chocolate Falcon. *Forster ad. angl.* LXII. p. 281. & *amer. catal.* p. 9.

Chocolate-colored Falcon. *Arct. zool.* 2. p. 201. n. 94. t. IX.

Bay-Falcon & Placentia Falcon. *Lath. syn.* I. 1. p. 54. n. 34. A. & 76. n. 57.

β. F. uropygio albo.

White-rumped Bay-Falcon. *Lath. syn.* I. 1. p. 54. n. 34. B. *Habitat in freto Hudsonis, & nova terra, visitans anatis, quibus in rupibus inhiat.*

Longitudo pedis & 10 pollicum; rostrum *nigrum*; rectrices duæ *intermediæ nigrae & cinerae*, ceteræ *extus obscuræ*, *intus albo & nigro variae*. Digiti *breves*.

S. Johan- 92. F. cera pedibusque pennatis flavis, corpore fusco, supra
nis. lineis obliquis *nigris & sordide albis*, subtus passim maculis *albis & flavicantibus*, cauda fasciata apice *alba*.

S. John's Falcon. *Arct. zool.* 2. p. 200. n. 93. t. IX. *Lath. syn.* p. 77. n. 58.

Habitat in freto Hudsonis & nova terra; pedem & 9 pollices longus. Digiti breves.

facer. 93. F. cera pedibusque cæruleis, dorso, pectore & testricibus alarum primariis fusco-maculatis, cauda maculis reniformibus.

Falco facer. *Briss. orn.* p. 98. n. 4. *M. Raj. av.* p. 13. n. 2. *Sacre. Buff. hist. nat. des ois.* I. p. 246. t. 14. *Will. orn.* p. 77. *Lath. syn.* I. 1. p. 77. n. 59.

β. Falco facer. *Forster. ad. angl.* LXII. p. 382.

Sacre. Arct. zool. 2. p. 202. n. 96.

American Sacre. *Lath. syn.* I. 1. p. 78. n. 59. A.

Habitat β) in freto Hudsonis, nova terra, Tataria, heic ad venatum institutus; frigoris patientissimus, ardeam albam potissimum venatur; Aprili & Maio in locis desertis ova plerumque 2 ponens, bipedalis; caput obscure fuscum; pennæ abdominis albae, medio fusco maculatae; testrices alarum, remigesque primariæ lineis transversis albis;

AVES ACCIPITRES. Falco.

cauda fusca, ad latera maculis ovalibus transversis rubris. Pedes ad digitos fere pennati.

novæ
terræ.

94. F. cera pedibusque flavis, occipite ferrugineo, corpore supra fusco, subtus ferrugineo, cauda lineis dilutius & saturatius fuscis varia.

New foundland Falcon. *Arch. zool.* 2. p. 201. n. 95.

Lath. syn. I. 1. p. 79. n. 60.

Habitat in nova terrâ, 20 pollices longus; pedes semipennati.

95. F. pedibus cæruleis, corpore nigricante maculis radiatis, subtus ex albo & nigro mixto. *Briss. orn.* p. 103. n. 11.
Blæ-footed Falcon. *Will. orn.* p. 82. c. 11.
Starry Falcon. *Lath. syn.* I. 1. p. 79. n. 61.
Magnitudo habitusque peregrini; alæ tamen breviores; cauda longior; irides aureæ.

96. F. cera flava, capite dorsoque ex atro fascis, cervice albofasciata, pectore & abdomine albis, maculis cordatis. Winter Falcon. *Arch. zool.* 2. p. 209. n. 107.

β. Northern Falcon. *Lath. syn.* I. 1. p. 79. n. 62.

Habitat hieme in provincia Noveboracensi, pygargi magnitudine. Tectrices alarum obscuræ, margine fordide albo, extimæ aurantio; cauda lineis fuscis & nigris apice alba; rostrum nigrum; pedes longi, graciles.

97. F. cera pedibusque pennatis luteis, capitis cristâ retrorsum pendula, corpore supra nigro, subtus albo & nigro striato. Falco indicus cristatus. *Briss. orn.* p. 104. n. 12.
Falco indicus cirrhatus. *Raj. av.* p. 14. n. 12.
Faucon huppé des Indes. *Buff. hist. nat. des ois.* I. p. 271. n. 4.

Crested indian Falcon. *Wil. orn.* p. 82. n. 12. *Lath. syn.* I. 1. p. 80. n. 63.

Habitat in India, palumbarii circiter magnitudine; rostrum obscure cæruleum; irides flava; cervix fulva; cauda fasciis transversis nigris & cinereis; unguis nigri.

98. F. pedibus luteis, capite, collo, dorso, humeris, & remigibus nigris, reliquo corpore, tectricibus alarum & cauda albis.

Black and white indian Falcon. *Penn. ind. zool.* t. 3. *Lath. syn.* I. 1. p. 81. n. 65.

Habitat in Zeylon, 16 pollices longus; rostrum, unguis, tectrices alarum mediæ plures nigricant; irides flavae; orbite albo maculata.

AVES ACCIPITRES. Falco.

275

ceylānen- 99. F. cera flavā , corpore lacteo , occipitis pennis duabus
 sis. dependentibus:

Ceyloneſe creſted Falcon. *Lath. ſyn.* I. 1. p. 82. n. 66.

Habitat in Zeylon ; roſtrum obſcurum.

grifeus. 100. F. cera pedibusque flavis , corpore ſupra obſcure grifeo ,
 ſubtus albo , maculis oblongis nigris , reſtrictibus longis ,
 intermediis duabus concoloribus ; reliquis maculatis.

Grey Falcon. *Brit. 1901. n. 49. Lath. ſyn.* I. 1. p. 82. n. 67.

Habitat in Angliā , corvi magnitudine.

Roſtrum cæruleſcens ; irides rubræ ; caput anterieus obſcure
 fufcum , poſterius album , ad latera cum gula bubali-
 num ; remiges albo-maculatæ.

Gyrſalco. 27. F. cera cærulea , pedibus luteis , corpore fuſco , ſubtus
 faſciis cinereis , caudæ lateribus albis. *Fn. ſucc.* 64.

Brown Jerſalcon. *Lath. ſyn.* I. 1. p. 82. n. 68.

Habitat in Europa , gruibus , ardeis ; columbis infeſtus.
Variat pedibus cæruleis & flavis.

candi-
 cans.

101. F. cera pedibusque ex cæruleſcente cinereis , corpore
 albo fuſco-maculato.

Gyrſalco. *Aldrov. orn.* I. p. 471. t. 473. *Raj. av.* 13. n. 3.

Geſſault. *Briff. orn.* I. p. 370. n. 19. t. 30. f. 2. *Buff. hiſt.*
nât. des oif. I. p. 239. t. 13. pl. enlum. n. 215. 446. 462.

Geſſalcon. *Will. orn.* p. 78. n. 3.

Gyrſalcon. *Brit. 1901. n. 47. Arch. 1901. 2. p. 221.*

White Jerſalcon. *Lath. ſyn.* I. 1. p. 83. n. 69.

islandi-
 cus.

β. Geſſault d'Islande. *Briff. orn.* I. p. 373. t. 31.

Iceland Jerſalcon. *Lath. ſyn.* I. 1. p. 84. n. 69. A.

*Habitat in Islandiā & Scotiā boreali, palumbarii magnitu-
 dine ; roſtrum ex cæruleo cinereum , apice nigricans ;
 unguis plumbeus ; irides & orbitæ cæruleæ , (β. irides lu-
 teæ). β. Corpus ſupra fuſcum , dorſi & alarum maculis
 albis , ſubtus album nigro maculatum. Pedes flavi.*

ſufflator. 17. F. cera pedibusque luteis , corpore fuſco albido , oculo-
 rum operculis oſſeis.

Surinam Falcon. *Lath. ſyn.* I. 1. p. 85. n. 70.

*Habitat in Surinamo & Cayenna ; iratus aut territus
 caput inflat ad magnitudinem corporis.* Rolander.

Corpus ſupra fuſcum , plumis baſi albis ; ſubtus luteo , albo
 fuſcoque maculatum , uti etiam redrices. Nares lobo
 carneo intercalari.

cachin-
nans.

18. F. cera pedibusque luteis, palpebris albis, corpore fusco albidoque vario, annulo nigro verticem album cingente. Laughing Falcon. *Lath. syn. I. 1. p. 85. n. 71.*
Habitat in America meridionali; hominem observans cachinnos edit. Rolander.
Corpus supra dorsum, alas, uropygium fuscum; sed alba sunt collum, gula, pectus, abdomen, alæ subtus. Cauda fasciis luteis nigrisque.

Lanarius. 24. F. cera lutea, pedibus rostroque cæruleis, corpore subtus maculis nigris longitudinalibus. *Fn. succ. 62.*

Lanarius. *Gesn. av. 76. Aldr. orn. 1. p. 488. Raj. av. p. 15. n. 13. Briss. orn. p. 105. n. 16.*

Lanier. *Buff. hist. nat. des ois. I. p. 243.*

Lanneret. *Albin. av. 2. p. 7. t. 7.*

Lanner. *Brit. zool. n. 51. t. 23. Arch. zool. 2. p. 225. Will. orn. p. 82. n. 13.*

Brown Lanner. *Lath. syn. I. 1. p. 86. n. 72.*

Habitat in Europa, desertis Uralensi, Baraba aliisque tataricis, migratorius; nidificans in arboribus humilibus; venatui aptissimus.

Tania alba cingit frontem supra oculos. Pedes breves, & prouti nonnunquam cera, cærulescentes; pectus album, flavo tinctum, maculis fuscis; remiges primariæ & cauda obscura; hæc utrinque, illæ intus maculis ovalibus ferrugineis.

albicans. 102. F. cera pedibusque luteis, corpore subtus albicante, remigibus nigricantibus.

Lanarius albicans. *Briss. orn. p. 107. n. 18.*

Lanarius. *Aldrov. orn. 1. p. 380. fig. p. 181.*

White Lanner. *Lath. syn. I. 1. p. 87. n. 73.*

β. Lanarius rectricibus duabus intermediis griseis, reliquis maculatis albis.

Lanarius. *Aldrov. orn. 1. p. 380. fig. p. 183.*

Habitat in Europa, an vere distinctus a lanario?

cyaneus. 10. F. cera alba, pedibus fulvis, corpore cæruleo-canefcente, arcu superciliari albo gulam cingente.

Lanarius cinereus. *Briss. orn. p. 106. n. 17.*

Oiseau S. Martin. *Buff. hist. nat. des ois. I. p. 212. planch. calum. n. 459.*

Blue Hawk. *Edw. av. 5. p. 33. t. 225.*

Hen-harrier. *Brit. zool. n. 58. t. 28. Lath. syn. I. 1. p. 88. n. 74. Hayes brit. Birds t. 1.*

Grau-weiße Geyer. *Frisch av. t. 79. 80.*

Habitat in Europa & Africa, 17 pollices longus.

Rostrum nigrum; irides, aliquando etiam cæra, luteæ; occiput album, maculis dilute fuscis; pectus & abdomen similiter alba, prius obscure striatum; rectrices 2 intermediae utrinque, reliquæ extus griseæ, intus albæ, obscure striatæ.

pygar- 11. F. cera pedibusque flavis, corpore cinereo, abdomine pal-
gus. lido, maculis oblongis rufis, ocularum orbita albæ.

Scop. ann. 1. p. 14.

Falco torquatus. Briss. av. 1. p. 345.

Subbuteo. Gess. av. 48.

Pygargus. Alb. av. 2. p. 5. t. 5. & 3. p. 3. t. 3. Will. orn. t. 7. Raj. av. 17. n. 5.

Soubuse. Buff. hist. nat. des ois. 1. p. 215. t. 9. planch. enl. n. 443. 480.

Ring tail. Brit. zool. n. 59. Arct. zool. 2. p. 209. n. 106. Will. orn. p. 72. Lath. syn. 1. 1. p. 89. n. 75. Hayes brit. Birds t. 2.

Habitat in Europa, & temperiori Sibiria, 7½ pollicibus pedem longitudine superans; rostrum pallidum; irides flavæ; cauda longiuscula, obscure fasciata, albo punctata; mas subtus maculis transversis, femina longitudinalibus.

hudson- 19. F. cera pedibusque flavis, dorso fusco, superciliis albis,
nius. speculo alarum cærulescente.

Accipiter freti Hudsonis. Briss. av. 6. app. 18.

Ringtail Hawk. Edw. av. 107. t. 107.

Hudson's bay Ringtail. Lath. syn. 1. 1. p. 91. n. 76.

Habitat ad fretum Hudsonis, pedem & 9½ pollices longus.

Rostrum unguis nigris; corpus subtus album, maculis ex rufis fuscis; rectrices 2 intermediae subfuscae, extimæ albæ, reliquæ ex cærulescente cinereæ, singulæ striis transversis fuscis.

Buffoni. 103. F. cera cærulea, pedibus luteis, corpore supra spadiceo, subtus ex rufescente bubalino, superciliis flavis, caudæ fasciis pallide & obscure fuscis.

Cayenne Ringtail. Lath. syn. 1. 1. p. 91. n. 76. A.

Habitat in Cayenna, bipedalis.

Rostrum unguis nigris; pennæ primariæ intus obscuræ, extus ex cinereo cæruleæ, fasciis fuscis, in secundariis magis obsolete; remiges apice albæ.

uligino- 104. F. cera pedibusque aurantiis, corpore supra fusco, sub-
sus. tus splendide ferrugineo, caudæ rariius quatuor nigris.

Marsh Hawk. *Arch. zool.* 2. p. 208. n. 105. *Edw. av.* 4 t. 291. *Lath. syn.* I. 1. p. 90. n. 75. A.

Habitat in Jamaica, Pennsylvania, heic æstate in locis uliginosis aviculæ, reptilia, serpentes venans, hieme discedens, bipedalis.

Rostrum cærulefcens; orbitæ aurantiæ; irides castaneæ; lineæ nigra ab angulo rostri pone oculos ducta; supra hanc alba genas cingens & ad cervicem pergens; caput, collum & pectoris superior pars ex nigro & ferrugineo varia; tectrices alarum fuscæ; pedes crassi, brevès, robusti. II, 19, 103 & 104 perquam inter se affines.

Litho- 105. F. cera lutea, corpore supra cinereo, subtus rufo maculis longitudinalibus fuscis, cauda cinerea, versus apicem nigricante, apice alba.

Lithofalco. *Briss. orn.* p. 101. n. 8.

Lithofalco & Dendrofalco. *Raj. av.* p. 18. n. 8.

Rochier. *Buff. hist. nat. des ois.* I. p. 286. pl. enlum. n. 447.

Stone-or Treefalcon. *Will. orn.* p. 80. *Latham syn.* I. 1. p. 93. n. 77.

Tinnunculi magnitudine, 12½ pollices longus; rostrum ex cærulefcente cinereum; irides luteæ; rectrices 2 intermediæ unicolores, reliquæ nigro-fasciatæ.

monta- 106. F. pedibus luteis, corpore supra ex fusco cinereo, gula nus. juguloque albidis maculatis, caudæ basi cinerea, medio nigricante, apice albo.

Falco montanus. *Raj. av.* p. 13. n. 4. *Briss. orn.* p. 101. n. 9.

Mountain Falcon. *Will. orn.* p. 78. *Lath. syn.* I. 1. p. 93. n. 78.

β. Falco montanus cinereus. *Briss. orn.* p. 102. n. 9. A.

Falco montanus secundus Aldrovandi. *Will. orn.* t. 9.

Feregrino minor, cauda brevior; β) pedem & 9 pollices longus; rostrum nigrum; irides β) flavæ; ungues nigri; corpus β) subtus niveum; colli maculæ nunc ferruginæ, nunc nigra; aliquando collum & pectus tota nigra; adulti caput nigrum. An varietas Lithofalconis?

Tinnun- 16. F. cera pedibusque flavis, dorso rufo punctis nigris, culus. pectore striis fuscis, cauda rotundata. *Fn. succ.* 61. *Scop. ann.* 1. p. 16.

Tinnunculus f. Cenchris. *Gesn. av.* 34. *Aldr. orn.* I. p. 356.

AVES ACCIPITRES. Falco,

279

t. 358. 359. Raj. av. p. 16. n. 16. Briff. ev. 1. p. 393. n. 27.

Cresserelle. Buffon hist. nat. des ois. 1. p. 280. t. 18. planch. enlum. n. 401. 471.

Kestrel, Kestril, Stannel, or Wind-hover. Brit. zool. n. 60. Arct. zool. 2. p. 226. M. Will. orn. p. 84. t. 5.

Lath. syn. 1. 1. p. 94. n. 78. Hayes brit. birds. t. IV.

Rother Falk, & Rotheigeyer. Frisch. av. t. 84. 85.

griseus. β. Tinnunculus pennis griseis. S. G. Gmelin it. p. 49. t. 10.

alauda- γ. Accipiter alaudarius. Briff. orn. p. 110. p. 22.

rius.

Maeuse-Falk. Frisch. av. t. 88.

Habitat in Europæ & Sibiria, potissimum turribus, aviculis, muribus, insectis visitans; advenit ex migratione primo die germinationis s. veris, una cum metacilla alba. Olim ad capiendas perdrices aliasque minores aves instructus.

Caudæ fascia lata nigra versus apicem; rectrices, intermediis exceptis, apice alba; mari corona capitis & cauda dilute grisea; dorsum & alæ, ex purpurascente rufa, nigro maculata; feminae longe ponderosiori caput rufescens, corona nigro-striata, dorsum, cauda, tectricesque alarum ferrugineæ, nigro-lineatæ.

bohemi- 107. F. pedibus flavescens, corpore supra cinereo, subtus candido, remigibus quinque exterioribus extus nigris, orbitis albis.

Maeuse-habicht, Missylauce. Jos. Mayer. bohém. Abh. 6. p. 313.

Habitat in Bohemæ montosis, muribus visitans, vespere demum conspicuus, vix ultra pedem longus.

Rostrum versus oris angulos flavescens; irides flavæ; cauda acuta, longa; pedes crassiusculi, infra genua plumosi; ungues nigri teretiusculi.

piscator. 108. F. pedibus fuscis, capite ferrugineo; pennis elongatis, corpore supra cinereo, subtus ex flavicante pallide albo, cauda supra dilute fusca, subtus ex cærulecente cinerea.

Faucon pêcheur. Dampier it. 3. p. 318.

Faucon pêcheur de Sénégal ou Tanas. Buffon hist. nat. des ois. 1. p. 273. pl. enlum. p. 478.

Difficillime in hoc genere pluribusque aliis definiendi limites specierum & varietatum, cum ætas, sexus, clima, vita genus, generatio hybrida pennarum ipsiusque ætæ colorem mutant.

AVES ACCIPITRES. Falco.

Fishing Falcon. *Lath. syn. I. I. p. 95. n. 80.*

Habitat in terra Senegal, piscibus victitans, quos non integros deglutit.

Rostrum iridesque flavæ; margo pennarum superiorum ex ferrugineo fuscus; inferiorum medium macula fusca.

badius. 109. F. pedibus pallidis, capite & corpore supra fusco, sub-
tus albo, lunulis flavis, cauda dilute fusca, lineis 4
obscurioribus.

*Brown Hawk. Brown. Illustr. p. 6. t. 3. Lath. syn. I.
I. p. 96. n. 81.*

Habitat in Zeylon, 13 pollices longus.

*Rostrum cæruleum, apice nigro; irides flavæ; tectrices ala-
rum margine albo; humeri maculis albis; ungues nigri.*

aquilinus. 110. F. cera pedibusque flavis, corpore supra cæruleo, sub-
tus ex rubicundo albo, collo ex purpurascēte rufo.

*Petit Aigle d'Amérique. Buffon hist. nat. des ois. I.
p. 142. pl. enlum. n. 417.*

Red-throated Falcon. Lath. syn. I. I. p. 97. n. 82.

Habitat in America australi, 16-18 pollices longus.

*Rostrum cæruleum; orbitæ flavæ; irides aurantiæ;
ungues nigri.*

fuscus. 111. F. cera cinerea, pedibus flavis, corpore nigro-undulato,
supra ex cinereo fusco, subtus albicante. *I. F. Miller
illustr. t. XVIII.*

American brown Hawk. Lath. syn. I. I. p. 98. n. 84.

*Habitat in America, Nisi magnitudine & facie; rostrum
dilute plumbeum; vertex & latera capitis striis longitudi-
nalibus albis; abdomen ex rufescente fuscis, in femina
numerosioribus; cauda ex cinereo fusca, striis tribus
transversis obscure fuscis, apice pallido; ungues nigri.*

nisus. 31. F. cera viridi, pedibus flavis, abdomine albo griseo-
undulato, cauda fasciis nigricantibus. *Fn. succ. 68.
Strep. ann. I. p. 17.*

Accipiter. Briss. orn. p. 89. n. 1.

*Accipiter fringillarius. Gesn. av. 51. Aldr. orn. I. p.
344. t. 346. 347. Bell. av. 19. b. Raf. av. 18.*

Molcheutus. Aldr. orn. 345.

*Epervier. Buffon hist. nat. des ois. I. p. 225. t. 11. planch.
enlum. n. 412. 466. 467.*

Sparrow Hawk. Brit zool. n. 62. Arct. zool. 2. p. 226. N.

Alb. av. 3. p. 4. t. 4. & 1. p. 5. t. 5. *Will. orn.* p. 86.

Lath. syn. 1. 1. p. 99. n. 85. *Hayes brit. birds.* t. III.

Sperber. Frisch. av. t. 90. 91. 92. *Günther Nester u.*

Eyer. t. 6.

macula- β . *Accipiter maculatus.* *Briss. orn.* p. 90. A.

tus, Spotted Sparrowhawk. *Lat. syn.* 1. 1. p. 100. n. 85. A.

lacteus. γ . *Accipiter corpore toto lacteo unicolore.*

White Sparrow Hawk. *Lath. syn.* 1. 1. p. 100. n. 85. B.

Habitat in Europa, etiam maxime boreali, & Madera, audax, gallinis, perdicibus, columbis passeribusque maxime infestus; venatur egregie alaudas; hinc ejus usus in aucupiiis.

Mas 12, femina 15 pollices longa; rostrum *cæruleum*; caput, dorsum, *testrices alarum*, & cauda *inaliis ex obscuro cærulescente cinerea*, *in aliis obscure fusca*, pennis *marginibus ferrugineis*, *maribus in colorem columbinum vergentia*, β) albo *maculata*; gula, pectus & abdomen *ex albedo flava*, *maribus obscuriora*, *undis obscure fuscis*, *vel aurantiis*, *in femina magis abruptis & numerosioribus*; *in* β) *fusca*, *maculis paucis albis*; caudæ apex *albus*, *tænia* 5 lata *nigra*, β) *subtus alternatim alba & fusca*.

dubius. 112. F. *cera pedibusque flavis, capite obscuro striis ferrugineis, corpore supra fusco, subtus sordide albo, striis fuscis, cauda obscure cinerea, tæniis 4 nigris.*

Dubious Falcon. *Arch. zool.* 2. p. 213. n. 112.

Habitat in Noveboraco & Carolina, Nisb valde affinis, 10 pollices longus.

Rostrum *obscurum*; *irides flava*; *testrices alarum margine ferrugineo*; *remiges primariae obscure cinerea*, *nigro lineatae*.

obscurus. 113. F. *cera pedibusque flavis, occipite & cervice albo maculatis, corpore supra obscure fusco, subtus albedo nigro-lineato, cauda obscure fusca fasciata, albo-punctata.*

Dusky Falcon. *Arch. zool.* 2. p. 213. n. 113.

Habitat in Noveboraco, præcedente minor.

Rostrum *cærulescens*; caput *obscure fuscum*; *testrices alarum margine leviter ferrugineo*; *remiges primariae obscuræ*; cauda *brevis*, *tæniis 4 obscuris, totidemque angustioribus albis*.

colum- 21. F. *cera pedibusque luteis, corpore fusco subtus albedo, barius, cauda fusca fasciis quatuor linearibus albis.*

Accipiter Carolinensis. *Briss. orn.* p. 110. n. 21.

AVES ACCIPITRES. Falco.

Epervier des pigeons. *Buffon hist. nat. des ois.* I. p. 238.

Pigeon Hawk. *Arch. zool.* 2. p. 212. n. III. *Catesb. Carol.* 1. p. 3. t. 3. *Lath. syn.* I. 1. p. 101. n. 86.

Habitat in America septentrionali, 10½ pollices longus, migratorius, aviculis visitans.

Rostrum albicans, apice nigro; irides luteæ; corpus sub-
tus ex flavicante albu, striis fuscis; ungues nigri.

superci-22. F. cera, pedibus palpebrisque luteis, corpore fusco albido
hiosus, undulato, remigibus ferrugineis nigro fasciatis.

Gujana Falcon. *Lath. syn.* I. 1. p. 102. n. 87.

Habitat in Surinamo, Gujana.

Magnitudo Picæ; habitus Nisi; corpus supra fuscum, sub-
tus totum etiam in femoribus confertim nigro undu-
latum; remiges secundariæ margine posteriore albido;
cauda nigra, fasciis duabus latis & apice cinereis; crissum
album strigis aliquot nigris; uropygium albo nigroque
varium; supercilia subtus nuda, prominula; lora setis
nigris patentibus; rostrum & ungues nigri; rectrices
alarum inferiores albæ lineolis tenuissimis nigris.

vesperti-23. F. cera, pedibus palpebrisque luteis, crisso femoribusque
nigros, ferrugineis. S. G. *Gmelin. it.* I. p. 67. II. p. 163. *Lep-
chin. it.* I. p. 230.

Ingrian Falcon. *Lath. syn.* I. 1. p. 102. n. 88.

*Habitat in Ingria & omni Russia, etiam Sibiria, Kobek
& Derbnitschok dictus, vespere & noctu volitans, in
cacumine arborum nidificans, aut picam ex nido expel-
lens; coturnices præsertim venans.*

Magnitudo columbæ; corpus ex fusco cærulescens; venter
ex albo cærulescens; caput fuscum; rostrum flavum,
apice fusco; rectrices 12 supra & subtus fusca; remiges
ex albo cærulescentes; primores 1-7 apice nigricantes;
pedes nudi. G. de Demidoff.

vesperti-114. F. cera, pedibus palpebrisque luteis, femoribus nigris,
noides, collo, pectore & ventre fulcescentibus albo-maculatis.
Falck. it. 3. p. 329.

*Habitat in Permia, Sibiria provincia Isettepfi & Basch-
kiria, vespertino dimidio minor, ut vix drachma pondus
duarum unciarum superet.*

magni- 115. F. cera pedibusque flavis, corpore supra fusco, subtus
rostris, alba ferrugineo striato, cauda fasciis nigris & albis.

Épervier à gros bec de Cayenne. *Buff. hist. nat. des ois. I. p. 237. pl. enlum. n. 464.*

Great-billed Falcon. *Lath. syn. I. 1. p. 103. n. 89.*

Habitat in Cayenna, Nisi major, pedibus tamen brevioribus, rostro longiore & crassiore nigro; irides aurantiæ; pennarum corpus supra, pedusque tegentium fuscæ margo ferrugineus; unguis nigri.

Subbuteo.

14. F. cera pedibusque flavis, dorso fusco, nucha alba, abdomine pallido, maculis oblongis fuscis. *Fn. suet. 59.*

Dendrofalco. *Raj. av. p. 14. n. 8. Briss. av. I. p. 375.*

Subbuteo. *Aldrov. orn. I. p. 374. Alb. av. I. p. 6. t. 6. Raj. av. p. 15. n. 14.*

Hobreaux. *Buff. hist. nat. des ois. I. p. 277. t. 17. pl. enlum. n. 431. 432.*

Hobby. *Brit. zool. n. 61. Arct. zool. 2. p. 227. O. Will. orn. p. 83. Lath. syn. I. 1. p. 103. n. 90.*

Habitat in Europa & Sibiria, alaudis infestus, quæ cum ita exhorre dicuntur, ut in sinum hominis se recipiant; hinc alaudis capiendis olim adhibitus; migratorius 12 pollices longus.

Rostrum cæruleum; orbitæ flavæ; irides castaneæ, rarius flavæ; genæ lunula nigra notatæ; rectrices laterales fasciis nigricantibus; unguis nigri.

aurantius.

116. F. rostro pedibusque plumbeis, corpore supra obscure fusco lineis angustis albidis decussantibus, gulæ pennis albidis angustis longissimis, jugulo & pectore aurantiis, abdomine caudaque fuscis interrupte striatis.

Orange-breasted Hobby. *Lath. syn. I. 1. p. 105. n. 91.*

Habitat in Surinam, Subbuteonis magnitudine, 15 pollices longus.

Rostrum 1/2 pollicis longum, basi albicans, cervix, vertex & rectrices alarum unicolores; jugulum maculis rotundatis albis; abdomen lineis coloris bubalini striatum; rectrices caudæ inferiores ferrugineæ; cauda basin versus albo lineata; pedes longi, graciles; unguis nigri.

plumbeus.

117. F. cera obscura, pedibus luteis, corpore cinereo, dorso parte superiore ex plumbeo atro, rectricibus intus maculis tribus albis.

Spotted-tailed Hobby. *Lath. syn. I. 1. p. 106. n. 92.*

Habitat in Cayenna, Nisi magnitudine.

Rostrum & unguis nigri; caput collumque cinerea; pedes breves.

Æsalon. 118. F. cera pedibusque flavis, capite ferrugineo, corpore supra ex cærulefcente cinereo, maculis striisque ferrugineis, subtus ex flavicante albo, maculis oblongis.

Æsalon. Briss. orn. p. 111. n. 23.

Æsalon Bellonii & Aldrovandi. Raj. av. p. 15. n. 15.

Merlin. Brit. zool. n. 63. Will. orn. p. 85. t. 3. Latham syn. I. 1. p. 106. n. 93.

Kleinster Rothfalk. Frisch. av. t. 89.

noveboracensis. β . *Æsalon* fronte cinerea, vertice, dorso & tectricibus alarum castaneis, temporum macula triangulari alba nigro marginata, cauda castanea striis transversis nigris, subtus albidis & nigris.

New-York Merlin. Lath. syn. I. 1. p. 107. n. 93. A.

caribæarum. γ . *Æsalon* supra rufus, subtus albus, utrinque maculis nigris. *Æsalon* Antillarum. *Briss. orn. p. 111. n. 24.*

Esmerillon Gry Gry. du Tertre hist. nat. des ant. 2. p. 253. Raj. av. p. 19. n. 3.

Falconiorum. δ . *Æsalon* habitu subbuteonis, cetera lithofalconi similior. *Esmerillon des Fauconniers. Buff. hist. nat. des ois. I. p. 288. t. 19.*

Fmerillon. Buff. planch. enlum. n. 468.

Habitat in Europa, β) in Noveboraco, γ) in insulis Caribæis, migratorius, olim venatui adhibitus; 12 $\frac{1}{2}$, β) 9 pollices longus.

Rostrum magis minusve in cæruleum vergens; irides obscuræ; cauda striis transversis 8-15 alternis obscuris & rubentibus; ungues nigri.

Sparre- 20. F. cera lutea, capite fusco, vertice abdomineque rubro, **nus.** alis cærulefcentibus.

Æsalon carolinensis. Briss. av. I. p. 386. t. 32. f. 1.

Falco minor rufescens. Brown. jam. p. 471.

Emerillon de la Caroline. Buff. hist. nat. des ois. I. p. 291. planch. enlum. n. 465.

Little Hawk. Catesb. Carol. I. p. 5. t. 5.

Little Falcon. Arch. zool. 2. p. 211. n. 110. Latham syn. I. 1. p. 110. n. 94.

Habitat in Virginia, Carolina & S. Domingo.

Magnitudo Æsalonis, femina paulo major; rostrum & irides flavescentes; caput ex cærulefcente cinereum; vertex & corpus supra ex aurantio fusca striis transversis nigris, quæ similiter in tectricibus alarum; cauda ex rubro fusca,

AVES ACCIPITRES. Falco.

285

nigro-punctata; pedes *lutei*. *Feminae caput cingitur maculis 7 nigricantibus.*

domini- 119. *F. cera pedibusque luteis, capite cinereo, corpore supra ex rubro fusco, subtus fordide albo; utrinque nigro-maculato, rectricibus 8 intermediis castaneis, versus apicem nigris, apice albis.*

Emerillon de S. Domingue. Briss. ornith. I. p. 389. n. 26. t. 32. f. 2.

St. Domingo Falcon. Lath. syn. I. 1. p. 111. n. 95.

Habitat in insula S. Domingo.

Rostrum flavum, apice nigro; irides flavae; rectrices extimae mari extus & apice albae, intus castaneae macula transversa nigra, versus apicem; feminae extus albae, maculis 5 nigris, intus castaneae, secundae castaneae prope apicem ulbiae, macula nigra; ungues nigri.

minutus. 32. *F. cera fusca, pedibus luteis, corpore subtus albo, rectricibus fuscis nigro fasciatis.*

Accipiter minor. Briss. av. I. p. 315. t. 30. f. 1.

Habitat in Melita, magnitudine turdi, 11½ pollices longus.

Rostrum & ungues nigri; corpus supra fuscum, rufum varium; subtus striis ex rufo fuscis transversis; pectus aliquando maculis lanceolatis notatum.

caeruleus. 9. *F. cera, palpebris, pedibus subtusque luteis, dorso nigro-caerulescente, temporibus linea alba incluis.*

Faucon de Bengale. Briss. orn. app. p. 20. n. 38.

Little black and orange Indian Hawk. Edw. av. 108. t. 108.

Bengal Falcon. Lath. syn. I. 1. p. 112. n. 97.

Habitat in Bengala, minimus sui generis, neque ultra 6½ pollices longus.

Rostrum nigricans; synciput candidum; area oculorum nuda, flava; genae albae, linea nigra; cauda nigra; rectrices 2 intermediae unicolores, reliquae intus striis transversis albis; ungues nigricantes.

regulus. 120. *F. cera virefcente, pedibus obscure flavis, torque ferrugineo, corpore supra plumbeo, subtus albido maculis ex ferrugineo fuscis. Pall. it. 2. p. 707.*

Siberian Falcon. Lath. syn. I. 1. p. 113. n. 98.

Habitat, rarius tamen, in Sibiria, alaudis visitans, praecedente minor, ut vix semilibram pondere aequet; rostro & habitu Tinnunculi.

AVES ACCIPITRES. Strix:

Irides *fusca*; vertex *fuscus*, *lineis nigricantibus*; alarum *margo albus, subtus varius*; rectrices *versus apicem plumbeæ*, *fasciis subtus obsoletis*, *marginè nigro, apice albo*.

43. STRIX. Rostrum aduncum (absque cera).

Nares oblongæ pennis fetaceis recumbentibus obtectæ.

Caput grande; auribus oculisque magnis.

Lingua bifida.

* *Auriculatæ; pennis auricularum instar exstantium.*

Bubo.

1. St. corpore rufo. *Fn. Suec.* 69. *Scop. ann.* 1. p. 18.

Bubo. *Bell. av.* 25. a. *Gesn. av.* 234. *Aldr. orn.* 1. p. 502.

Briff. av. 1. p. 477. n. 1. *Raj. av.* p. 24. n. 1.

Duc. ou Grand Duc. *Buff. hist. nat. des ois.* 1. p. 322. t. 22. *planch. enlum.* n. 435.

Great Horn-Owl, or Eagle-owl. *Alb. av.* 2. p. 9. t. 9. *Will. orn. p.* 99. t. 12.

Eagle-owl. *Brit. zool. n.* 64. t. 29.

Great eared Owl. *Lath. syn.* 1. 1. p. 116. n. 1.

Schuffut. *Frisch. av.* t. 93.

β. Bubo atheniensis.

Bubo italicus. *Briff. orn.* p. 140. n. 1. A.

Black winged Horn-owl. *Alb. av.* 3. t. 6.

Eagle-owl. *Will. orn.* p. 99. n. 2.

Great-horned Owl from Athens. *Edw. av.* 37. t. 227.

γ. Bubo pedibus audis. *Briff. orn.* p. 141. n. 1. B.

Great Horn-Owl. *Will. orn.* p. 100. n. 3.

δ. Bubo magellanicus.

Jacurutu. *Marcgr. bras.* p. 199.

Hibou des terres magellaniques. *Buff. pl. enlum.* n. 385.

Habitat in Europæ, etiâ Calmuccia, δ) in America australis rudibus, montibus, cavernis, rupibus. Minervæ avis, unde noctuas Athenas mittere; venatur lepores, cuniculos, talpas, rattos, mures, rarius vespertiliones & amphibia.

Magnitudo aquilæ; irides flavæ; caput corpusque lineis & maculis nigris, fuscis, cinereis, ferrugineis eleganter varium; alæ longæ; cauda brevis, lineis transversis obscuris; pedes testacei; (excepto γ) ad digitos pennati; ungues magni, valde adunci, obscuri.

virginia- 13. St. corpore supra fusco lineis subtilibus rufis cinereisque
na. vario, subtus pallide cinereo, striis transversis fuscis,
jugulo & lateribus pectoris ex autantio fuscis striatis.
Bubo virginianus. *Briss. orn. p. 141. n. 2.*
Horned Owl. *Ellis Hudson'sb. p. 40. t. 2.*
Great horned Owl from Virginia. *Edw. av. 2. t. 60.*
Eagle Owl. *Arch. zool. 2. p. 228. n. 114.*
Virginian Eagle Owl. *Lath. syn. I. 1. p. 119. n. 2.*
Habitat in omni America, in Altracania ad Camischateam
usque, & polo arctico propius; noctu vocem edens in-
gratissimam, funestam Americæ inquilinis omen.
Bubone paulo minor; an ejus varietas? Pennæ auricu-
larum magnæ; rostrum nigrum; irides aureæ; alæ
& cauda tæniis fuscis; pedes ad digitos usque plumis
cinereis vestiti; ungues corneli.

scandia- 2. St. corpore albido. *Fn. succ. 70.*
ca. Bubo lapponicus. *Briss. orn. p. 142. n. 3.*
Scandinavian Eagle Owl. *Lath. syn. I. 1. p. 120. n. 3.*
Habitat in alpinis Lapponiæ; magnitudine gallopavonis;
nigris maculis insignita; an pariter varietas Bubonis?

zeilo- 14. St. corpore supra ex rufescente fusco, subtus ex flavicante
nensis. albo, circulis faciei ex rufescente fuscis, nigro-striatis.
Ceylonesse Eagle Owl. *Lath. syn. I. 1. p. 120. n. 4.*
Great Ceylonesse Horned-owl. *Brown's illustr. zool. p. 8*
t. 4.
Habitat in insula Zeylan, 11 pollicibus pedem longitudine
superans.
Rostrum corneum; irides flavæ; auriculæ brevæ, acutæ;
remiges primores & cauda lineis transversis nigris, albis
& pallide rufis; pedes feminudi.

Asia. 3. St. corpore supra ferrugineo, subtus cinereo, alis punctis
quinque albis.
Scops carolinienus. *Briss. av. I. p. 497.*
Little Owl. *Catesb. Carol. I. p. 7. t. 71*

Strix differt a falcone, ut phalana a papillione; altera enim diurna altera nocturna est.
Noctu pleræque prædantur aviculis, muribus, vespertilionibus; pedes plerisque
lanati, ne frigescant, digito extimo retrorsum tractili; aures amplæ, membrana
vestitæ, quæ retrotracta tubam Eustachianam auris humanæ simulat; oculi magni
noctu lucentes, ut tum acutius videant; die pleræque cæcutiunt; passeribus oppro-
brio expositis; remigum exteriorum una alterave ferrata; ungues uncinati, acuti.

AVES ACCIPITRES. Strix.

Red Owl. *Arz. zool.* 2. p. 231. n. 117. t. XI.

Red Eared Owl. *Lath. syn.* I. 1. p. 123. n. 8.

Habitat in Noveboraco ad Carolinam usque, 10½ pollices longa.

Corpus supra stris, subtus maculis nigris oblongis; remiges primariæ lineis nigris, rufis & albis; cauda rufa, obscure lineata; pedes ad ungues usque pennati.

Mexica- 15. St. corpore ex fusco & nigro vario.

na.

Año mexicanus. *Briss. orn.* p. 146. n. 9.

Tecolotl. *Raj. av.* p. 160.

Mexican Eared Owl. *Lath. syn.* I. 1. p. 123. n. 7.

Habitat in nova Hispania. Oculi magni aurei.

america- 16. St. capite & corpore supra cinereo, subtus ferrugineo, na. uropygio albo, nigro maculato, alis caudaque ferrugineis lineis transversis cinereis & griseis.

Año americanus. *Briss. orn.* p. 145. n. 7.

Bubo ocreo-cinereus pectore maculoso. *Feuill. journ. des obs. ed.* 1725. p. 59.

Habitat in America australi, Qui magnitudine, an ejus varietus?

Rostrum luteum; irides auræ; orbitæ cineræ; pedes flavi; ungues nigri.

Otus.

4. St. auricularum pennis Senis. *Fn. succ.* 71. *Scap. ann.* I. p. 18.

Año. *Briss. av.* I. p. 486.

Otus s. Año. *Bell. av.* 25. 6. *Gefn. av.* 223. *Aldr. orn.*

I. p. 525. *Raj. av.* 25.

Hibou, appelé Cañot. *Charley. nouv. Fr.* 3. p. 5. 6.

Moyen Duc ou le Hibou. *Buff. hist. nat. des ois.* I. p. 342. t. 22. pl. enlum. 29.

Horn-owl. *Will. orn.* p. 100. *Albin. av.* 2. t. 10.

Long-eared Owl. *Brit. zool.* n. 65. *Arz. zool.* 2. p. 229. n. 115. *Lath. syn.* I. 1. p. 121. n. 5.

Roths Kaeuzlein. *Frisch. av.* t. 99.

Habitat in America, Europa, Asia borealibus, ad Astracianam usque, & in ipsa Ægypto, valde sonora, non migratoria, in arboribus nidificans, & ova 4 utro Aprilis ponens.

Pennæ auricularum longissimæ flavæ & nigrae; irides flavæ; dorsum tectricetque alarum obscure fusca, grisea & ex flavicante ferruginea; pectus & abdomen pallide flava striata; cauda cinerea & obscurius lineata. Longitudo 14 pollicum.

17. St.

brachy- 17. St. auricularum penna brevi, corpore supra fusco, pennis
tos. margine flavis, subtus pallide flavo, longitudinaliter
striato. *Forster ad. angl. LXII. p. 384. n. 2.*

Short-eared Owl. *Brit. zool. n. 66. t. 31. Arct. zool. 2.
p. 229. n. 116. Lath. syn. I. 1. p. 124. n. 9.*

Chouette ou grande Chevéche. *Buff. hist. nat. des ois. I.
p. 372. t. 27. pl. enlum. n. 438.*

*Habitat in America & Europa, potissimum boreali, Sibiria,
14 pollices longa, muribus visitans, quibus invigilat,
audax. Cauda obscure fusca; rectrices intermediæ
circulo flavo.*

brasilian- 18. St. corpore supra pallide ex ferrugineo fusco albo ma-
na. culato, subtus albido maculis ex ferrugineo fuscis.

Asio brasiliensis. Briss. orn. p. 145. n. 8.

Cabure ou Caboure. *Will. orn. p. 107. n. 8. Buffon hist.
nat. des ois. I. p. 383.*

Noctua Brasiliensibus Cabure dicta. *Raj. av. p. 26. n. 7.
Brazilian Eared owl. Lath. syn. I. 1. p. 125. n. 10.*

*Habitat in Brasilia, turdi magnitudine; rostrum, irides,
pedes breves cum digitis flavicant.*

navia. 19. St. corpore griseo, subtus pallidiore, utrinque maculis
ferrugineis & nigris, capitis pectorisque pennis nigro-
punctatis.

Mottled Owl. *Arct. zool. 2. p. 231. n. 118. t. XI. Lath.
syn. I. 1. p. 126. n. 11.*

*Habitat in Noveboraco, Majo pariens, 11 pollices longa.
Facies alba, fusco maculata; humeri testricesque alarum
maculis magnis albis.*

indica. 20. St. dorso obscuro, testricibus alarum griseis nigro lineatis,
pectore bubalino, maculis exiguis sagittatis nigris.

Little Hawk Owl of Ceylon. *Penn. ind. zool. t. 3.
Indian Eared Owl. Lath. syn. I. 1. p. 127. n. 12.*

*Habitat in insula Zeylon, 7 pollices longa.
Rostrum obscurum, setis longis cinctum; caput obscure
fuscum; orbitæ pallide cinereæ; pedes seminudi, subtus
ex rufescente flavi.*

Zorca. 21. St. auricularum pennis 8-9. Cetti ucc. di Sardegn. p. 60.
*Habitat in Italia, Sardinia, solitaria, non migrans, 7
pollices longa, ululans.*

Rostrum ex virefcente flavum; digiti nudi.

carnioli- 22. *St.* corpore ex cinereo albicante, maculis striisque trans-
versis nigricantibus variegato. *Scop. ann.* 1. p. 19.

Strix capite subauritio, corpore ex nigro, albo & fusco
tenuissime undulatum mixtis variegato. *Kramer elench.*
p. 323. n. 3.

*Habitat in silvis Carniolæ frigidioris, in rupium fissuris
cavisque arboribus nidificans, ova alba 4-2 ponens;
pulli scarabeo majali nutrluntur.*

*Habitus passerinus; auriculæ in cadavere vix conspicuæ;
irides flavæ; cauda fuscescens maculata; remiges 6
primæ uno latere albido maculatæ.*

deminu- 23. *St.* minor, corpore rufo. *Pall. it.* 2. p. 707. n. 14
ta. Yaickan Eagle Owl. *Lath. syn.* 1. 1. p. 128. n. 14.

*Habitat in lucis campestribus & montanis ad fluvium
montesque Uraleses; buboni colore struduraque similis,
est inulto minor, ut vix libram pondere æquet.*

pulchella. 24. *St.* minima, corpore toto griseo, fusco, ferrugineo
alboque vario. *Pall. it.* 1. p. 466. nov. comm. *Petrop.*
XV, p. 490. t. XXVI. f. 1. *Lepeth. it.* 2. t. 4.

Siberian eared Owl. *Lath. syn.* 1. 1. p. 130. n. 16. t. 5. f. 1.

*Habitat circa Catharinopolin Sibiricæ, & reliquo australi
Wolgæ littore; ultra 9 pollices longa.*

*Rostrium, pedes, unguesque sordidi; irides flavæ; dorsum
sordide cinereum; alæ maculis albis oblongis; cauda
rufescens, fasciis & punctulis fuscis.*

Scops. 5. *St.* auricularum penna solitaria.

Scops. Briss. av. 1. p. 495. t. 37. f. 1. *Aldr. orn.* 1. 8. c. 4.

Raj. av. p. 25. n. 3. *Lath. syn.* 1. 1. p. 129. n. 15.

Scops ou petit Due. Buff. hist. nat. des ois. 1. p. 353. t.
24. pl. enlum. n. 436.

Little Horn-owl. *Will. orn.* p. 101. t. 12.

Horn-oder Ohreule. *Günth. Nest. u. Eyer*, t. 40.

*Habitat in Europa, ex Anglia tamen exul, 7½ pollices
longa, cum muribus agrestibus aliquando bella gerens.*

*Auricularum penna a morte vix conspicua; color pro
ætate multum variat, ex griseo, rufo, fusco & nigri-
cante mistus; pedes pariter fusco-maculati; digiti
unguesque fuscis.*

* * non auriculatæ.

Nyctea. 6. St. corpore albedo, maculis lunatis distantibus fuscis. *Fn. Suec.* 76. *Scop. ann.* 1. p. 20.

Strix alba freti Hudsonis. *Briss. av.* 1. p. 322.

Hibou blanc d'Illande. *Anders. hist.* 1. p. 85. t. 1.

Harfang. *Buff. hist. nat. des ois.* 1. p. 387. *planch. enlumi.* n. 458.

Great white Owl. *Edw. av.* 61. t. 61.

Snowy Owl. *Arct. zool.* 2. p. 233. n. 121. *Lath. syn.* 1. 1. p. 132. n. 17.

Habitat in America, Europa, Asia; potissimum borealibus, interdum volando velocissime ardeas venatur, lepores, mures, aliquando cadaveribus contenta ululans, buboni fere æqualis, bipedalis.

Hyeme evadit sæpius immaculata nivea.

Teng- 44. St. corpore griseo, maculis pisiformibus albis, iridibus
malmi. flavis. *Tengmalm act. Stockh. ann.* 1783. *trim.* 1.

Habitat in Uplandia Sueciæ, merula magnitudine.

nebulosa. 25. St. capite, collo, pectore, dorso & testricibus alarum fuscis albo-maculatis, abdomine & crisso fordide albis fuscotriatis, cauda fusco & albedo fasciata, apice al-
bida. *Forster act. angl.* LXII. p. 424.

Grey Owl. *Act. angl.* LXII. p. 386.

Barred Owl. *Arct. zool.* 2. p. 234. n. 122. t. XI. *Latham syn.* 1. 1. p. 133. n. 18.

Habitat in freto Hudsonis & Noveboraco, leporibus, ardeis, muribus victitans, bipedalis; rostro iridibusque flavis.

cinerea. 26. St. capite, cervice, & testricibus alarum fuliginosis, lineis fordide albis, pectore & abdomine albidis, maculis magnis oblongis obscure fuscis.

Sooty Owl. *Arct. zool.* 2. p. 232. n. 120.

Cinereous Owl. *Lath. syn.* 1. 1. p. 134. n. 19.

Habitat in freto Hudsonis, per paria volans, muribus & leporibus victitans, Maji medio in pinu nidificans, & ova 2 obscure maculata ponens; bipedali.

Rostrium albidum; irides flavæ; cauda striis obliquis fuscis & fordide albis; pars cutis a gula ad crissum denudata.

Wapacu- 27. St. dorso & testricibus caudæ albis, obscure maculatis, pectore & abdomine fordide albis, lineis rufescentibus decussantibus. *Arct. zool.* 2. p. 231. n. 119.

thu.

AVES ACCIPITRES. Strix.

Habitat in silvis circa fretum Hudsonis, esculenta, muribus & aviculis victitans, in terra sicca ex musco nidum struens, bipedalis.

Junior albet; rostrum & unguis nigra, incurvata; irides flavæ; spatium inter oculos, genas & gulam album; capitis pennarum apex niger; humeri & tectrices alarum albet, maculis rufescentibus.

cunicularia. 28. St. corpore supra fusco subtus albo, pedibus tuberculatis pilosis. *Molina hist. nat. Chil. p. 233. Klein av. p. 57. n. 9. Feuill. obs. phys. ed. 1714. p. 562.*

Noctua coquimbana. Briss. orn. p. 155. n. 11.

Coquimbo Owl. Lath. syn. I. 1. p. 145. n. 33.

Habitat in Chili, interdum aliquando cum femina volans, insectis & amphibis victitans, ova 4 alba flavoque varia in cuniculos longas ponens, columbae magnitudinis. Irides flavæ; corpus supra albo-maculatum.

Aluco. 7. St. capite ferrugineo, iridibus atris, remigibus primoribus ferratis. *It. oel. 69. Scop. ann. 1. p. 20. n. 4. Tengmalm nov. ad. Stockh. ann. 1782. 2. n. 8.*

Strix cinerea. Raj. av. p. 26. n. 3.

Ulula. Gefn. av. 773. Aldr. orn. 1. p. 540. Briss. av. 1. p. 507.

Hulotte. Buff. hist. nat. des ois. 1. p. 358. pl. enlum. n. 441.

Aldrovandus former Aluco. Will. orn. p. 104. t. 13.

Aluco Owl. Lath. syn. I. 1. p. 134. n. 20.

Grabeale. Frisch. av. t. 94.

Habitat in Europa, Calmuccis sacra, æstate in silvarum arboribus cavis, hieme hominum habitationes accedens, victitans muribus, ova 4 sordide grisea in nudo buteonis, tinnunculi, cornicis, picæ ponens.

Longitudo 15 pollicum; rostrum ex flavicante album aut virens; corpus supra obscure ferrugineum maculis nigris & albidis; subtus album, maculis nigris transversis & longitudinalibus; pedes albi, maculis ætignis nigris.

Sylvestris. 29. St. capillitio eleganti, iridibus glaucis, corpore albo fuscoque vario. *Scop. ann. 1. p. 21. n. 13.*

Austrian Owl. Lath. syn. I. 1. p. 136. n. 21.

Habitat in Carniolia, galli habitu; & mediæ magnitudinis; a basi unius auris per frontem transit ad basin alserius radius plumosus albicans.

alba. 30. St. corpore supra rufo griseo maculato, subtus albo, remigibus rectricibusque rufis, his apice albis. *Scop. ann. I. p. 21. n. 14.*

White austrian owl. *Lath. syn. I. I. p. 136. n. 22.*

Habitat in Foro Julii, gallinæ fere habitu, rostro albo, capillitii margine rufo.

Noctua. 31. St. iridibus fuscis, corpore pallide rufo, maculis fuscis longitudinalibus. *Scop. ann. I. p. 22. n. 15.*

Rufous austrian Owl. *Lath. syn. I. I. p. 136. n. 23.*

Habitat in Carniolæ silvis, columbæ habitu.

rufa. 32. St. iridibus cærulefcentibus, corpore ferrugineo fusco-maculato. *Scop. ann. I. p. 22. n. 16.*

Ferrugineous austrian Owl. *Lath. syn. I. I. p. 137. n. 24.*

Habitat in Idriæ silvis, præcedentis habitu.

soloniën- 33. St. corpore supra ex atro fusco, fulvo admisto, subtus
fus. albo, cauda alba versus apicem lineis nigricantibus decussantibus.

Ulula five noctua minor dorso ferrugineo, ventre albido. *Salerne orn. p. 56.*

Solognese Owl. *Lath. syn. I. I. p. 137. n. 25.*

Habitat in Galliæ provincia Soloniensi, 15 pollices longa; vertex circulusque pennarum faciei exterior rufo alboque varius; digiti cornei.

flammea. 8. St. corpore luteo punctis albis, subtus albido punctis nigricantibus. •

Strix capite lævi, corpore luteo. *Fn. succ. 73.*

Aluco. *Briff. orn. p. 147. n. 2.*

Aluco minor. *Aldrov. orn. I. p. 536. 538. Raj. av. p. 25.*

A. I. Brünn. orn. 17.

Ululæ genus alterum. *Gesn. av. 775.*

Tuidara. *Marcgr. bras. p. 205.*

Effraie ou Frefaie. *Buff. hist. nat. des ois. I. p. 366. t. 26. planch. enlum. n. 440. 474.*

Common Barn or White Owl. *Will. orn. p. 104. t. 13.*

White Owl. *Brit. zool. n. 67. Arct. zool. 2. p. 235. n. 124.*

Albin. av. 2. t. 11. Lath. syn. I. I. p. 138. n. 26.

Schlaefereule, Perleule. *Frisch. av. t. 97.*

Habitat in Europa & America, borealiori quoque Asia, Mongolia sacra, 14 pollices longa; rostrum album; iride obscura; rectrices intus albæ, extus obscure lineæ.

AVES ACCIPITRES. *Strix*.

Stridula. 9. St. corpore ferrugineo, remige tertia longiore. *Fn. Suec.* 77. *Scop. ann.* 1. p. 22. n. 12.

Strix. *Gesn. av.* 738. *Aldrov. orn.* 561. t. 563. *Raj. av.* p. 23. *Briss. av.* 1. p. 500.

Chat huant. *Buff. hist. nat. des ois.* 1. p. 362. t. 25. *planch. enlum.* 437.

Brown Owl. *Albin. av.* 1. t. 9.

Common brown or Joy Owl. *Will. orn.* p. 102. t. 14.

Tawny Owl. *Brit. zool. n.* 68. *Arch. zool.* 2. p. 237. *B. Lath. syn.* 1. 1. p. 139. n. 27.

Braune oder Stockeule, gelbliche oder braune Eule. *Frisch. av.* t. 96. 95.

Habitat in Europæ & Tataria australioris desertis, 19 uncias ponderans.

Caput ferrugineum, cum reliquo corpore supra maculis punctisque obscurioribus; pectus & abdomen flavicant, albo intermixto, subtus striis obscuris; cauda maculis lineisque pallide ferrugineis & nigris.

Ulnula. 10. St. corpore supra fusco albo-maculato, rectricibus fasciis linearibus albis. *Fn. Suec.* 78. *Nozem. nederl. Vogel.* t. 33. 34.

Noctua major. *Briss. av.* 1. p. 511.

Noctua saxatilis. *Gesn. av.* 622. *Aldr. orn.* 1. p. 545.

Chouette ou grande Cheveche. *Buff. hist. nat. des ois.* 1. p. 372. t. 27. *planch. enlum.* 438.

Grey Owl. *Will. orn.* p. 103.

Great brown Owl. *Alb. av.* 3. t. 7.

Brown Owl. *Brit. zool. n.* 69. *Arch. zool.* p. 236. n. 125. *Lath. syn.* 1. 1. p. 140. n. 28.

Steineule. *Frisch. av.* t. 98.

8. Noctua minor aucuparia. *Nozem. nederl. Vogel.* t. 37.

Habitat in Europa & nova terra, 14 pollices longa.

Irides castaneæ; caput, alæ & dorsum maculis nigris, humeri rectricisque alarum albis; pectus pallide cinereum, striis obscuris.

Funerea. 11. St. corpore fusco, iridibus flavis. *Fn. Suec.* 75.

Chat huant de Canada. *Briss. orn.* 1. p. 518. n. 6. t. 37. f. 2.

Chouette ou grande Cheveche de Canada. *Buff. hist. nat. des ois.* 1. p. 391. n. 3.

Canada Owl. *Lath. syn.* 1. 1. p. 142. n. 29.

Habitat in Europa & America septentrionali.

Corpus supra fuscum, maculis albis; caput supra atrum
punctis albis; rostrum supra album; pectus & abdomen
albida fasciis linearibus transversis; remiges & primæres
posteriores ad marginem exteriorem non maculata; rectri-
ces fasciis angustis albidis; intermediis vix apice alben-
tibus.

hudsonia. 34. St. corporis pennis supra fuscis margine albis; subtus
albis, lineis transversis nigris, rostro iridibusque aurantiis.

Strix freti Hudsonis. *Briss. orn. p. 151. n. 7.*

Caparacoch. *Buff. hist. nat. des ois. I. p. 385. n. 2.*

Little Hawk Owl. *Edw. av. 2. t. 62.*

Hawk Owl. *Arct. zool. 2. p. 234. n. 123. Lath. syn. I. 1.
p. 143. n. 30.*

Habitat in freto Hudsonis, interdum prædans, Niso vix
major.

Vertex fuscus albo maculatus; facies alba, fusco intermixto,
nigro marginata; uropygium fuscum, fasciis pallidis;
cauda alæque longæ; an varietas funerea?

uralensis. 35. St. corpore albedo, maculis in singularum pennarum
medio longitudinalibus fuscis. *Lepech. it. 2. t. 3. Pall.
it. I. p. 455.*

Chouette à longue queue de Sibirie. *Buff. planch. enl. 463.*

Ural Owl. *Lath. syn. I. 1. p. 148. n. 37.*

Habitat in montibus Uralensibus.

Rostrum cereum; irides palpebræque nigrae; orbitæ cine-
rea; uropygium album; cauda longa, cuneiformis;
an varietas funerea?

accipitri- 36. St. corpore supra lutescente, subtus ex lutescente albo;
na. lituris utrinque longitudinalibus nigricantibus subtus
guttatis, iridibus citrinis. *Pall. it. I. p. 455. n. 6. S. G.
Gmelin it. 2. p. 163. t. 9.*

Caspian Owl. *Lath. syn. I. 1. p. 147. n. 36.*

Habitat ad mare Caspium, ululæ magnitudine.

Rostrum nigrum; alæ subtus & cristum alba; remiges ex-
tus lutescentes, intus alba, nigro tessellata; cauda alis
brevior rotundata, nigricans, lateribus albida, fasciata.
An varietas funerea?

javanica. 37. St. corpore cinereo hinc inde rufescente, maculis albis &
nigris, subtus fordide albo hinc inde rufescente, maculis
nigris. *de Wurm apud Lichtenberg Magaz. IV. 2. 10.*
Habitat in Java.

- novæ 38. St. iridibus flavis , corpore supra fusco albo-maculato ;
Seelandia. subtus fulvo.
New Zealand Owl. *Lath. syn. I. I. p. 149. n. 39.*
Habitat in nova Seelandia, passerinæ magnitudine; rostrum
corneo apice nigro. Forster.
- cayen- 39. St. corpore rufo striato , transversim fusco undulato ,
nenfis. iridibus flavis.
Chat huant de Cayenne. *Buff. hist. nat. des ois. I. p. 391.*
pl. enlum. n. 442.
Cayenne Owl. *Lath. syn. I. I. p. 146. n. 35.*
Habitat in Cayenna, magnitudine stridulæ ; rostrum
corneum ; ungues nigri.
- domini- 40. St. corpore subtus rufo , pectore parumper maculato.
censis. Chouette ou grande Chevêche de S. Domingue. *Buff. hist.*
nat. des ois. I. p. 392. n. 6.
S. Domingo Owl. *Lath. syn. I. I. p. 146. n. 34.*
Habitat in insula S. Dominici, ululæ perquam affinis ,
rostrum tamen majore, robustiore, magis adunco distincta.
- Tolchi- 41. St. iridibus pallide flavis , corpore supra nigro , pallide
quatli. flavo , albo , & fulvo vario , subtus albo.
Chouette du Mexique. *Briss. orn. I. p. 524. n. 10.*
Tolchiquatli. *Raj. av. p. 160.*
New Spain Owl. *Lath. syn. I. I. p. 145. n. 32.*
Habitat in nova Hispania.
Rostrum, ungues, tectrices alarum inferiores nigra.
- Chichic- 42. St. corpore fulvo, albo fusco & nigro vario, oculis nigris,
m. palpebris cæruleis.
Chat huant du Mexique. *Briss. orn. I. p. 523. n. 9.*
Chichictli. *Raj. av. p. 160.*
Mexican Owl. *Lath. syn. I. I. p. 144. n. 31.*
Habitat in nova Hispania, gallinæ magnitudine.
- Acadica. 43. St. corpore supra spadiceo albo-maculato , subtus sordide
albo ferrugineo intermixto.
Acadian Owl. *Lath. syn. I. I. p. 149. n. 38. t. V. f. 2.*
Habitat in America septentrionali, 7 pollices longa.
Rostrum fuscum ; irides flavæ ; vertex pallide maculatus ;
orbitæ cinereæ ; digiti fusci.
- passerina. 12. St. remigibus maculis albis quinque ordinum. *Fn. succ. 79.*
Scop. ann. I. p. 22. n. 17.
Noctua minor. *Briss. av. I. p. 514. Raj. av. p. 26. n. 6.*

AVES ACCIPITRES. Lanius.

297

Noctua minima. *Gesn. av.* 620. *Aldrov. orn.* 1. p. 543. t. 544.

Chevêche ou petite Chouette. *Buff. hist. nat. des ois.* 1. p. 377. t. 28. *planch. enlum.* n. 439.

Little Owl. *Brit. zool. n.* 70. *Arch. zool.* 2. p. 236. n. 126. *Albin. av.* 2. t. 12. *Will. orn. p.* 105. t. 13. *Edw. av.* 39. t. 228. *Lath. syn.* 1. 1. p. 150. n. 40.

Kleinste Kaeuzlein. *Frisch. av. t.* 100.

β. Noctua minor. *S. G. Gmelin nov. comm. Petrop. XV. p.* 447. t. XII.

Habitat in Europa & boreali America, solitaria, visitans vespertilionibus, muribus, gryllis, in coniferis nidificans, ova bina ponens, 7-8 pollices, β. fere pedem longa.

Rostrum ex albicante fuscum; caput, dorsum, testricelque alarum dilute fusca maculis albis; pectus albicans, ferrugineo varium.

44. LANIUS. Rostrum rectiusculum, dente utrinque
versus apicem, basi nudum.

Lingua lacera.

forficatus. 1. L. cauda forficata, crista frontali erecta, corpore nigro-viridante.

Drongo. *Buff. hist. nat. des ois.* 4. p. 586.

Gobe-mouche huppé de Madagascar. *Buff. planch. enlum.* n. 189.

Muscicapa madagascariensis nigra major cristata. *Briss. av.* 2. p. 388. n. 16. t. 37. f. 4.

Fork-tailed crested Shrike. *Lath. syn.* 1. 1. p. 158. n. 1.

Habitat in Capite bonæ spei, Madagascar, Sina, non semper cristata, 10 pollices longa; cauda longa.

cæruleus. 2. L. cauda forficata, corpore nigro-cærulescente, abdomine albo.

Lanius bengalensis, cauda bifurca. *Briss. av.* 2. p. 89.

Fingah. *Buff. hist. nat. des ois.* 1. p. 108.

Fork-tailed indian Butcher-Bird. *Edw. av. t.* 56.

Fork-tailed Shrike. *Lath. syn.* 1. 1. p. 158. n. 2.

Habitat in Bengala, cornices persequens, 7½ pollices longus. Pectus obscure cinereum.

castaneus. 5. L. cauda cuneiformi, rectricibus intermediis apice, extimis totis ferrugineis, corpore supra castaneo, subtus albo.

Cherant backed Shrike. *Lath. syn.* I. 1. p. 159. n. 3.
Longitudo 11 pollicum ; rostrum, alæ, pedesque nigra ;
 frons ex atro fusca ; vertex, occiput, nucha, cervix
 cinerea.

cristatus. 3. *L. cauda cuneiformi, capite cristato, corpore rufescente*
subtus fulvo fuscoque undulato.

Lanius bengalensis rufus. Briss. av. 2. p. 173.

Crested red or rousset-coloured Butcher bird. *Edw. av.*
 t. 54.

Crested red Shrike. *Lath. syn.* I. 1. p. 134. n. 18.

Habitat in Bengala, 6½ pollices longus, non semper cristatus.
Rostrum corneum ; pone oculos lunula nigra ; cauda supra
rufa, subtus grisea ; pedes cum unguibus nigri.

canaden- 4. *L. cauda cuneiformi, capite cristato, corpore rufescente,*
 sis. *subtus albedo.*

Lanius canadensis. Briss. av. 2. p. 171. t. 18. f. 3.

Pie-grièche huppé de Canada. *Buff. hist. nat. des ois. 1.*
p. 316. pl. enlum. n. 479. f. 2.

Crested Shrike. *Arch. zool. 2. p. 239. n. 129. Lath. syn.*
I. 1. p. 182. n. 35.

Habitat in Canada, 6½ pollices longus ; rostrum ungueque
nigri ; crista rubens ; genæ obscuræ, maculis albis ;
jugulum pectusque ex flavicante rubent ; abdomen cinereum ;
rectrices alarum nigrae margine albo, cauda nigra,
albo-punctata.

Ludovi- 6. *L. cauda cuneiformi cinereus, remigibus nigris basi restri-*
 cianus. *cibusque apice albis.*

Lanius canadensis. Briss. av. 2. p. 162. t. 15. f. 2.

Pie-grièche de la Louisiane. *Buff. planch. enlum. n. 397.*

Louisiane Shrike. *Lath. syn.* I. 1. p. 162. n. 5.

Habitat in Ludovicia, excubitori & collurioni affinis.

Fascia sub oculis nigra ; rectrices mediae 6, 6 totæ nigrae,
reliquæ basi apiceque albæ ; remiges secundariæ apice
albæ.

Nengeta. 7. *L. cauda cuneiformi apice alba, corpore cinereo subtus*
albedo.

Cotinga cinerea. Briss. av. 2. p. 353.

Lanii accedunt ad accipitres laniena, ad picos moribus, ad passeris statura, adeoque tanquam inter hos medii ; digitus medius articulo primo connexus.

Guiraru Nhengeta. *Marcgr. Brasl.* 209.

Guiraru Nheengeta brasiliensis. *Raj. av. p.* 166. n. 5.

Guirarou. *Buff. hist. nat. des ois.* 4. p. 459.

Guiraru or american Chat. *Will. orn. t.* 235.

Grey Pye of Brasil. *Edw. av. t.* 318.

Grey Shrike. *Lath. syn. I. 1. p.* 183. n. 36.

β. Cotinga gris de Cayenne. *Buff. pl. enlum.* 699.

Variété du Guirarou. *Buff. hist. nat. des ois.* 4. p. 461.

*Habitat in Brasiliæ, Surinami, Gujanæ, Russiæ, Sibirizæ
potissimum aquosis gregarius, 9 pollices longus. Irides
sapphirinæ; alæ & cauda nigricant.*

surviro- 8. L. cauda cuneiformi, corpore albo, dorso nigro, remigi-
stris. bus primoribus quinque macula alba.

Collurio madagascariensis. *Briss. av. 2. p.* 191. t. 19. f. 1.

Ecorcheur de Madagascar. *Buff. pl. enlum. n.* 228.

Vanga ou Becarde à ventre blanc. *Buffon hist. nat. des
ois. I. p.* 312.

Hookbilled Shrike. *Lath. syn. I. 1. p.* 171. n. 19.

*Habitat in Madagascar, fructibus viditans, 10 pollices lon-
gus. Mandibulæ inferioris apex reflexus, uti superioris;
occiput ex nigro virescens; rectrices alarum majores
oblique albo punctatæ. Rectrices medietate interiore
cinereæ, exteriore nigra, apice albo; pedes plumbei;
ungues nigricantes.*

collaris. 9. L. cauda cuneiformi, corpore nigro subtus albo, remigibus
primoribus basi albis.

Lanius Capitis bonæ spei, *Briss. av. 2. p.* 182. t. 15. f. 1.

Pie-griesche du Cap de bonne espérance. *Buff. pl. enlum.
n.* 477. f. 1.

Collared Shrike. *Lath. syn. I. 1. p.* 163. n. 7.

*Habitat ad Caput bonæ spei, excubitoris magnitudine, 12
fere pollices longus. Rostrum & caput nigricant; rectri-
ces, intermediis 4 exceptis, apice albæ.*

lucionen- 10. L. cauda cuneiformi, macula aurium nigra, rectricibus
lis. rufescentibus apice fusco-fasciatis.

Lanius lucionensis. *Briss. av. 2. p.* 169. t. 18. f. 1.

Luzonian Shrike. *Lath. syn. I. 1. p.* 172. n. 21.

Habitat in insula Luzonia, 7½ pollices longus.

*Rostrum & corpus supra ex griseo fuscum, subtus & ad
latera ex rufescente album lineatum.*

Excubitor. II. *L. cauda cuneiformi lateribus alba, dorso cano, alis nigris macula alba.* *Fn. succ.* 80. *Scop. ann.* 1. p. 23. n. 18.

Brünnich orn. 21. 22. *Noëman nederl. Vog.* t. 63.

Lanius cinereus. *Briss. av.* 2. p. 141.

Lanius cinereus major. *Gesn. av.* 579. *Aldr. orn.* 1. p. 384. t. 386. *Raj. av.* 18.

Ampelis cærulescens, alis caudaque nigricantibus. *Fn. succ.* 1. n. 181.

Castrica palombina. *Olin. uccell.* t. 41.

Pie-grièche grise. *Buff. hist. nat. des ois.* 1. p. 296. t. 20. pl. enlum. 445.

Greater Butcher-bird or Mattagefs. *Will. orn.* p. 87. t. 10. *Albin. av.* 2. t. 13.

Great Shrike. *Brit. zool.* 1. n. 71. t. 33. *Arch. zool.* 2. p. 238. n. 127. *Catesb. Carol. app.* p. 36.

Great cinereous Shrike. *Lath. syn.* 1. 1. p. 160. n. 4.

Neuntoeder. *Brisch. av.* t. 60.

albus. β. *L. corpore albo, pedibus flavicantibus, rostro unguibusque nigricantibus.*

major. γ. *L. tectricibus alarum minoribus, humerisque rufescentibus.*

Lanius cinereus major. *Briss. orn.* p. 198. n. 2.

Gesner's great Butcher-bird. *Will. orn.* p. 88.

Groeferer Neuntoeder. *Frisch. av.* t. 59.

Habitat in Europa & boreali America, in silvis, inter primas veris aves; nidum ex gramine sicco & plumis struit, 7 ova cærulescentia fusco-maculata ponit; prædam transfigit; accipitres adventantes observat, & aviculis indicare dicitur.

Rostrium pedesque nigra; vertex cum cervice canus; genæ albæ, linea nigra; corpus subtus album, arcubus pallide fuscis; tectrices alarum minores nigra; rectrices nigrae &, exceptis intermediis 2, apice albo.

Collurio. 12. *L. cauda subcuneiformi, dorso griseo, tectricibus quatuor intermediis unicoloribus, rostro plumbeo.* *Fn. succ.* 81.

Scop. ann. 1. p. 24. n. 19. *Noëman nederl. Vogel.* t. 65.

Günther Nest. u. Eyer. t. 23.

Lanius minor rufus seu zius Aldrovandi. *Raj. av.* p. 18. A. 4.

Merulæ congener alia. *Raj. av.* p. 67. n. 13. *Will. orn.* p. 198. n. 3.

Collurio. *Briss. av.* 2. p. 152.

Écorcheur. *Buff. hist. nat. des ois.* 1. p. 304. t. 21. planch. enlum. n. 31. f. 2.

Lesser Butcher bird, called in Yorkshire Flusher. *Will. orn. p. 88. Alb. av. 2. t. 14.*

Red backed Shrike. *Brit. zool. 1. n. 72. Aræ. zool. 2. p. 240. n. 131. Lath. syn. 1. 1. p. 167. n. 15.*

varius. β . *Collurio varius. Briss. orn. p. 201. n. 5.*

Lesser variegated Butcher bird. *Will. orn. p. 189.*

Variegated Shrike. *Lath. syn. 1. 1. p. 168. n. 16.*

rufus. γ . *Lanius rufus. Briss. orn. p. 199. n. 3.*

Lanius minor cinerascens. Raj. av. p. 19. A. 6.

Ampelis dorso griseo, macula ad oculos longitudinali. Fn. suec. 1. n. 180. t. 2.

Ampelis tertia. Kram. elench. p. 363.

Pie-grièche rousse. Buffon hist. nat. des ois. 1. p. 103. pl. enlum. n. 9. f. 2. & n. 31. f. 1.

An other Sort of Butcher bird. Will. orn. p. 189. §. 4.

Wood Chat. Brit. zool. n. 73. Latham syn. 1. 1. p. 169. n. 17.

senega- δ . *Pie-grièche rousse du Sénégal. Buffon planch. enlum. lentis. n. 477. f. 2.*

malano- ϵ . *Pie-grièche à tête noire du Sénégal. Buffon pl. enlum. cephalus. n. 474.*

Habitat in Europa, δ . & ϵ . ad Senegal fluvium, in dumetis & sepibus nidum struens, in quo ova 6 alba versus finem latiore circulo ex rufescente fusco notata ponit; videtur insectis & aviculis; scarabæos & gryllos pruno spinosa perforat; cerebra avicularum effodit; sonos quoscumque imitari gestiens, $7\frac{1}{2}$ pollices longus.

antigua- 29 . *L. cauda longa cuneiformi, corpore supra ex flavicante rufo, subtus albo, capite, rostro, alis, pedibus caudaque supra nigris.*

Pie-grièche d'Antigue. Sonnerat it. p. 114. t. 70.

Antiguan Shrike. Lath. syn. 1. 1. p. 171. n. 20.

Habitat in insula Philippina, Panay, collurionis magnitudine. Rostri magni mandibula superior longissima, valde adunca; alæ breves; rectrices 2 intermediae totæ nigrae; reliquæ subtus rufescentes, apice rufo.

niger. 30 . *L. niger, cauda subcuneiformi.*

Black Shrike. Lath. syn. 1. 1. p. 187. n. 38.

Habitat in Jamaica, 7 pollices longus, rostro pollicari, Tyranni rostro multum simili.

Leveria- 31. L. cauda longa cuneiformi apice alba, rostro, capite, nus. collo, pectoris medio, alis, pedibusque nigris, reliquis partibus albis.

Magpie Shrike. *Lath. syn. I. 1. p. 192. n. 49.*

Turdi magnitudine; pice habitu & facie. Longitudo 10 pollicum; rectrices alarum majores, remigesque secundariae margine albo; rectrices 2 intermediae 4½, reliquae 2 pollices longae.

atricapil- 32. L. cauda cuneiformi, & vertice, cervice, humeris alisque lus. nigris, corpore supra murino, subtus ex caeruleo cinereo. *Merrem Beytr. II. p. 30. t. X.*

Habitat in Surinamo, carduelis magnitudine, longitudinem 5 pollicum vix superans; alae breves; rectrices alarum remigesque secundariae margine albo; rectrices, exceptis duabus intermediis, apice albo.

pomera- 33. L. supra niger, subtus albus, occipite dorsoque colli nus. saturate ferrugineis nigro circumdati, alarum maculis utrinque duabus uropygioque albis. *Sparmann. mus. Carlson. n. 1. t. 1.*

Habitat in Pomerania; rostrum, pedes, alaeque nigrae; remiges tamen 8 primariae basi albæ; rectrices 2 inferiores & extremae albæ; his proximæ 2 vel 3 apice, nec non a basi ad medium fere albicant.

Tyran- 34. L. cinereus, subtus albus, vertice nigro, stria longi- nus. tudinali fulva.

Muscicapa Tyrannus. Briss. av. 2. p. 391.

Tyran. Buffon pl. enlum. n. 537.

Tiriri ou Pipiri. Buffon hist. nat. des ois. 4. p. 572.

Kleiner americanischer Neuntoeder. Frisch. av. t. 62.

Tyrant Shrike. Lath. syn. I. 1. p. 184. n. 37.

Tyrant Fly-catcher. Arch. zool. 2. p. 384. n. 263.

domini- 35. Tyrannus dominicensis. *Briss. orn. 2. p. 394. n. 19.* cens. *t. 18. f. 2.*

Saint Domingo Tyrant. Lath. syn. I. 1. p. 185. n. 37. A.

carolinen- 36. Tyran de la Caroline. *Buff. hist. nat. des ois. 4. p. 577.* fis. *Gobe-mouche de la Caroline. Buff. pl. enlum. n. 676.*

Tyrant of Carolina. Catesb. carol. 1. p. 55. t. 55. Lath. syn. I. 1. p. 186. n. 37. B.

ludovicia- 37. Tyran de la Louisiane. *Buff. hist. nat. des ois. 4. p. 579.* nus. *Gobe-mouche de la Louisiane. Buff. pl. enlum. n. 676.*

Louisiana Tyrant. *Arch. zool.* 2. p. 385. n. 264. *Lath. syn.* I. 1. p. 186. n. 37. C.

Habitat in America septentrionali, β. insula S. Dominici & Jamaica, turdi magnitudine, 8 circiter pollices longus, in cavis arborum nidificans; ferox & audax, ita ut plures simul aquilam ipsam adoriantur, & pellant, femina incubante.

Rostrum & pedes cum unguibus ex nigricante fusca; irides fusca; capitis stria verticalis longitudinalis e pennis fulvis apice nigricantibus; cauda fusca, margine rufo. β. pectus cinereum; δ. rostrum nigrum; pedes & corpus supra plumbeum; tectrices majores alarum remigesque margine albo; cauda extus & apice alba.

Schach. 14. L. lutescens fronte alisque nigris.

Lanius A-scack. *Osb. it.* 227.

Chinese Shrike. *Lath. syn.* I. 1. p. 173. n. 22.

Habitat in Sina. P. Osbek.

Magnitudo Tyranni; caput & collum supra griseum; collum subtus ex testaceo albidum; dorsum & abdomen pallide testacea; remiges nigrae, primores basi albæ, secundariæ apice albicantes.

Pitangua. 15. L. niger, subtus flavus, vertice stria fulva, fascia oculari alba.

Tyrannus brasiliensis. *Briss. av.* 2. p. 401. t. 36. f. 5.

Pitangua guacu. *Marcgr. bras.* 216. *Raj. av.* 165.

Pitanga guacu or Bemtere. *Will. orn.* p. 198.

Bentaveo ou Cuiriri. *Buff. hist. nat. des ois.* 4. p. 579. t. 27.

Tyrann du Brésil. *Buff. pl. enlum.* n. 212.

Brazilian Shrike. *Lath. syn.* I. 1. p. 187. n. 39.

Habitat in Brasilia, 9 pollices longus.

Pone & infra oculos macula fusca; gula alba; pennæ corpus supra tegentes margine flavo; alæ subtus flavæ; cauda fusca, margine rufo, subtus olivacea.

rufus. 17. L. rufus, subtus albus, capite nigro-virescente.

Lanius madagascariensis rufus. *Briss. av.* 2. p. 178. t. 18. f. 4.

Pie-grièche rousse de Madagascar. *Buff. pl. enlum.* n. 298. f. 2.

Schet-bé. *Buff. hist. nat. des ois.* I. p. 313.

Rufous Shrike. *Lath. syn.* I. 1. p. 180. n. 31.

Habitat in Madagascar; 8 fere pollices longus.

Rostrum *plumbeum* ; pedes *cum unguibus cornei* ; cauda *rufa* , *marginē fusco* ; collum *ex virescente nigrum* , *feminae antèrius griseum*.

barbarus. 18. *L. niger* , *subtus ruber* , *vertice femoribusque fulvis*.

Lanius senegalensis ruber. *Briss. av. 2. p. 185. t. 17. f. 2.*

Gonolak. *Buff. hist. nat. des ois. 1. p. 314.*

Pie-grièche de Sénégal. *Buff. pl. enlum. n. 56.*

Habitat in Senegal , *9 fere pollices longus*.

Rostrum , *alæ* , *cauda* , *pedes & ungues nigra* ; *caput* , *cervix* , *crissum* , *& tectrices alarum inferiores flavae*.

sulphureus. 19. *L. fuscus* , *subtus flavus* , *capite nigricante* : *fascia am-biente albida*.

Lanius cayannensis luteus. *Briss. av. 2. p. 176. t. 16. f. 4.*

Pie-grièche jaune de Cayenne. *Buff. pl. enlum. n. 296.*

Becarde à ventre jaune. *Buff. hist. nat. des ois. 1. p. 312.*

Yellow-bellied Shrike. *Lath. syn. 1. 1. p. 188. n. 40.*

Habitat in Cayenna , *9 fere pollices longus*.

Gula *jugulumque alba* ; *pedes grisei* ; *ungues & rostrum nigricantes* ; *alæ & cauda fusca* , *marginē rufa*.

cayanus. 20. *L. cinereus* , *capite remigibus rectricibusque primoribus nigris*.

Lanius cayannensis cinereus. *Briss. av. 2. p. 158. t. 14. f. 1.*

Pie-grièche grise de Cayenne. *Buff. pl. enlum. n. 304.*

Becarde. *Buff. hist. nat. des ois. 1. p. 311.*

Cayenne Shrike. *Lath. syn. 1. 1. p. 181. n. 41.*

nævius. β. *Lanius cayannensis nævius*. *Buff. av. 2. p. 160. t. 14. f. 2.*

Pie-grièche tachetée de Cayenne. *Buff. pl. enlum. n. 377.*

Habitat in Cayenna , *8½ pollices longus*.

Rostrum *basī rubrum* , *apice nigrum* ; *pedes cinerei* ; *ungues nigri* ; β. *per singularum pennarum longitudinem mediam striā nigra*.

senegalus. 21. *L. griseus* , *subtus albidus* , *vertice fasciaque oculari nigris* , *rectricibus nigris apice albis*.

Lanius senegalensis cinereus. *Briss. av. 2. p. 167. t. 17. f. 1.*

Pie-grièche grise de Sénégal. *Buff. pl. enlum. n. 297. f. 1.*

Senegal Shrike. *Lath. syn. 1. 1. p. 162. n. 6.*

Habitat in Senegal , *9 fere pollices longus*.

Remiges *latere exteriore rufa*. Rectrices 6 : *6 fasciis obsolete fuscis* ; *apice concolores*.

madagāf-22. *L. cinereus* subtus albidus, loris nigris, rectricibus rufescens.

Lanius madagascariensis minor. Briss. av. 2. p. 264. t. 16. f. 1. 2.

Cali-calic & Bruja. *Buff. hist. nat. des ois. 1. p. 315.*

Petite pie-grièche de Madagascar. *Buff. pl. enlum. n. 299. f. 1. 2.*

Madagascar Shrike. *Lath. syn. 1. 1. p. 174. n. 24.*

Habitat in Madagascar, vix 5 pollices longus, passeris magnitudine.

Macula nigra utrinque inter nares & oculos; alarum rectrices superiores rufæ; rectrices maximam partem rufæ. Mas gula juguloque nigro.

Emeria. 23. *L. griseus* subtus albus temporibus uropygioque rubris.

Lanius bengalensis fuscus Briss. av. 2. p. 175. n. 14.

Muscicapa Emeria. *Syst. nat. X. 1. p. 236. n. 7.*

Rouge-queue. *Buff. hist. nat. des ois. 1. p. 309.*

Bengal Redstart. *Albin. av. 3. p. 24. t. 56.*

Indian Redstart. *Edw. av. 4. t. 190.*

Bengal Shrike. *Lath. syn. 1. 1. p. 175. n. 25.*

Habitat in Bengala, 5½ pollices longus.

Rostrum ex cinereo fuscum; irides albidæ; vertex & occiput nigra; abdomen & caudæ rectrices superiores rubræ; ad utrumque colli latus maculæ 4 nigra curvæ; caudæ pallide fusca; pedes cum unguibus nigri.

bicolor. 27. *L. cæruleus* subtus albus, capistro nigro. *Mant. 1771. p. 124.*

Lanius madagascariensis cæruleus. Briss. av. 2. p. 197. t. 16. f. 3.

Loxia madagascarina. Syst. nat. XII. 1. p. 306. n. 42.

Pie-grièche bleue de Madagascar. *Buff. pl. enlum. n. 32. f. 2. n. 298. f. 1.*

Blue Shrike. *Lath. syn. 1. 1. p. 178. n. 29.*

Habitat in Madagascar, viditans infedis, 6½ pollices longus.

Rostrum, caput, margo remigum, rectrices 2 intermedia, margo 4 proximarum exterior cærulea; pennæ rostrum cingentes, remiges, basi excepta, rectrices extrema, pedes & ungues nigra; femina subius sordide alba.

leucorhyn-28. *L. corpore* supra nigricante, subtus albedo, rostro, pectoribus, abdomine & uropygio albis.

Lanius manillensis. Briss. av. 2. p. 180. n. 17. t. 18. f. 2.

AVES ACCIPITRES. Lanius.

Pie-grièche de Manille. *Buff. pl. enlum. n. 9. f. 1.*
 Longraien. *Buff. hist. nat. des ois. I. p. 310.*
 White-bellied Shrike. *Lath. syn. I. I. p. 181. n. 33.*
Habitat in Manilla, 7 pollices longus.
Alæ, cauda, pedes & ungues nigricant.

ferrugi- 34. L. copore supra ex fusco nigro; jugulo & pectore for-
 neus. dide albis, abdomine ferrugineo.

Ferruginous bellied shrike. *Lath. syn. I. I. p. 163. n. 8.*
Habitat ad Caput bonæ spei, 9 pollices longus.
Rostrum plumbeum; cauda obscure fusca unicolor; pedes nigri.

tabuenfis: 35. L. corpore supra olivaceo, gula & pectore cinereis,
 abdomine ex flavicante fusco, cauda pedibusque fuscis.
 Tabuan Shrike. *Lath. syn. I. I. p. 164. n. 9.*
Habitat in insulis amicis maris australis, 9 fere pollices longus.

Rostrum fuscum; vertex ex virescente, tempora ex olivaceo fusca; alæ margine exteriori nigra; remiges secundariæ ex atro fusca margine sordide albo.

pacificus. 36. L. niger, capite colloque in virescentem colorem vergentibus, abdomine & cauda magis obscuris.

Pacific Shrike. *Lath. syn. I. I. p. 164. n. 10.*
Habitat in insulis maris australis, 11 pollices longus.
Rostrum obscurum, ½ pollicem longum; capitis collique penna valde angustæ; cauda 3 pollices longa; digiti ad ortum discreti, medius longissimus.

septen- 37. L. rostro nigro, pedibus plumbeis, corpore supra fusco, trionalis: gula & pectore cinereis, abdomine crisloque fuscescentibus.

Northern Shirke. *Lath. syn. I. I. p. 165. n. 11.*
Habitat in America septentrionali, fere 8 pollices longus.
Nares rotundæ, parvæ; ad basin mandibulæ superioris setæ 5-6 nigra; rectrices 4 intermediæ fusca unicolores, reliquæ intus apice albæ, omnes 2 pollices longæ; pedes breves; ungues robusti, fuscæ.

viridis. 38. L. capite, alis & corpore supra obscure viridibus, hoc subrus albo, cauda nigra.

Lanius madagascariensis minor viridis. *Briss. av. 2. p. 195. n. 25. t. 15. f. 2.*
Teka-chert. Buff. hist. nat. des ois. I. p. 310.

AVES ACCIPITRES. *Lanius.*

307

Pie-grièche de Madagascar. *Buff. pl. enlum. n. 32. f. 2.*

Green Shrike. *Lath. syn. I. 1. p. 179. n. 30.*

Habitat in Madagascar, 6 fere pollices longus.

Alæ longæ; rectrices 2 intermediae obscure virides, reliquæ margine exteriori; pedes unguesque nigri.

leucocephalos. 39. *L. albus*, corpore supra ex virescente nigro; cauda supra ex virescente atro, subtus nigro, rostro; pedibus & ungibus plumbeis.

Lanius madagascariensis major viridis. Briss. av. 2. n. 24. t. 19. f. 2.

Grande pie-grièche verdâtre de Madagascar. *Buffon pl. enlum. n. 374.*

Tcha-chert-be. *Buffon hist. nat. des ois. I. p. 314.*

White-headed Shrike. *Lath. syn. I. 1. p. 180. n. 32.*

Habitat in Madagascar, rufo affinis; 8 pollices longus.

dominicanus. 40. *L. niger*, abdomine & uropygio albis;

Pie-grièche Dominicaine. *Sonnerat it. p. 55. t. 26.*

Habitat in insulis philippinis, velocissime volans, audax; corvis potissimum insectus; an mera leucorhynchi varietas? passere major.

Rostrum cinereum; robustum; conicum, basi setis munitum.

panayensis. 41. *L.* rostro Pedibusque nigris, capite, gula, jugulo, pectore & abdomine rubris, cervice, alis caudaque fuscis.

Pie-grièche rouge de l'île de Panay. *Sonnerat it. p. 114. t. 70.*

Habitat in insula Panay, collurionis magnitudine; irides igneæ.

albus. 42. *L. albus*; rostro, cauda, pedibus, & plurima alarum parte nigris.

Pie-grièche blanche de l'île de Panay. *Sonnerat it. p. 115. t. 72.*

Habitat in insula Panay; collurione rufo duplo major; remiges majores fascia alba.

varius. 43. *L.* corpore supra ex cinereo fusco, gula & pectore ex bubali colore flavo, abdomine, uropygio & crisso ferdide ex fuscescente albo, intercapulis albis, cauda alisque fuscis.

White-shouldered Shrike. *Lath. syn. I. 1. p. 190. n. 43.*

Habitat in Brasilia. Pennant.

Rostrum pedesque nigri; frons genæque maculis pallidioribus;

- ævius.** 44. L. corpore supra nigro, subtus cinereo, testricibus alarum fngulis macula oblonga alba.
 Spotted Shrike. *Lath. syn.* I. I. p. 190. n. 45.
Habitat in Cayenna, doliato similis, sed minor.
 Rostrum pedesque nigri; pauca pennæ ad exortum dorsî apice albo; remiges margine albo; rectrices apice albo.
- obscurus.** 45. L. corpore supra obscure atrò, subtus albo, supercilio albo; pedibus fuscis.
 Dusky Shrike. *Lath. syn.* I. I. p. 191. n. 46.
Navio aqualis; rostrum corneum; alæ cum cauda obscuriores; pedes fusci.
- fuscus.** 46. L. corpore supra fusco, subtus albo, area inter rostrum oculosque, apice remigum secundariarum, margineque primariarum flavicantibus.
 Brown Shrike. *Lath. syn.* I. I. p. 191. n. 47.
 Magnitudo *Pipra*; rostrum corneum, apice nigrum; pedes nigri.
- ruber.** 47. L. ruber, alis caudaque ocellatis apice nigris.
 Red Lanius or Butcher bird of Surinam. *Bancr. Gujan.* p. 154.
 Red Shrike. *Lath. syn.* I. I. p. 192. n. 48.
Habitat in Surinamo.
- america-nus.** 48. L. niger, remigum primorum macula, genis gulaque albis, pectore & abdomine cinereis.
 Black-crowned Shrike. *Arch. zool.* 2. p. 238. n. 128.
Habitat in America septentrionali, Excubitore minor, ludoviciano affinis.
 Cauda longa; rectrices intermedia tota nigra; reliquæ apice albo, albedine versus exteriora nigredinem sensim fere delente.
- minor.** 49. L. cinereus, gula alba, pectore & abdomine roseis, fronte, linea oculari caudaque nigris.
 Pie-grièche d'Italie. *Buffon hist. nat. des ois.* p. 298. pl. enlum. n. 32.
Habitat in Italia, Hispania, Russia, nengetæ affinis.
 Remiges nigra; primariæ macula ad basin, secundariæ apice albo; rectrices extimæ albæ.

Natka. 50. *L. cauda rotundata*, vertice & corpore supra nigro, hoc subtus albo; torque albo.

Natka Shrike. Arct. zool. 2. p. 139. n. 130.

Habitat in sinu Natka America septentrionalis ultra 7 pollices longus.

Rostrum pedelque nigri; supra oculos linea alba ad nucham protensa; infra hanc alia nigra; rectrices alarum minores nigrae, majores a. b. a.; remiges primariae obscurae, margine ex flavicante fusco; secundariae nigrae, margine & apice albis; rectrices nigrae, 4 extrema apice albo. Latham.

melano- 51. *L. rostro, capite, gulaque nigris, corpore olivaceo sub-*
cephalos, tus pallidior, cauda fascia lata nigra, apice flava.

Black-headed Shrike. Lath. syn. I. 1. p. 165. n. 12. t. VI.

Habitat in insulis Sandwich maris australis, 6 circiter pollices longus; pedes obscuri.

brachy- 52. *L. capite supra e ferrugineo griseo superciliis albidis, fas-*
rus, cia nigra per oculos ad aures ducta, corpore supra ex griseo cinereo, subtus ex lutescente albedo, cauda rotundata. *Pall. it. 3. p. 693. n. 5.*

Short tailed Shrike. Lath. syn. I. 1. p. 166. n. 13.

Habitat rarior in Dauniae rupestribus, collurionis magnitudine.

Uropygium subserrugineum; gula & crissum fere alba; aiae nigricantes, testricum apice griseo; rectrices 10 ex griseo fuscae, praeter medias apice albae.

phoeni- 53. *L. fascia per oculos nigricante, corpore supra ex griseo*
curus, rufescente, subtus ex lutescente albedo, cauda longa rotundata & uropygio intense rufis. *Pall. it. 3. p. 693. n. 6.*

Rufous tailed Shrike. Lath. syn. I. 1. p. 166. n. 14.

Habitat in rupestribus ad Ononem, Collurionis magnitudine & facie.

foliatus. 16. *L. cauda rotundata, corpore albo nigroque confertim*
subfasciato. *Mus. Ad. Frid. 2. p. 12.*

Lanius cayennensis striatus. Briss. av. 2. p. 187. n. 21. t. 29. f. 3.

Pie-grièche rayée de Cayenne. Buff. planch. enlum. n. 297. f. 2.

AVES ACCIPITRES. Lanius.

Black and white Butcher-bird. *Edw. av.* 5. p. 35. t. 226.
 Pied Shrike. *Lath. syn.* I. 1. p. 190. n. 44.

Habitat in Cayenna, 6½ pollices longus.

Rostrum obscurum; pedes & ungues fusci; singulæ pennæ fasciis albis & nigris; capitis longiores albæ apice nigræ, quas dum erigit, cristatus apparet; alæ cum cauda nigræ, maculis transversis albis.

jocosus. 24. *L. cauda rotundata, corpore griseo, palpebra inferiore purpurea, ano sanguineo. Amæn. acad.* 4. p. 238.

Merula sinensis cristata minor, Briss. av. 2. p. 255. t. 21. f. 2.

Jocose Shrike. Lath. syn. I. 1. p. 175. n. 26.

Habitat in Sina, alaudæ magnitudine, 7½ pollices longus. Osbeck.

Vertex niger; tempora, gula & jugulum alba; abdomen albicans; cauda fusca, rectrices 4 exteriores apice albo; pedes cum unguibus nigri; rostrum magis rectum, quam in reliquis, sed utrinque intra apicem emarginatum.

inaustus. 25. *L. dorso cinereo, rectricibus rufis, intermediis duabus cinereis fascia nigricante, cauda rotundata.*

Corvus inausus. Fn. succ. 93. *Brünn. orn.* p. 10.

Corvus ruficollis. S. G. Gmelin it. 1. p. 50.

Merula faxatilis. Gesn. av. 732. *Raj. av.* p. 68. n. 3. *Briss. av.* 2. p. 238.

Merle de roche. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 351. t. 23. pl. enlum. n. 562.

Codirossa maggiore. Olin. acc. t. 47.

Greater Redstart. Alb. av. 3. p. 51. t. 55. *Will. orn.* p. 197. t. 36.

Rock Shrike. Lath. syn. I. 1. p. 176. n. 27.

minor. 26. *Turdus faxatilis. Syst. nat.* XII. 1. p. 294. n. 14.

Merula faxatilis minor. Briss. av. 2. p. 240.

Petrochelidon. Gesn. av. 767.

Blaukœpfige rothe Amsel. Frisch. av. t. 32.

Habitat in omnis Europæ, regionis quoque Uralensis silvis desertis, alpinis, turdis corvisque satis affinis; moribus tamen lani, protervus, comestantes peregrinatores sæpe adiens, carnesque dissecas rapiens, ceterum vermibus & insectis vicatans, pullosque nutrens; nidum in rupium

cavernis inaccessis struens, in eoque 3-4 ova ponens; cantu grato, Longitudo fere 8 pollicum, β. minor.

Rostrum fere pollicare, nigricans, utrinque emarginatum; pedes & alæ similiter nigricant; cauda 3 pollices longa, rectricibus 2 intermediis fuscis, reliquis rufis; caput & collum obscure (in β. ex cærulescente) cinerea, maculis exiguis rufis & fuscis; superior dorsi pars obscure fusca (in β. nigricans, rufo & ex cærulescente cinereo mista), inferior cinerea (in β. & alba); pectus & abdomen aurantia, maculis parvis albis fuscisque; pennarum radii laxi. *An turdi species, forte saxatilis?*

faustus, 26. L. griseus, subtus ferrugineus, lineola alba pone oculos, cauda rotundata. *Amæn. acad. 4. p. 241.*

White wreathed Shrike. *Lark. syn. I. 1, p. 178. n. 28.*

Habitat in Sina, turdi pilaris magnitudine.

Rostrum cum pedibus pallidum; alæ rotundata; remiges subfusca, marginibus griseis, lineis obsoletis fuscis decussantibus; cauda fusca, similiter lineata.

II. PICÆ.

Rostrum subcompressum convexum.

45. PSITTACUS. *Rostrum aduncum* ; mandibula superiori mobili, cera (in multis) instructa.

Nares in rostri basi rotundæ,

Lingua carnosâ obtusa integra.

Pedes scanforii.

* *Macrouri, cauda cuneiformi.* *

Macao. I. Ps. ruber, remigibus supra cæruleis, subtus rufis, pennis scapularibus cæruleo & viridi variis, genis nudis rugosis. *Scop. ann. I. p. 26.*

Ara brasiliensis. *Briss. av. 4. p. 184. t. 19. f. 1.*

Psittacus maximus alter. *Aldr. orn. I. p. 665. t. 666.*

Raj. av. p. 29. n. 2.

Ara premier. *Fermin Surin. 2. p. 173.*

Ara rouge. *Buffon hist. nat. des ois. 6. p. 179. pl. enlum. n. 12.*

Maccaw. *Albin. av. I. p. 11. t. 11. Will. orn. p. 73.*

Red and blue Maccaw. *Edw. av. 158. t. 158. Bancr. Guj. p. 156. Lath. syn. I. 1. p. 199. n. 1.*

Habitat in America meridionali, ulnam longe superans. Nidificat in sylvis palmiferis, quarum fructibus potissimum vidit, in arboribus cavis, bina ova ponens, magnitudine columbinorum, facie ovorum perdricis; bis in anno pruriunt, mare & femina alternatim incubante; junior facile cicurandus, non item adultior; caro comeditur, quamvis dura & insipida.

Corpus magnitudine gallinæ, coccineum; rostri mandibula superior alba, inferior nigra; tempora alba; remiges potissimum exteriores cæuleæ, rectricibus pluribus luteis; cauda longissima, rubra, rectricibus lateralibus cæruleis.

Psittacis omnibus proprium, quod eis lingua latior, quam ceteris avibus. Plin.

Aracanga. 52. *Pf.* dilute coccineus, pennis scapularibus luteis viridi terminatis, remigibus supra cæruleis, subtus rufis, genis nudis rugosis.

Ara jamaicensis. *Briss. av.* 4. p. 188. n. 2.

Psittacus erythroxanthus. *Gesn. av.* 721. *Aldr. orn.* 1. p. 683.

Aracanga. *Marcgr. bras.* 206. *Raj. av.* p. 29. n. 3.

Petit Ara rouge. *Buffon hist. nat. des ois.* 6. p. 180. pl. enlum. n. 641.

Maccaw from Jamaica. *Alb. av.* 2. t. 17. *Brown jam.* p. 472.

Maccaw called Aracanga. *Will. orn.* p. 111.

Red and yellow Maccaw. *Bancr. Gujan.* p. 156. *Lath. syn.* 1. 1. p. 201. n. 2.

Habitat in Gujana, Brasilia, Jamaica, *precedenti æqualis*.

Rectrices supra coccineæ, violaceo admixto, infra obscure rubræ; 2 intermediæ utrinque in primâ medietate obscure rubræ.

militaris. 2. *Pf.* viridis, alis cæruleis, fronte caudaque rubris, genis nudis lineis plumosis.

Largest Gujana Parrot. *Bancr. Guj.* p. 158.

Great green Maccaw. *Edw. av.* t. 313.

Military Maccaw. *Lath. syn.* 1. 1. p. 202. n. 3.

Rostrum nigrum; uropygium, rectricumque apices cærulei.

Ararauna. 3. *Pf.* supra cæruleus subtus luteus, genis nudis: lineis plumosis.

Ara brasiliensis cyano-crocea. *Briss. av.* 4. p. 193. t. 20.

Psittacus maximus cyano-croceus. *Aldr. orn.* 1. p. 664.

Raj. av. p. 28. 1. p. 181. 5. *Sloan. jam.* 2. p. 296.

Ara bleu. *Ferm. Surinam.* 2. p. 174. *Buffon hist. nat. des ois.* 6. p. 191. pl. enlum. n. 36.

Ararauna. *Marcgr. bras.* 206. *Alb. av.* 3. p. 10. t. 10. & 2. p. 16. t. 17.

Aldrov. blue and yellow Maccaw & brasilian Ararauna.

Will. orn. p. 110. n. 1. & 111. n. 4. t. 15.

Blue and yellow Maccaw. *Edw. av.* 159. t. 159. *Latham syn.* 1. 1. p. 204. n. 4.

Psittaci capite magno, vertice plano, monogami per paria incedunt pedibus brevibus, garruli, doctes, longævi; visitant inprimis nucibus, glandibus, cucurbitæ, carthami seminibus, in patria sæpe edules; scandunt rostro, irati pennas erigunt; inter aves simiæ; ex regionibus borealibus exulant, ad 34° latitudinis obviæ; 25° utrinque ab æquatore distantia frequentissimi.

cæruleus. β . *Psittacus maximus cæruleus varius*, cauda producta,

Brown, jam. p. 272.

Ara jamaicensis cyaneo-crocea. Briss. av. 4. p. 191. n. 3.

Blue Maccaw. Alb. av. 3. t. 10. Lath. syn. I. 1. p. 205. n. 4. A.

Habitat in Jamaica, Guiana, Brasilia, Surinamo, æqualis cum præcedentibus magnitudinis.

Cærulea supra collum, dorsum, alas, caudam, subtus collo, pectore, abdomine; cauda lutea femina, rubra mari; nigra rostrum & gula; palpebræ ferratæ papillis nigris; tempora nuda alba, lineata (non in β .) pundis plumosis cæruleo-nigris.

Makawu-anna. 53. *Ps.* supra obscure viridis, capite viridi cæruleo admisto, gula, jugulo & pectoris parte superiore rufescentibus, pectoris parte inferiore & abdomine viridibus,

uropygio ex rubro fusco.

Perruche ara. Buffon hist. nat. des ois. 6. p. 277.

Perruche ara de Cayenne. Buffon pl. enlum. n. 864. Barrer. Fr. equin. p. 145.

Parrot Maccaw. Lath. syn. I. 1. p. 205. n. 5.

Habitat in Cayenna & Gujana, migratorius, 18 pollices longus.

Genæ nudæ; cauda 9 pollices longa, alæque supra obscure, subtus ex flavescente virides.

ater. 54. *Ps.* niger cum splendore viridi, rostro, oculisque rubentibus, pedibus flavis.

Ara noir. Buffon hist. nat. des ois. 6. p. 202.

Ararauna ou Machao. de Lacép. descr. des ind. orient. p. 490.

Black Maccaw. Latham syn. I. 1. p. 206. n. 6.

Habitat in Gujana partibus interioribus incultis, in rupium montiumque aridorum & sterilium cacumine.

obscurus. 4. *Ps.* fuscus, genis nudis rubris, vertice cinereo-nigrescente vario, cauda cinerea. *Hasselq. it. 236.*

Obscure Parrot. Latham syn. I. 1. p. 206. n. 7.

Habitat in Africa, picæ magnitudine.

Rostrum & capistrum, pedes & ungues nigra; orbitæ alæ; irides flava; cervice & alæ supra nigra; abdomen cinereum.

nobilis. 5. *Ps.* viridis, genis nudis, humeris coccineis. *Mus. Ad. Frid. 2. p. 13.*

Noble Parrot. Lath. syn. I. 1. p. 207. n. 8.

AVES PICÆ. Psittacus.

313

*Habitat in Surinamo, turturis magnitudine,
Facies nuda, alba.*

- severus. 6. Ps. viridis, genis nudis, remigibus rectricibusque cæruleis
subtus purpurascens. *Mus. Ad. Fr. 1. p. 13. Scop.
ann. 1. p. 27. n. 23.*
Ara brasiliensis viridis. *Briss. av. 4. p. 198. n. 6.*
Maracana. *Marcgr. bras. 207. Will. orn. p. 112. n. 5. 6.*
Raj. av. p. 29. n. 5. Sloan. jam. 2. p. 297.
Ara vert. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 194. t. 8.*
Ara vert du Brésil. *Buff. pl. enlum. n. 383.*
Brazilian green Macaw. *Edw. av. 41. t. 229. Lath. syn.
I. 1. p. 208. n. 9.*
β. Ara brasiliensis erythrochlora. *Briss. av. 4. p. 198. n. 7.*
*Habitat in Jamaica, Gujana, Brasilia, 5 circiter pollicibus
pedem longitudine superans.*
Rostrum, ungues, & genarum lineæ nigra; irides aureæ;
pennæ virides, in β. obscurius; frons ex castaneo pur-
purascens, in β. fusca, vertex cæruleus, in β. magis in
viridem vergens; cauda supra viridis, versus apicem cæ-
rulea; pedes fusci.
- Eupatria. 7. Ps. viridis, genis nudis, humeris coccineis, rostro purpu-
rascens.
Psittaca ginginiana. *Briss. av. 4. p. 343. n. 64. t. 29. f. 1.*
Perruche de Gingi. *Buff. pl. enlum. n. 239.*
Grande perruche à ailes rougeâtres. *Buff. hist. nat. des
ois. 6. p. 156.*
Gingi Parrot. *Lath. syn. I. 1. p. 209. n. 10.*
Habitat in regno Gingi Indiæ, 21 pollices longus.
Orbitæ nudæ rubicundæ; corpus supra ex olivaceo profun-
de viride, subtus pallide virens flavescens admixto;
gula jugulumque cinerascens; cauda & alæ, exceptis
rectricibus superioribus rubris, virides; pedes rubentes;
ungues nigri.
- japoni- 8. Ps. viridis, subtus rectricibusque lateralibus ruber, remi-
cus, gibus cæruleis.
Psittacus erythrochlorus macrourus. *Aldr. orn. 1. p. 678.
t. 681. Raj. av. p. 34. n. 3.*
Psittaca japonensis. *Briss. av. 4. p. 362. n. 71.*
Perruche verte & rouge. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 159.*
Red and yellow or pale green Parrot of Aldrovandus.
Will. orn. p. 116.
Japonesse Parrot. *Lath. syn. I. 1. p. 209. n. 11.*

Habitat in Japonia, non tamen boreali, quæ psittacis caret.
 Cauda corpore longior, radicibus 2 intermediis viridibus
 scapis albis, reliquis rubris scapis nigris; iostrium & iri-
 des rubent; macula ante & pone oculum, & intercapu-
 lulum cæruleum; gula ex ferrugineo rubra; corpus sub-
 tus lineis longitudinalibus nigris; pedes & ungues nigri.

amboi-
nenfis.

9. Ps. coccineus, dorso cæruleo, alis macula viridi.
 Psittaca amboinenfis coccinea. *Briss. av. 4. p. 378. t. 28. f. 2.*
 Lori Perruche tricolor. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 138.*
 Perruche rouge d'Amboine. *Buff. pl. enlum. n. 240.*
 Amboina red Parrot. *Lath. syn. I. 1. p. 210. n. 12.*
Habitat in Amboina, 15½ pollices longus.
 Rostrum, pedes & ungues rubri, illud apice nigrum;
 rectrices caudæ inferiores medio violaceæ, rectrices 2
 intermediæ ex violaceo fuscæ 9½ pollices, extimæ binæ
 vix 6 pollices longæ, margine interiore rubro.

cianoce-
phalus.

10. Ps. viridis, capite gulaque cæruleis.
 Psittaca cyanocephala. *Briss. av. 4. p. 359. t. 19. f. 2.*
 Perruche à tête bleue. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 145.*
 Perruche à tête bleue des Indes orientales. *Buff. pl. enlum.
 n. 192.*
 Blue-headed Parrot. *Lath. syn. I. 1. p. 211. n. 13.*
Habitat in India, 11½ pollices longus.
 Mandibula superior flava, apice cinerascens, inferior cine-
 rascens; area oculorum nuda flavicans; corpus subtus
 ex viridi flavicans; gula violaceæ in cæruleum vergens;
 colli latera lutea; alæ subtus cinereæ; caudæ subtus
 flavicante cinerea; pedes cærulescentes; ungues grisei.

hamato-
tus.

50. Ps. corpore supra viridi, jugulo & pectore aurantio,
 pennarum margine cæruleo, abdomine caudaque viri-
 dibus. *Mant. 1771. p. 574.*
 Psittaca amboinenfis varia. *Briss. av. 4. p. 364. n. 72.*
 Perruche à face bleue. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 150.*
 Perruche d'Amboine. *Buff. pl. enlum. n. 61.*
 Red breasted Parrakeet. *Edw. glean. t. 232.*
 Red breasted Parrot. *Lath. syn. I. 1. p. 212. n. 14.*

molucca-
nus.

- β. Perruche des Moluques. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 150.*
pl. enlum. n. 743.

novæ
Hollan-
diæ.

- Blue-bellied Parrot. *Brown. Illustr. p. 14. t. 7.*
Habitat in Amboina, γ. in nova Hollandia; 11, β. 10.
 γ. 15 pollices longus.

Rostrum ex flavicante, β . ex rubicundo album, γ . rubicundum, cera flavicante; capistrum & pars verticis, β . totum caput, γ . caput collumque cærulea; occipite tamen virescente; pectus β . & γ . rubrum flavo almixto; abdomen γ . cæruleum, β . macula cærulea notatum.

atricapillus. 55. *Pf.* supra cæruleus, gula, jugulo pectoreque rubris, abdomine crissoque viridibus, vertice nigro, torque viridi & rubro.

Ara moluccensis varia. Briss. av. 4. p. 197. n. 5.

Pittacus orientalis exquisitus Loeri dictus. Seb. thes. 1. p. 63. fi. 4.

Pittacus capite nigro, collari viridi. Klein av. p. 25. n. 16.

Grande perruche à bandeau noir. Buffon hist. nat. des ois. 6. p. 158.

Habitat in Moluccis; 14 pollices longus.

Alæ, rectricesque caudæ superiores cæruleæ, inferiores virides rubro variæ; cauda supra viridis, subtus rubra margine nigro.

tabuenfis. 56. *Pf.* capite, collo, pectore & abdomine purpureis, dorso & tectricibus alarum viridibus, lunula cervicem terminante, remigibus primariis caudæque maxima parte cæruleis.

Tabuan Parrot. Lath. syn. 1. 1. p. 214. n. 16. t. 7.

Habitat in insulis amicis maris australis, 19 pollices longus.

Rostrum nigrum, mandibulæ inferioris basis pennis viridibus cincta; alæ spuria cæruleæ; remiges secundaria virides margine cæruleo; rectrices 2 intermedia 8 pollices longæ cæruleæ, margine & apice viridi; reliquæ cæruleæ scapis nigris; pedes obscuri.

papuenfis. 57. *Pf.* capite, collo & pectore rubris, occipitis macula cærulea lunulisque duabus nigris, alis dorsique parte viridibus, cetera dorsii parte, abdomine & caudæ apice rubris.

Petit Lori Papon: Sonnerat it. p. 175. t. III.

Papuan Lory. Lath. syn. 1. 1. p. 215. n. 17.

β . *Pittacus* tænia abdominis transversa nigra margine viridi.

γ . *Pittacus* coccineus, cauda brevior, dorsii parte posteriore ex cæruleo atra, macula inter alas lutea.

δ . *Pf.* abdominis medio viridi.

Habitat in Papua, 16 pollices longus.

Rostrum rubrum; alæ breves; dorsum posterius stria longitudinali media cærulea; ad utrumque alarum latus macula oblonga lutea; caudæ $\frac{2}{3}$ virides, reliquum luteum; pedes rubri.

borneus. 11. *Pf. ruber*, remigibus rectricibusque apice viridibus, alis macula cærulea, orbitis fuscis.

Plittaca coccinea bonarum fortunarum insulæ. *Briss. av. 4. p. 373. n. 77.*

Lori perruche rouge Nr. 1. *Buffon hist. nat. des ois. 6. p. 137.*

Longtailed Scarlet Lory. *Edw. av. 173. t. 173. Lath. syn. 1. 1. p. 216. n. 18.*

Habitat in India, 9½ pollices longus.

Rostrum *durantium*; orbitæ *nudæ*; remiges *punctis cæruleis & viridibus*; rectrices 2 *extimæ in colorem viridem inclinant*; rectrices caudæ inferiores *rubræ, margine cæruleo.*

indicus. 58. *Pf. coccineus*, fusco & violaceo variegatus, capite & collo superioribus, pectore & tænia pone oculos violaceis, rectricum majorum apice dilute fusco, minorum rectricibusque ex fusco violaceis.

Plittaca indica coccinea. *Briss. av. 4. p. 376. t. 25. f. 2.*
Lori perruche violet & rouge Nr. 2. *Buffon hist. nat. des ois. 6. p. 138.*

Perruche des Indes orientales. *Buffon pl. enlum. n. 143.*

Indian Lory. *Lath. syn. 1. 1. p. 217. n. 19.*

Habitat in Amboina, 11 fere pollices longus.

Rostrum *rubicundum*, apice *nigro*; pedes & ungues *fusci.*

élégans. 59. *Pf.* capite, collo & corpore subtus rubro, supra fusco, interscapulis pallide cæruleis rubro mistis, cauda ex viridante fusca, apice albicante;

Beautiful Lory. *Lath. syn. 1. 1. p. 217. n. 20.*

β. *Pf.* alis, cauda & corpore supra viridibus. *Lath. syn. 1. 1. p. 218.*

Longitudo 15 (β: 12) *pollicum*; rostrum ex *flavicante fuscum*, β. *plumbeum*, apice *flavo.*

guebienfis. 60. *Pf.* splendide ruber, remigibus nigris transversim fasciatis, cauda ex rubro fusca;

Petit Lory de Gueby. *Sonner. it. p. 174. t. 109.*

Lori rouge & violet. *Buffon hist. nat. des ois. 6. p. 125.*

Lori de Gueby. *Buffon pl. enlum. n. 684.*

Gueby Lory. *Lath. syn. 1. 1. p. 219. n. 21.*

Habitat in insula Gueby, amazono dimidio minor 9½ pollices longus.

Rostrum & irides *ignæ*; fascia alarum *rubra*; annulus *purpureus a cervice ad pedus progrediens.*

- janthinus.** 61. *Pf.* capite & corpore supra rubro, subtus violaceo, humeris cæruleis, cauda alisque viridibus & rubris.
Perroquet violet. Ferm. Surin. 2. p. 175.
Habitat in Amazoniæ littore.
Rostrum nigrum; irides aureæ.
- variegatus.** 62. *Pf.* coccineus, nucha, dorsi initio, pectore & abdomine purpureo-cæruleis, alis supra rubris, subtus flavis, cauda viridi.
Variegated Lory. Lath. syn. I. 1. p. 220. n. 22.
Habitat in India, 10-11 pollices longus.
Rostrum obscurum; color abdominis posterioris in virescente-nigrum vergens; rectrices basi intus rubicundæ, versus apicem extus cæruleæ.
- novæ Guineæ.** 63. *Pf.* niger cum splendore cæruleo, cauda subtus rubra, orbitis nudis fuscis.
Lori noir de la nouvelle Guinée. Sonner. it. p. 175. t. III.
Forrest It. p. 133.
Black Lory. Lath. syn. I. 1. p. 221. n. 23.
Habitat in nova Guinea.
Rostrum pedesque nigricantes; irides circulis duobus, altero cæruleo, altero minori ex rubro fusco.
- javanicus.** 64. *Pf.* coccineus, orbitis nudis argenteis, capite cristato, gula grisea, jugulo & pectore roseis, humeris & alis ex rubro & viridi mistis, rectricibus duabus intermediis coccineis, reliquis roseis viridi-mixtis, apice cæruleo.
Pittaca javensis cristata coccinea. Briss. av. 4. p. 381. n. 80.
Pittacus parvus Bontii. Raj. av. p. 34. n. 5.
Perruche huppée. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 160.
Bontius's small Parrakeet. Will. orn. p. 120. n. 7.
Crested red Parrakeet. Lath. syn. I. 1. p. 223. n. 25.
Habitat in Java, alaudæ magnitudine.
Rostrum griseum; cæra albicans; oculi nigri.
- Jandaya.** 65. *Pf.* supra viridis, subtus flavus, capite colloque flavis.
Pittacula brasiliensis lutea. Briss. av. 4. p. 399. n. 91.
Jandaya. Will. orn. p. 116. S. 4. n. 5. Raj. av. p. 34. n. 5. Buffon hist. nat. des ois. 6. p. 262.
Yellow-headed Parrot. Lath. syn. I. 1. p. 224. n. 26.
Habitat in Brasilia.
Rostrum, pedes & ungues nigri; orbitæ nudæ, albæ; irides aureæ; abdominis pars posterior viridis.

solstitia- 12. *Pf. luteus*, alarum tectricibus viridibus, orbitis rubris, rectricibus lateralibus extus cæruleis.

Psittacus aurantius. *I. F. Miller illustr. t. V. A.*

Psittaca angolensis lutea: *Briss. av. 4. p. 371. n. 76.*

Perruche jaune. *Buffon hist. nat. des ois. 6. p. 147.*

Perroquet from Angola. *Albin. av. 3. t. 13.*

Angola Yellow Parrot: *Lath. syn. 1. 1. p. 224. n. 27.*

Habitat in Angola, turturis magnitudine, 11½ pollices longus.

Rostrum ex virescente, cera pallide cinerea; irides flava; dorsum maculis ex flavo viridibus; tectrices alarum a corpore remotissimæ margine cæruleo; tectrices 6 intermedia utrinque ex flavicante virides; pedes & ungues rubicundi.

Guarou- 66. *Pf. flavus*, remigibus majoribus viridibus.

ba. *Psittaca brasiliensis lutea*. *Briss. av. 4. p. 369. n. 74.*

Quijubarui. *Raj. av. p. 35. Will. orn. p. 117.*

Quarouba ou Perruche jaune: *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 272.*

Perruche jaune de Cayenne. *Buff. planch. enlum. n. 525.*

Brazilian yellow Parrot. *Lath. syn. 1. 1. p. 225. n. 28.*

mexicana- β. *Psittaca mexicana lutea*. *Briss. av. 4. p. 374. n. 75.*

nus. *Avis Cocho Psittaci mexicani species*. *Seb. the. 1. t. 64. f. 4.*

Habitat in Brasilia & Amazonia, β. in nova Hispania, 11 pollices longus, solitarius, & rarior, facile quidem circurandus, sed lingua minus docili.

Rostrum griseum; oculi nigri; cauda longissima; in β. rostrum rubens; caput pallide, collum ex aurantio rubrum; tectrices alarum superiores ex viridi, rubro & aurantio variæ.

carolinensis- 13. *Pf. viridis*, capite, collo genibusque luteis. *Scop. ann. 1. p. 19. n. 25.*

Psittaca carolinensis: *Briss. av. 4. p. 350. n. 67.*

Perroquet n°. 7. *Ferm. Surin. 2. p. 176.*

Perruche à tête jaune: *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 274.*

Perruche de la Caroline: *Buff. planch. enlum. n. 499.*

Papegay à tête aurore. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 247.*

Caroline Parrot. *Arch. zool. 2. p. 242. n. 132. Catesh. Carol. 1. p. 11. t. 11. Lath. syn. 1. 1. p. 227. n. 29.*

Habitat in Gujana, moris maturantibus in Carolinam & Virginiam migrans, gregarius, pomariis valde infestus; in arboribus cavis soli humilioris spongiosum nidum struens,

&

AVES PICÆ. *Pittacus*.

321

& ova *ut plurimum* 2 *subrotunda nivea ponens*; *facile*
cicurandus, *non tamen loquax*.

Rostrum *ex flavicante album*; *pedes albi*.

Alexan- 14. *Pf. viridis*, *collari pectoreque rubro*, *gula nigra*. *Aman.*
dri. *acad. 4. p. 236. Mus. Ad. Frid. 2. p. 14. Scop. ann. 1.*
p. 29. n. 26.

Pittacus (cubicularius), *cauda cuneiformi*, *digito inte-*
riore postico mutico. *Hasselq. it. 235.*

Pittacus torquatus macrourus antiquorum. *Aldr. av. 1.*
p. 678. Raj. av. p. 33. n. 1.

Pittaca torquata. *Briss. av. 4. p. 323. n. 55.*

Perrocello. Olin. accell. 24. t. 24.

Grande Perruche à collier d'un rouge vif. *Buff. hist. nat.*
des ois. 6. p. 141.

Perruche à collier des îles Maldives. *Buff. planch. enlum.*
n. 642.

Ring Parrakeet. *Will. orn. p. 115. Edw. av. t. 292. f. 1.*

Alexandrine Parrakeet. *Lath. syn. 1. 1. p. 234. n. 37.*

β. *Pittacus torque roseo*.

Perruche à collier couleur de rose. *Buff. hist. nat. des*
ois. 6. p. 142. planch. enlum. n. 551.

γ. *Pittacus torque purpureo*.

Pittaca indica torquata. *Briss. av. 4. p. 326. n. 56.*

Bracelat Parrakeet from the Eastindies. *Albin. av. 2. t. 18.*

δ. *Pittacus torque duplici*.

Pittaca borbonica torquata. *Briss. av. 4. p. 328. n. 57. t. 27.*
f. 1.

Perruche à double collier. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 143.*

Perruche à collier de l'île de Bourbon. *Buff. planch.*
enlum. n. 215.

ε. *Pittacus capite cyaneo*.

Pittaca cyanocephalos. *Briss. av. app. p. 129.*

Perruche à tête d'azur. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 148.*

Blue headed Parrakeet. *Edw. av. t. 292.*

ζ. *Pittacus javanius*. *Osbeck it. 1. p. 156.*

Habitat in Asia australi, insulisque maris indici, δ. etiam
in Africa, β. in sola Africa, columbæ plerumque magni-
tudine, primus innotuit expeditione Alexandri Magni.

Rostrum *magis minusve rubrum*; *in β. mandibula superio*
ris apice & inferiore nigra; in γ. mandibula superiore au-
rantia, inferiore nigra; in ζ. inferiore flava; cera in hoc
nigra; irides luteæ; orbitæ nudæ incarnatæ, in ζ. fuscæ;
caput in ε. cyaneum, in ζ. ex pallide cæruleo &

AVES PICÆ. Pſittacus.

pallide flavo mistum; occiput in β. in violaceum vergens; vertex in γ. ex cærulescente viridis; tempora in ζ. nigricant; gula in ε. cyanea, in ζ. pallide rubra; jugulum & pectus in γ. & ζ. pallide rosea; in δ. stria lutea; alæ macula purpurascens; in ζ. rectrices alarum superiores macula flava, remiges subtus cinereæ, margine cæruleæ; in ζ. alæ subtus dilute cinereæ, rectricibus 5 luteis. Cauda margine cæruleo, subtus pallide flava; in δ. subtus ex flavo cinerea; in ε. supra cærulea, subtus flava, in ζ. flavicans. Pedes obscuri; in β. & ε. cinerei; in ζ. ex virescente grisei.

pertinax. 15. Pſ. viridis, gemis fulvis, remigibus rectricibusque canescentibus. *Mus. Ad. Frid. 1. p. 14.*

Pſittaca illiniaca. *Briss. av. 4. p. 353. n. 68.*

Tui-aputejuba. *Marsgr. bras. 206. Raj. av. p. 34. n. 2.*

Tui species secunda. *Raj. av. p. 181. n. 6. Will. orn. p. 116.*

Apujeruba. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 269. t. 13.*

Perruche Illinoise. *Buff. pl. enlum. n. 528.*

Yellow-faced Parakeet. *Edw. av. 49. t. 234.*

Illinois Parrot. *Arch. zool. 2. p. 143. n. 133. Lath. syn. I. 1. p. 228. n. 30.*

Kleiner langschwänziger grüner Papagay. *Frisch. av. t. 54.*

Habitat in America, gregatim in septentrionalem migrans, castaneis, pisis &c. viditans, & nidum in habitaculis æmitum fruens; agilis, voce parum articulata, 13 circiter pollices longus. Caro esculenta.

Rostrium cinereum; irides, frons, aliquando & occiput aurantia; remiges primariæ margine extremo cæruleæ; pectus & abdomen ex flavicante virent.

Leveria- 67. Pſ. pallide viridis, capite colloque flavis, uropygio puniceo, remigibus rectricibusque apice cæruleis.

Crimson vented Parrot. *Lath. syn. I. 1. p. 229. n. 31.*

Habitat in Asia australi, satis grandis.

Smargdi- 68. Pſ. splendide viridis, abdomine posteriore, uropygio & cauda ex ferrugineo castaneis.

Perruche émeraude. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 262.*

Perruche des terres magellaniques. *Buff. pl. enlum. n. 85.*

Fernald Parrot. *Lath. syn. I. 1. p. 230. n. 32.*

Habitat in freto Magellani? 13 pollices longus.

Rostrium & pedes obscuri; cauda apice viridis.

canicu-16. *Ps. viridis*, fronte tundra, occipite remigibusque extimis
laris. cæruleis, orbitis fulvis.

Psittaca brasiliensis. *Briss. av.* 4. p. 339. n. 62.

Perruche à front rouge. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p.
268. pl. enlum. n. 767.

Red and blue headed Parrakeet. *Edw. av.* 4. t. 176.
Lath. syn. I. 1. p. 242. n. 40.

Habitat in Americæ calidioribus, majoris turdi magni-
tudine.

Corpus subtus ex virescente luteum; rostrum nigricans;
oculi nigri; pedes rufescentes; remiges latere exte-
riore virescentes; cauda elongata.

ærugino-17. *Ps. viridis*, vertice, semigibusque primoribus cæruleis,
sus. orbitis cinereis.

Psittaca martinica. *Briss. av.* 4. p. 356. n. 69.

Perruche à gorge brune. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 257.

Brown-throated Parrakeet. *Bancr. Guj.* p. 162. *Edw. av.*
4. t. 177. *Lath. syn.* I. 1. p. 243. n. 41.

Habitat in America insulisque adjacentibus, 10 pollices
longitudine excedens.

Rostrum, cera & pedes cum unguibus cinerea; irides ex
flavicante badia; corpus subtus ex flavicante viride;
capitrum, genæ, gula & jugulum ex griseo fusca,
flavo admisso; cauda corpore brevior, subtus flavicans.

rufirof-18. *Ps. viridis*, rostro pedibusque rubris, rectricibus apice cæ-
ria. rufescentibus, orbitis incarnatis. *Mus. Ad. Fr.* 2. p. 13.

Psittaca. *Briss. av.* 4. p. 319. n. 54.

Tui Nr. 1. *Raj. av.* p. 34. *Wil. orn.* p. 116.

Perruche. *Buffon planche enlum.* n. 550.

Sinivalo. *Buffon hist. nat. des ois.* 6. p. 265.

Small green longtailed Parrakeet. *Brown. Jam.* 472.

Long tailed green Parrakeet. *Edw. av.* 4. t. 175. *Latham*
syn. I. 1. p. 230. n. 33.

gujanaen-β. *Psittaca aquarum Lupiarum insulæ*. *Briss. av.* 4. p. 330.
lis. n. 58.

Green Parrot of Gujana. *Bancr. Guj.* p. 161.

Habitat in America australi, 12 pollices longitudine supe-
rans, β. turdi magnitudine; gregarius, facile cicuran-
das, doctilis, loquacissimus.

Pedes cum unguibus incarnati; in β. etiam rostrum; irides
aurantiæ, in β. extus rubicundæ, interius cinereæ;
orbitæ quoque cinereæ; pedes & ungues albid.

ornatus. 19. *Pf. luteo-viridis, occipite, gula pectoreque rubris, vertice auribusque cæruleis orbitis cinereis.*

Pittaca indica varia. Briss. av. 4. p. 366. n. 73.

Perruche Lori. *Buffon hist. nat. des ois. 6 p. 145.*

Perruche variée des Indes orientales. *Buff. pl. enlum. n. 552.*

Lory Parrakeet. *Edw. av. 4. p. 174. t. 174. Latham syn. 1. 1. p. 221. n. 24.*

Habitat in India, 8 pollices longus.

Rostrum pallide aurantium; cera subfusca; irides aurantiæ; vertex & macula pone & supra oculos ex atro cærulea; cauda subtus rubicunda; pedes & ungues cinerei.

Jagui- 69. *Pf. viridis, remigibus apice fuscis, orbitis fulvis. Molina*
ma. *hist. nat. Chil. p. 228.*

Habitat in regno Chilensi, æstate in montibus Cordilleras, turturis magnitudine, sonorus, gregibus numerosissimis, fertilissimus, gemmas arborum herbasque vorans, campis infestissimus; caro sapidissima tenera.

gujanen- 70. *Pf. viridis, genis rubro-maculatis, tectricibus alarum mi-*
lis. *noribus coccineis, majoribus flavis, remigibus infra luteis, margine versus apicem nigricante.*

Pittaca gujanensis. Briss. av. 4. p. 331. n. 59. t. 28. f. 1.

Perruche pavaouane. *Buffon hist. nat. des ois. 6. p. 255.*

Perruche de la Gujane. *Buff. pl. enlum. n. 167. 407.*

Pavaouane Parrot. *Lath. syn. 1. 1. p. 232. n. 34.*

Habitat in Gujana & insulis Caribæis, pedem longus, ferrox. Cera rostrumque albicans; apex hujus cinereus; pedes grisei; ungues nigricantes.

margina- 71. *Pf. viridis, tectricibus alarum nigris, minorum margine*
tus. *ex flavicante fusco, majorum cæruleo.*

Perruche de l'île de Luçon. *Sonner. it. p. 80. t. 44.*

Varied-winged Parrot. *Lath. syn. 1. 1. p. 233. n. 35.*

Habitat in insula Luzonia.

Capistrum splendide virens; rostrum magnum incarnatum; irides albæ; vertex cæruleus; corpus supra gramineum, subtus ex flavicante viride; pedes nigricantes.

Sonne- 72. *Pf. viridis, torque cæruleo, macula ad alarum exortum*
ti. *rubra.*

Perruche à collier de l'île de Luçon. *Sonner. it. p. 80. t. 43.*

Blue collared Parrot. *Lath. syn. 1. 1. p. 234. n. 36.*

Habitat in insula Luzonia.

Roftrum & irides *rubræ* ; caput, collum & abdomen *ex grifeo viridia* ; alæ & dorsum *graminea* ; reſtrices 2 *intermedia graminea* , *cetera ex grifeo virides* ; pedes *ex nigricante grifei*.

pondice- 73. Pſ. *viridis*, fronte ſtriaque a mandibula utrinque ad gulam
rianus. *nigris*, facie *alba* & *cæruleſcente*, pectore *ex purpurafcente cæruleo*, cauda *ſubtus ſtraminea*.

Perruche à Mouſtaches. *Buff. hiſt. nat. des oif. 6. p. 149.*

Perruche de Pondichery. *Buff. pl. enlum. n. 517.*

Muſtacho Parrakeet. *Lath. ſyn. I. 1. p. 238. n. 38.*

barbatus. β. Pſ. *capite a baſi roſtri ad oculos caſtaneo*, linea a naribus
ad oculos *fulca*, gula *deorſum ducta nigra*, nucha *rubra*.

Bearded Parrakeet. *Lath. ſyn. I. 1. p. 238. n. 38. A.*

Habitat in regione Pondichery, 11 pollices longus.

Teſtrices alarum flavo varia ; in β. *remiges margine cæruleo*, roſtrum *rubrum*, vertex *viridis*, pedes *obſcuri*.

erythro- 74. Pſ. *viridis*, capite *rubro*, *cæruleo admixto*, gula *nigra*,
cephalus. torque *nigro* & *pallide viridi*.

Bloſſom headed Parrakeet. *Lath. ſyn. I. 1. p. 239. n. 39.*

Pſittaca ginginiana erythrocephalos. *Briff. av. 4. p. 346. n. 65. t. 29. f. 2.*

Perruche à tête rouge. *Buff. hiſt. nat. des oif. 6. p. 144.*

Perruche à tête rouge de Gingi. *Buff. pl. enlum. n. 264.*

benga- β. Pſ. *vertice genisque roſeis*, occipite *reſtriciſque duabus*
lenſis. *intermediis ſupra totis*, reliquis *marginè cæruleis*.

Pſittaca bengalenſis. *Briff. av. 4. p. 348. n. 66.*

Petite perruche à tête couleur de roſe à longs brins. *Buff. hiſt. nat. des oif. 6. p. 154.*

Perruche de Mahé. *Buff. pl. enlum. n. 888.*

Perruche à tête rouge de l'île de Luçon. *Sonner. it. p. 79. t. 42.*

Parrakeet from Bengal. *Albin. av. 3. p. 7. t. 14.*

Roſe-headedring Parrakeet. *Edw. glean. t. 233. Latham ſyn. I. 1. p. 239. n. 39. A.*

borneus. γ. Pſ. *capite*, gula, jugulo, pectore, & abdominis parte
antere ſlorum *perſicorum in modum rubris*.

Bornean Parrakeet. *Lath. ſyn. I. 1. p. 240. n. 39. B.*

malac- δ. Pſ. *colore magis in flavum vergente*, area oculorum &
cenſis. occipite *roſeis*.

Grande perruche à longs brins. *Buff. hiſt. nat. des oif. 6. p. 155.*

Perruche de Malac. Buff. pl. enlum. n. 887.

Malacca Parrakeet. Lath. syn. I. I. p. 241. n. 39. C.

Habitat in India, insulisque oceani indici, II, β. 10, γ. 12, δ. 16 pollices longus.

Rostrum rubens, mandibula inferiore in γ. & β. nigra, superiore in hac posteriori varietate lutea; cera in β. subfusca, in γ. una cum orbitis cinerea; in hac etiam frontis macula viridis, & linea nigra ab altero oculo ad alterum ducta; in δ. torques nullus; corpus subtus, in γ. etiam supra e viridi in flavum vergens; tectrices alarum macula rubra; cauda interiori margine, in β. subtus flavo, in δ. in cæruleum inclinans. Pedes & ungues cinerei.

plum-
beus.

75. Pf. viridis, rostro, pedibus orbitisque plumbeis, fronte, genis gulaque fuscis, tectricum margine & apice cæruleis. Brown fronted Parrakeet. Lath. syn. I. I. p. 243. n. 41. A. Longitudo II $\frac{1}{2}$ pollicum; irides castaneæ; vertex cærulescens; remiges margine cæruleæ; an varietas aruginosi?

oliva-
ceus.

76. Pf. olivaceus, occipitis macula cærulescente, alis ex cæruleo, viridi & aurantio variis. Perruche aux ailes chamarrées. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 151. Perroquet de l'île de Luzon. Buff. pl. enlum. n. 287. Lace-winged Parrakeet. Lath. syn. I. I. p. 244. n. 42. Habitat in insula Luzonia, ultra II pollices longus. Rostrum rubrum; alarum medium cæruleum; cauda $\frac{1}{2}$ longitudinis totius corporis; alæ complicatæ ad medium caudæ usque; pedes obscuri.

virescens.

77. Pf. virescens, tectricibus alarum minoribus basi intusque albis, extus & apice flavis, remigibus quinque primis intus nigris, margine albo, septem proximis albis, margine & apice flavis. Pittaca cayenensis. Briss. av. 4. p. 334. n. 60. t. 27. f. 2. Perruche à ailes variées. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 259. Petite perruche verte de Cayenne. Buff. pl. enlum. n. 359. Yellow winged Parrakeet. Lath. syn. I. I. p. 244. n. 43. Habitat in Cayenna numerosissimus, non timidus, docilis, erythrina coralliodendri floribus se delectans, 8 pollices longitudine superans. Rostrum cum cera albidum; tectrices alarum a corpore remotissimæ ex virescente cæruleæ; subtus corpori proximæ sulphureæ, exteriores ex cærulescente virides; re-

miges plurimæ extus & apice flavæ, intus ex flavicanti alba; 4 corpori proximæ virides; rectrices marginæ interiore flavicantes.

versicolor. 78. *Pf. viridis, capite gulaque fuscis, hac fulvo undulata, alis cæruleis plica flammea, abdomine ex purpurascente dilute cæruleo, venis fuscis.*

Perruche à gorge variée. Buffon hist. nat. des ois. 6. p. 259.

Perruche à gorge tachetée de Cayenne. Buffon pl. enlum. n. 144.

Perruche Nr. 2. Fermin Surin. 2. p. 177.

Waved-breasted Perrakeet. Lath. syn. I. 1. p. 245. n. 44.

Habitat in Cayenna & Surinamo, virenti aqualis.

Rostrium, pedes & ungues nigra; irides flammeæ; capistrum supra schisti, subtus calî colore; cauda linea longitudinali ex purpurascente dilute cærulea (lilac), subtus ex rubro fusca.

incarnatus. 79. *Pf. viridis, rostro, pedibus & unguibus incarnatis, cera orbitisque albidis, gula tetricibusque alarum rubris.*

Phittaca indica. Briss. av. 4. p. 341. n. 63.

Perruche à gorge ronge. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 157.

Little redwinged Parrakeet. Edw. glean. t. 236. Latham syn. I. 1. p. 246. n. 46.

Habitat in India, 8½ pollices longus.

Irides castaneæ; cauda 4½ pollices longa.

murinus. 80. *Pf. olivaceus, facie, gula & pectore murinis, remigibus viridibus.*

Perruche. Pernatt. it. Malouin. 1. p. 312.

Perruche fouris. Buffon hist. nat. des ois. 6. p. 148.

Perruche à poitrine grise. Buffon pl. enlum. n. 768.

Habitat in Montevideo, mansuetus & docilis, 10 pollices longus.

Rostrium & pedes grisei; cauda, pollicum.

sornatus. 81. *Pf. viridis, capite coccineo, pennis duabus elongatis exstantibus, torque & uropygio stramineis, remigum tetricumque marginæ exteriori cæruleo.*

Horned Parrot. Latham syn. I. 1. p. 248. n. 48. t. 8.

Habitat in nova Caledonia, 11 pollices longus.

Rostrium & pedes ex atro cærulei; tempora aurantia; irides aureæ; pennæ 2 verticis exstantes 1½ pollices longæ; tetricæ alarum intus & apice obscuræ; cauda subtus atra.

caledoni- 82. Pf. olivaceus, vertice ex virescente flavo, rectricibus
cus. apice albicantibus, 4. extimis margine exteriori pallide
cæruleis.

Caledonian Parrot. *Latham syn.* I. 1. p. 248. n. 49.

Habitat in nova Caledonia, 12 pollices longus.

Rostrum cæruleum, apice pallido; capistrum supra rufum, subtus cæruleum; corpus supra magis in viridem, subtus magis in flavum colorem vergens; pedes ex atro cærulei; an femina carnuti?

novæ. 83. Pf. viridis, fronte purpurea, vertice badio, stria a basi rostri per oculos ducta rubra, rectricibus cæruleis, intermediarum duarum margine viridi, uropygio rubro.

Seelandia.

Red rumped Parrot. *Latham syn.* I. 1. p. 249. n. 50.

Habitat in nova Seelandia, 15 pollices longus.

Rostrum profunde cæruleum apice nigrum; in cervice pennæ nonnullæ pallide flavæ, in dorsi medio ex pallide ferrugineo fusæ; tempora pallide viridia; abdomen ex cinereo viride; remiges primariæ fusæ, margine cæruleiscenti, secundariæ & alæ spuria obscuræ margine viridi & apice pallide ferrugineo; pedes nigri.

novæ. 84. Pf. olivaceus, capite cristato & gula flavis, macula pone
Hollan- oculos rubra, fascia alarum obliqua alba.

diæ.

Crested Parrakeet. *Latham syn.* I. 1. p. 250. n. 51.

Habitat in nova Hollandia, 12 pollices longus.

Rostrum pallidum; crista pennæ 6 gracilibus, quarum 2 pollices 3 fere longæ, reliquæ breviores; pedes obscuri; femina caput & corpus magis in badium vergunt; uropygio & cauda lineis transversis griseis picta.

ulietanus. 85. Pf. olivaceus, capite ex atro fusco, uropygio obscure
rubro, alis caudaque obscuris.

Society Parrot. *Latham syn.* I. 1. p. 250. n. 52.

Habitat in Ulietea, 10½ pollices longus.

Rostrum ex atro cæruleum, apice nigrum; pennæ margine obscuro, subtus magis in flavum vergentes; pedes nigri.

multico- 86. Pf. viridis, capite, gula & abdomine cæruleis, pectore
lor. anteriore rubro, posteriore & cauda subtus lutea, torque albo.

White collared Parrot. *Gener. of birds.* p. 59. & 2. *Latham syn.* I. 1. p. 251. n. 53.

Habitat in insulis oceani indici; rostrum rubrum.

- aureus.** 87. Pf. viridis, cera orbitifque ex cærulefcente incarnatis, vertice aureo, tectricibus alarum fascia obliqua cærulea. Psittaca brasiliensis. *Briss. av. 4. p. 337. n. 61.*
 Perruche couronnée d'or. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 271.*
 Golden-crowned Parrakeet. *Edw. glean. t. 235. Latham syn. I. 1. p. 251. n. 54.*
Habitat in Brasilia.
 Rostrum nigrum; irides aurantiæ; gula ex flavicante viridis, rubro admisto; pedes rubicundi; ungues nigricantes.
- lineatus.** 48. Pf. viridis, remigibus subtus fuscis, margine interiore pallidis.
 Magnitudo turturis; color subtus magis in flavum vergens; alæ subtus lineis pallidis longitudinalibus tenuissimis; cauda corpore longior.
- pacificus.** 88. Pf. viridis fronte & macula pone oculos & utrumque ad uropygium rubra, alarum margine exteriori cæruleo, cauda subtus cinerea.
 Pacific Parrakeet. *Latham syn. I. 1. p. 252. n. 56.*
 β. Pf. macula ad uropygium nulla.
 γ. Pf. uropygium rubro.
 δ. Pf. vertice flavo.
Habitat in insulis maris pacifici, 12 pollices longus.
 Rostrum argenteum, apice nigro; pedes fusi; ungues nigri.
- palmarum.** 89. Pf. viridis, rostro pedibusque rubris, remigum apice & margine atro.
 Palm Parrot. *Latham syn. I. 1. p. 253. n. 57.*
Habitat in insula Tanna, palmas frequentans, 8 pollices longus.
 Color subtus magis pallidus, in abdomine & caudæ apice in flavum vergens.
- australis.** 90. Pf. viridis, vertice cæruleo pennis elongatis cristato, gula & abdomine medio rubris, femoribus purpureis.
 Blue crested Parrakeet. *Latham syn. I. 1. p. 254. n. 58.*
Habitat in insulis Sandwich, 6½ pollices longus.
 Rostrum aurantium; frons pallide viridis; rectrices 2 intermediæ virides, apice flavo; reliquæ flavicantes, margine & apice viridi; pedes obscuri; ungues nigri.
- taitianus.** 91. Pf. cæruleus, capitis pennis elongatis, gula juguloque albis, rostro pedibusque rubris.
 Arimanon. *Buffon hist. nat. des ois. 6. p. 173.*

AVES PICÆ. *Plittacus*.

Petite Perruche de l'île de Taiti. *Buffon planch. enlum.*
n. 455. f. 2.

Otaheitian blue Parrakeet. *Latham syn. I. I. p. 255. n. 59.*
Habitat in insula Taiti, sonorus, frequens, musæ fructibus
viçitans, longitudine 5 pollices parum excedens.

pygmæus. 92. Pf. viridis, pennarum apice ex virecente flavo, remi-
gibus intus obscuris.

Pygmy Parrakeet. *Latham syn. I. I. p. 256. n. 60.*
Habitat in insulis maris australis, 6 pollices longus.
Rostrum albicans; cera obscura; pedes plumbei.

agilis. 20. Pf. viridis, tectricibus remigum primorum cærulescen-
tium falvis, cauda vix elongata subtus rubra, orbitis
cinereis.

Plittacus cayenensis. Briss. av. 4. p. 227. n. 23.

Criq. *Buffon hist. nat. des ois. 6. p. 228.*

Criq de Cayenne. *Buffon pl. enlum. n. 839.*

Little green Parrot. *Edw. av. 4. t. 168.*

Agile Parrot. *Latham syn. I. I. p. 297. n. 101.*

Habitat in America, 10½ pollices longus, coccothrauxiæ
magnitudine.

Rostrum pedes cinerea; irides badia; remiges intus &
apice nigra; rectrices 2 intermediæ virides; 3 proximæ
intus ½ longitudinis rubrae.

* * *Brachyuri, cauda æquali.*

coronatus. 21. Pf. viridis, crista plicatili rubra apice cærulea.

Cockatoo of Gujana. *Bancr. Guj. p. 160.*

Crowned Cockatoo. *Latham syn. I. I. p. 259. n. 65.*

Habitat in Surinamo & Gujana, cristati magnitudine.

Frons flava; crista coccinea, apice lucide cæruleo; rectri-
ces extimæ latere exteriori cæruleæ; crissum rubrum,
pennarum apice cæruleo.

aterrimus. 93. Pf. niger, crista magna dilutiore, genis rubris nudis.

Kakatoës noir. *Buffon hist. nat. des ois. 6. p. 97.*

Great black Cockatoo. *Edw. glean. t. 316.*

Black Cockatoo. *Latham syn. V. I. p. 260. n. 66.*

Habitat in nova Hollandia. Magnitudine Macao.

Rostrum obscure fuscum; pedes ex fusco nigri.

sulphureus. 94. Pf. albus, crista plicatili acuminatâ, & macula infra
oculos sulphureis.

Cacatua luteo-cristata. *Briss. av. 4. p. 206. n. 9.*

Kakatoës à huppe jaune. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 93.

pl. enlum. n. 14.

Crested Parrot or Cockatoo. *Albin. av.* 3. t. 12.

Lesser white Cockatoo. *Edw. glean. t.* 317. *Lath. syn.*

I. I. p. 258. n. 64.

Habitat in insulis Moluccis, $14\frac{1}{2}$ pollices longus.

Rostrum & cera nigricant; irides rubent; color subtus in sulphureum inclinans; pedes nigri.

philippinarum. 95. *Pf. albus*, crista sulphurea plicatili apice alba, orbitis ex flavicante rubris, rectricibus caudæ inferioribus rubris albo punctatis.

Cacatua minor. Briss. av. 4. p. 212. n. 11. t. 22. f. 1.

Petit Kakatoës à bec couleur de chair. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 96.

Petit Kakatoës des Philippines. *Buff. pl. enlum.* n. 191.

Red-vented Cockatoo. *Brown illust. p.* 10. t. 5. *Latham syn.* I. I. p. 258. n. 63.

Habitat in insulis Philippinis, $13\frac{1}{2}$ pollices longus.

Rostrum album, basi ut plurimum cinereum; cera grisea; orbitæ ex flavicante rubræ; crista penne longissima sesquipollicares; inferiorum aliquæ pallide rubræ; rectrices 2 intermediæ albæ, laterales intus ad medium usque sulphureæ; pedes & ungues plumbei.

molucentia. 96. *Pf. albus* in colorem dilute roseum inclinans, crista subtus rubra, rectricibus lateralibus intus a basi ad medium usque sulphureis.

Cacatua rubro cristata. Briss. av. 4. p. 209. n. 10.

Kakatoës à huppe rouge. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 95. *pl. enlum.* n. 498.

Greater Cockatoo. *Edw. av.* 4. t. 160.

Great red-crested Cockatoo. *Lath. syn.* I. I. p. 257. n. 62.

Habitat in insulis Moluccis, $17\frac{1}{2}$ pollices longus.

Rostrum ex cæruleo nigrum; cera & ungues nigra; orbitæ griseæ; irides rubræ; crista $6\frac{1}{2}$ pollices longa; pedes plumbei.

cristatus. 22. *Pf. albus*, crista plicatili flava.

Cacatua. Briss. av. 4. p. 204. n. 8. t. 21.

Plittacus albus cristatus. Aldrov. orn. l. 11. c. 4. *Raj. av.* p. 30. n. 1.

Kakatoës à huppe blanche. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 92.

Kakatoës des Moluques. *Buff. pl. enlum.* n. 263.

White crested Parrot of Aldrovandus. *Albin. av.* 3. p. 12.
t. 12. *Will. orn.* p. 112. t. 15.

Great white Cockatoo. *Lath. syn.* I. 1. p. 256. n. 61.
Habitat in insulis Moluccis, 18 pollices longus.

Rostrum, cera, irides, pedes & ungues nigra; orbitæ nuda & alba; remiges & laterales rectrices a basi ad medium intus sulphureæ; cervicis penna laxa & fluctuantes; crista 5 pollices longa, uti 92-96 pupæ plicatilis, tegens verticis calvitium pennæ duplici serie, sed alternatim connivente imbricatis, quas erigit affectu quovis excitatus.

erythro- 23. *Pf. cinereus, uropygio, rectricibus remigibusque coccineis.*
leucus. *Pittacus erythroleucus. Aldrov. orn.* I. p. 675. *Raj. av.*
p. 31. n. 7.

Cacatua alis & cauda rubris. *Briss. av.* 4. p. 214. n. 12.
Kakatoës à ailes & queue rouges. *Buff. hist. nat. des ois.*
6. p. 96.

Red and white Parrot. *Will. orn.* p. 114. n. 8. *Lath. syn.*
I. 1. p. 260. n. 67.

Magnitudo gallinæ; longitudo 17 pollicum; rostrum & ungues nigra; dorsi pars inferior punicea; pedes nigricantes.

eritha- 24. *Pf. canus, temporibus nudis albis, cauda coccinea. Musc.*
cus. *Ad. Frid.* I. p. 14. *Scop. ann.* I. p. 31. n. 30.

Pittacus guineensis cinereus. Briss. av. 4. p. 310. n. 49.
Pittacus cinereus f. subcæruleus. Aldr. orn. I. p. 675. t. 676.

Raj. av. p. 31. n. 8.

Perroquet cendré ou Jaco. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 100.
pl. enlum. n. 311.

Ash-coloured Parrot. *Will. orn.* p. 114. n. 7. *Albin. av.* I.
t. 12. *Lath. syn.* I. 1. p. 261. n. 68.

Grauer Papagay mit rothem Schwanz. *Frisch. av.* t. 51.

β. *Pittacus alis rubris. Briss. av.* 4. p. 313. n. 49. A.

γ. *Pittacus rubro-varius. Briss. av.* 4. p. 313. n. 49. B.

Ash-coloured and red Parrot. *Edw. av.* 4. t. 163.

δ. *Pittacus ruber, capite cinereo, genis nudis, remigibus primariis ex cinereo fuscis. Scopol. ann.* I. p. 32. n. 31.

Habitat in Africa occidentali, 20 pollices longus, loquax varias modulatur gutture voces, scurrili strepitu, quicquid & audit, ait.

Rostrum nigrum; cera alba; irides ex flavicante albæ; pedes cinerei; ungues nigricantes.

- cinereus.** 97. *Ps.* totus ex cærulescente cinereus.
Psittacus brasiliensis cinereus. Briss. av. 4. p. 313. n. 50.
Maracana. Will. orn. p. 112. n. 5.
Maracana Brasiliensibus, prima Maregravii. Raj. av. p. 29. n. 4.
Cinereous Parrot. Lath. syn. I. 1. p. 263. n. 69.
Habitat in Guinea, erithaco major.
- meridio-nalis.** 98. *Ps.* supra ex virescente cinereus, subtus spadiceus, orbitis, vertice, occipite & cervice cinereis, pennarum apice fusco.
Southern brown Parrot. Lath. syn. I. 1. p. 264. n. 70.
Habitat in nova Seelandia, 16 pollices longus.
Rostrum ex cæruleo nigrum; pedes nigri.
- malacari-nus.** 49. *Ps.* cinereus capistro subtus nigro, orbitis nudis rubicundis, rectricibus lateralibus basi albicantibus. *Mantiss. 1771. p. 524. Briss. av. 4. p. 315. n. 52.*
Malacarin. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 120. t. 5. pl. entum. n. 35.
Malacarine Parrot. Lath. syn. I. 1. p. 265. n. 72.
Habitat in Malacarin, 13½ pollices longus.
Rostrum, cera & pedes rubicunda; vertex & cervix pallidiores; ungues grisei.
- fuscus.** 99. *Ps.* totus ex cinereo fuscus. *Briss. av. 4. p. 314. n. 51.*
Brown Parrot. Lat. syn. I. 1. p. 266. n. 73.
Longitudo 13½ pollicum.
- garrulus.** 25. *Ps.* ruber, orbitis, cinereis, genis alisque viridibus, rectricibus medietate postica cæruleis. *Mus. Ad. Frid. 2. p. 14.*
Psittacus ruber, remigibus rectricibusque introrsum purpureis. It. wgoth. 137.
Lorius ceramenfis. Briss. av. 4. p. 215. n. 13.
Lory. Raj. av. p. 151. n. 5.
Purple Parrot. Charlet. exerc. p. 75. n. 16.
Scarlet Parrakeeto with green and black Wings. Will. orn. p. 117.
Lory de Ceram. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 129. var. 2.
Ceram Lory. Lath. syn. I. 1. p. 269. n. 76.
Ganz rother Papagay. Frisch. av. t. 45.
- aurora.** β. *Ps.* coccineus, alis viridibus nigrisque, rectricibus flavis, medietate postica virescentibus. *Syst. nat. 10. n. 22.*
Psittacus coccineus orientalis, alis ex viridi & nigro variis.
Raj. av. p. 31. n. 9.
Noira variété. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 129. n. 1.

moluccensis.

- γ. *Psittacus* *humeris luteo-maculatis*. *Briss. av.* 4. p. 219.
n. 14. t. 23. f. 1.

Lori Noira. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 127.

Lori des Moluques. *Buffon pl. enlum.* n. 216.

Scarlet Lori. *Edw. av.* 4. t. 172. *Lath. syn.* I. 1. p. 270. n. 76. B.

- β. *Psittacus* *testricibus alarum plurimis cæruleo punctatis*.
Habitat in insulis Moluccis, 10½ pollices longus.

Rostrum aurantium; cera cinerea; irides flava; pedes fusi, in β. nigri; ungues nigri; testricibus alarum minores & inferiores ex flavo & viridi varia; β. virides; γ. primo flava, tum virides, dein virides flavo punctata; alæ spuria violacea; remiges majores, obscure virides intus coccinea, apice cinerea; in β. nigra, extrorsum virides, subtus obscura; in γ. obscure virides, in cæruleum vergentes. Rectrices intermediae basi virides, tum rubrae punctis viridibus, proximæ $\frac{2}{3}$ longitudinis rubrae, tum virides, reliquæ basi coccinea, tum violacea punctis obscure viridibus; in β. exterior pars caudæ flava, apex ex flavo viridis; in γ. rectrices omnes subtus ex rubro flava.

domicel-26. *Pf. ruber*, pileo violaceo, alis viridibus, humeris genibusque cæruleis, orbitis fuscis.

Lorius orientalis indicus. *Briss. av.* 4. p. 22. n. 15. t. 24. f. 1.

Lory des Indes orientales. *Buff. pl. enlum.* n. 84.

Lori à collier. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 130.

Second black-cap Lory. *Edw. av.* 4. t. 171.

Purple-capped Lory. *Lath. syn.* I. 1. p. 271. n. 77.

- β. *Psittacus* pileo cæruleo.

Lorius torquatus indicus. *Briss. av.* 4. p. 130. n. 18.

Lori à collier. *Buffon hist. nat. des ois.* 6. p. 131.

Lori mâle des Indes orientales. *Buff. pl. enlum.* n. 119.

Laurey from the Brâsils. *Albin. av.* I. t. 13.

Habitat in insulis Moluccis & nova Guinea, docilis, distincte loquens, 11 fere pollices longus.

Rostrum rubrum, in β. flavicans; cera cinerea; orbitæ β. nigra; irides flava; lunula ad pectus, β. torques flavus, β. dorso, uropygio & abdomine ex albo & roseo mistis; β. cauda purpurea, testricibus ejus ex albo & rubro variis; β. remiges cærulea, minores cum testricibus ex flavicante virides; pedes subatri; ungues nigri.

- Lory.** 27. *Pf. purpureus*, pileo violaceo, alis viridibus, pectore, genibus caudaque cæruleis, orbitis subincarnatis.
Lorius philippensis. Buff. av. 4. p. 225. n. 16. t. 23. f. 2.

Lori tricolor. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 132.

Lory des Philippines. Buff. pl. enlum. n. 168.

First black cap Lory. Edw. av. 4. t. 170.

Black-capped Lory. Lath. syn. I. 1. p. 273. n. 78.

Habitat in insula Yolo & reliquis Philippinis, 10½ pollices longus.

Rostrum & irides aurantia; cera cinerea; rectrices partim rubra, partim virides, exteriores margine extremo violaceæ; pedes nigricantes.

- pusiceus.** 100. *Pf. saturate coccineus*, subtus violaceus, testricibus alarum minoribus & inferioribus, remigibusque intus & subtus ex nigricante fuscis.

Lorius amboinensis. Buff. av. 4. p. 231. n. 19.

Lory d'Amboine. Buff. pl. enlum. n. 518.

Lori Cramoisi. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 133.

Blue breasted Parrot. Brown's illustr. t. 6.

Crimson Lory. Lath. syn. I. 1. p. 273. n. 79.

Habitat in Amboina, 11½ pollices longus.

Rostrum rubrum, aliquando nigrum; cera orbitæque nigricantes; irides aurantiæ; rectrices apice sordidæ rubra aut aurantiæ; pedes fusci; ungues nigri.

- ruber.** 101. *Pf. ruber*, area oculorum remigibusque nigris, alarum macula & testricibus caudæ inferioribus cyaneis, caudæ apice badio.

Lori de Gilolo. Sonner. it. p. 177. t. 112.

Lori rouge. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 134.

Lori de la Chine. Buff. pl. enlum. n. 519.

Molucca Lory. Lath. syn. I. 1. p. 274. n. 80.

- β.** *Pf. humeris, abdomine, crisso, remigum secundariorum & testricum alarum majorum apicibus cæruleis.*

Habitat in Moluccis insulis & nova Guinea, 9-10 pollices longus.

- grandis.** 102. *Pf. ruber*, subtus ex rubro, cæruleo, violaceo & viridi mistus, nucha violacea, alis cyaneis, caudæ apice flavo.

Purpur-roode Lori. Vosmaer Monogr. 1769. p. 10 t. 7.

Lori de la nouvelle Guinée. Buff. pl. enlum. n. 683.

Grand Lori. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 135. Lath. syn.

I. 1. p. 275. n. 81.

AVES PICÆ. *Pittacus*.

pittacus corpore supra ex fusco & viridi vario, subtus cæruleo, alarum margine & rectricibus alarum inferioribus cæruleis, cauda badia.

Habitat in Zeylona, 13 pollices longus. Rostrum nigrum.

guineen-103. *Pf.* capite colloque coccineis, superciliis & pectore flavescens, alis ex luteo virentibus apice cæruleis, abdomine, uropygio caudaque subtus canis, apice coccineis. *Miller illustr. t. XXIX.*

Yellow-breasted Lory. *Lath. syn. I. 1. p. 276. n. 82.*

Habitat in Guinea, 10 pollices longus.

Rostrum nigrum; cera, gula, & orbitæ albæ; ungues nigri.

paragua-104. *Pf.* coccineus, capite, cervice, crisso, cauda, humeris alisque nigris.

Lorius brasiliensis. *Briss. av. 4 p. 229. n. 17.*

Paragua. *Raj. av. p. 33. n. 4. Will. orn. p. 115. n. 9.*

Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 248.

Paraguan Lory. *Lath. syn. I. 1. p. 277. n. 83.*

Habitat in Brasilia? Rostrum cinereum; irides rubræ.

niger. 29. *Pf.* cauda elongata æquali, corpore cærulescente nigro, rostro orbitisque albidis.

Pittacus madagascariensis niger. Briss. av. 4. p. 317. n. 53.

Vasa ou Perroquet noir. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 119. t. 4.*

Perroquet noir de Madagascar. *Buff. pl. enlum. n. 500.*

Black Parrot of Madagascar. *Edw. av. I. t. 5.*

Black Parrot. *Lath. syn. I. 1. p. 264. n. 71.*

Habitat in Madagascar; 13½ pollices longus.

Rostrum rubicundum; irides fuscæ; pedes carnei; ungues nigri.

cæruleo-28. *Pf.* cæruleus, ventre, uropygio caudaque viridibus, vertice flavo, remigibus rectricibusque rubris.

Pittacus gujanensis cæruleus. Briss. av. 4. p. 304. n. 46.

Pittacus versicolor f. erythrocyanus. Aldr. orn. I. p. 675.

Raj. av. p. 31. n. 6.

Crik rouge & bleu. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 226.*

Red and blue Parrot. *Will. orn. p. 114. n. 6. Lath. syn.*

I. 1. p. 277. n. 84.

Habitat in Gujana, 9 pollices longus.

Rostrum nigricans; orbitæ nudæ, albida; irides flavæ; pedes ex rubro grisei.

varius. 105. Ps. ex fusco & cyaneo varius, genis, gula juguloque albicantibus, remigibus rectricibusque obscure fuscis; latere exteriori cyaneis: *Maëter phys. Arb. der eintr. Fr. zu Wien. I. 2. p. 48.*

Habitat in America australi; parum ultra 5 pollices longus; rostro pedibusque flavescentibus, unguibus nigris.

violaceus. 106. Ps. violaceus viridi & nigro-admixto varius, dorso ex fusco viridi, remigibus majoribus nigris, reliquis ex luteo, viridi & rubro variis, tectricum macula rosea: Psittacus aquatum Lupiarum insulæ. *Briss. av. 4. p. 302. n. 44.*

Crick à tête violette. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 233.

Perroquet de la Guadeloupe, du Tetre antill. 2. p. 250. fig. p. 246.

Ruff. necked Parrot. Lath. syn. I. 1. p. 268. n. 75.

Habitat in insula aquarum Lupiarum.

Rostrum & orbitæ incarnata.

fringilla- 107. Ps. viridis, capite cyaneo, genis; gula, jugulo; ceus: maculaque abdominis ex lacteo sanguineis, abdomine violaceo. *Maëter phys. Arb. der eintr. Fr. zu Wien. I. 2. p. 47.*

Habitat in America australi, fringillæ magnitudine, 6 pollices longitudine superans. Rectrices latere interiori & apice; rostrum & pedes pallide lutea; ungues subfusci.

choræus. 108. Ps. viridis, subtus cinereus, orbitis incarnatis. *Molina hist. nat. Chil. p. 228.*

Habitat in Chili, moribus & visu cum Jaquilma conveniens:

sinensis. 109. Ps. viridis, alarum tectricibus inferioribus rubris, majoribus nonnullis & margine cæruleis, cauda subtus fusca. Psittacus sinensis. *Briss. av. 4. p. 291. n. 39.*

Perroquet de la Chine. Buff. pl. enlum. n. 514.

Perroquet vert. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 116.

Grand Perroquet vert de la nouvelle Guinée. Sonner. it. p. 174. t. 108.

Green and red Parrot from China. Edw. glean. t. 231.

Lath. syn. I. 1. p. 278. n. 85.

Habitat in Sina australi, Amboina, nova Guinea, gallinæ magnitudine.

Cera nulla; orbitæ non nude; mandibula inferior nigra; superior rubra, apice flavicans; irides aurantiæ; pedes & ungues nigri.

macro- 110. Pf. viridis subtus in flavum vergens, alis ex cyaneo & rhynchos. - viridi mistis tectricibus nigris.

Perroquet à bec couleur de sang. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 122.*

Perroquet de la nouvelle Guinée. *Buff. pl. enlum. n. 713.*

Great billed Parrot. *Lath. syn. I. 1. p. 278. n. 86.*

Habitat in nova Guinea, 14 pollices longus.

Rostrum magnum, sanguineum.

grami-
neus.

111. Pf. viridis, subtus olivaceus, fronte & vertice cæruleis, cauda subtius flava.

Grand Perroquet vert à tête bleue. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 122.*

Perroquet d'Amboine. *Buff. pl. enlum. n. 862.*

Amboina Parrot. *Lath. syn. I. 1. p. 279. n. 87.*

Habitat in Amboina, 16 pollices longus. Pedes plumbei.

leucoce-
phalus.

30. Pf. viridis, remigibus cæruleis, fronte alba, orbitis niveis.

Pſittacus martinicanus. *Briss. av. 4. p. 242. n. 26.*

Amazone à tête blanche. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 212. t. 9.*

Perroquet à front blanc du Sénégal. *Buff. pl. enlum. n. 335.*

White-headed Parrot. *Edw. av. 4. t. 166.*

White-fronted Parrot. *Lath. syn. I. 1. p. 279. n. 88.*

β. Pſittacus martinicanus gutture rubro. *Briss. av. 4. p. 244. n. 27.*

Pſittacus leucocephalus. *Aldr. orn. I. p. 670. Raj. av. p. 31. n. 5. p. 181. n. 7.*

Amazone à tête blanche. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 221. var.*

Perroquet de la Martinique. *Buff. pl. enlum. n. 549.*

White-headed Parrot. *Will. orn. p. 113. n. 5. Lath. syn. I. 1. p. 280. n. 88. A.*

γ. Pſittacus capite a fronte ad verticem albo, ceterum pallide cæruleo.

White crowned Parrot. *Lath. syn. I. 1. p. 281. n. 88. B.*

δ. Pſittacus martinicanus cyanocephalus. *Briss. av. 4. p. 251. n. 29.*

Papagai à ventre pourpre. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 242.*

Papagai à ventre pourpre de la Martinique. *Buff. pl. enlum. n. 548.*

Alb crowned Parrot. *Latham syn. I. 1. p. 281. n. 88. C.*

Habitat in insula Martinica, β. etiam in Jamaica, & in nova Hispania.

Corpus magnitudine columbæ, viride, pennarum margine fusco aut rubro; caput supra & ad latera cæruleum, iris

β. postice viride; gula tota rubra, in *γ. & δ. viridis*; remiges nigra latere exteriore denudato cærulea; rectrices æquales virides, basi rubra, apice flavescentes; at *1, 1* latere exteriore cæruleo, *6, 6* unicolores; abdomen postice non raro ferrugineum.

ochro- 112. *Pf. viridis*, vertice flavo, tectricibus alarum rubris, remigibus ex viridi, nigro, violaceo & rubro variis; cephalus, tectricibus duabus extimis basi intus rubris.

Pittacus amazonicus brasiliensis. Briss. av. 4. p. 272. n. 35. t. 26. f. 1.

Amazoné à tête jaune. *Buffon hist. nat. des ois. 6. p. 208.*
Yellow-headed Amazons Parrot. *Latham syn. 1. 1. p. 282. n. 89.*

β. Amazone à tête jaune, var. 1. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 209.
Pêroquet vert & rouge de Cayenne. *Buff. plâch. enlum. n. 312.*

γ. Pittacus poikilorhynchos Aldrovandi. Raj. av. p. 30. n. 3.
Pittacus amazonicus poikilorhynchos. Briss. av. 4. p. 270. n. 34.

Amazoné à tête jaune, var. 2. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 210.*

Aldrovandus his Parrot, with a parti-coloured bill.
Will. orn. p. 113.

Habitat in America australi, γ. ad 18 pollices longus.
Rostrum cinereum, basi rubrum; in *β. rubens*; in *γ. mandibula superior supra ex cærulescente viridis, lateribus ochracea, apice macula alba, inferior plumbea, medio flava; irides flava; vertex in β. macula tantum flava; pedes plumbei; ungues nigri.*

barba- 113. *Pf. viridis*, orbitis & fronte cinereis, vertice, genis, gula, denfis, jugulo, alarumque tectricibus minoribus flavis, majoribus cæruleis, remigibus primariis multis extus violaceis, reliquis a basi ad medium rubris, cetera cæruleis.
Ashfronted Parrot. *Lath. syn. 1. 1. p. 284. n. 90.*

Habitat in Barbados, columbae magnitudinē.

Rostrum corneum; pedes cinerei; ungues nigri.

lucionen- 31. *Pf. viridis*, occipite uropygioque cæruleis, alis nigro, fis, cæruleo rubroque notatis.

Pittacus lucionensis. Briss. av. 4. p. 295. n. 41. t. 22. f. 2.
Manilla Green Parrot. *Lath. syn. 1. 1. p. 296. n. 98.*

AVES PICÆ. *Psittacus*.

Habitat in insula Luzonia, columbæ magnitudine, 12½ pollices longus.

Rostrum coccineum, apice album; cera rubens; pedes cinerei; ungues nigrescentes.

æstivus. 32. *Ps. viridis luteo-submaculatus, fronte cærulea, humeris sanguineis, orbitis incarnatis.*

Psittacus amazonicus. Briss. av. 4. p. 256. n. 31.

Ajuru-curaou. Raj. av. p. 32. n. 1. Marcgr. bras. 205.

Aourou-couraou. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 215.

Perroquet Amazone. Buff. planch. enlum. n. 547.

Marcgravius middle-sized Parrot, 1st species. Will. orn. p. 115.

Common Amazons Parrot. Lath. syn. I. 1. p. 284. n. 91.

β. *Psittacus jamaicensis icterocephalos. Briss. av. 4. p. 233. n. 20.*

Psittacus viridis melanorhynchos. Aldrov. av. l. II. c. 7.

Raj. av. p. 30. n. 4.

Aourou-couraou, var. 1. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 216.

Black-billed green Parrot of Aldrovandus. Will. orn. p.

113. n. 4.

Jamaica-Parrot. Brown. jam. p. 473. Lath. syn. I. 1.

p. 285. n. 91. A.

γ. *Psittacus amazonicus jamaicensis. Briss. av. 4. p. 276. n. 36.*

Psittacus viridis alarum costa superne rubente. Raj. av. p.

30. n. 2. p. 181. n. 6.

Aourou-couraou, var. 2. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 217.

Common green Parrot with the ridge of the wing red.

Will. orn. p. 113. n. 2.

Main Parrot. Brown. jam. p. 472. Lath. syn. I. 1. p. 285.

n. 91. B.

δ. *Psittacus brasiliensis cyanocephalos. Briss. av. 4. p. 234. n. 21.*

Aourou-couraou, var. 3. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 219.

Ajuru-curaou. Raj. av. p. 33. n. 3. Will. orn. p. 115.

fed. 9.

Blue-topped Parrot. Lath. syn. I. 1. p. 286. n. 91. C.

ε. *Psittacus amazonicus varius. Briss. av. 4. p. 281. n. 37. t. 26. f. 2.*

Ajurucuraou 2. Marcgr. bras. 205.

Aourou-couraou, var. 4. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 219.

Psittacus major, seu mediæ magnitudinis, Marcgr. 2.

species. Raj. av. p. 33. n. 2.

Second species of Marcgrave. Will. orn. p. 115. f. 9.

Great green Parrot from the Westindies. Edw. av. 4. t. 162.

Habitat in America australi.

Corpus magnitudine columbæ, dorso adperso pennis fulvis; facies flava; frons cærulea; vertex albidus, in ♂. cæruleus, macula flava; rectrices apice pallidiores; 1, 2, 3, basi interiori rubræ; at 1 latere etiam exteriore cærulea; humeri fulvi vel sanguinei; remiges primores nigræ apice cærulescentes latere interiore nigræ, exteriore virides; secundariæ anteriores latere exteriore versus basin rubræ; rostrum, saltem apice nigrum, & cinereum.

- amazo- 33. Pf. subvirescens, fronte flava, temporibus fulvis.
nius, *Pittacus amazonicus* fronte lutea. *Briss. av.* 4. p. 261. n. 32.
Aourou-couraou, var. 5. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 221.
Brazilian yellow-fronted Parrot. *Latham syn.* 1. 1. p. 287. n. 91. E.

Habitat in Brasilia & Amazonum terra, æstivo valde affinis, forte varietas, sed duplo major. Remiges exteriores cæruleæ, medio rubræ; rectrices extimæ medio exteriore cæruleæ; laterales interiori latere rubræ.

- luteus. 114. Pf. viridis, vertice cyaneo, humeris flavis, rectricibus alarum majoribus macula aurantia.
Yellow shouldered Parrot. *Lath. syn.* 1. 1. p. 288. n. 92.
Habitat in America meridionali, 11 pollices longus.

- ochro- 115. Pf. viridis, fronte orbitisque albidis, vertice, genis, gula, jugulo, rectricibusque alarum remotioribus flavis.
pterus. *Pittacus amazonicus*, gutture luteo. *Briss. av.* 4. p. 287. n. 38.
Crick à tête & gorge jaune. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 222.
Yellow-headed Creature. *Bancr. Gujan.* p. 159.
Yellow-winged Parrot. *Lath. syn.* 1. 1. p. 289. n. 93.
Habitat in America australi, 13 pollices longus, minus docilis.

Rostrum albidum; pennæ corporis superiores margine nigro; rectrices alarum minores corpori proximæ rubræ, margine flavo; remiges nigræ, nonnullæ margine cæruleo & viridi; mediæ & basi intus rubræ; rectrices & intermedia apice flavicantes; proximæ tres basi ad medium usque rubræ; extimæ margine exteriori cæruleæ; pedes cinerei.

- pulveru- 116. Pf. viridis & supra quasi farina conspersus, capitis macula flava, alarum rubra.
lentus. Meunier ou Crick poudré. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 223.

AYES PICÆ. *Psittacus*.

- Mennier de Cayenne. *Buff. pl. enlum. n.* 861.
 Meally green Parrot. *Lath. syn. I. 1. p.* 291. *n.* 94.
Habitat in Cayenna, distinde garriens, americanorum maximus.
 Rostrum *ex albedo corneum*; pennæ faciei margine ob-
soleto fusco; remiges *extrorsum nigra*.

havanen- 117. *Pf. viridis, fronte, gula & jugulo ex cinereo cæruleis,*
sis, pectoris macula magna rubra, orbitis cinereis.
Psittacus amazonicus gutture cæruleo. Briss. av. 4. p. 266.
n. 33. t. 25. f. 1.
 Crick à face bleue. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p.* 227.
 Perroquet de la Havane. *Buff. pl. enlum. n.* 360.
 Blue-fronted Parrot. *Lath. syn. I. 1. p.* 291. *n.* 95.
Habitat Havanæ, 12 pollices longus.
Pennæ supra apice nigro; subtus cærulescente; remiges
majorés nigra; pedes grisei.

paradisi. 34. *Pf. luteus, gula, ventre, rectricumque basi rubris.*
Psittacus luteus insulæ Cubæ. Briss. av. 4. p. 308. *n.* 48.
 Papagai de Paradis. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p.* 237.
 Perroquet de Cuba. *Buff. pl. enlum. n.* 336.
 Cuba Parrot. *Brown. jam. p.* 473.
 Parrot of Paradise of Cuba. *Catesb. carol. I. t.* 10.
 Paradis Parrot. *Lath. syn. I. 1. p.* 300. *n.* 105.
Habitat in Cuba, 12½ pollices circiter longus.
 Rostrum, *pedes nudæque orbitæ alba; irides rubra; remi-*
gines majores alba; rectrices 2 intermediæ tota, re-
liquæ extrema tertia parte flava, ceterum rubra.

aurora. 50. *Pf. flavus, axillis, alarum marginibus, remigibusque ma-*
ioribus extrorsum in medio rubris. Manr. 1771. p. 524.
Psittacus luteus. Briss. av. 4. p. 306. *n.* 47.
 Perroquet jaune. *Salern. orn. p.* 69. *n. 9. t. 7. f. 2. Buff.*
pl. enlum. n. 13.
 Amazone jaune. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p.* 214. *t.* 10.
 Aurora-Parrot. *Lath. syn. I. 1. p.* 301. *n.* 106.
Habitat in Brasilia, æstivo aqualis, 12 pollices longus.
 Rostrum, *cera, pedes & ungues alba; palpebræ & irides*
rubra; cauda rotundata; rectrices 4 extremæ a basi ad
medium intus rubra.

passeri- 47. *Pf. luteo-virens, macula alarum alisque subtus cæruleis.*
Mus. Ad. Frid. 1. p. 14. *2. p.* 16.
Psittacula brasiliensis. Briss. av. 4. p. 384. *n.* 81.

Tuete. Raj. av. p. 34. n. 6. Will. orn. p. 116. c. 14. n. 6.

Été ou Toni-été. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 283.

Least green and blue Parrakeet. Edw. glean. t. 235.

Short tailed yellowish green Parroquet. Bancr. Gujan, p. 162.

Little blue and green Parrakeet. Latham. syn. I. 1. p. 319. n. 127.

Habitat in Brasilia & Gujana, passeris magnitudine, 4 pollices longus.

Rostrum, cera, orbitæ, pedes & ungues aurantia; remiges subtus, & tectrices alarum primariæ cæruleæ.

cyanolys- 118. Ps. luteo-virens, collari cæruleo, uropygio rubro. seos. Molin. hist. nat. Chil. p. 227.

Habitat in regno Chilensi, columba paulo major, segetibus valde infesta; in abyssis præcipitibus nidificans, & ova plerumque bina alba, columbinis æqualia ponens, docilis & mansuetus; caro esculenta, junioris sapidissima.

sordidus. 40. Ps. subfuscus, gula cærulea, alis caudaque viridibus, rostro crissoque rubris.

Psittacus novæ Hispaniæ. Briss. av. 4. p. 303. n. 45.

Papagai brun. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 246.

Dusky Parrot. Edw. av. 4. t. 167. Lath. syn. I. 1. p. 304. n. 110.

Habitat in nova Hispania, collarii magnitudine.

Cera nigricans; orbitæ nudæ, pallide cinereæ; irides badiæ; tempora, occiput, uropygium, & cauda supra virescentia; tectrices caudæ inferiores rubræ; pedes plumbei; ungues nigri.

dominicensis. 119. Ps. viridis, frontis fascia rubra, cervicis dorsique lunulis higris, remigibus cæruleis.

Papagai à bandeau rouge. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 241.

Perroquet de S. Domingue. Buff. pl. enlum. n. 792.

Red banded Parrot. Lath. syn. I. 1. p. 300. n. 104.

Habitat in insula S. Dominici, 9½ pollices longus.

Rostrum pallide incarnatum; pedes cinerei.

erythropterus. 120. Ps. viridis, orbitis nigricantibus, dorsi medio nigro, inferiore parte cærulea, tectricibus alarum rubris.

Crimson winged Parrot. Lath. syn. I. 1. p. 299. n. 103.

Longitudo 10 pollicum; rostrum rubrum; cera & pedes sordida; cauda paulo longior.

festivus. 35. *Pf. viridis*, fronte purpurascens, superciliis gulaque cæruleis, dorso sanguineo.

Tavoua. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 240.

Perroquet tahué de Cayenne. *Buff. pl. entom.* n. 840.

Festive Parrot. *Lath. syn.* I. 1. p. 298. n. 102.

Habitat in Gujana, agilissimus, sed ferox & ingratus, columbæ magnitudine, 11 pollices longus.

Rostrium plumbeum, apice nigro; cera ex griseo nigra; irides crocæ; pedes cinerei; ungues nigri.

robustus. 121. *Pf. viridis*, capite cinerascens, alarum rectricibus sordide nigris margine viridibus, remigibus rectricibusque fuscis. alarum macula rubra.

Robust Parrot. *Lath. syn.* I. 1. p. 296. n. 106.

Magnitudo columbæ; longitudo 12 pollicum; rostrum magnum, album; capistrum supra nigricans; verticis penna per medium sordide striatæ; pedes sordidi.

magnus. 122. *Pf. viridis*, remigibus majoribus cæruleis, minoribus subtus rubris.

Grand Perroquet vert de la nouvelle Guinée. *Sonner. it.* p. 74. t. 108.

New-Guinea Green Parrot. *Lath. syn.* I. 1. p. 296. n. 99.

Habitat in nova Guinea æstivi magnitudine.

Mandibula superior colore auripigmenti; inferior nigra; irides flammeæ; Virredo graminea.

Taraba. 123. *Pf. viridis*, capite, gula, jugulo, pectore & rectricibus alarum minoribus rubris.

Psittacus brasiliensis erythrocephalus. Briss. av. 4. p. 240. n. 24.

Tarabe. *Raj. av.* p. 33. n. 5. *Will. orn.* p. 114. n. 9.

Tarabé ou Amazone à tête rouge. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 211.

Habitat in Brasilia.

Rostrium pedesque cinerea; ungues nigri.

brasiliensis. 36. *Pf. viridis*, facie pubra, temporibus cæruleis, orbitis cinereis.

Psittacus brasiliensis, fronte rubra. Briss. av. 4. p. 254. n. 30.

Crick à tête bleue. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 232. var. 3.

Brasilian green Parrot. *Edw. av.* 4. t. 161. *Bancr. Guj.* p. 160. *Lath. syn.* I. 1. p. 294. n. 96. C.

Habitat in Brasilia, columbæ magnitudine; an varietas autumnalis?

Color viridis flavo contaminatus ; ruber infra flexuram alæ & in exteriori latere rectricum 2, 2 ; cæruleus in latere exteriori remigum rectricumque primorum,

autum- 37. *Ps.* viridis, fronte remigumque macula coccineis, vertice
nalis. remigibusque primoribus cæruleis.

Psittacus americanus. *Briss. av.* 4. p. 293. n. 40.

Crick à tête bleue. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 232. var. 2.

Lesser green Parrot. *Edw. av.* 4. t. 164. *Bancr. Guj.* p. 160.

Autumnal Parrot. *Lath. syn.* 1. 1. p. 293. n. 96. B.

β. *Psittacus* fronte gulaque cæruleis.

Crick à tête bleue. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 230.

Blue faced green Parrot. *Edw. glean.* t. 230. *Lath. syn.*

1. 1. p. 293. n. 96.

Blue headed Creature. *Bancr. Guja.* p. 158.

γ. *Psittacus* capite ex rubro & albedo vario.

Crick à tête bleue. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 231.
var. 1.

Cocho. *Fernand. hist. nov. Hisp.* p. 38.

Habitat in Gujana.

Magnitudo columbæ ; oculorum regio cærulea ; alarum
rectrices primores cæruleæ basi rubræ ; remiges posterio-
res virides, rectrices supra virides, apice flavescētes,
extimo latere exteriori cæruleo ; subtus flavæ, basi ru-
fescētes, medio macula viridi.

accipitri- 38. *Ps.* viridis, capite griseo, collo pectoreque subviolaceo
nus. vario, remigibus rectricibusque apice cæruleis.

Psittacus varius indicus. *Briss. av.* 4. p. 300. n. 43.

Psittacus elegans. *Clus. exot.* 365. *Raj. av.* p. 32. n. II.

Perroquet varié. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 117.

Hawk-headed Parrot. *Edw. av.* 4. t. 165. *Lath. syn.* 1.

1. p. 266. n. 74.

β. *Psittacus* capitis pennis albis longis angustis nigro striatis,

Papagai maillé. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 239. t. 12.

Perroquet maillé. *Buff. pl. enlum.* n. 526.

Habitat in India, β. nunc in Gujana domesticus ; irrita-
tus pennas capitis erigit.

Magnitudo columbæ ; longitudo 12½ pollicum ; rostrum
cum cera nigricans ; orbitæ nudæ nigricantes ; irides
ex flavo badia ; pedes cum unguibus plumbei.

menstruus. 29. *Ps.* viridis, capite cærulescente, crisso rubro. *Scop.*
ann. 1. p. 33.

Psittacus gujanensis cyanocephalus. *Briss. av.* 4. p. 247. n. 28.

AVES PICÆ. *Psittacus*.

Papagai à tête & gorge bleue. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 243.*

Perroquet à tête bleue de Cayenne. *Buff. pl. enlum. n. 384.*
Blue-headed Parrot. *Edw. glean. t. 314. Lath. syn. I. 1. p. 301. n. 107.*

Habitat in Gujana, parum docilis, voce monedula. D. Bierchen.

Corpus magnitudine turturis; caput collumque cæruleus pennis fuscis apice cæruleis; dorsum & alæ virides; rectrices alarum ex flavesciente virides; remiges virides, interiori margine fusce; abdomen virens, penarum apice cærulescente; rectrices virides apice cærulescentes, sed 1, 2, 3 interiore latere a basi ad medium sanguineæ, exteriori latere totæ cæruleæ; cristum rubrum, apice penarum ex flavesciente cæruleo; rostrum corneum, mandibula superiore lateribus fuscis; oculi nigri; orbitæ ex cæruleo canescentes.

purpu- 124. *Ps. supra ex atro fuscus, subtus purpureus, vertice genisque nigris, orbitis cæruleis, torque sordide punctato, remigibus rectricibusque cæruleis.*

Perroquet violet. *Barr. Fr. équin. p. 144.*

Papagai violet. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 244.*

Perroquet varié de Cayenne. *Buff. pl. enlum. n. 408.*

Little dusky Parrot. *Edw. glean. t. 315. Lath. syn. I. 1. p. 302. n. 108.*

Habitat in Surinamo, columbæ domesticæ magnitudinis, parum docilis.

Rostrum sordidum, macula ad utrumque latus aurantia; rectrices laterales latere interiore rubicundæ, apice cæruleæ; pedes sordidi.

melano- 41. *Ps. viridis subtus luteus, pileo nigro, pectore albo, orbitis incarnatis. Mus. Ad. Frid. 2. p. 15.*

Psittacus mexicanus, pectore albo. Briss. av. 4. p. 297. n. 42.

Psittacus atricapillus. I. Fr. Miller illustr. t. 4. A.

Maipouri. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 250.*

Petite perruche Maipouri de Cayenne. *Buff. pl. enlum. n. 527.*

White breasted Parrot. *Edw. av. 4. p. 169. Lath. syn. I. 1. p. 305. n. 112.*

Habitat in nova Hispania, Gujana & Caraccas in silvis, turturis magnitudine, indocilis, & nisi pullus vix circumrandus; volando parvis gregibus sibilans, crassior & brevior reliquis speciebus.

Rostrum & cera incarnata ; genæ flavæ ; cervix aurantia ;
remiges majores exteriore latere cæruleæ , interiori &
subtus nigra , minorum primæ virides , margine flavo ,
reliquæ virides ; cauda rotundata ; pedes ex cinerea
fusci ; ungues nigricantes.

pileatus. 125. *Ps.* viridis , capite nigro , orbitis albis , humerorum ma-
cula cyanea , caudæ apice cæruleo.

Caica. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 253.

Perruche à tête noire de Cayenne. *Buff. pl. enlum. n.* 744.

Hooded Parrot. *Lath. syn.* I. 1. p. 306. n. 113.

Habitat in Cayenna, 8½ pollices longus , reliquis speciebus
crassior , migratorius.

Rostrum & pedes rubri ; gula flavicans ; rectrices 2 inter-
mediæ totæ virides.

ludovi- 126. *Ps.* thalassinus , capite fulvo , versus rostrum in ruborem
cianus, vergente.

Papagai à tête aurore. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 247.
du Praz it. 2. p. 128.

Orange-headed Parrot. *Lath. syn.* I. 1. p. 304. n. 111.

Habitat in Louisiana, bromeliæ , liriodendri seminibus
visitans , magnis gregibus volans , ferus , valde so-
norus ; cicuratus parum , parumque docilis.

collarius. 42. *Ps.* viridis , gula rubente.

Psittacus minor , collo miniaceo. *Raj. av.* p. 181. n. 8.

Psittacus jamaicensis , gutture rubro. *Briss. av.* p. 241. n. 25.

Xaxabes. *Ovied. l.* 4. c. 4.

Sassebé. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 245.

Common Parrot of Jamaica. *Sloan. jam.* p. 297. n. 9.

Red-throated Parrot. *Lath. syn.* I. 1. p. 303. n. 109.

Habitat in Jamaica, columbæ magnitudine.

Jugulum rubrum ; remiges nigra , margine viridi.

senega- 43. *Ps.* viridis subtus luteus , capite cinereo , orbitis nigris nudis.
lus.

Psittacula senegalensis. *Briss. av.* 4. p. 400. n. 92. t. 24. f. 2.

Perroquet à tête grise. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 123. pl.

enlum. n. 288.

Senegal Parrot, *Lath. syn.* I. 1. p. 307. n. 114.

Habitat frequens ad Senegal fluvii littora arenosa , voce
ingrata & acuta ; quini senive volant , in arborum ca-
minibus quiescentes.

Longitudo 8½ pollicum ; rostrum cinereum ; cera nigricans ;
irides flavæ ; remiges & alæ spuria cinerea , margine

exteriore viridi ; rectrices cinereæ , margine & apice virides ; pedes ex rubicundo cinerei.

Tuipara. 127. *Pf. pallide viridis , frontis lunula rubra , alarum macula media flava.*

- *Tuipara Tupinambis. Raj. av. p. 35. n. 7. Will. orn. p. 117. Pfittacula brasiliensis erythrocephalos. Briss. av. 4. p. 383. n. 82.*

Red-fronted Parrot. Lath. syn. I. 1. p. 308. n. 115.

Habitat in Brasiliâ , alaudæ magnitudinis.

Rostrum incarnatum ; cauda brevissima ; pedes & ungues grisei.

chryso- 44. *Pf. viridis , alis macula cærulea fulvaque , orbitis nudis*
pterus. *albis.*

Pfittacula alis deauratis. Briss. av. app. p. 130. n. 97.

Perruche aux ailes d'or. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 170.

Golden-winged Parrakeet. Edw. glean. t. 293. f. 2. Lath. syn. I. 1. p. 309. n. 116.

Habitat in India , alauda vix major.

Rostrum album ; remiges primores & margine exteriori cæruleæ , interiori fuscæ ; reliquæ supra aurantiæ , subtus luteæ.

pullarius. 45. *Pf. viridis , fronte rubra , cauda fulva , fascia nigra ,*
orbitis cinereis. Mus. Ad. Fr. 2. p. 15. Scop. ann. 1.
p. 33. n. 34.

Pfittacus minimus. Clus. exot. 365.

Pfittacus pusillus viridis æthiopicus Clusii. Raj. av. p. 31. n. 10.

Pfittacus minor versicolor. Seb. mus. 2. p. 40. t. 40. f. 1.

Pfittacula guineensis. Briss. av. 4. p. 387. n. 85.

Perruche à tête rouge , ou moineau de Guinée. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 165. t. 7.

Petite perruche mâle de Guinée. Buff. planch. enlum. n. 60.

Little red-headed Parrakeet , or Guinea Sparrow. Albin. av. 3. t. 15. Edw. glean. t. 237.

Red-headed Guinea-Parrakeet. Latham syn. I. 1. p. 309. n. 117.

Kleinster grüner Papagay mit rother Stirn und Kehle. Frisch. av. t. 54.

Habitat in Guinea frequens , in Æthiopia , India , & insula Java , morum alienorum , non perinde vocis dexterrimus imitator , suæ speciei amantissimus ; alaudæ magnitudinis , $5\frac{1}{2}$ pollices longus.

Rostrium rubrum; cera cinerea; irides cærulescentes; gula rubra; uropygium cæruleum; rectrices 2 intermediae totæ, reliquæ apice virides; pedes & ungues grisei.

indicus. 128. *Pf. viridis, orbitis pallide incarnatis, vertice rubro vel aurantio, uropygii parte postica rubra, remigibus intus, cauda subtus ex cærulecente viridibus.*

Psittacula indica. Briss. av. 4. p. 390. n. 86.

Smallest red and green indian Parrot. Edw. av. t. t. 6.

Red and green indian Parrot. Lath. syn. I. 1. p. 311. n. 118.

Habitat in India, a laudæ magnitudine.

Rostrium aurantium; rectrices caudæ superiores rubræ; pedes & ungues incarnati.

gulgulus. 46. *Pf. viridis, uropygio pectoreque coccineis, vertice (maris) cæruleo. Amæn. ac. 4. p. 236. Mus. Ad. Frid. 16. Osb. it. 101.*

Avicula cechini. Ald. orn. I. 20. p. 560.

Psittacula malaccensis. Briss. av. 4. p. 386. n. 84?

Perruche à tête bleue. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 163.

Petite perruche de Pérou. Buff. pl. enlum. n. 190. f. 2.

Petite perruche de l'île de Luçon. Sonner. it. p. 76. t. 33. fig. inf.

Sapphire-crowned Parrakeet. Edw. glean. t. 293. f. 2.

Lath. syn. I. 1. p. 312. n. 119. A.

β. *Psittacula Philippensis. Briss. av. 4. p. 392. n. 87. t. 30. f. 1.*

Perruche des Philippines. Buff. pl. enlum. n. 520. f. 1. 2.

Coulacissi. Buffon hist. nat. des ois. 6. p. 169.

Philippine Parrakeet. Lath. syn. I. 1. p. 311. n. 119.

Habitat in insulis Philippinis, forsitan etiam aliis oceanî indicî, & modo pollicis longus; & adhuc minor. Pede altero suspensus dormit; cocos succo resenti se delectans.

Remiges subtus cæruleæ, excepto margine exteriori; rectrices subtus cærulescentes; jugulum sanguineum, qui tamen color, prouti cæruleus verticis, in femina deest.

β. *Rostrium rubrum; caput ex siccato viride; occipitis fascia transversa aurantia; rectrices caudæ rubræ; remiges nigricantes margine profunde viridi; cauda rotundata; pedes & ungues rubri.*

Anaca. 129. *Pf. viridis, subtus ex rufo fuscus, vertice badio, dorso macula caudaque pallide fusca, alarum margine rubro.*

Psittacula brasiliensis fusca. Briss. av. 4. p. 403. n. 93.

Anaca Brasiliensis. Raj. av. p. 35. n. 8. Will. orn.

p. 117. c. 4. n. 8.

Sofove. 138. Pſ. viridis, alarum & tectricum caudæ macula dilute flava.

Sofové. *Buff. hiſt. nat. des oif.* 6. p. 280.

Petite perruche de Cayenne. *Buff. pl. enlum. n.* 456. f. 2.

Cayenne Parrakeet. *Lath. ſyn.* I. 1. p. 320. n. 130.

Habitat in Gujana, facile cicurandus, & eximie garrulus.

Roſtrum & pedes grifea.

Tui. 139. Pſ. viridis, fronte aurantia, orbitis flavis.

Pſittacula braſiliensis icterocephalos. Briff. av. 4. p. 398. n. 90.

Tui ſpecies 4. *Raj. av.* p. 34.

Tovi à tête d'or. *Buff. hiſt. nat. des oif.* 6. p. 284.

Petite perroche de l'ile de S. Thomas. *Buff. planch. enlum. n.* 456. f. 1.

Tui of the Braſiliens, 4th ſpecies. *Will. orn.* p. 116. f. 4.

Gold-headed Parrakeet. *Lath. ſyn.* I. 1. p. 321. n. 131.

Habitat in Braſilia, ſturni magnitudine.

Roſtrum nigrum; oculi magni & nigricantes.

erythro- 140. Pſ. viridis, capite criſtato, alis caudaque rubris.

chlorus. *Pſittacula criſtata. Briff. av.* 4. p. 404. n. 94.

Pſittacus erythrochloros. criſtatus Aldrovandi. Raj. av. p. 34. n. 4.

Criſted red and green Parrot of Aldrovandus. *Will. ornith.* p. 116. f. 3.

Criſted red and green Parrakeet. *Latham ſyn.* I. 1. p. 321. n. 132.

Irides rubra; criſta pro arbitrio mobilis, pennis ſex conſtans; tribus majoribus.

mexica- 141. Pſ. viridis, fronte criſtata, tectricibus alarum & cauda
nus. purpureis, orbitis cæruleis, gula flava, cervice rubra.

Pſittacula mexicana criſtata. Briff. av. 4. p. 405. n. 95.

Avis de cocho, pſittaci ſpecies mexicana vario colore.

Seb. muſ. I. p. 94. t. 39. f. 2.

Criſted mexican Parrakeet. *Lath. ſyn.* I. 1. p. 322. n. 133.

Habitat in nova Hiſpania, 7 pollices longus.

Roſtrum flavum, remigum margo albus; pedes & ungues cinerei.

46. RAMPHASTOS. *Rostrum* maximum, inane, convexum, extrorsum ferratum : mandibula utraque apice incurva.
Nares pone rostri basin, longæ, angustæ.
Lingua pennacea.
Pedes scanforii (plerisque).

viridis. 1. *R. viridis* abdomine flavo, uropygio rubro.
Tucana cayennensis viridis. *Briss. av.* 4. p. 423. n. 8. t. 33. f. 2.

Toucan vert de Cayenne. *Buffon pl. enlum.* n. 727. 728.

Green Toucan. *Lath. syn.* I. i. p. 331. n. 9.

Habitat in Cayenna, 14 pollices longus.

Mandibularum dentes albi; inferior nigra, basi & circa nares rubra; superior supra flava, ad latera rubra, linea media nigra; orbitæ nudæ iridelque flavæ; pedes plumbei; ungues nigri; cauda cuneata, subtus in cinereum vergens; caput, gula & jugulum mari nigra, feminae badia, fascia nigra angusta transversa terminata.

pavoni- 9, *R. viridis*, pennis rubris & pavonipis hinc inde interspersis.
 nus. *Tucana mexicana viridis*. *Briss. av.* 4. p. 423. n. 7.

Xochitenacatl. *Fern. hist. n. Hisp.* p. 51. c. 187.

Hochicat. *Buffon hist. nat. des ois.* 7. p. 125.

Pavonine Toucan. *Lath. syn.* I. i. p. 331. n. 8.

Habitat in novæ Hispaniæ calidioribus maritimis, piscibus victitare fertur, dicolori magnitudine.

Rostrum ex flavo & nigro varium; pedes & ungues nigri.

piperivo- 2. *R. viridis*, antice niger, crisso femoribusque rubris.
 rus. *Tucana cayennensis torquata*. *Briss. av.* 4. p. 429. n.

10. t. 32. f. 2.

Koulik. *Buff. hist. nat. des ois.* 7. p. 128.

Genus hoc in solâ America australi intra tropicos obvium, frigoris impatiens, fructibus præsertim palmarum victitat, facile cicuratur; in patria parvis gregibus, numero octono vel denario volitat, in arborum cavis a picis reliâ nidificat, bina ova ponens, numerosum.

AVES PICÆ. Ramphastos.

Toucan à Collier de Cayenne, & Toucan à ventre gris de Cayenne. *Buffon pl. enlum. n. 577. & 729.*

Green Toucan. *Edw. glean. t. 330.*

Piperine Toucan. *Lath. syn. I. 1. p. 334. n. 11.*

Habitat in Cayenna, 13 pollices longus.

Rostrum nigrum, basi rubrum; orbitæ incarnatæ aut cærulecentes; tempora macula aurantia; cervicis lunula aurantia; remiges fuscæ, margine viridi; cauda cuneiformis, subtus fusca, apice badia; tectrices caudæ inferiores rubræ; pedes plumbei; ungues nigri. Femina subtus grisea, cervice fusca.

Aracari. 3. R. viridis, fascia abdominali, crisso uropygioque rubris, abdomine flavo.

Ramphastos rostro nigro, mandibula superiore lateribus alba, basi triloba. *Syst. nat. I. p. 104.*

Tucana brasiliensis viridis. *Briss. av. 4. p. 426. n. 9. t. 33. f. 2.*

Aracari. *Marcgr. bras. 217. Raj. av. p. 44. n. 2. Will. orn. p. 140. t. 22. Lath. syn. I. 1. p. 332. n. 10.*

Grigri. *Buffon hist. nat. des ois. 7. p. 126.*

Toucan vert du Brésil. *Buff. pl. enlum. n. 166.*

Habitat in Brasilia, Surinamo, Cayenna, ultra 16 pollices longus.

Rostrum mandibula superior dorso & apice nigra, lateribus albicans, basi triloba ad nares, arcu albo ad radicem; inferior nigra. Caput, alæ & cauda nigra; pectus & abdomen flava coccineaque, cum macula nigra subrotunda in medio pectore, similisque macula transversalis ad initium ventris. Uropygium coccineum; femora rufa. Jacquin.

torqua- 10. R. supra niger, subtus albicans, abdomine viridi, postice rubro, torque rubro.

Tucana mexicana torquata. *Briss. av. 4. p. 421. n. 6.*

Cochitenacatl. *Fern. hist. nov. Hisp. p. 46. c. 1. 60.*

Cochicat. *Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 124.*

Collared Toucan. *Lath. syn. I. 1. p. 330. n. 7.*

Habitat in novæ Hispaniæ maritimis, 18 pollices longus; piscibus victitare fertur.

Rostrum mandibula superior albicans, inferior nigra; irides ex rubicundo flavæ; caput collumque nigra; tectrices caudæ inferiores rubræ; femora purpurea; pedes ex virescente cinerei; ungues nigri.

piscivorus. 4. *R. nigricans*, fascia abdominali crissoque rubris, uropygio albo.

Tucana brasiliensis gutture albo. *Briss. av.* 4. p. 413. n. 3.

Picus americanus. *Hern. mex.* 697.

Xochitenacatl tertia. *Raj. av.* p. 178. n. 6.

Toucan à gorge blanche de Cayenne, appelée Tocan. *Buffon pl. enlum.* 262.

Toucan or Brazilian Pye. *Edw. av.* 2. t. 64. *Bancr. Guj.* p. 163.

Brazilian Toucan. *Latham syn.* I. 1. p. 327. n. 4.

Habitat in America australi, 21 pollices longus.

Rostrum luteum, apicis macula coccinea, mandibula inferior cærulea; pedes cærulei; nigra pileus, dorsum, alæ, cauda, venter, femora; albida tempora, gula, pedus, uropygium; rubra fascia pectoralis & crissum.

erythro- 11. *R. nigricans*, genis, gula, & jugulo albis, tectricibus rhynchos. caudæ superioribus sulphureis, inferioribus & pectoris lunula rubris.

Tucana cayennensis gutture albo. *Briss. av.* 4. p. 416. n. 4. t. 31. f. 2.

Red-beaked Toucan. *Edw. glean.* t. 238. *Lath. syn.* I. 1. p. 328. n. 5.

Habitat in America australi, præcedentis magnitudine.

Rostrum basi dorsoque flavum, mandibula superioris apice inferiorisque fundo rubris, naribus nigro-marginatis; orbitæ cærulescentes; pedes plumbei; ungues nigri.

Tucanus. 5. *R. nigricans*, fascia abdominali, crisso uropygioque flavis.

Ramphastos rostro rubro, carina obtusa albida. *Syst. nat.* I. p. 103.

Tucana. *Marcgr. bras.* 217.

Tucana brasiliensis gutture luteo. *Briss. av.* 4. p. 419. n. 5. t. 32. f. 1.

Toucan surinamensis niger ex albo, flavo, rubro mixtus. *Pet. gar.* t. 44. f. 13.

Toucan à gorge jaune du Brésil. *Buffon pl. enlum.* n. 307.

Yellow-breasted Tucan. *Edw. glean.* t. 329. *Latham syn.* I. 1. p. 326. n. 3.

Habitat in America australi, 19 pollices longus.

Genæ, gula & cervix aurantiæ; fascia abdominalis & crissum in rubrum colorem vergunt; uropygium sulphureum; rostrum nigrum, basi griseum; pedes & ungues plumbei.

- picarus.** 6. *R. nigricans*, pectore luteo, crisso rectricumque apicibus rubris, uropygio nigro.
Ramphastos rostro rubro apice nigro, carina compressa.
Syst. nat. I. p. 103.
Tucana. Briss. av. 4. p. 408. n. 1.
Pica brasiliensis. Gesn. av. 800. *Aldr. orn.* 1. p. 801.
Raj. av. p. 44. n. 1.
Brazilian Pye or Toucan. Albin. av. 2. t. 25. *Will. orn.* p. 128. t. 20.
Toucan à ventre rouge. Buffon hist. nat. des ois. 7. p. 122.
Preacher Toucan. Latham syn. I. 1. p. 329. n. 6.
Habitat in Gujana & Brasilia, 8½ pollicibus pedem longitudine excedens.
Rostrum ex flavicanti viride, apice rubicundum; abdomen rubrum; cauda apice rubro-punctata.
- dicolorus.** 7. *R. nigricans*, pectore, abdomine, crisso uropygioque rubris, gula lutea.
Tucana cayennensis, gutture luteo. Briss. av. 4. p. 411. n. 2. t. 31. f. 1.
Toucan à gorge jaune. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 118.
Toucan à gorge jaune de Cayenne. Buff. pl. enlum. n. 269.
Yellow-throated Toucan. Latham syn. I. 1. p. 325. n. 2.
Habitat in Cayenna, 17 pollices longus.
Rostrum olivaceum, basi nigrum, mandibularum margine rubro; genæ sulphuræ; jugulum aurantium, margine sulphureo.
- Toco.** 12. *R. nigricans*, gula, jugulo & uropygio albis, orbitis, pectoris circulo crissoque rubris.
Toucan de Cayenne, appelé Toco. Buff. pl. enlum. n. 82.
Toco. Buffon hist. nat. des ois. 7. p. 117. *Latham syn.* I. 1. p. 325. n. 1. t. 9.
Habitat in Cayenna, 9-10 pollices longus.
Rostrum ex rubicundo flavum basi nigrum, mandibulæ superioris apice nigro.
- luteus.** 13. *R. ex flavicante albus*, striis collis lateralibus duabus nigris, cauda & alis ex albo & nigro variis, testricibus alarum minoribus flavis.
Tucana lutea. Briss. av. 4. p. 432. n. 11.
Alia Xochitenacatl. Nieremb. hist. nat. p. 207. *Johnst. av.* p. 119.
Aracari à bec noir. Buffon hist. nat. des ois. 7. p. 130.

An other sort of Xochitenacatl, Toucan or Brasilian Pye.

Will. orn. p. 386.

Blackbilled Toucan. *Lath. syn. I. 1. p. 335. n. 12.*

Habitat in nova Hispania, columbæ magnitudine.

Rostrum nigrum; irides flavæ; pedes fuscii; ungues flavicantes.

cæruleus.

14. R. cæruleus, cinereo admixto.

Tucana cærulea. Briss. av. 4. p. 433. n. 12.

Xochitenacatl. Nieremb. hist. nat. p. 209. Fern. hist. p.

47. c. 146. Johnst. av. p. 126. 157. t. 56.

Blue Toucan. Lath. syn. I. 1. p. 335. n. 13.

Habitat in novæ Hispaniæ maritimis, columbæ magnitudine.

Rostrum corpore ipsa longius; oculi nigri; irides fulvæ.

dubius.

15. R. gula cærulea.

Blue throated Toucan. Lath. syn. I. 1. p. 336. n. 14.

albus.

16. R. totus albus.

White Toucan. Lath. syn. I. 1. p. 336. n. 15.

Momota. 8. R. pedibus gressoriis.

Momot. Will. orn. p. 386. t. 24. Raj. av. p. 164. Briss. av. 4. p. 465. t. 35. f. 3.

Guira Guainumbi. Marcgr. bras. 193. Raj. av. p. 49. n. 4.

Houtou ou Momot. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 430. t. 20.

Momot du Brésil. Buff. pl. enlum. n. 370.

Brasilian sawbilled Roller. Edw. glean. t. 328.

Brasilian Motmot. Lath. syn. I. 1. p. 338. n. 1. t. 10.

β. *Momotus varius. Briss. av. 4. p. 469. n. 2.*

Yayauquitotl. Raj. av. p. 167. n. 19.

Yayauquitotl or longtailed Bird. Will. orn. p. 386.

Variegated Motmot. Lath. syn. I. 1. p. 340. n. 1. A.

Habitat in Americæ australis densis silvis, solitarius, in terra, aut fovea a Dasyode relicta nidum struens ex gramine sicco, & bina ova ponens; visitans insectis, & carne cruda, cujus frustula in aqua maceat, rostro prehensa violentis ictibus verberat. Vox rauca, tremula, debilis. Jacquin.

Corpus magnitudine merula sesquipedale, splendide olivaceum, subtus ferrugineum, in β. ex viridi, fulvo, cæruleo, & cinereo mistum. Caput majusculum vertice cæruleo medio nigro; mystaces ad angulos oris longiores mobiles; remiges cæruleæ; cauda cuneiformis, 11½ pollicea

longa, testricibus 2 intermediis longioribus in medio nonnunquam nudis; rostrum mediocre, vix 2 pollices longum, atrum; pedes nigri, digito uno postico; ungues adunci. Differt a præcedentibus rostro minore, pedibusque non scansoriis; an ideo generis distincti? Vetare videntur lingua pennacea, rostrique serræ.

- 47. BUCEROS.** *Rostrum convexum, curvatum, cultratum, magnum, extrorsum ferratum: Frontis calvaria nuda, osseo-gibbosa. Nares pone rostri basin. Lingua acuta, brevis. Pedes gressorii.*

bicornis. 1. *B. fronte ossea plana antrorsum bicorni. Amæn. acad. 4. p. 237.*

Hydrocorax philippensis. Briss. av. 4. p. 568. n. 2.

Rhinoceros avis prima varietas. Will. orn. t. 17. f. 1.

Calao. Pet. gar. 43. t. 28. f. 6. & t. 31. f. 1. Edw. av. 2. p. 151. t. 281. f. D.

Philippine Hornbill. Lath. syn. I. 1. p. 345. n. 3.

β. *Calao vel Cayao. Ad. angl. vol. 23. p. 1394.*

Habitat in insulis Philippinis magnitudine gallinæ niger, subtus albus; remigum macula alba; cauda longiuscula nigra; rectrices 10, extimæ 4 utrinque albæ; pedes virescentes.

β. *Rostrum cinnabarino, abdomine nigro, dorso & uropygio ex fusco cinereis, voce porci aut vituli, Indis adoratus, fructibus victitat, quos integros deglutit, & exterioribus partibus concoctis, nucleos illatos eructat.*

abyssini- 5. *B. niger, fronte ossea prominentia antrorsum semicircu-*
-cus. *lari, orbitis, gula jugulique parte nudis ex violaceo*
fuscis, remigibus majoribus albis.

Calao d'Abyssinie. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 155.

Grand Calao d'Abyssinie. Buff. pl. enlum. n. 779.

Abyssinian Hornbill. Lath. syn. I. 1. p. 347. n. 4.

AVES hujus generis in antiquo orbe easdem regiones occupant; quam superioris in America, vidu quoque, uti quidem videtur, in similes.

Habitat in Abyssinia, corvo similis, duobus pollicibus pedes tres longitudine superans. Rostrum 9 pollicum.

- africanus. 6. B. niger, rostro unicorni, cornu rectiusculo acuminato. Hydrocorax africanus. *Briss. av. 4. p. 570. n. 3.*
 Rhinoceros avis secunda varietas. *Will. orn. t. 17. Mus. Bcslcr. t. 9. n. 7.*
 Brac ou Calao d'Afrique. *Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 154.*
 Trompette de Brac ou oiseau trompette. *Labat Afr. occid. 4. p. 160. 161.*
 African Hornbill. *Lath. syn. I. 1. p. 348. n. 5.*
Habitat in Africa, gallopavonis magnitudine.
 Rostrum partim rubrum, partim flavum, margine mandibularum nigro.

- malabaricus. 7. B. niger subtus albus, prominentia frontis supra rotundata frontem versus acuta, pone oculos protensa.
 Beaks of curious Birds. *Edw. glean. t. 281. f. D.*
 Calao de Malabar. *Buffon hist. nat. des ois. 7. p. 149. t. 8. pl. enlum. n. 873?*
 Pied Hornbill. *Lath. syn. I. 1. p. 349. n. 6. t. II.*
Habitat in India, 2 pedes & 6 pollices ad 3 pedes usque longus, picæ ad instar ambulans, lactucam, carnem crudam, nuces, aviculas devorans.
 Rostri mandibula utraque deorsum incurvata, apice acuta; prominentia superioris 4 $\frac{1}{2}$ pollices longa, plurimam partem nigra, medio & prominentiæ & rostri sordide ex flavicanti albo; crissum, remiges, rectricesque exteriores apice alba.

- Hydrocorax. 2. B. frontè offea plana antrorsum mutica, abdomine fulvo. Hydrocorax. *Briss. av. 4. p. 556. n. 1. t. 45.*
 Corvi marini genus. *Clus. exot. 106.*
 Corvus indicus. *Bont. jav. 62. Will. orn. 86. t. 17. Raj. av. p. 40. n. 7.*
 Corbeau indien. *Salern. ornith. p. 91. n. 8. t. 9. f. 3.*
 Calao des Moluques. *Buffon hist. nat. des ois. 3. p. 41. 7. p. 147. pl. enlum. n. 283.*
 Bontius's indian Raven. *Will. orn. p. 126. n. 7.*
 Indian Hornbill. *Lath. syn. I. 1. p. 351. n. 7.*
Habitat in Moluccis frequenter cicuratus & occidendis muribus & rattis adhibitus; sylvestris nuce myristica vescitur; hinc caro deliciosa aromatica.
 Longitudo 2 pedum & 4 pollicum. Prominentia rostri cinerea, posterius albicans; vertex nigricans; genæ & gula

AVES PICÆ. Buceros.

nigræ; hæc arcu sordide griseo terminata; occiput & cervix pallide castanea; dorsum, humeri, uropygium, rectrices alarum caudæque fusca; pectus & abdomen nigricantia, hoc postice flavicans; cauda ex cinereo sordide albâ; pedes ex griseo fusci; ungues nigri.

Rhinoce-3. B. cornu mandibulari frontis recurvato.

ros.

Hydrocorax indicus. *Briss. av.* 4. p. 571. n. 4.

Rhinoceros. *Bont. Jav.* 63. t. 64. *Olear. mus.* t. 15. f. 4.

Worm. mus. 293. *Aldr. orn.* 1. p. 84. *Besler. mus.* t.

20. *Lath. syn.* 1. 1. p. 342. n. 1.

Corvus indicus cornutus seu Rhinoceros avis Bontii.

Raj. av. p. 40. n. 8.

Horned indian Raven or Rhinoceros-Bird. *Will. orn.* p.

127. t. 17. *Edw. glean.* t. 281. f. B.

Calao Rhinoceros. *Buffon hist. nat. des ois.* 7. p. 161.

Bec de l'oiseau Rhinoceros. *Buff. pl. enlum.* 934.

Habitat in India, insulisque oceani Indici, tripedalis, ratis, muribus, carne, cadaveribus victitans, venatores concomitans, exempta intestina ingurgitatura, gallo pavonis fere magnitudine.

Rostrum 10 pollices longum ex albicante flavum; mandibula superior basi rubra, inferior nigra; cornu 8 pollices longum, ex albo & nigro varium; corpus nigrum, subtus & postice sordide album; cauda 12 pollices longa; rectrices inferiores albæ & nigræ; rectrices basi & apice albæ, in medio nigræ; pedes & ungues obscure grisei.

galeatus. 8. B. rostro rectiusculo, prominentia fere quadrata, posterior rotundata, antérieur plana.

Calao à casque rond. *Buff. hist. nat. des ois.* 7. p. 159. pl. enlum. n. 933.

Helmet Hornbill. *Lath. syn.* 1. 1. p. 343. n. 2. *Edw. glean.* t. 281. f. C.

Rostrum 8 pollices longum, plurimam partem rubrum.

panayen-9. B. ex virefcente niger, subtus ex rubro fuscus, prominentia mandibulæ superioris supra acuta, & ad latera plana.

lis.

Calao à bec ciselé de l'île de Panay. *Sonner. it.* p. 122. t. 82. 83.

Calao de l'île de Panay. *Buff. hist. nat. des ois.* 7. p. 145. pl. enlum. n. 780. 781.

Panayan Hornbill. *Lath. syn.* 1. 1. p. 353. n. 8.

Habitat in insula Panay, coracis magnitudine.

Rostrum longissimum, arcuatum, fuscum, lateribus transversim rugosis, sulcis aurantiis; orbitæ nudæ fusæ; irides albidæ, caput collumque feminae alba, macula magna triangulari ex virescenti nigra; rectrices 10, a basi ultra medium ex rufo lutea, apice nigra; pedes plumbei.

manil- 10. B. supra ex nigricante fuscus, subtus sordide albus, rostro
lenfis. non ferrato: prominentia exigua.

Calao de Manille. *Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 144. pl. enlum. n. 891.*

Manilla Hornbill. *Lath. syn. I. 1. p. 354. n. 9.*

Habitat in insula Manilla.

Rostrum minus curvatum, apice magis acuto; caput collumque alba, fusco-undulata; temporum macula nigra; caudæ fascia media rufa.

masutus. 4. B. fronte lævi, rectricibus basi apiceque albis.

Crotophaga. *Forskal Faun. arab. p. 2. n. 4.*

Hydrocorax senegalensis melanorhynchos. *Briss. av. 4. p. 573. n. 5. t. 46. f. 1.*

Tock. *Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 141.*

Calao à bec noir du Sénégal. *Buff. pl. enlum. n. 890.*

Blackbilled Hornbill. *Lath. syn. I. 1. p. 355. n. 10.*

β. Hydrocorax senegalensis erythrorhynchos. *Briss. av. 4. p. 575. t. 46. f. 2.*

Calao à bec rouge de Sénégal. *Buff. pl. enlum. n. 260.*

Habitat ad fluvium Senegal, & in aliis calidioribus anti-qui orbis; fructibus victitans; junior facile cicurandus, magnitudine picæ.

Rostrum deorsum curvatum cum pedibus nigrum, adultiori rubrum; corpus supra sordide griseum, pennarum apice albedo, subtus sordide album; genarum stria similiter sordide alba; rectrices 2 intermediæ sordide griseæ; reliquæ 10 ad medium usque & apice albæ, ceterum nigricantes; ungues nigri.

albus. 11. B. niveus, rostro pedibusque nigris.

White Toucan. *Hawkesw. it. I. p. 123.*

White Hornbill. *Lath. syn. I. 1. p. 357. n. 11.*

Captus inter insulas Tinian & Pulotimoen, anseris magnitudine.

Rostrum angustum, & pedem longum.

obscu- 12. B. rostri prominentia supra rotundata septem vel octoloba.
rus. Wreathed Hornbill. *Lath. syn.* I. I. p. 358. n. 12.

Indan Raven. *Will. orn.* t. 78.

Rostrum 5 pollices longum, prominentia pollicem alta;
mandibularum margo non serratus.

48. BUPHAGA. *Rostrum* rectum subquadrangulare: mandibulis gibbis intergris, extrorsum gibbosioribus.
Pedes ambulatorii.

africana. I. Buphaga. *Briss. av.* 2. p. 457. n. 1. t. 42. f. 2.

Pic-bœuf. *Buffon hist. nat. des ois.* 3. p. 175. t. 14. pl. enlum. n. 293.

African Beef-eater. *Lath. syn.* I. I. p. 359. n. 1. t. 12.

Habitat ad fluvium Senegal; dorso boum insidens extrahit æstrorum larvas; alaudæ cristate magnitudine, 8½ pollices longa.

Corpus supra ex griseo fuscum, subtus & uropygio flavicans; rostrum nunc flavicans apice rubro, nunc nigrum, 10 lineas longum; cauda cuneiformis; rectrices 12 acutæ, ex griseo fuscae, lateralibus interius rufis; pedes & ungues fusci.

49. CROTOPHAGA. *Rostrum* compressum, semi-ovatum, arcuatum, dorso-fato-carinatum: mandibula superiore margine utrinque angulata.

Nares perviæ.

Ani. I. Cz. minor, pedibus scanforiis.

Crotophagus. *Briss. av.* 4. p. 177. t. 18. f. 2.

Crotophagus ater, rostro brevior compresso arcuato-cultrato. *Brown. jam.* 474.

Monedula tota nigra major garrula, mandibula superiore arcuata. *Sloan. jam.* 2. p. 298. t. 256. f. 1.

Ani. *Marcgr. bras.* 193. *Will. orn.* p. 120. *Raj. av.* p. 35. n. 10. & p. 185. n. 129.

Cacalototl. *Raj. av.* p. 168. n. 27.

Ani des savanes. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 420.*

Petit bout de petun. *Buff. pl. enlum. n. 102. f. 2.*

Razor-billed Blackbird. *Catesb. car. app. t. 3.*

Lesser Ani. *Lath. syn. I. 1. p. 360. n. 1. t. 13.*

Habitat in America australi, in insulisque Americam spectantibus gregaria; nidificant in eodem nido amplissimo sæpe 50; singula femina sibi propinqua suis ovis, quæ bis in anno pariunt, marini coloris, versus utrumque finem maculata, incubant, quæ foliis tegunt. Visitant fructibus, seminibus, vermibus, insectis, potissimum gryllis, imprimis vero acaris ricinis in bobus copiosissimis, ideoque accedentibus hisce boves se prosternere feruntur, ut ricinos evellant, qui alias nimium multiplicarentur.

Longitudo 13½ pollicum; corpus nigrum; cauda longa, cuneiformis, rectricibus 10 constans; mandibula superior apice incurvata; nares ovata; lingua carnea, integra; pedes nigri.

major. 3. Cr. major, pedibus scanforiis.

Crotophaga major. Briss. av. 4. p. 180. t. 18. f. 2.

Grand Bout de Petun. *Buff. pl. enlum. n. 102. f. 1.*

Ani des palétuviers. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 423. t. 19. Salern. orn. p. 73. n. 10.*

Greater Ani. *Lath. syn. I. 1. p. 362. n. 2.*

Habitat in Cayenna, facile cicuranda, & psittaci more docilis; 18 pollices longa, ceterum præcedenti similis.

ambula- 2. Cr. pedibus ambulatoriis.

toria. *Walking Ani. Lath. syn. I. 1. p. 363. n. 3.*

Habitat in Surinamo, præcedenti, si pedes excipias, semillima; rectrices 10.

CLAUCOPIS. *Rostrum incurvatum, fornicatum, mandibula inferiore breviora subtus ad basin carunculata.*

Nares depressæ, membrana subcartilaginea semitectæ.

Lingua subcartilaginea apice incisa & ciliata.

Pedes ambulatorii.

cinerea. 1. Glaucopis.

Cinereous Wattle-bird. Latham syn. I. 1. p. 364. n. 1. t. 14.

Habitat in nova Seelandia, picæ magnitudine, 15 pollices longa; in terra ambulans, rarius arboribus insidens, baccis, insectis, aviculis quoque victans, sibilans & murmurans. Caro sapidissima. Forster.

Provi totum corpus una cum pedibus; caruncula primo cærulea, post aurantia; irides egregie cæuleæ; cauda longa, cuneiformis, rectricibus 12 constans; pedes longi; unguis posterior reliquis longior.

50. CORVUS. *Rostrum convexum, cultratum. Nares pennis fetaceis recumbentibus obtektæ. Lingua cartilaginea bifida. Pedes ambulatorii.*

hotten- 1. *C. virescenti-ater, cauda æquali, mysticibus longissimis.*
tortus. *Monedula Capitis bonæ spei. Briss. av. 2. p. 33. n. 10. t. 2. f. 2.*

Choucas moustache. Buffon hist. nat. des ois. 3. p. 79.

Choucas du Cap de bonne espérance. Buff. pl. enlum. n. 226.

Habitat ad Caput bonæ spei, 11½ pollices longus.

Supra nares mystices nigre tres pollices longæ, breviores & rigide in angulis oris; pennæ cervicis angustiores & longiores reliquis, laxæ, & quasi fluitantes.

Corax. 2. *C. ater, dorso atro-cærulescente, cauda subrotundata. Faun. groenl. p. 62. n. 38.*

Corvus maximus. Scop. ann. 1. p. 34. n. 45.

Corvus. Gesn. av. 334. Aldrov. orn. 1. p. 684. t. 685.

Jonst. av. 38. t. 16. Raj. av. p. 39. n. 1. Briss. av. 2. p. 8. n. 1.

Corbeau. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 13. t. 2. pl. enlum. n. 495.

Raven. Aræ. zool. 2. p. 245. n. 134. Brit. zool. 1. p. 218.

n. 74. Alb. av. 2. p. 19. t. 20. Will. orn. p. 121. t.

18. Lath. syn. 1. 1. p. 367. n. 1.

Rabe. Frisch. av. t. 63.

β. *Corvus varius. Briss. av. 2. p. 12. n. 1. A.*

Cacalotl. Fernand. hist. nov. Hisp. p. 48.

γ. *Corvus albus. Briss. av. 2. p. 12. n. 1. B. Schwenckf. av. Siles. p. 245.*

Corvus feroensis ex albo & nigro mixtus. Brännich ornith. bor. p. 8.

Habitat in omni Europa, Sibiria, Camtschatca, America boreali ad novam usque Hispaniam; duos utplurimum pedes duosque pollices longus, vidit cadaveribus, aviculis vivis, agnis infirmis, famelicus adeo pellibus siccis & excrementis, ovis, piscibus, testaceis, baccis, feris in regionibus potissimum magis borealibus, convivalis, furto deditus, clamitans, loqui addiscit; nidificat in altis arboribus aut rupibus; coit Martio, parit April 5-6 ova, ex cærulescente viridia fuscomaculata, quibus mas interdiu, femina noctu incubat; longævus, obsidu acerrimo præditus. Caro Groenlandis ædulis, pellis in vestimentis adhibita, alæ scopulis, remiges fissæ piscatui.

Rostrum paulisper curvatum, dente utrinque exiguo.

clericus. 20. C. totus niger, mento albo, rostri basi cinerea. *Sparrmann mus. Carlön. t. 2.*

Habitat in Suecia, rarissimus, an vere distincta a corace species?

Color in maxima corporis parte fuliginosus; remigum & rectricum supra in violaceum vergens.

australis. 21. C. totus niger, menti pennis laxioribus, remigibus ex fuscescenti nigris.

South-sea Raven. Lath. syn. I. 1. p. 369. n. 2.

Habitat in insulis amicis maris australis, 19 pollices longus.

Cauda 8 pollices longa.

Corone. 3. C. atro-cærulescens totus, cauda rotundata, rectricibus acutis. *Fn. suec. 86. Scop. ann. I. p. 35. n. 36.*

Cornix. Gefn. av. 320. t. 321. Aldr. orn. I. p. 734. t. 736.

Raj. av. p. 39. n. 2. Briss. av. 2. p. 12. n. 2.

Corneille. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 45. t. 3. pl. enlum. n. 483.

Carrion Crow. Brit. zool. I. n. 75. t. 34. Arch. zool. 2. p. 246. n. 135. Albin. av. 2. t. 21. Will. orn. p. 122.

t. 18. Lath. syn. I. 1. p. 370. n. 3.

3. Cornix varia. Briss. av. 2. p. 15 n. 2. A.

Corvus varius. Brünn. orn. bor. p. 8. n. 8.

Bunte Kraehe, schekige Kraehe. Frisch. av. t. 66.

7. Cornix alba. Briss. av. p. 15. n. 2. B.

Habitat in Europa, Sibiria, boreali America, insulis Philippinis, nova Guinea, nova Hollandia, nova Caledonia, Madera, corace minor, 18 pollices longa; cadaveribus & vivis adeo animalibus minoribus & debilioribus viditans, sed fructibus etiam, seminibusque,

hinc segetibus aliquando infesta ; in silvarum arboribus nidificat , & 5-6 ova parit , coracinis similia.

Tota ex atro carulegens , coracis modo dorsum ; femina minus splendida ; fauces , prouti etiam thoracis , nigra ; trachea propriis musculis instructa , subtus ad dichotomiam antice 4 , postice 2.

frugilegus. 4. C. ater, fronte cinerascens , cauda subrotundata.

Faun. suec. 87. It. oel. 67.

Cornix frugilega. *Aldrov. orn. 1. p. 751. t. 753. Raj. av. p. 39. n. A. 3. Briss. av. 2. p. 16. n. 3.*

Freux ou Frayonne. *Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 55. pl. enlum. n. 484.*

Rook. *Brit. zool. 1. n. 76. Arct. zool. 2. p. 250. n. A.*

Albin. av. 2. p. 21. t. 22. Will. orn. p. 123. t. 18. Lath.

syn. 1. 1. p. 372. n. 4.

Schwarze Kraehe. *Frisch. av. t. 64.*

Habitat in Europa & occidentali Sibiria , magnis gregibus mane potissimum & vespere volitans ; plures pernoctant in arbore , unde facile capiuntur , valde sonori ; vermicibus , larvis , potissimum scarabæorum , sed seminibus etiam victitant , hinc agris infestis ; Martio jam nidificare incipiunt , ovaque pariunt cornicinis similia. Juniorum caro sapida. Nigredini intermixtus splendor purpureus ; caudæ supra viridis ; rostrum magis rectum , gracilius , debilius , quam præcedenti , 2½ pollices longum , basi albicans , naribus nudatis.

Cornix. 5. C. cinerascens, capite , jugulo , alis caudaque nigris.

Fn. suec. 88. Scop. ann. 1. p. 35. n. 37.

Cornix cinerea. *Briss. av. 2. p. 19. n. 4.*

Cornix cinerea frugilega. *Gesn. av. 332. Aldrov. orn. 1.*

p. 754. t. 755. Raj. av. p. 39. n. A. 4.

Corneille mantelée. *Buffon hist. nat. des ois. 3. p. 61. t. 4. pl. enlum. n. 76.*

Royston Crow. *Albin. av. 2. p. 22. t. 23. Will. orn. p. 124. t. 77.*

Hooded Crow. *Brit. zool. 1. n. 77. Arct. zool. 2. p. 251.*

n. B. Flor. scot. 1. p. 20. t. 2. Lath. syn. 1. 1. p. 374. n. 5.

Plurimæ corvi species in omni climate obviæ , perquam sonoræ , in arboribus nidificans , & 6 ova pariunt ; viduus plurimis ex animali & vegetabili mistus.

Nebelkraehe. *Frisch. av. t. 65.*

Graue Krau, Krauveitl. *Kram. elench. p. 333.*

Habitat in Europa & Asia, Alberto magno jam dicta, Oðobri ex subalpinis in plânitie descendens, gregaria, cadaveribus, quisquiliis, vivis quoque animalibus minoribus, avibus; testaceis, ranis, cochleis, insectis horumque larvis, rarius baccis feminibusque viditans; in Suecia relegata, at injuste, quum purget prata a larvis phalænæ calamitosæ graminumque radicibus subjacentibus tipularum larvis; ventis adversa confidet; lepide capitur cucullo papyraceo in nive.

Magnitudo frugilegi; longitudo 22 pollicum.

dauricus. 22. *C. ater, vertice ex cæruleo atro, cervice, jugulo & abdomine albis. Pall. it. 3. p. 694. n. 8.*

Corneille du Sénégal. *Buffon hist. nat. des ois. 3. p. 67. pl. enlum. n. 327.*

Chinese black Raven with white neck. *Osb. it. 1. p. 377.*

White-breasted Crow. *Fryer it. p. 21. Latham syn. 1. 1. p. 376. n. 6. t. 15.*

β. *Corvus totus niger, cervice juguloque fuscis.*

Habitat in Sina, Mongolia, Persia, ad lacum Bajkal, fluviumque Lena, in insula Ivanna, & ad fluvium, Senegal, gregaria, monedulæ facie & magnitudine, 12. pollices & ultra longus; insectis fructibusque viditans. Cauda & alæ nitore virescente.

caledoni-23. *C. cinereus, rostro, palpebris, cauda pedibusque nigris.*
cus.

New caledonian Crow. *Latham syn. 1. 1. p. 377. n. 7.*
Habitat in nova Caledonia, 15 circiter pollices longus. Cauda 5 pollices, rostrum 14 lineas longum; irides flavescentes.

jamai- 24. *C. totus niger.*

cenfis. *Cornix jamaicensis. Briss. av. 2. p. 22. n. 5.*

Corneille de la Jamaïque. *Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 67.*

Chattering Crow or Cacao Walk. *Raj. av. p. 181. Sloan.*

jamaic. 2. p. 298. *Lath. syn. 1. 1. p. 377. n. 8.*

Habitat in Jamaica montanis, perpetuo garrulus, baccis & scarabæis viditans, 18 pollices longus.

Monedu-6. *C. fuscus, occipite incano, fronte, alis caudaque nigris.*
la.

Fn. succ. 89. Scop. ann. 1. p. 36. n. 38.

Graculus s. monedula. *Gesn. av. p. 520. t. 521.*

æa seminibus, hinc agris, hac confitis infestissimus.
Majo parit ova olivacea, maculis ferrugineis.

*Capitis crista cærulea, stria nigra a rostro ultra oculos produ-
 cta; genæ cum gula & abdomine albæ; pectus ex eri-
 naceo rubrum; dorsum pallide purpureum; rectrices alar-
 um, & remiges secundariæ cæruleæ, hæ etiam una
 cum tectricum ordine albo-punctatæ; cauda longa cu-
 neiformis nigro & cæruleo lineata apice alba; pedes nigri.*

Stelleri. 27. C. corpore supra nigro, subtus, alis, caudaque longâ
 cuneiformi cæruleis, capite cristato.

Steller's Crow. *Arch. zool. 2. p. 249. n. 139. Lath. syn.*
I. 1. p. 387. n. 21.

Habitat in sinu Natka Americæ borealis, 15 pollices longus.
*Rectrices alarum minores remigesque primariæ intus fordi-
 dæ; remiges secundariæ rectricesque intermedia nigro
 lineatæ.*

Cayanus. 9. C. subviolaceus subtus candidus, jugulo fronteque nigris,
 cauda apice alba.

Garrulus cayanensis, tribus utrinque maculis in capite albis.
Briff. av. p. 52. n. 2. t. 4. f. 1.

Geay de Cayenne. *Buff. pl. enlum. n. 373.*

Blanche-coiffe ou Geay de Cayenne. *Buff. hist. nat. des
 ois. 3. p. 118.*

Cayenne Jay. *Lath. syn. I. 1. p. 389. n. 22.*

Habitat in Cayenna, 13 pollices longus.

Rostrum, pedes & ungues grisea; capistrum, genæ &
 nucha nigra; cauda rotundata violacea.

Caryoca- 10. C. fuscus alboque punctatus, alis caudaque nigris;
 tactes. rectricibus apice albis: intermediis apice detritis. *Fn.*

succ. 91. Scop. ann. 1. p. 37. n. 40.

Corvus cinereus, cauda alisque nigris. *Fn. succ. 1. n. 75.*

Caryocatactes. *Gesn. av. 245. Will. orn. 90. t. 20. Raj.
 av. p. 42. Nozem. nederl. Vogel. t. 3.*

Merula saxatilis. *Aldr. ornith. 2. p. 630.*

Nucifraga. *Briff. av. 2. p. 59. n. 1. t. 1. f. 1.*

Casse-noix. *Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 122. t. 9. planch.
 enlum. n. 50.*

Nut-cracker. *Brit. zool. 2. app. p. 625. t. 3. Arch. zool. 2.
 p. 252. D.*

Waldstarl, Steinheher. *Kram. el. p. 334.*

Tauchenheher. *Frisch. av. t. 56.*

Nuskraeche. *Schranck Naturf. XVIII. p. 67.*

AVES PICÆ. Corvus:

371

Habitat in Europa & Sibiria ad Camtschatcam usque, in pinetis potissimum, colligit editque insecta, baccas, nuces, præsertim pini pineæ; in cavis arborum nidificans, moribus picæ similis, 13 pollices longus.

Corpus maculis triangularibus albis; crissum album; vertex caudæque testrices non maculatæ. Pennæ narium aliquando deficientes; lingua bicuspidata.

Balicassius. II. C. virenti ater, cauda forficata.

Corvus splendide nigro-viridans. Buff. av. 2. p. 31. n. 9. t. 2. f. 1.

Choucas des Philippines. Buff. pl. enlum. n. 603.

Balicasse des Philippines. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 83.

Habitat in insulis Philippinis, eximie cantans.

Rostrum, pedes & ungues nigra; cauda fere 4 pollices longa.

novæ 28. C. fronte, capistro, caudaque nigris, capite, collo, dorso
Guineæ. & pectoris parte superiore obscure cinereis, inferiore, abdomine, crisso & uropygio albis transversim nigro-striatis.
Choucas de la nouvelle Guinée. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 80. pl. enlum. n. 629.

New Guinea Crow. Lath. syn. I. 1. p. 381. n. 13.

Habitat in nova Guinea, pedem longus.

Rostrum nigricans; stria nigra per & pone oculos ducta; pedes breves, sordidi.

papuenfis. 29. C. cinereus abdomine albo, remigibus ex nigricante fuscis.

Choucas de la nouvelle Guinée. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 81. pl. enlum. n. 630.

Papuan Crow. Lath. syn. I. 1. p. 382. n. 14.

Habitat in nova Guinea, 11 pollices longus.

Rostrum fere pollicare, flavicans, dorso mandibula superioris angulato; pedes parvi cinerei; ungues breves.

audus. 30. C. niger, pileo ex mollioribus plumis contexto, collo rarius plumis contexto.

Colnud de Cayenne. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 82. planch. enlum. n. 609.

Bare-necked Crow. Lath. syn. I. 2. p. 382. n. 15.

Habitat in Cayenna, monedula magnitudine.

Rostrum basi latum, sordide caruleum; alarum pennæ nonnullæ dilute griseæ.

calvus. 31. *C. ex ferrugineo fuscus, fronte & vertice calvis.*

Choucas chauve. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 80. pl. enlum. n. 521.

Bald Crow. Latham syn. 1. 1. p. 383. n. 16.

Habitat in Cayenna, 13 pollices longus.

Rostrum paulisper curvatum, sordide nigrum; pedes sordidi; color subtus & in rectricibus caudæ superioribus dilutior.

pacificus. 32. *C. cinereus, subtus in spadiceum vergens, occipite, cer-*
vix, alis caudaque nigris, alarum caudæque apice albæ.

Pacific Crow. Lath. syn. 1. 1. p. 383. n. 17.

Habitat in insulis maris australis 10½ pollices longus.

Rostrum, pedes & ungues nigra; frons & gula pallida; rectrices 2 intermediæ totæ nigrae.

tropicus. 33. *C. niger, crisso punctis sordide albis, cauda rotundata.*

Tropic Crow. Lath. syn. 1. 1. p. 384. n. 18.

Habitat in insula O-why-hee maris australis 12½ pollices longus.

Rostrum 1½ pollicem longum, basi latum; color supra splendidus, alarum & caudæ in virentem vergens; pedes & ungues nigri.

erythro- 34. *C. corpore supra fusco subtus albicante, cauda cuneiformi,*
rhynchos. remigibus basi dilute violaceis, medio nigris, apice albis.

Geay de la Chine à bec rouge. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 115. pl. enlum. n. 622.

Red-billed Jay. Lath. syn. 1. 1. p. 390. n. 24.

Habitat in Sina, glandario major.

Rostrum pedesque rubri; frons, jugulum & pectus aterrima; occiput & cervix dilute grisea; ungues albicantes, longi, adunci, apice nigri.

sinensis. 35. *C. supra ex rufo rubens, vertice fusco, superciliis albis,*
cauda fusca cuneiformi tænia versus apicem nigra, maculaque ad apicem rectricum sordide albis subrotundis.

Chinese Jay. Lath. syn. 1. 1. p. 390. n. 35.

Habitat in Sina, glandarii magnitudine & habitu.

Rostrum pedesque plumbei; linea trans & pone oculos ducta nigra; macula ex cærulescente & albo mixta circulo nigro inclusa ad aures; mentum album; remiges secundariæ fusca.

Asiaticus. 36. C. supra cinereus, subtus ex ferrugineo aurantiis, remigibus rectricibus 2 intermediis cinereis, reliquis rectricibus aurantiis.

Geay de Sibérie. *Buffon hist. nat. des ois.* 3. p. 118. pl. enlum. n. 608.

Siberian Jay. *Lath. syn.* I. 1. p. 391. n. 26.

Habitat in Sibiria, 10 pollices longus.

Rostrum *sordidum*; frons, genæ, mentum, & jugulum *pallida*; vertex *ex subfusco niger, subcristatus*; uropygium *ex ferrugineo aurantium*; pedes *cinerei*.

peruviana. 37. C. supra dilute viridis, subtus dilute flavus, vertice albo, fasciculo gulæ jugulique nigro, rectricibus tribus utrinque exterioribus flavis.

Geay du Pérou. *Buff. hist. nat. des ois.* 3. p. 116. n. 2. pl. enlum. n. 625.

Peruvian Jay. *Lath. syn.* I. 1. p. 391. n. 27.

Habitat in Peru.

Rostrum *sordidum*, basi *linea cærulea circumscriptum*; cauda *cuneiformis*.

flavus. 38. C. supra ex virescente fuscus, subtus flavus, mento & superciliis albis, alis caudaque ex rubescente fuscis.

Carlu ou Geay à ventre jaune de Cayenne. *Buff. hist. nat. des ois.* 3. p. 119. pl. enlum. n. 249.

Yellow-bellied Jay. *Lath. syn.* I. 1. p. 392. n. 28.

Habitat in Cayenna, 9 pollices longus.

Rostrum *nigrum*; vertex *stria media, longitudinati aurea*; pedes *graciles, breves, plumbei*.

afer. 12. C. violaceo-niger, cauda cuneiformi.

Habitat in Africa; nonne idem cum senegalensi?

cyaneus. 39. C. cinereus, vertice splendide atro, alis caudaque cyaneis, rectricibus longissimis, intermediis apice albis. *Pall. it.* 3. p. 694. n. 7.

Blue Crow. *Lath. syn.* I. 1. p. 394. n. 30.

Habitat in Dauria, in quam gregarius adventat Aprili, timidissimus, astutus, clamorosus, in arbutis & salicetis nidificans, habitu moribusque picæ similis, magnitudine lanii infausi. Corpus subtus magis albidum.

Pica. 13. C. albo nigroque varius, cauda cuneiformi. *Fn. succ.* 92. *Scop. ann.* 1. p. 38. n. 41.

Pica. *Nojeman nederl. Vogel.* t. 2.

AVES PICÆ. Corvus.

Pica varia f. *caudata*. *Gesn. av.* 695. *Aldr. orn.* 1. p. 784.
 • t. 785. *Jonst. av.* 44. t. 17. *Briss. av.* 2. p. 35. n. 1.
Pie. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 85. t. 7. pl. enlum. 488.
Magpye or *Piapiet*. *Brit. zool.* 1. n. 18. *Arct. zool.* 2. p. 247.
 n. 136. *Hayes brit. birds.* t. 8. *Raj. av.* p. 41. t. 1.
Will. orn. p. 127. t. 19. *Albin. av.* 1. t. 15.

β. *Pica candida*. *Briss. av.* 2. p. 39. n. 1. A. t. 3. f. 1.
Habitat in Europa & boreali America atque Asia ad Japon
usque, in Madera insula, ad pagos, in turribus, inter
hostes offensos, sylvarum osor, junior facile cicurandus,
& tum perquam docilis; victus animalis & vegetabilis,
quiesquiliæ, ova, pulli gallinarum anserumque; nidus
artificiosus, introitu unico; ova virescentia, maculis
creberrimis nigris. Migrat.

Longitudo 18 pollicum; nigro colori splendor viridis & purpureus; cauda valde longa.

fenega- 14. *C. nigro-violaceus*, cauda cuneiformi, artubus nigris.
 lensis. *Pica fenegalenis*. *Briss. av.* 2. p. 40. n. 2. t. 3. f. 2.
Ple du Sénégal. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 97. pl. enlum.
 n. 538.

African Crow. Lath. syn. 1. 1. p. 394. n. 31.

Habitat ad fluvium Senegal, picæ magnitudine, 14
pollices longus.

Color subtus fordide niger; rostrum nigrum; remiges
 rectricesque fuscae, margine ex violaceo nigro.

caribæus. 40. *C. supra ferrugineus, subtus albus, capite, collo,*
caudaque cuneiformi albo-friata cæruleis, torque
maculaque occipitali albis.

Galgulus antillarum. Briss. av. 2. p. 8. n. 6.

Pica Antillarum, & Pica perfica Aldrovandi? Raj. av.
p. 152. & p. 4. n. 6.

Pie des Antilles. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 101. 129.

Habitat in insulis Antillis, picæ magnitudine.

Rostrum pedesque rubri; macula occipitis (in mare) lineis
transversis nigris; uropygium tectricesque caudæ supe-
riores flavæ; remiges ex cæruleo virides, tectrices
alarum minores castaneæ, mediæ virides, majores cæ-
ruleæ, (in femina virides) scapis marginibusque albidis.

africa- 41. *C. supra fuscus, subtus fordide cinerascens, capite subcri-*
 nus. *stato colloque purpureis, cauda cuneiformi apice alba.*
African Crow. Lath. syn. 1. 1. p. 396. n. 33.

Habitat in Africa, pedem & 10 pollices longus.
Rostrum pedesque rubri; occipitis pennæ apice griseo;
remiges exteriori margine cærulecentes,

- mexica- 42. C. totus ex cæruleo ater,
 nus, Pica mexicana major. *Briss. av. 2. p. 43. n. 4.*
Hoitzanatl. Raj. av. p. 162.
Criard. Pernet, it. mal. 1. p. 185.
Hocifana. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 103.
Mexican Crow. Lath. syn. 1. 1. p. 396. n. 34.
Habitat in nova Hispania, ad oppida, perpetim sonorus,
mongedulæ magnitudine.
Rostrum, pedes & ungues nigri.
- furina- 43. C. viridis, occipite remigumque primariarum apice
 menfis. cyaneis, macula cervicis & pone aures pallide viri-
 dibus, cauda fordida.
Surinam Daw. Brown. illustr. t. 10.
Surinam Crow. Lath. syn. 1. 1. p. 397. n. 35.
Habitat in Surinamo, coronæ magnitudine.
Color profundus variabilis; rostrum remigisque primariæ
fordida; pedes incarnati.
- Zanoe. 44. C. nigricans, capite colloque subfulvis, cauda longa.
Pica mexicana minor. Briss. av. 2. p. 44. n. 5.
Tzanahoei, seu Pica mexicana Hernand. Raj. av. p. 162.
Zanoe. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 106.
Lesser mexican Crow. Lath. syn. 1. 1. p. 397. n. 36.
Habitat in nova Hispania, picæ magnitudine, eique mo-
ribus, astutia, garrulitate, docilitate similis.
Rostrum, pedes & ungues nigra.
- Brachyu- 15. C. viridis, subtus lineisque capitis fulvescentibus, alis
 rus. macula alba.
Merula viridis moluccensis. Briss. av. 2. p. 316. n. 56.
t. 32. f. 1.
Pica indica vulgaris. Raj. av. p. 195. t. 1. f. 10.
Breve de Bengale. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 414.
Merle de Bengale. Buff. pl. enlum. n. 258.
Short-tailed Crow. Lath. syn. 1. 1. p. 398. n. 37.
- β. Corvus philippensis.
Merula viridis moluccensis. Briss. av. 2. p. 319. n. 57.
t. 32. f. 2.
Breve des Philippines. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 413. n. 1.
Merle des Philippines. Buff. pl. enlum. n. 89.

γ. *Corvus bengalensis*.Breve. *Buff. hist. nat. des ois.* 3. p. 413. n. 2.Madras Jay. *Raj. av.* p. 195.Bengal Quail. *Alb. av.* 1. t. 31.Short-tailed Pye. *Edw. glean. t.* 324.δ. *Corvus madagascariensis*.Breve de Madagascar. *Buff. hist. nat. des ois.* 3. p. 414. n. 4.Merle des Moliuques. *Buff. pl. enlum.* n. 257.*Habitat in insulis oceani Indici, 6-7 pollices longus.**Rostrum fuscum; caput nigrum, in γ. tæniis nigris, albis & ex aurantio fuscis alternantibus; anguli oris aurantii; irides albidæ; gula, remiges & cauda nigra, hæ apice viridi; pedes aurantii; ungues sordide rubri.*canaden- 16. *C. fuscus*, fronte flavicante subtus rectricumque apicibus
fis, albus.Garrulus canadensis fuscus. *Briss. av.* 2. p. 54. n. 3. t. 4. f. 2.Geay brun de Canada. *Buff. hist. nat. des ois.* 3. p. 117. pl. enlum. n. 530.Cinereous Crow. *Arch. zool.* 2. p. 248. n. 137, *Latham syn.* 1. 1. p. 389. n. 23.*Habitat in America boreali, & occidentalis potissimum ejus partis silvis, hieme ad habitacula hominum, audax, furto deditus, per paria volitans, vix cicurandus, penum pro hieme colligens, algis, vermibus, carne victitans, nidificans primo vere in pinibus, ovaque cærulea pariens, incolis detestatus, ad 11 pollices longus.**Rostrum robustum nigrum; nares fascicula pennarum albidarum testæ; genæ ex rufescente sordide albæ; verticis pennæ longæ & nigra; alæ, cauda longa, cuneiformis, & pedes nigra.*Pyrrho- 17. *C. nigricans*, rostro luteo, pedibus nigris.

corax.

Pyrrhocorax. *Gesn. av.* 527. *Aldrov. av.* 1. p. 769. t. 16.*Briss. av.* 2. p. 30. n. 8. t. 1. f. 2.Choucas des Alpes. *Buff. hist. nat. des ois.* 3. p. 76. t. 6. pl. enlum. n. 531.Alpine Crow. *Lath. syn.* 1. 1. p. 183. n. 11.Choagh. *Hayes brit. Birds.* t. 6.*Habitat in alpibus Helveticis, 15 pollices longus; voce aucta ingrata; seminibus victitans, hinc segetibus infestus; caro sapida.**Ungues nigri, pedes aliquando flavi; rostrum, prouti tribus insequentibus, subulatum curvum, longius.*

Graculus, 18. C. violaceo-nigricans, rostro pedibusque rubris. S. G. Gmelin it. 3. t. 39.

Gracula pyrrhonorax. Scop. ann. 1. p. 42. n. 46.

Monedula Pyrrhonorax. Hasselq. it. p. 238. n. 19.

Coracias. Aldr. orn. 1. p. 766. t. 368. Briss. av. 2. p. 3. n. 1. t. 1. f. 1. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 1. t. 1. pl. enlum. n. 255.

Coracias f. Pyrrhonorax. Raj. av. p. 40. n. 6.

Graculi tertium genus. Gefn. av. 522.

Cornish Chough. Alb. av. 2 t. 24. Borlase Cornw. p. 249. t. 24. Will. ornith. p. 126. t. 19.

Red-legged Crow. Brit. zool. 1. n. 80. Latham syn. 1. 1. p. 401. n. 39.

Habitat in alpinis Helveticis & Noricis, Anglia, Scotia, Ægypto, Candia, Persia, inquietus, clamitans, vorax, intimidus, furto deditus, moribus monedula, gregarius, in circulo volitans, in rupibus nidificans, ova pariens 4-5 alba maculis flavis, visitans baccis juniperi, locustis, blattis.

Magnitudo monedula; longitudo 16 pollicum; iridium circulus exterior rubens; interior griseus; palpebræ rubræ; ungues magni, adunci, nigri.

australis. 45. C. supra niger, subtus cinereus, rostro rubro, testribus alarum albo maculatis, cauda rotundata.

Cayenne red-billed Crow. Lath. syn. 1. 1. p. 403. n. 40.

Habitat in Cayenna, turdi viscivori magnitudine, 11 pollices longus.

Rostrium sesquipollicare; setæ narium nigra; pedes sordidi; ungues nigri.

Eremita. 19. C. virescens, capite flavescente, occipite subcristato, rostro pedibusque rubris.

Upupa Eremita. Syst. nat. X. 1. p. 118. n. 3.

Coracias cristata. Briss. av. 2. p. 6. n. 2.

Corvus sylvaticus. Gefn. av. 351. Aldr. orn. 3. p. 267. 270.

Coracias huppé ou Sonneur. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 9.

Gefner's Wood Crow. Will. orn. p. 396.

Wood Crow from Switzerland. Albin. av. 3. t. 16.

Hermit Crow. Lath. syn. 1. 1. p. 403. n. 41.

Habitat in alpinis Helveticis, Apenninis, Noricis, gallina magnitudine, altissime volans, gregarius, migratorius,

in rupibus, turribus, & antiquis ædificiis nidificans; 2-3 ova pariens, junior facillime cicurandus. Caro sapida. Color niger, cum splendore viridi; caput striis rubris; cauda brevis.

51. CORACIAS. *Rostrum cultratum apice incurvatum, basi pennis denudatum. Lingua cartilaginea bifida. Pedes ambulatorii.*

Garrula. 1. *C. cærulea*, dorso rubro, remigibus nigris. *Fa. succ.* 94. *Scop. ann.* 1. p. 40. n. 44.

Cornix cærulea. *Gesn. av.* 335. *Aldr. ornith.* 1. p. 790. t. 791. 792. *Günth. Nest. u. Eyer* t. 14.

Galgulus. *Briss. av.* 2. p. 64. n. 1. t. 5. f. 2.

Garrulus argentoratensis. *Raj. av.* p. 41. n. 3.

Rollier. Buffon pl. enlum. n. 468.

Rollier d'Europe. Buffon hist. nat. des ois. 3. p. 135. t. 70.

Roller. Brit. zool. app. p. 624. t. 2. *Arch. zool.* 2. p. 253. G.

Raj. av. p. 42. *Wille orn.* p. 131. t. 20. *Edw. av.* t. 109.

Blauer Raker, Birkheher. Frisch. av. t. 57.

Habitat in Africa, Syria, Sibiria & Europa, gregaria, sonora, migratoria, timida, in arboribus, præsertim betula, rarius in argilla nidificans, ova pariens dilute virentia, maculis innumeris obscuris, viditans scarabæis, vermibus, ranis, glandibus, frugibus; caro multis deliciosa.

Magnitudo corvi glandarii.

Pone aures macula utrinque calva; remiges primariæ subtus cæruleæ; rectrices intermediæ sordide virides, ceteræ cæruleæ, exteriori margine nigro - punctata; pedes flavicantes.

indica. 2. *C. cærulea* antice testacea, pileo viridi.

Blue Jay from the East-indies. Edw. glean. t. 326.

Indian Roller. Latham syn. 1. 1. p. 412. n. 7.

Habitat in Zeylon, garrulæ similis, 11 pollices longa.

Rostrum nigrum, sesquipollicare; vertex ex cæruleo viridis; cervix dorisque pars superior testacea; tempora & gula albo-striata; alæ ex viridi & cæruleo mistæ; rectrices exteriores media sui parte thalassina.

Coraciæ genus per omnem terrarum orbem dispersam; pedibus brevibus ab affinis distinctum.

- caffra.** 3. *C. cærulea*, remigibus margine exteriore luteis.
Cape-Roller. *Lath. syn.* I. 1. p. 412, n. 8.
Habitat in Æthiopia. I. Burmann.
Femina ex cærulefcente nigra.
- abyffinica.** 7. *C. viridis*, genis albis, humeris, uropygio & remigibus majoribus cæruleis, dorso remigibusque secundariis ex aurantio fuscis.
Rollier d'Abyffinie. *Buff. hist. nat. des ois.* 3. p. 143. *planch. enlum.* n. 626.
Abyffinian Roller. *Lath. syn.* I. 1. p. 408, n. 2.
Habitat in Abyffinia.
- fenega-
lentis.** 8. *C. supra ex rubente fusca*, subtus, capite, cauda, alarumque parte superiore ex cærulefcente thalaffinis, facie alba, humeris remigibusque cæruleis.
Rollier du Sénégal. *Buff. hist. nat. des ois.* 3. p. 143. *planch. enlum.* n. 326.
Swallow-tailed indian Roller. *Edw. glean. t.* 327.
Senegal Roller. *Lath. syn.* I. 1. p. 408, n. 3.
Habitat ad fluvium Senegal, & in Zeylon, corvi glandarii magnitudine.
Rostrum nigrum; cauda furcata; pedes ex rubente incarnati.
- madagaf-
carienfis.** 9. *C. ex ferrugineo purpurafcente fusca*, uropygio, criffo & cauda ex cæruleo viridibus, hac verfus apicem fascia purpurafcente, apice ipfo, remigibusque fupra ex atro cæruleis.
Rollier de Madagafcar. *Buff. hist. nat. des ois.* 3. p. 148.
Rolle de Madagafcar. *Buff. pl. enlum.* n. 501.
Madagafcar Roller. *Lath. syn.* I. 1. p. 413, n. 11.
Habitat in Madagafcar, cyaneæ magnitudine.
Rostrum breve, flavum; oculi magni; remiges interiori margine nigra; pedes ex rubente fufci.
- orienta-
lis.** 4. *C. viridis*, jugulo cæruleo ftriato, rectricibus apice nigris.
Galgulus indicus. *Briff. av.* 2. p. 75. n. 4. t. 7. f. 2.
Rollier des Indes. *Buff. hist. nat. des ois.* 3. p. 147. *pl. enlum.* n. 619.
Oriental Roller. *Lath. syn.* I. 1. p. 411, n. 6.
Habitat in India, corvi glandarii magnitudine, 10 ½ pollices longa.
Rostrum flavicans, bafi latius, apice magis aduncum, quam reliquis fpecibus; corpus fupra ex viridi in fufcum, fubtus ex cæruleo in viridem vergens; caput & cervix fufca;

remiges ex cæruleo & nigro mistæ, macula in medio magna pallide cærulea; rectrices basi virides, 2 intermediæ nigra, reliquæ cæruleæ; pedes flavicantes; ungues nigri.

bengalensis.

5. *C. subfulva*, subtus cærulescens, collo subtus violacea pallido striato, cauda integra.

Corvus bengalensis. *Syst. nat.* X. 1. p. 106. n. 6.

Galgulus mindanensis. *Briss. av.* 2. p. 69. n. 2. t. 6. f. 1.

Cuir ou Rollier de Mindanao, *Buff. hist. nat. des ois.* 3. p. 144. pl. enlum. n. 285.

Bengal Pye. *Albin. av.* 1. t. 17.

Bengal Roller. *Latham syn.* I. 1. p. 410. n. 5.

Habitat in Bengala, & *insula* Mindanao, 12½ pollices longa.

Rostrium unguetque nigricantes; vertex viridis; color fulvo violaceus admixtus; dorsi pars inferior cum uropygio cærulea; pectus rufum, in violaceum colorem vergens; tectrices alarum minores, caudæque superiores ex atro cærulea; alarum majores remotioresque ex cæruleo virides, mediæ ex cæruleo & viridi mistæ, proximæ virides; remiges 5 primariæ ex atro cærulea; rectrices 2 intermediæ obscure virides, reliquæ ex cæruleo virides, basi & apicē cærulea; pedes grisei.

- caudata. 6. *C. subfulva*, subtus cærulescens, collo subtus violaceo pallido striato, rectricibus extimis longissimis.

Galgulus angolensis. *Briss. av.* 2. p. 72. n. 3. t. 7. f. 1.

Rollier d'Angola. *Buff. hist. nat. des ois.* 3. p. 144. pl. enlum. n. 88.

Long-tailed Roller. *Lath. syn.* I. 1. p. 409. n. 4.

Habitat in Angola, corvi glandarii magnitudinis, 15½ pollices longa.

Rostrium & ungues nigricant; occiput & cervix virent; dorsi pars inferior, cum uropygio & tectricibus alarum cærulea; tectrices caudæ superiores ex cæruleo virides; abdomen, femora, tectrices alarum & caudæ inferiores, & ad medium usque remiges thalassina; rectrices 2 intermediæ obscure virides, reliquæ ex cæruleo virides, pars extimarum supra ceteras producta ex atro cærulea; pedes grisei.

- cærulea. 10. *C. supra* ex cæruleo pallide viridis, subtus ferruginea, alarum apice nigro.

Blue Roller. *Lath. syn.* I. 1. p. 412. n. 9.

Longitudo 8 pollicum; rostrum fordidum.

- cyanea. 11. *C. tota splendide cyanea.*
 Ultramarine Roller. *Lath. syn. I. 1. p. 413. n. 10.*
 Longitudo 8 pollicum; rostrum sordidum.
- cayen- 12. *C. ex fuscescente viridis, subtus sordide alba, superciliis*
 nenfis. *albis, gulæ stria utrinque nigra, cauda cuneiformi.*
Grivard ou Rolle de Cayennæ. Buff. hist. nat. des ois. 3.
p. 134. pl. enlum. n. 616.
Cayenne Roller. Lath. syn. I. 1. p. 415. n. 15.
Habitat in Cayenna, 9 pollices longa.
Rostrum robustum, rubens, versus apicem paulisper cur-
vatum; pedes pallide grisei, longiores, quam in reli-
quis speciebus.
- mexicana. 13. *C. ex rufo grisea, subtus & alis dilute griseis, flammeo*
admixto.
Galgulus mexicanus. Briss. av. 2. p. 83. n. 8.
Merula mexicana. Seb. mus. I. t. 64. f. 5.
Rollier du Mexique. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 148.
Mexican Roller. Lath. syn. I. 1. p. 413. n. 12.
Habitat in novâ Hispania, turdo multo major.
- striata. 14. *C. ex cæruleo atra, striis exvirescente cæruleis, rostro,*
cauda pedibusque nigris.
Blue striped Roller. Lath. syn. I. 1. p. 414. n. 13. t. 16.
Habitat in nova Caledonia, 8 pollices longa.
Irides rubra; femina non striata ex cinereo grisea; remi-
gibus testricibusque alarum nigris, margine cinereo.
- varia. 15. *C. nigra, subtus, dorfi parte inferiore, uropygio & tec-*
trixibus caudæ superioribus alba, cauda æquali nigra
apice alba.
Cassican de la nouvelle Guinée. Buff. hist. nat. des ois.
7. p. 134. t. 7. pl. enlum. n. 628.
Pied Roller. Lath. syn. I. 1. p. 415. n. 16.
Habitat in nova Guinea? 13 pollices longa, dubii generis.
Rostrum 2½ pollicum, cærulescens; testrices alarum ex
albo & nigro varia; secundariorum alia nigra, alia
alba; remiges majores alarumque margo exterior ni-
gra; testrices 2 intermediæ totæ nigra; pedes plum-
bei; ungues robusti, acuti, nigri.
- sinensis. 16. *C. viridis, subtus ex flavicante alba, cauda cuneiformi,*
apice alba.
Galgulus sinensis. Briss. av. 2. p. 77. n. 5. t. 6. f. 2.

Rolle de la Chine. *Buff. hist. nat. des ois.* 3. p. 132.

Rollier de la Chine. *Buff. pl. enlum.* n. 620.

Chinese Roller. *Lath. syn.* I. 1. p. 414. n. 14.

Habitat in Sina, rarior, corvi glandiarii magnitudine, 11½ pollices longa.

Rostrum, irides, pedes & ungues rubent; stria nigra per oculos ducta; femora grisea; rectrices alarum, remigesque olivaceæ; harum nonnullæ apice albo.

Docilis. 17. *C. alba cum rubicundo interperso, subtus badia pedibus luteis, rectricibus nigris, apice albis. S. G. Gmelin it.* 3. p. 378. t. 42.

Habitat in Asia australi, monedula magnitudine, docilis, imitabunda.

Rostrum luteum; remiges 9 priores ad medium usque albæ, reliqua parte nigræ, ceteræ totæ nigræ; ungues incarnati.

§ 2. ORIOLUS. *Rostrum* conicum, convexum, acutissimum rectum: mandibula superiore paulo longiore, obsolete emarginata.

Lingua bifida acuta.

Pedes ambulatorii.

Galbula. 1. *O. luteus, loris artubusque nigris, rectricibus exterioribus postice flavis. Ad. Stockh.* 1750. 127. t. 3. f. 5.

Coracias Oriolus. Fn. suec. 95. *Scop. ann.* 1. p. 41. n. 45. *Forsk. Fn. arab.* p. 7.

Oriolus. Gesn. av. 713. *Briss. av.* 2. p. 320. n. 58. *Nörmann nederl. Vogel.* t. 11.

Chlorion. Gesn. av. 261.

Galbula f. Picus nidum suspendens. Raj. av. p. 58. n. 5.

Loriot. Buff. hist. nat. des ois. 2. p. 554. t. 17. *pl. enlum.* n. 26.

Yellow Bird from Bengal. Alb. av. 3. t. 19.

Witwall. Will. orn. p. 189.

Golden Thrush. Edw. av. t. 185.

Oriole. Brit. zool. app. n. 4. t. 4.

Golden Oriole. Lath. syn. I. 2. p. 449. n. 43.

Kirschvogel. Günth. Nest. u. Eyer, t. 47.

β. *Icterus maderaspatanus nævius. Briss. av.* 2. p. 91. n. 5.

Mottled Jay. Raj. av. p. 195. n. 9. t. 1. f. 7.

Yellow Starlin from Bengal. *Albin. av. 2. t. 41.*

Yellow indian Starling. *Edw. av. t. 186.*

γ. Oriolus indicus. *Briss. av. 2. p. 328. n. 60.*

Chloris indicus. *Aldr. av. 1. fig. p. 862. Johnst. av. t. 41.*

Loriot des Indes. *Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 264.*

Habitat in Europa, Asia, Africa; migratorius, videntur cerasis, uvis, ficibus, insectis; nidus e foliis urceolatus in ramificationibus arborum; ova 4-5 sordide alba; maculis exiguis obscure fuscis; caro sapida; vox acuta.

Longitudo $9\frac{1}{2}$ pollicum; rostrum & irides rubent; in β. corpus maculis nigris conspersum; loræ artusque in semina ex virescente fusca; alæ hinc inde maculis flavis, magnæque in medio, feminae sordidæ, in γ. maculis cæruleiscentibus insignita; in β. rectrices alarum remigesque nigricantes; rectrices 2 intermediæ apice demum, reliquæ a medio inde flavæ; feminae cauda sordide viridis, rectricibus 2 intermediis ex flavicante albis, in β. nigricans, in γ. tertia in medio cæruleiscente; pedes plumbei; ungues nigri; in β. caput collumque nigra; rectrices caudæ nigro - maculata.

ethinen- 2. O. luteus, artubus nigris apice luteis, fascia occipitis nigra.
fis. Oriolus cochinenfis. *Briss. av. 2. p. 326. n. 59. t. 33. f. 1.*
Coulavan. *Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 262.*
Gouliavan de la Cochinchine. *Buff. pl. enlum. n. 570.*

• *Habitat in Cochinchina, nonne varietas Galbulæ?*
Rostrum flavum; pedes nigri; fascia occipitis ab oculo per occiput ad oculum ducta.

melano- 3. O. luteus, capite, remigibus, apicibusque rectricum inter-
cephalus. mediarum nigris.

Sturnus luteolus. Syst. nat. X. 1. p. 167.

Oriolus bengalensis. *Briss. av. 2. p. 329. n. 61.*

Pica maderaspatana sturni instar maculata. *Raj. av. p. 175. t. 1. f. 7.*

Loriot de la Chine. *Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 262. planch. enlum. n. 79.*

Black headed indian Icterus. *Edw. av. t. 77. Alb. av. 2. p. 41. t. 41.*

Aves hujus generis gregariæ, sonoræ, voraces, frugivoræ, numerosæ, potissimum in America habitant, nidis saepe pendulis.

AVES PICÆ. Oriolus.

Habitat in regione Maderaſpatana, 8½ pollices longa, Galbulæ varietas.

Irides badiæ; gula & pedes nigri; alæ ſtriis longitudinalibus flavis inſignitæ.

- radiatus. 21.** *O. fulvus, capite, gula juguloque nigris albo punctatis, alarum tectricibus remigibusque nigris margine albo. Oriolus capite ſtriato. Briff. av. 2. p. 332. n. 62. Merula bicolor Aldrovandi. Raj. av. p. 67. n. 11. Lorient à tête rayée. Buff. hiſt. nat. des oif. 3. p. 265. Aldrovandus braſilian Merula. Will. orn. p. 193. §. 5. Striped-headed Oriole. Lath. ſyn. 1. 2. p. 453. n. 44. Corpus ſubtus pallidius; pedes flavi; ungues rubicundi.*

- Picus. 22.** *O. rufus, capite, collo & pectore albo maculatis, cauda rotundata.*

Talapiot. Buff. hiſt. nat. des oif. 7. p. 82. pl. enlum. n. 605.

Climbing Oriole. Lath. ſyn. 1. 2. p. 453. n. 45.

Habitat in Gujanæ arboribus, quas pici inſtar conſcendit, inſecta que pone corticem latentia extrahit, 7 pollices longus.

Roſtrum ex flavicante griseum; abdominis color in fuſcum vergens; pedes nigricantes.

- Icterus. 4.** *O. fulvus, capite, jugulo, dorſo, remigibus tectricibusque nigris, macula alarum alba. Scop. ann. 1. p. 39. n. 40.*

Oriolus. Briff. av. 2. p. 86. n. 1. t. 8. f. 1.

Coracias Xanthornus. Scop. ann. 1. p. 39. n. 42.

Guira-Tangeima. Marcgr. braſ. 192. Raj. av. p. 45. n. 6. Will. orn. p. 141.

Troupiale. Buff. hiſt. nat. des oif. 3. p. 203. t. 16. planch. enlum. n. 532.

Banana Bird from Jamaica. Alb. av. 2. t. 40.

Large Banana Bird from Jamaica. Brown. jam. p. 447.

Yellow. and black Pie. Raj. av. p. 181. n. 10. Sloan. jam. p. 301. t. 259. f. 4. Catesb. carol. app. t. 5.

Icteric Oriole. Lath. ſyn. 1. 2. p. 424. n. 6.

Habitat in America calidiore, inſulisque Caribæis, agilis & audax, chryſalides poſſimum perſequitur, nidum ſtruit cylindricum, ab extremo arboris ramo pendulum, in America frequenter ad necanda inſecta domeſticus, tum perquam docilis, 9½ pollices longus.

Roſtrum ut plurimum nigrum, baſi fuſca; orbitæ nudæ caruleſcentes; irides flavicantes; alarum ſcixiæ dææ obliquæ albæ; pedes aliis nigri; aliis ptumbæ, aliis ex grifeo albi.

- novæ 23. O. flavus, capite, gula, remigibus caudaque nigris, tectricibus alarum majoribus apice flavo, minoribus totis nigris. Hispaniæ. *Icterus mexicanus*. *Briss. av. 2. p. 88. n. 2.*
Avis americana de Acolchichi nigro-lutea. Seb. mus. 1. t. 54. f. 4.
Acolchi de Seba. Buffon hist. nat. des ois. 3. p. 206.
Mexican Oriole. Lath. syn. 1. 2. p. 425. n. 8.
Habitat in nova Hispania, Icteri magnitudine.
Rostrum longum, flavum.
- annula-24. O. flavus, capite colloque nigris, tectricibus alarum majoribus remigibusque nigricantibus flavicante marginatis; cauda nigricante annulata. *Icterus cauda annulata. Briss. av. 2. p. 89. n. 3.*
Avis Ocotzinitzan, columbæ magnitudine. Seb. mus. 1. p. 97. t. 63. f. 3.
Arc-en-queue. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 207.
Habitat in America, columbæ magnitudine.
Rostrum flavum; pedes grisei.
- brasilia-25. O. flavus, pectore maculato, capite dorsoque dilute fuscis nus. maculatis, abdomine albo, cauda alisque fuscis, hinc apice albidis. *Icterus brasiliensis. Briss. av. 2. p. 93. n. 8.*
Small yellow and brown Bird. Sloan. jam. p. 309. n. 43.
Brazilian Oriole. Lath. syn. 1. 2. p. 426. n. 9.
Habitat in Jamaica dumetis, 4 pollices longus.
Rostrum $\frac{1}{2}$ pollicem longum; orbitæ flavæ; pedes fusci; ungues flavi.
- Japacani. 26. O. ex nigro & dilute fusco, subtus ex albo & flavo varius, lineis transversis, nigris, capite caudaque nigricantibus. *Japacani. Raj. av. p. 84. n. 12. Will. orn. p. 240. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 208. Lath. syn. 1. 2. p. 426. n. 10.*
Brasiliano duplo major; rostrum nigrum; irides aureæ; pedes sordidi; ungues acuti & nigri.
- Costo- 27. O. niger, subtus caudaque ex croceo & nigro varius. totl. *Icterus novæ Hispaniæ. Briss. av. 2. p. 95. n. 10.*
Xochilol & Costototl. Buffon hist. nat. des ois. 3. p. 210.
New Spain Oriole. Lath. syn. 1. 2. p. 427. n. 11.
Habitat in nova Hispania, sturni magnitudine.
Alæ subtus cinereæ; junior avis tota flava, exceptis alarum apicibus nigris.

griseus. 28. O. ex nigro & flavo varius, dorso, femoribus & abdomine cinereis.

Icterus cinereus novæ Hispaniæ. *Briss. av. 2. p. 96. n. 11.*
 Tocolin. *Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 213.*

Grey Oriole. *Lath. syn. 1. 2. p. 427. n. 12.*

Habitat in novæ Hispaniæ sylvis, sturni magnitudine, non canorus; caro sapida.

phœni- 5. O. niger, alarum tectricibus fulvis.
 œus.

Icterus pterophœniceus. *Briss. av. 2. p. 97. n. 12.*

Pterophœnicus Indiarum. *Nieremb. nat. 225.*

Acolichichi. *Hern. mex. 14. Raj. av. p. 166. n. 6.*

Commandeur. *Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 214.*

Troupiales à ailes rouges. *Buff. pl. enum. n. 402.*

Scarlet-feathered indian Bird. *Will. orn. p. 391.*

Red-winged Starling. *Catesb. Carol. 1. t. 13. Alb. av. 1. t. 13.*

Red-winged Oriole. *Arch. zool. 2. p. 255. n. 140. Lath. syn. 1. 2. p. 428. n. 13.*

Habitat gregibus numerosissimis in America a Noveboraco ad novam Hispaniam usque, sturni magnitudine, 8-9 pollices longus, oryxæ segetes devastans, insectis ceterum visitans, & vermibus, qui ea ave extirpata tanto lætius vivunt & multiplicantur. Nidum struit densum pendulum inter arundines ea altitudine, ut fluctus avellere non possint; ova parit alba striis raris & irregularibus nigris.

Tota avis nigra, exceptis iridibus albis, alarumque tectricibus fulvis vel rubris.

america- 29. O. niger, mento, jugulo, pectore alarumque angulo
 rus. superiore rubris.

Merula indica, pectore cinnabarinum, an Jacapu Marcgr. *Raj. av. p. 67. n. 10.*

Troupiale de Cayenne. *Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 218. pl. enum. p. 236. f. 2.*

Red-breasted indian Blackbird. *Will. orn. p. 194. n. 7.*

Mocking bird of Gujana. *Bancr. Guj. p. 177.*

Red-breasted Oriole. *Lath. syn. 1. 2. p. 430. n. 14.*

Habitat in Gujana & Cayenna, 7 pollices longus, grate canorus, imitabundus, nido cylindrico longo pendulo.

oryzivo- 30. O. niger, capitis, colli pectorisque splendore purpureo.
 rus.

Rice Oriole. *Lath. syn. 1. 2. p. 423. n. 5.*

Habitat in Cayenna, 9 pollices longus.

Rostrum sesquipollicare, basi convexum & protuberans.

- Indovici- 31. O. ex nigro & albo varius, capite, collo, abdomine &
cianus. uropygio albis, alis caudaque cuneiformi violaceis
margine albo.
Cassique de la Louisiane. *Buff. hist. nat. des ois.* 3. p. 242.
pl. enlum. n. 646.
White-headed Oriole. *Arch. zool.* 2. p. 260. n. 148. *Lath.*
syn. I. 2. p. 422. n. 4.
Habitat in America boreali, potissimum Louisiana, 10
pollices longus.
Rostrum nigrum, pollicare, pedes plumbei.
- hudson- 32. O. fordidus, capite, gula, tectricibus alarum nonnullis
nius. inferioribus, remigibus primoribus, femoribus, pectorif-
que striis albis.
Hudsonian white-headed Oriole. *Arch. zool.* 2. p. 260.
n. 148.
Habitat in sinu Hudsonis, 8½ pollices longus, rarior.
- cristatus. 33. O. aterrimus, vertice penni aliquot elongatis subcristato.
Xanthornus maximus. *Pall. spicil. zool.* 6. p. 3. t. 1.
Cassique huppé de Cayenne. *Buff. hist. nat. des ois.* 3. p.
241. *pl. enlum. 344.*
Crested Oriole. *Latham syn.* I. 2. p. 421. n. 3.
β. Xanthornus olivaceus, subtus badius. *Lath. syn.* I. 2.
p. 421. n. 3. A.
γ. Cassique vert de Cayenne. *Buff. hist. nat. des ois.* 3. p. 240.
pl. enlum. n. 328.
Grüner Citronvogel. *Naturf.* IV. p. 1. t. 1.
Habitat in Surinamo & Cayenna, 18. β. 20. γ. 14 polli-
ces longus.
Rostrum majusculum sordide flavum, in β. apice aurantium,
in γ. totum rubrum, basi versus frontem denudata, gib-
bosa, rotundata & convexa; nares laterales subrotundæ,
parvulæ in sulco obsoleto, ante tophum plumaceum horri-
dulum lateraliter in rostrum excurrentem posita denu-
data; lingua angusta canaliculata, profunde in 2 laci-
nias acute fissa; pili ad oris angulos vel tenerrimi, vel
nulli; cauda rotundata, rectricibus 2 intermediis nigris,
in β. badiis, reliquis citrinis; in γ. corpus antice cum
tectricibus alarum viride, postice badium; remiges pedes-
que nigra.
- hæmor- 6. O. niger, uropygio coccineo. *Briss. av.* 2. p. 98. n. 13.
rhous. t. 8. f. 2.
Cassique rouge de Brésil ou Jupuba. *Buff. hist. nat. des*
ois. 3. p. 238. *pl. enlum. n. 432.*

Red-rumped Oriole. *Lath. syn.* I. 2. p. 420. n. 1.

β. Cassique brun. *Ornith. de Salern.* p. 112.

Habitat in Brasilia; Cayenna, β. *in* Gujana, II pollices longus.

Rostrum sulphureum; in β. corpus ex atro fuscum, uropygium vinaceum.

perficus. 7. O. niger, dorso postico, maculaque tectricum alarum basique rectricum luteis.

Cassicus luteus. *Briss. av.* 2. p. 100. n. 14. t. 9. f. 1.

Cassique jaune du Brésil. *Buff. hist. nat. des ois.* 3. p. 235. pl. enlum. n. 184.

Pica perfica. *Bell. ex.* 292. *Aldr. orn.* I. p. 793. t. 795. *Will. orn.* 90. *Raj. av.* 42.

β. Jupujuba. *Marcgr. bras.* 193.

Jupujuba s. Japu. *Raj. av.* p. 46. n. 7.

Brasilian Jupujuba, or Japu of Marcgrave. *Will. orn.* p. 142.

γ. Black and yellow Daw of Brasil. *Edw. av.* p. 319.

Habitat in calidioribus Americæ australis; nidus alembici forma prope pagos ex arboris extremis ramis pendens (ex una nonnunquam 400) ex stramine, setis, pilis, totlandia usneoides contextus, ter non raro per annum pariens.

Rostrum flavescens; lingua β. cærulea; irides cæruleæ; pedes & ungues nigri; in γ. nigredini purpureus splendor affulget; in β. rectrices subtus flavæ, altera partem nigra, supra nigra; extima basi flavæ.

mexica- 8. O. nigricans, subtus capiteque luteus.
nus.

Icterus fuscus novæ Hispaniæ. *Briss. av.* 2. p. 105. n. 17.

Troupiale à calotte noire. *Buff. hist. nat. des ois.* 3. p. 222.

Troupiale jaune à calotte noire de Cayenne. *Buff. pl. enlum.* n. 533.

Black-crowned Oriol. *Lath. syn.* I. 2. p. 431. n. 17.

Habitat in nova Hispania & Cayenna, 19 fere pollices longus.

Rostrum, pedes & ungues flavicant; collum flavum; vertex ex atro fuscus; cauda & alæ nigra.

ruber. 34. O. miniatus, alis, abdomine & cauda nigerrimis.

Troupiale rouge d'Antigue. *Sonner. it.* p. 113. t. 68.

Red Oriole. *Lath. syn.* I. 2. p. 431. n. 16.

Habitat in Antigua insula Panay.

Rostrum pedesque nigrescent.

gujaren- 9. O. nigricans, marginibus pennarum griseis, pectore collo-
que subtus rubris.

Icterus gujanensis. *Briss.* av. 2. p. 107. n. 18. t. 11. f. 1.
Troupiale de la Gujane. *Buff. hist. nat. des ois.* 3. p. 218,
pl. enlum. n. 536.

Gujana Oriole. *Latham. syn.* I. 2. p. 430. n. 15.

Habitat in Gujana, *ultra 7 pollices longus.*

*Pennarum margo, caudæque stria grisea; corpus a menta
ad abdomen rubrum; pedes & ungues fusci.*

flavus. 35. *O. aureus, dorso postico, alis, caudaque nigris.*

Troupiale jaune d'Antigue. *Sonner. it. p.* 113. t. 69.

Antiguan yellow Oriole. *Lath. syn.* I. 2. p. 432. n. 18.

Habitat in Antigua *insulæ* Panay, & *America australi,*
Rostrium & pedes nigricant; irides rubent.

Baltimo- 10. *O. nigricans, subtus fasciaque alarum fulvus,*

re. *Icterus minor.* *Briss.* av. 2. p. 109. n. 19. t. 12. f. 1.

Baltimore. *Arch. zool.* 2. p. 257. n. 142. t. 12. *Catesb.*
Carol. 1. t. 48. *Buff. hist. nat. des ois.* 3. p. 231. pl.
enlum. n. 506. f. 1. *Lath. syn.* I. 2. p. 433. n. 19.

Habitat in America boreali, *ante hiemem discedens, 7
pollices longus; nidum struit marsupii forma apice pa-
tulum foramine laterali hiantem ex bifurcatura ramo-
rum liriodendri, platani, &c. pendulum.*

*Rostrium plumbeum; tectrices alarum majores nigra apice
alba; remiges primores sordida, margine albo; tectrices
2 intermedia nigra, reliqua parte inferiori nigra,
reliqua aurantiæ.*

*Femina caput & dorsum olivaceum subfusco marginatum;
corpus subtus, caudæque tectrices flava; cauda ipsa
sordida, margine flavo.*

spurius. 11. *O. niger, subtus fulvus, fascia alarum alba.*

Icterus minor spurius. *Briss.* av. 2. p. 111. n. 20. t. 10. f. 3.
Baltimore Bastard. *Arch. zool.* 2. p. 258. n. 143. *Buff. hist.*
nat. des ois. 3. p. 233. pl. enlum. n. 506. f. 2. *Latham*
syn. I. 2. p. 433. n. 20. *Catesb. Carol.* 1. t. 49.

Habitat in America boreali, *præcedentis magnitudine,
paulo tamen brevior; nido ex arbore malo pendulo, ovis s.*
*Dors. pars inferior tectricelque caudæ fulvæ; alarum mi-
niores dilute badia, majores nigra, margine sordide
albo; remiges sordida margine albo; cauda nigra cu-
neiformis.*

*Femina caput cervixque olivacea, gula nigra; tectrices
alarum remigelque sordida margine albo; corpus subtus
ex virescente flavum; cauda sordida, margine flavo.*

- textos.** 36. *O. flavus*, capite fusco cum splendore aureo, remigibus rectricibusque nigricantibus margine aurantio.
 Cap-more. *Buff. hist. nat. des ois.* 3. p. 226.
 Troupiale mâle & femelle du Sénégal. *Buff. planch. enlum.* n. 375. 376.
 Weever-Oriole. *Lath. syn.* I. 2. p. 435. n. 21.
Habitat ad fluvium Senegal, voce acuta, galbulæ magnitudine; uterque sexus nidum struit.
 Rostrum corneum; caput aliquando per hiemem flavum; cervix nonnunquam fusca, alæ caudaque sordidæ flavo marginatæ, & abdomen cum femoribus albicans; irides aurantiæ; pedes rubescentes.
- Bonanz.** 12. *O. fulvus*, capite pectoreque castaneis, dorso, remigibus rectricibusque nigris.
 Isterus minor nidum suspendens. *Sloane jam.* 2. p. 299. t. 257. f. 1.
 Xanthornus. *Briss. av.* 2. p. 115. n. 22. t. 12. f. 2.
 Xochitototl. *Hern. mex.* 40. *Raj. av.* p. 167. n. 12.
 Carouge. *Buff. hist. nat. des ois.* 3. p. 243. *planch. enlum.* n. 535. f. 1.
 Bonana Bird. *Brown. jam.* p. 477. *Lath. syn.* I. 2. p. 436. n. 22.
Habitat in insulis Americæ meridionali obversis, 7 pollices longus; nidus intertextus e foliorum fibrillis quartam globi partem efformans sub folio musæ, quod parietem ejus constituit.
 Rostrum, dorsi pars superior, remiges & cauda nigra; collum castaneum; uropygium punctis castaneis insignitum; pedes & ungues grisei.
- nidipendulus.** 37. *O. capistro* & torque nigris, vertice, collo, dorso caudaque ex rubicundo fuscis, pectore & abdomine ex fusco flavis.
 Isterus minor, nidum suspendens, watchy Picket, spanish Nightingale, american Hangnest. *Raj. av.* p. 184. *Sloane jam.* p. 300. n. 17. t. 258. f. 3.
 Hangnest Oriole. *Lath. syn.* I. 2. p. 437. n. 23.
Habitat in Jamaicæ silvis, voce suavi, nido ex arborum altorum extremis ramis pendulo.
 Rostrum album; alæ obscurius fuscae, albo intermixto.
- varius.** 38. *O. niger*, subtus, uropygio, & testricibus alarum minoribus ferrugineus.
 Carouge de Cayenne. *Buff. pl. enlum.* n. 607. f. 1.

Bastard Baltimore female. *Catesb. carol. r. t. 49. f. inf.*
 Chefnat and black Baltimore. *Lath. syn. I. 2. p. 437. n. 24.*
Habitat in Cayenna, 6 pollices longus.
 Rostrum & pedes ex caruleo atra; remigum secundariorum
 margo exterior sordide albus.

Xanthor- 13. O. luteus, gula remigibus rectricibusque nigris.

nus. Xanthornus mexicanus. *Briss. av. 2. p. 118. n. 23. t. 1. f. 2.*
 Avis Ayoquantototl. *Hern. mex. 54. Seb. mus. 2. p. 102.*
t. 96. f. 5. Raj. av. p. 171.
 Carouge du Mexique. *Buff. pl. enlum. n. 5. f. 1.*
 Petit Cul-jaune de Cayenne. *Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 247.*
 Lesser Bonana Bird. *Edw. glean. t. 243. Lath. syn. I. 2.*
p. 439. n. 25.
Habitat in Jamaica & nova Hispania, 7½ pollices longus.
 Rostrum nigricans; rectrices alarum nigrae, plurimæ
 margine, remiges intus, basim versus albæ; pedes &
 ungues nigri.

domini- 14. O. niger, corpore postico, rectricibus alarum maculaque
 centis. luteis.

Xanthornus dominicensis. *Briss. av. 2. p. 121. n. 25. t. 12.*
f. 3.
 Carouge de S. Domingue. *Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 247.*
pl. enlum. n. 5. f. 2.
 S. Domingo Oriole. *Lath. syn. I. 2. p. 439. n. 26.*
Habitat in nova Hispania, insulisque Jamaica & S. Domini-
ci, 8 pollices longus; cantus galbulæ; nidus ab extremis
ramis arborum ad aquas plantatarum positus peræ forma
multilocularis. Utrum femina Xanthorni, an cum cayan-
ensi & chrysocephalo in unam speciem conjugendus?

Jamacaii. 39. O. flavus, capite, jugulo, humeri macula, alis, cauda-
 que nigris.

Xanthornus brasiliensis. *Briss. av. p. 120. n. 24.*
 Jamacaii. *Raj. av. p. 75. Will. orn. p. 137. t. 42. Salern.*
orn. p. 221. n. 4. t. 16 f. 5.
 Brazilian Oriole. *Lath. syn. I. 2. p. 439. n. 27.*
Habitat in Brasilia, nidum filis assigens musæ folio, 10
fere pollices longus.
 Rostrum nigrum, basi caruleum; rectrices alarum macula
 media alba; pedes fuscii.

cayanen- 15. O. niger, macula alarum lutea.

lis. Xanthornus cayanensis. *Briss. av. 2. p. 123. n. 26. t. 9. f. 2.*

AVES PICÆ. Oriolus.

Carouge de l'île de S. Thomas. *Buffon hist. nat. des ois.* 3. p. 248. *pl. enlum. n.* 535. f. 2.
 Yellow-winged Pye. *Edw. glean. t.* 322.
 Yellow-winged Oriole. *Lath. syn. I. 2. p.* 440. n. 28.
Habitat in Cayenna & insula S. Thomæ, 8 pollices longus.
Rostrum nigrum; cauda rotundata.

leucopte-40. O. niger, macula alarum alba.

rus.

White-winged Oriole. *Lath. syn. I. 1. p.* 440. n. 29.
 β. White-backed Oriole. *Arct. zool. 2. p.* 257. n. 141.
 White backed Maik-thieves. *Kalm. it. 2. p.* 274.
Habitat in Cayenna, β. ad Noveboracum usque, cayanensis magnitudine.
Rostrum pedesque nigra.

icteroce-16. O. niger, capite colloque luteis.

phalus.

Xanthornus icterocephalus cayanensis. Briss. av. 2. p. 124. n. 27. t. 12. f. 4.
Cornix atra, capite collo pectoreque flavis. Nov. Comm. Petr. II. p. 435. t. 15. f. 7.
Coiffes jaunes. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 217. 250.
 Carouge de Cayenne. *Buff. pl. enlum. n.* 343.
 Yellow-headed Starling. *Edw. glean. t.* 323.
 Yellow-headed Oriole. *Lath. syn. I. 2. p.* 441. n. 30.
Habitat in Cayenna, 7 pollices longus.
Rostrum nigricans; pedes & ungues fusci.

melan-17. O. griseus nigro-punctatus, fascia oculorum atra.

cholicus.

Fringilla melancholica. Syst. nat. X. 1. p. 180. n. 7.
Xanthornus nævius. Briss. av. 2. p. 126. n. 29.
Shomburger. Edw. av. t. 85. *Lath. syn. I. 2. p.* 441. n. 31.
 β. Troupiale tacheté de Cayenne. *Buff. hist. nat. des ois. 3. p.* 223. *pl. enlum. n.* 448. f. 1. 2.
Habitat in nova Hispania, β. in Cayenna, alauda magnitudine, 6 pollices longus.
Rostrum cum pedibus incarnatum; irides badia, s. aurantia; pennæ singulæ macula media nigricante; remiges & cauda nigricantes margine ex rufo fusco; genæ & gula nigra, hæc in β. alba.

capensis. 18. O. fusco-olivaceus subtus luteus.

Xanthornus Capitis bonæ spei. Briss. av. 2. p. 128. n. 30.
 Carouge du Cap de bonne espérance. *Buff. planch. enlum. n.* 607. f. 2.

Carouge olive de la Louifiane. *Buff. hift. nat. des oif.* 3. p. 251.

Olive Oriole. *Arđ. ſool.* 2. p. 260. n. 149. *Latham ſyn.* I. 2. p. 444. n. 35.

Habitat ad Caput bonæ ſpei, & in Louifiana, 7 pollices longus.

Roſtrum, pedes & ungues *fuſca*, verticis *color in grifeum*, gulæ jugulique *in aurantium vergens*, tectrices *alarum fuſcæ*, margine & apice *olivaceis*, remiges *fuſcæ* margine *olivaceo*.

cæruleus. 41. O. niger aut cinereus, capite, alis caudaque cæruleis.

Xanthornus cæruleus. *Briff. av.* 2. p. 125. n. 28.

Small blue Jay. *Raj. av.* p. 95. n. 11. t. 1. f. 11.

Blue Oriole. *Latham ſyn.* I. 2. p. 444. n. 36.

Habitat in regione Maderaſpatana. Roſtrum ruſum.

viridis. 42. O. viridis, ſuperciliis, genis, gulaque, flavis, tectricum alarum nonnullarum apice albo.

Yellow-throated Oriole. *Arđ. ſool.* 2. p. 261. n. 150.

Habitat in ſinu Hudſonis, 9 pollices longus.

ferrugineus. 43. O. niger, pennarum margine ferrugineo, capite & cervice ex nigricante purpuſcentibus, abdomine ſordido.

Ruſty Oriole. *Arđ. ſool.* 2. p. 260. n. 146.

Habitat in Noveboraco, 7-8 pollices longus.

Roſtrum & pedes ſordidi; area oculorum *nigra*; alarum caudæque ſplendor *vireſcens*.

fuſcus. 44. O. niger, capite ex ferrugineo fuſco, cauda ſordida.

Brown headed Oriole. *Arđ. ſool.* 2. p. 259. n. 145.

Habitat in Noveboraco, gregarius.

niger. 45. O. totius niger.

Iſterus niger. *Briff. av.* 2. p. 103. n. 15. t. 10. f. 1.

Troupiale noir. *Buffon hift. nat. des oif.* 3. p. 320. pl. enlum. n. 534.

Black Oriole. *Arđ. ſool.* 2. p. 259. n. 144. *Latham ſyn.* I. 2. p. 445. n. 37.

Habitat in America boreali, 10 fere pollices longus, gregarius, vermibus & ſcarabæis viſitans, incubationis tempore ſuaviſſime cantans; nidum in arboribus ſtruit, 8 circiter pedibus ſupra terram elatum, & ova 5 parit obſcuro coloris, maculis nigris notata.

Femina coloris ex *vireſcente fuſci*; ſubtus & capite in cinereum colorem vergens.

- minor.** 46. *O. niger*, capitis nigredini cæruleo colore intermixto.
 Petit Troupiale noir. *Buffon hist. nat. des ois.* 3. p. 221.
 Troupiale de la Caroline. *Buff. pl. enlum.* n. 606. f. 1.
 Lesser black Oriole. *Latham syn.* 1. 2. p. 446. n. 38.
Habitat in America, 6 pollices longus, facie cicurandus.
Femina etiam in alis & cauda color cæruleus intermixtus.
- olivaceus.** 47. *O. olivaceus*, capite, gula, jugulo, & pectore fuscis, alis
 nigris.
 Troupiale olive de Cayenne. *Buff. hist. nat. des ois.* 3.
 p. 225. *pl. enlum.* n. 606. f. 2.
 Cayenne Olive Oriole. *Latham syn.* 1. 2. p. 447. n. 39.
Habitat in Cayenna.
Rostrium & pedes nigra.
- Aunalaschken.** 48. *O. fuscus*, macula suboculari mentoque albis, jugulo &
 pectore ex ferrugineo fuscis.
 Aonalaschken Oriole. *Lath. syn.* 1. 2. p. 447. n. 40.
Habitat in Aunalaschka, 8 pollices longus.
Rostrium & pedes fusca.
- caudatus.** 49. *O. varius*, rectricibus angustis acuminatis.
 Sharp-tailed Oriole. *Arct. zool.* 2. p. 261. n. 151. *Latham*
syn. 1. 2. p. 448. n. 41. t. 17.
Habitat in Noveboraco, alaude magnitudine.
Rostrium obscurum; vertex fuscus & cinereus; genæ fus-
cæ; pectus, femora & crurum pallide flavescencia, ma-
culis fuscis; abdomen album; dorsum ex cinereo, ni-
gro & albo varium; remiges testicesque alarum fuscæ,
hæ margine ferrugineo; cauda obscure olivacea, fasciis
obsoletis; pedes pallide fusci.
- sinensis.** 50. *O. albus*, capite, collo, pectore, & superiore dorsi parte
 cinereis, remigibus chalybeis, cauda rotundata ex cha-
 lybeo & albo mixta.
 Kink. *Buff. hist. nat. des ois.* 3. p. 253. *Latham syn.* 1. 2.
 p. 448. n. 42.
 Kink de la Chine. *Buff. pl. enlum.* n. 617.
Habitat in Sina.
Rostrium ex rubicundo fuscum; pedes incarnati.
- aureus.** 19. *O. flavo-fulvus*, capistro, gula, testricibus primariis
 rectricumque extremitate nigris.
 Icterus indicus. *Briss. av. app.* p. 37. n. 31.
 Paradisea flavo-fulva. *Mus. Ad. Frid.* 1. p. 15.

Rollier de Paradis. *Buff. hist. nat. des ois.* 3. p. 149.

Golden Bird of Paradise. *Edw. av. t.* 112. *Lath. syn. I.*

2. p. 483. n. 8.

Habitat in India, 8 pollices longus.

Rostrum fuscum.

viridis. 51. O. olivaceus, subtus in viridem vergens, alarum apice & tectricibus inferioribus flavis, superioribus & majoribus fuscis flavo marginatis, cauda rotundata.

Icterus minor viridis. *Briss. av. 2. p.* 113. n. 21. t. 2. f. 2.

Troupiale de S. Domingue, appelé le Siffleur. *Buff. hist. nat. des ois.* 3. p. 230. *pl. enlum. n.* 236. f. 1.

Whistler-Oriole. *Lath. syn. I.* 2. p. 443. n. 34.

Habitat in insula S. Dominici, 7 fere pollices longus.

Rostrum corneum; pedes & ungues grisei.

furcatus. 52. O. niger, dorso, uropygio, remigibus, caudaque furcata in cæruleum vergentibus, tectricibus caudæ inferioribus albis.

Icterus cauda bifida. *Briss. av. 2. p.* 105. n. 16.

Fork-tailed Oriole. *Lath. syn. I.* 2. p. 443. n. 33.

Habitat in nova Hispania.

Rostrum flavum; cauda longa; pedes cum unguibus nigri.

chrysocephalus. 20. O. niger, pileo tectricibus alarum caudæque luteis.

Xanthornus icterocephalus americanus. *Briss. av. app. p.* 38. t. 2. f. 2.

Goldkœpfge gelbschulterrichte Atzel. *Merrem Beytr. I.* p. 14. t. 3.

Habitat in America, ultra 8 pollices longus, alaudæ magnitudine.

Occiput & femora aurea; rostrum nigrum; pedes cum unguibus ex nigro fusci.

53. GRACULA. *Rostrum convexo-cultratum, basi nudiusculum.*

Lingua integra, auctiuscula, car-nosa.

Pedes ambulatorii.

religiosa. 1. Gr. nigro-violacea, macula alarum alba, fascia occipitis nuda flava.

Mainatus. *Briss. av. 2. p.* 305. n. 49. t. 28. f. 2.

Corvus javanensis. *Osb. it.* 102.

AVES PICÆ. Gracula.

Sturnus indicus. Bont. jav. 67. Raj. av. p. 68. n. 2.

Mainate. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 416. t. 25.

Mainate des Indes orientales. Buff. pl. enlum. n. 268.

Bontius indian Stare. Will. orn. p. 145. t. 38.

Minor from the Eastindies. Albin. av. 2. p. 35. t. 38.

Lesser Minor or Mino. Edw. av. 1. t. 17.

Minor Grakle. Lath. syn. 1. 2. p. 455. n. 1.

β. Mainatus major. Briss. av. 2. p. 308. n. 50.

Grand Mainate. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 419.

Greater Minor or Mino. Edw. av. 1. t. 17.

Habitat in India, insulisque oceani Indici, 10½ pollices longa, β. major, mansueta, fructibus, cerasis, uvis, &c. victans, in adibus loquacissima, præstantior psittaco, egregie sibilans.

Rostrum rubrum apice flavum; pedes fulvi; pennæ capitis (exceptis intermediis) brevissimæ, holosericeæ; fascia nuda infra oculos fere ad nucham; remiges 2-8 fascia alba.

calva. 2. Gr. subcinerea, capite utrinque nudo.

Merula calva. Briss. av. 2. p. 280. n. 36. t. 26. f. 2.

Merle chauve des Philippines. Buff. pl. enlum. n. 200.

Goulin. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 420.

Iting, Tabaduru, vel Gulin (Palacæ species). Camel.

Ad. angl. 23. p. 1397. n. 43.

Bald Grakle. Lath. syn. 1. 2. p. 497. n. 2.

Habitat in Philippinis, vorax, victans fructibus, in cavis arborum, potissimum cocos nidificans.

Rostrum pedesque fusca; latera capitis, dum irascitur avis, coccineæ; linea verticis plumosa nigra.

fætida 3. Gr. nigra, remigibus extus cærulescentibus, fascia collarî nuda.

Fetid Grakle. Lath. syn. 1. 2. p. 460. n. 4.

Habitat in America. Rolander.

Magnitudo picæ; caput plumis erectis brevissimis quasi holosericeum; rostrum fere cuculi; nares ovata nuda; lingua acuta; alæ compositis remigibus extus cærulescentes absque alba macula; rectrices æquales.

Barita. 4. Gr. subgrisea, humeris cæruleis, remigibus extus viridibus.

Monedula tota nigra. Sloan. jam. 2. p. 299. t. 257. f. 2.

Raj. av. p. 185. n. 28.

Graculæ omnes extra Europam habitant, rostro crasso, ad latera compresso; ad basin ejus nares exiles; ungues adunci, acuti; digitorum anteriorum medius basî cum exteriori connexus.

Boat-tailed Grakle. *Arch. zool.* 2. p. 264. n. 154. *Lath. syn.* 1. 2. p. 460. n. 5. t. 18.

Habitat in insulis Antillis, & calidiori Americæ borealis parte, hic insectis & zea, ibi musarum fructibus victitans, quos devastat. Rolander.

Rostrum breviusculum, cultratum, nigricans, basi nudum, subtus albicans; alæ complicatis remigibus virides; explicatæ remiges intus nigre; cauda rotundata, viridis dum complicata, & supra concava.

crista-
tella.

5. Gr. nigra, remigibus primoribus basi rectricibusque apice albis, rostro flavo.

Merula sinensis cristata. *Briss. av.* 2. p. 253. n. 21.

Merle huppé de la Chine. *Buff. hist. nat. des ois.* 3. p. 367. pl. enlum. 507.

Chinese Starling or Blackbird. *Edw. av.* 1. t. 19.

Crested Grakle. *Lath. syn.* 1. 2. p. 464. n. 7.

Habitat in Sina, oryza, vermibus, insectis victitans, egregie loquax & sibilans; 8½ pollices longa.

Color nigricans, in cæruleum vergens; irides aurantiæ; frontis pennæ elongatæ, cristæ in modum erigendæ; remiges majores a basi ad medium usque albæ, ceterum ex atro cæruleæ; pedes flavi.

Saularis. 6. Gr. nigro-cærulescens, abdomine, macula alarum, rectricibusque lateralibus albis.

Lanius bengalensis niger. *Briss. av.* 2. p. 184. & suppl. p. 41. n. 19.

Saularis maderaspatanus. *Raj. av.* p. 197. t. 2. f. 19. 20.

Pie - griesche noire de Bengale. *Buff. hist. nat. des ois.* 1. p. 299.

Bengal Magpie or Dial-bird. *Alb. av.* 3. p. 17. t. 17. 18.

Little indian Pie. *Edw. av.* t. 181.

Dial Grakle. *Lath. syn.* 1. 2. p. 465. n. 8.

Habitat in Bengala, turdi viscivori magnitudine.

Femina supra quidem nigra, jugulo tamen & pectore fusca.

Quiscal. 7. Gr. nigro-violacea, cauda rotundata.

Pica jamaicensis. *Briss. av.* 2. p. 41. n. 3.

Pie de la Jamaïque. *Buff. hist. nat. des ois.* 3. p. 97. n. 2.

Purple Jackdaw. *Catesb. carol.* 1. p. 12. t. 12.

Barbado's Blackbird. *Brown. jam.* p. 476.

Purple Grakle. *Arch. zool.* 2. p. 263. n. 153. *Lath. syn.*

1. 2. p. 462. n. 6.

Tequiquiacatzanatl. Fern. Mex. 21.

Maisdieb. Kalm it. 3. p. 33.

Habitat in America septentrionali ad novam Hispaniam & Jamaicam usque, migratoria, suaviter cantans, in arboribus abditarum ut plurimum regionum nidificans, ova pariens 5-6, cærulescentia, maculis struisque nigris insignita, famelica quidem oryza, hordeo, avena, tritico visitans, lubentius tamen rixania aquatica & zea mays, qua consitos agros devastat, hinc Virginianis invisa avis, aqua & igne interdicta, sed injuste, destruit enim bruchos pisi, & prata infestantes vermes, ita ut ea fere exstirpata omne granen comestum viderent 1750 Pensylvaniæ incolæ. Caro parum sapida.

Longitudo $13\frac{1}{2}$, femina $11\frac{1}{2}$ pollicum. Rostrum & pedes nigra; irides argenteæ; cauda longa, cuneiformis, una cum alis purpurea; femina tota, præcipue dorso, alis, caudaque obscura.

Atthis. 8. Gr. viridi-cærulea, abdomine ferrugineo, pedibus sanguineis.

Corvus (ægyptius) viridi-maculatus, dorso medio cæruleo. Hasselq. it. 140. n. 20.

Egyptian Grakle. Lath. syn. I. 2. p. 466. n. 9.

Habitat in Ægypto, in sedis visitans, alaudæ magnitudine, 4 pollices longa.

longiro- 9. Gr. brunnea, subtus ochroleuca, capite & collo atris, str. fascia collari nuda rugosa, alarum area albâ, cauda cuneiformi nigra, tectricibus ferrugineis. Pall. spicil. 6. p. 5. t. 2. f. 2.

Longbilled Grakle. Lath. syn. I. 2. p. 466. n. 10.

β. Oriolus nobilis, edle Atzel. Merrem Beytr. I. p. 8. t. 2.

Habitat in America australi, β. in insulis Sandwich ultra 8 pollices longa.

Rostrum nigrum, longius, quam reliquis speciebus, naribus in medio positis; lingua profunde bifida, marginibus laceris; irides obscuræ; remiges primariæ basi oblique albæ; pedes longi robusti nigri; habitus gracilis.

β. Sturni magnitudine; rostri basi nullis setis cincta; naribus semilunaribus; colore splendide nigro, pennarum quorundam humeralium, & tectricum caudæ inferiorum flavo, rectricum extimarum albo, basi extus lutea differt.

sturnina. 10. Gr. cana, verticis macula, dorsoque inter alas violaceo-atro, caudæ alarumque nitore viridi, harum striga gemina alba. *Pall. it. 3. p. 695.*

Habitat in Dauriæ australioris salicetis circa Ononem & Argunum, speciosa, habitu, nido, ovorumque colore sturni æmula.

Femina decolor, sordide cinerea, dorso fusto, alis caudaque sine splendore atris.

cayen- 11. Gr. striata, supra rufa, subtus flavicans, capite & gula
nenfis. ex rufo & albo variis, cauda cuneiformi acuminatâ
alisque rufis unicoloribus.

Picucule de Cayenne. *Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 82. pl. enlum. n. 621.*

Climbing Grakle. *Lath. syn. I. 2. p. 467. n. 11.*

Habitat in Gujanæ interioribus, pici instar arbores adscendens, 10 pollices longa.

Rostrum nigrum, 2 fere pollicum, paulisper incurvatum; pedes $1\frac{1}{2}$ pollicem longi, cum unguibus nigri.

carancu- 12. Gr. cinerea, cauda remigibusque atris, vertice mentoque
lata. carunculatis.

Tringa carunculata capensis. *Walch Naturf. II. p. 9. t. 2. 17. p. 14.*

Cockscorn Stare. *Lath. syn. II. 1. p. 9. n. 7.*

Habitat ad Caput bonæ spei? 6 pollices longa.

54. PARADISEA. Rostrum capistri plumis tomentosis tectum.

Pennæ hypochondriorum longiores.

Rectrices duæ superiores singulares denudatæ.

apoda. 1. P. pennis hypochondriorum corpore longioribus, rectricibus duabus intermediis longis setaceis.

Manucodiata. *Briss. av. 2. p. 130. n. 1. p. 13. f. 1.*

Raj. av. p. 20. n. 1. p. 21. n. 3. 5. 6. p. 22. n.

8. 9. Marcgr. brasl. 201.

Paradisea lutea, cauda, pectore abdomineque brunneis, gula azurea. *It. Wgoth. 139. Mus. Ad. Frid. 1. p. 15.*

Oiseau de Paradis. *Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 151. t. 12. pl. enlum. n. 254.*

AVES PICÆ. Paradisea.

Paradisea avis. *Clus. exot.* 360. *Olear. mus.* 24. t. 13. f. 1. *Seb. mus.* 1. p. 24. t. 13. f. 1. *Hern. mex.* 317. t. 318. *Worm. mus.* 294. f. 294. *Bradl. nat.* t. 12. f. 1. 2. *Calceol. mus.* 669. t. 673. *Best. mus.* 32. t. 9. f. 1. Birds of Paradise. *Will. orn.* p. 91. n. 1. p. 92. n. 3. 5. 6. 7. p. 93. n. 8. 9. t. 11. Greater Bird of Paradise. *Albin. av.* 3. t. 9. *Edw. av. t.* 110. *Lath. syn.* 1. 2. p. 471. n. 1. Great Bird of Paradise from Aroo. *Forr. it.* p. 135.

β. Smaller Bird of Paradise from Papua. *Forr. it.* p. 137.

Habitat in insulis Molluccis, & reliquis novæ Guineæ vicinis, anni tempore humido in novam Guineam revertens; gregatim volat, duce præeunte, sturnorum in morem clamitans; audax, ornamentis & mercaturæ in India materies, apoda perperam dicta veteribus;

Femina rectricibus modo 2 intermediis brevioribus; sunt hæ apice attenuata, nudæ rectæ; cauda perperam dicta sunt pennæ elongatæ dorfi & hypocondriorum.

β. minor, in arboribus altis nidificat, maris collo & rostro longioribus.

regia. 2. P. rectricibus duabus intermediis filiformibus, apicelunato-pennaceis. *Mus. Ad. Fr.* 1. p. 15.

Rex avium paradisæarum. *Pet. gar.* 1. t. 53. f. 2. *Clus. exot.* 362. t. 362. *Olear. mus.* 24. t. 13. f. 2. *Raj. av.* p. 22. n. 10. *Seb. mus.* 1. t. 38. f. 5.

Manucodiata minor. *Briss. av.* 2. p. 136. n. 2. t. 13. f. 2. *Manucode. Buff. hist. nat. des ois.* 3. p. 163. t. 13. pl. enlum. n. 496.

Roi des oiseaux de Paradis. *Sonner. it.* p. 156. t. 95.

Supposed King of the greater birds of Paradise. *Will. orn.* p. 96. t. 77. *Edw. av. t.* 111.

King's Bird. *Forr. it.* p. 141. n. 7.

ing paradise Bird. *Lath. syn.* 1. 2. p. 475. n. 2.

Habitat in Aroo reliquisque oceani Indici insulis, humido anni tempore novam Guineam repetens, alaudæ magni-

Aves hujus generis in nova Guinea potissimum habitant, ex hac sicco anni tempore in vicinas insulas migrantes, paucos modo gradus ab æquatore distantes; fidæ (Seb. mus. 1. t. 60. f. 1. 2. 3.) e phittæis aliisque vendidit sæpe museis astus dicens. Nares exigua, pennæ rectæ; cauda rectricibus 10, 2 intermediæ basi & apice modo barbata; pedes magni robusti, digitorum anteriorum medius primo articulo exteriori connexus.

tudine,

tudine , 5 pollices circiter longa , præcedente rarior ; solitaria , baccas rubras appetens.
Purpurea , peâorali cærulescente ; cirrhi caudæ longissimi ; pennæ sub âlis reliquis longiores , quamvis cauda breviores & truncatæ.

- tristis. 3. P. area nuda pone oculos triangulari , capite colloque fuscis. Merula philippenfis. *Briss. av. 2. p. 278. n. 35. t. 26. f. 1.* Martin. *Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 423. pl. enlum. n. 219.* Paradise Grakle. *Lath. syn. I. 2. p. 458. n. 3.*
Habitat in insulis Philippinis , omnivora , vorax , æstiva boum dorso infixis , gryllis , aliis insectis , his deficientibus ipsæ columbarum pullis , rattis , fructibus , dactylis , uvis , frumento victitans , bis in anno nidum in bifurcationibus palmarum struens , ova 4 pariens , junior facile cicuranda , docilis & imitabunda.
Magnitudo monedulæ ; longitudo $9\frac{1}{2}$ pollicum ; rostrum & pedes flavi ; corpus subfuscum ; remiges primores a basi ad medium albæ ; rectrices , exceptis intermediis , apice albæ. Ob rostri basin plumis tomentosis testam huic generi ; ceterum graculis magis affinis.

- magnifica. 4. P. supra spadiceus , gula viridi lunulis aureis ; cervicis fasciculo pennarum flavarum. Magnifique de la nouvelle Guinée , ou Manucode à Bouquets. *Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 166.* Oiseau de Paradis , surnommé le Magnifique. *Buff. planch. enlum. n. 631. Sonner. it. p. 163. t. 98.* Magnificent Paradise Bird. *Latham syn. I. 2. p. 477. n. 3. t. 19.*
Habitat in nova Guinea , monedulæ magnitudine , 9 pollices longa.
Remiges primores fuscæ ; secundariæ profunde flavæ ; remiges intermediæ longissimæ , barba brevissima , pedes & rostrum flava ; hoc apice & basi nigrum.

- nigra. 5. P. nigra , subtus obsolete viridis , occipite , nucha , cervice , & media abdominis fascia lætius viridibus aureo-lunulatis , arcu aureo cum lunulis rubris ab angulo oris ad gulam protenso. Gorget Paradise Bird. *Lath. syn. I. 2. p. 478. n. 4. t. 20.* *Habitat in insulis oceani Indici , monedulæ magnitudinis.* Rectrices 12 inæquales ; 2 intermediæ 22 , extimæ 5 modo pollices longæ.

- superba. 6. *P. subcristata viridi aurea, subtus læte viridis, gula violacea, alis nigris, caudæ splendore cærulescente.*
Manucode noir de la nouvelle Guinée, dit le Superbe.
Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 169. pl. enlum. n. 632.
Oiseau de Paradis à gorge violet, surnommé le Superbe.
Sonner. it. p. 157. t. t. 96.
Superb Paradise Bird. Lath. syn. I. 2. p. 479. n. 5.
Habitat in nova Guinea.
Rostrum nigrum; pedes fusci; sub alis fasciculus plumarum nigrarum tomentosorum in dorso conspicuus.
- aurea. 7. *P. cristata nigra, verticis, genarum & gulæ nitore violaceo, jugulo, pectore, maculaque cervicis viridi-aureis.*
Sifilet ou Manucode à six filets. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 171. pl. enlum. n. 633.
Oiseau Paradis à gorge dorée. Sonner. it. p. 158. t. 97.
Gold-breasted Paradise Bird. Lath. syn. I. 2. p. 481. n. 6.
Habitat in nova Guinea, turturis magnitudine.
Rostrum & pedes nigricant; irides flavent; crista pene erecta, pennis aliquot dimidia parte albis, reliquis totis nigris; ad utrumque capitis latus tres pennæ præter apicem imberbes, adeo longæ, ut primam caudæ cuneiformis quartam partem attingant.
- viridis. 8. *P. thalassina, dorso, abdomine, uropygio caudaque chalybeis.*
Calybè de la nouvelle Guinée. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 173. pl. enlum. n. 634.
Oiseau de Paradis vert. Sonner. it. p. 164. t. 99.
Blue green Paradise Bird. Lath. syn. I. 2. p. 482. n. 7.
Habitat in nova Guinea, 16 pollices longa.
Rostrum crassum, nigrum; plumæ capitis tomentosæ.
- alba. 9. *P. tota alba. Penn. ind. 1001. n. 5.*
β. Paradisea antèrius nigra, postèrius alba. Penn. ind. 1001. n. 5. β.
Habitat rarissima in insulis Papuanis.

55. TROGON. *Rostrum capite brevius, cultratum, aduncum, margine mandibularum ferratum.*

Pedes scanforii.

- strigilatus. 1. *Tr. cinereus, alis strigis albis.*
Trogon cayanensis cinereus. Briss. av. 4. p. 165. n. 1. t. 16.
f. 1. Ger. orn. 2. p. 53. t. 188.

Couroucou de la Gujane. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 293. *pl. enlum. n.* 765.

Cinereous Curucui. *Lath. syn.* I. 2. p. 489. n. 3.

Habitat in Gujana, Cayenna, monedula paulo major, 12½ pollices longus.

Rostrum, pedes & ungues obscure cinerea; abdomen & tectrices caudæ inferiores aurantiæ; cauda nigricans.

Curucui, 2. Tr. viridi-aureus, subtus fulvus, gula nigra.

Trogon brasiliensis viridis. *Briss. av.* 4. p. 173. n. 4.

Picis congener Curucui. *Klein av.* p. 28.

Curucui Brasiliensibus. *Marcgr. bras.* p. 211. *Will. orn.* p. 296. t. 22. *Raj. av.* p. 45. n. 4. *Jonst. av.* p. 216. t. 60.

Tzintzcan. *Fern. nov. Hisp. c.* 43. p. 23. *Nieremb. hist. nat.* 230. *Will. orn.* 303. *Raj. av.* 163.

Couroucou à ventre rouge. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 207. t. 14.

Couroucou à ventre rouge de Cayenne. *Buff. pl. enl. n.* 452.

Red-bellied Curucui. *Lath. syn.* I. 2. p. 485. n. 1.

Rothbauchichter Kuruku. *Merrem Beytr.* 2. p. 37. t. 9.

β. Tr. tectricibus alarum fuscis, area nuda infra oculos nulla. Avis anonyma tertia. *Marcgr. bras.* p. 219.

γ. Tr. abdomine flavo.

Plittacus flammeus viridis & cinereus, rostro ferrato. *Feuill. suit. de journ.* p. 20.

Green yellow-bellied Cuckow. *Edw. glean.* t. 331.

Grüner Kuckuk mit dem gelben Bauch. *Seligm. aust. Voegel.* 9. t. 21.

δ. Tr. cinereus intermixto viridi-aureo, cauda longa.

Couroucou gris à longue queue de Cayenne. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 288. *pl. enlum. n.* 737.

Habitat in nova Hispania, Brasilia, Peru, & in Cayenna, solitarius in densissimis silvis, non cicurandus, in cavis arboribus bis in anno 3-4 ova alba; columbinis æqualia pariens, pullosque prodeuntes vermibus & insectis nutritiens; pica paulo minor, 10½ pollices longus.

Rectrices laterales fasciis albis nigrisque; intermedia apice nigra.

Aves hujus generis in calidiori modo climate obvia solitaria degunt in densarum humidarumque silvarum arboribus, harumque ramis inferioribus; brevissime volant, insectisque viditant; corpus procerum, pedes breves; cauda longissima, ex 12 rectricibus constans.

- viridis.** 3. Tr. viridi-aureus, subtus luteus, gula nigra, fascia pectorali viridi-aurea.
Trogon cayanensis viridis. *Briss. av.* 4. p. 168. n. 2. t. 17. f. 1.
Couroucou à ventre jaune. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 291.
Couroucou de Cayenne. *Buff. pl. enlum. n.* 195.
Yellow-bellied Curucui. *Lath. syn.* 1. 2. p. 488. n. 2.
B. Trogon cayannensis viridis, ventre candido. *Briss. av.* 4. p. 170. n. 3.
Couroucou vert à ventre blanc de Cayenne. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 293.
Habitat in Cayenna, 11 ½ pollices longus.
- rufus.** 4. Tr. rufus, abdomine, crisso, femoribusque flavis, testricibus alarum nigro & griseo striatis, remigibus rectricumque mediarum apicibus nigris.
Couroucou à queue rousse de Cayenne. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 293. pl. enlum. n. 736.
Rufous Curucui. *Lath. syn.* 1. 2. p. 490. n. 4. t. 21.
Habitat in Cayenna, 9 pollices longus.
Remigum margo obscurus; rectrices utrinque 3 exteriores striis transversis nigris & albis, apice albo; abdomen pedesque obscuri.
- violaceus.** 5. Tr. violaceus, superciliis flavis, dorso utropygioque viridi-aureis, alis fuscis, rectricibus intermediis ex cæruleo viridibus apice nigris.
Lanius capite, collo pectoreque e violaceo nigricantibus, digitis duobus anticis totidemque posticis. *Köelreuter nov. ad. Petrop.* II. p. 436. n. 7. t. 16. f. 8.
Couroucou à chaperon violet. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 294.
Violet-headed Curucui. *Lath. syn.* 1. 2. p. 491. n. 5.
Longitudo 9 ½ pollicum; rostrum plumbeum, apice albidum, versus frontem nigricans; testrices caudæ superiores viridi-aureæ; rectrices 2, 2, partim ex cæruleo virides, partim nigra, tres extrema nigra, lineis & apicibus albis.
- maculatus.** 6. Tr. fuscescens, lineis obscuris, vertice viridi, alarum marginibus, caudæque obscuræ lineis, remigum secundariarum & testricum alarum apicibus albis.
Spotted Curucui. *Brown. illustr. t.* 13. *Lath. syn.* 1. 2. p. 491. n. 6.
Habitat in Zeylon.
Rostrum fuscum.

fasciatus. 7. Tr. fascia pectorali alba.

Fasciated Curucui. *Ind. zool. t. 5. Lath. syn. 1. 2. p. 492. n. 7.*

Trogon ceylonensis. *Briss. av. 4. n. 7?*

Band-Kuruku. *Walch Naturf. 17. p. 17.*

Habitat in Zeylonæ arboribus emortuis, in altis arboribus nidificans.

Rostrum nigrum, crassum, paulisper arcuatum, basi setis circumseptum; orbitæ nudæ, cæruleæ; irides flavæ; caput collumque nigra; abdomen ex rubente aurantium; dorsum lomentaceum; tectrices caudæ griseæ; tectrices alarum cum humeris albo & nigro undulatæ; remiges & pedes obscuri; cauda prælonga, inæqualis, apice nigra.

56. BUCCO. Rostrum cultratum, lateraliter compressum, apice utrinque emarginato, incurvato, rictu infra oculos protenso.

Nares pennis recumbentibus obtektæ.

Pedes scanforii.

Tamatia. 2. B. ex rufo fuscus, subtus ex rufo albus, nigro maculatus, gula aurantia, torque dimidiato.

Tamatia. *Raj. av. p. 65. n. 6. Will. ornith. p. 190. t. 59. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 94.*

Barbu à ventre tacheté de Cayenne. *Buff. pl. enlum. n. 746.*

Spotted bellied Barbet. *Lath. syn. 1. 2. p. 494. n. 1.*

Habitat in Cayenna & Brasilia solitarius, in locis abditis, imprimis silvis, victitans insectis, carne insipida; 6½ pollices longus.

Caput prægrande; rostrum nigrum; vertex & frons rufescent; pone oculos area magna nigra; pedes nigri.

cayen- 3. B. niger, subtus ochroleucus, fronte gulaque rubris.

ensis. Bucco Cayennensis. *Briss. av. 4. p. 95. n. 2. t. 7. f. 1.*

Tamatia à tête & gorge rouges. *Buffon hist. nat. des ois. 7. p. 96.*

Barbu de Cayenne. *Buff. pl. enlum. n. 206. f. 1.*

Cayenne Barbet. *Lath. syn. 1. 2. p. 495. n. 2.*

β. Bucco Cayanensis nævius. *Briss. av. 4. p. 97. n. 3. t. 7. f. 4.*

Barbu de S. Domingue. *Buff. pl. enlum. n. 746. f. 2.*

Yellow. Woodpecker with black spots. *Edw. glecliff. t. 333.*

AVES PICÆ. Bucco.

*Habitat in Cayenna, Gujana, insula S. Dominici;
 alaudæ cristatæ magnitudine 7 pollices longa,
 ♂, subtus flavus, maculis nigris.*

capensis. 1. B. rufus fascia humerali fulva, pectorali nigra.

Bucco. *Briss. av.* 4. p. 92. n. 1. t. 6. f. 2.

Tamatia à collier. *Buff. hist. nat. des ois.* 7. p. 97. t. 4.

Barbu à collier de Cayenne. *Buff. pl. enlum.* n. 395.

Collared Barbet. *Lath. syn.* I. 2. p. 497. n. 3.

Habitat in Gujana, rarior, 7½ pollices longus.

Rostrum corneum; pedes & ungues cinerei.

elegans. 4. B. viridis, capite gulaque rubris cæruleo marginatis, remigibus fuscis, jugulo & pectore flavo, hoc rubro-maculato, abdomine ochroleuco viridi-maculato.

Bucco Maynanaensis. *Briss. av.* 4. p. 102. n. 5. t. 7. f. 3.

Beau Tamatia. *Buff. hist. nat. des ois.* 7. p. 98.

Barbu de Maynas. *Buff. pl. enlum.* n. 330.

Beautiful Barbet. *Lath. syn.* I. 1. p. 498. n. 4.

Habitat in provincia Maynas ad Amazonum fluvium, reliquis speciebus agilior, passeris magnitudine, 6 fere pollices longus.

Rostrum, pedes & ungues cinerei; illius apex ochroleucus; ab angulo oris stria utrinque cærulea; cauda cuneiformis, rectricibus 10; remigum margo viridis.

macro-rhynchos. 5. B. niger, fronte rectricum apice subtusque albus, fascia pectorali nigra.

Tamatia noir & blanc. *Buff. hist. nat. des ois.* 7. p. 99.

Le plus grand Barbu à gros bec de Cayenne. *Buff. planch. enlum.* n. 689.

Greater pied Barbet. *Lath. syn.* I. 2. p. 498. n. 5.

Habitat in Cayenna, 7 pollices longus.

Rostrum prægrande; pedes obscuri.

melano-leucos. 6. B. niger humerorum macula, stria pone oculos, caudæ apice & subtus albus, fascia pectorali nigra.

Tamatia noir & blanc. *Buff. hist. nat. des ois.* 7. p. 99.

Le plus petit barbu à poitrine noire de Cayenne. *Buff. pl. enlum.* n. 688.

Lesser pied Barbet. *Lath. syn.* I. 2. p. 499. n. 6.

Aves hujus generis, in Africa, potissimum in Asia & America calidiori inquilina, stupida; rostrum robustum, rectriculcum, setis fere penitus obtusum; rectrices plerumque 10 debiles.

Habitat in Cayenna, 3 pollices longus.

Rostrum magnum, apice bifidum; fronti candor inter-
mixtus; gula & colli latera alba; hypochondriis ni-
gredo adspersa; pedes obscuri.

philippi- 7. *B. viridis, vertice (maris) fasciaque pectorali rubris,*
nensi. *area oculorum, gula, jugulo subtusque flavus.*

Bucco philippensis. Briss. av. 4. p. 99. n. 4. t. 7. f. 2.

Barbu à gorge jaune. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 102. t. 5.

Barbu des Philippines. Buff. pl. enlum. n. 331.

Yellow-throated Barbet. Lath. syn. I. 2. p. 500. n. 7.

Habitat in insulis Philippinis, passeris magnitudine; 5½
pollices longus.

Rostrum & ungues fusca; color subtus sordide flavus,
striis, longitudinalibus obscure viridibus; pedes fla-
vicantes. Feminae area oculorum, jugulum & pedus
ex flavicante alba; neque in pectore neque in capite
rubor ullus.

niger. 8. *B. niger, subtus albus, stria supraoculari flava utrinque*
ad collum producta, torque albo.

Barbu de l'île de Luçon. Sonner. it. p. 68 t. 34.

Barbu à gorge noire. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 103.

Black throated Barbet. Lath. syn. I. 2. p. 501. n. 8.

β. *Bucco Capitis bonæ spei.*

Barbu à plastron noir. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 104.

Barbu du Cap de bonne espérance. Buff. planch. enlum.
n. 688. f. 1.

Habitat in insulis Philippinis, β. in Capite bonæ spei.

Pennæ laterales colli dorsique macula flava; rectrices
alarum 4 fimbria alba, 1 fimbria flava; reliquæ infra
hanc ad apicem flavo-maculatæ; remiges nigra,
marginè flava; rectrices præter 4 intermedias fimbria
flava; pedes rostrumque nigra.

β. *supra ex fusco & flavo mixtus; uropygium splendide*
flavescent; cauda fusca, marginè flavo.

parvus. 9. *B. ex nigricante fuscus, subtus albus fusco-maculatus,*
gula flava.

Petit Barbu. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 105.

Barbu du Sénégal. Buff. pl. enlum. n. 746. f. 2.

Little Barbet. Lath. syn. I. 2. p. 503. n. 9.

Habitat ad fluvium Senegal, 4 pollices longus.

Rostrum fuscum; stria alba ab angulis oris infra oculos;
pedes incarnati; color supra nitore fulvo, in alis
caudaque viridi.

- grandis. 10. *B. viridis*, tectricibus caudæ inferioribus rubris.
 Grand Barbu. *Buff. hist. nat. des ois.* 7. p. 106.
 Grand barbu de la Chine. *Buff. pl. enlum. n.* 871.
 Grand Barbet. *Lath. syn.* 1. 2. p. 503. n. 10.
Habitat in Sina, 11 pollices longus,
Rostrum albicans, apice nigrum; color capitis & juguli
in cæruleum, cervicis & dorfi in badium vergens;
pedes obscure flavi.
- viridis. 11. *B. viridis*, capite & collo ex griseo fuscis, area oculo-
 rum alba.
 Barbu vert. *Buff. hist. nat. des ois.* 7. p. 107.
 Barbu de Mahé. *Buff. pl. enlum. n.* 870.
 Green Barbet. *Lath. syn.* 1. 2. p. 504. n. 11.
Habitat in India, 6½ pollices longus.
Rostrum albicans; remiges majores fusca; pedes obscuri.
- Lathamii. 12. *B. olivaceus*, remigibus caudaque obscuris, facie
 mentoque ex subfusco rufescente.
 Buff faced Barbet. *Lath. syn.* 1. 2. p. 504. n. 12. t. 22.
 Longitudo 6 pollicum, rostrum pallidum; pedes cum
 unguibus flavi.
- fuscus. 13. *B. fuscus*, macula pectoris magna triangulari alba.
 White breasted Barbet. *Lath. syn.* 1. 2. p. 505. n. 13.
Habitat in Cayenna, alaudæ magnitudine, 7 pollices
longus.
Rostrum ex subfusco atrum, basi flavum; cauda cuneiformis.
- rubrica- 14. *B. vertice gulaque coccineis, dorso, tectricibus alarum,*
 pillus. *& cauda viridibus, abdomine albo, pectore flavo stria*
transversa nigra, altera rubra.
 Red-crowned Barbet. *Brown's Illustr. p.* 30 t. 14. *Lath.*
syn. 1. 2. p. 505. n. 14.
Habitat in insula Zeylon, 5½ pollices longus.
Rostrum obscurum; linea nigra supra utrumque oculum ad
genas; supra humeros utrinque area magna albicans;
rectrices exteriores obscuræ; pedes rubicundi.
- Zeylani- 15. *B. viridis*, genis nudis flavis, capite colloque pallide fuscis.
 cus. Yellow-cheeked Barbet. *Brown's Illustr. p.* 34. t. 15.
Lath. syn. 1. 2. p. 506. n. 15.
Habitat in insula Zeylon, præcedentis magnitudine.
Rostrum rubrum; pedes pallide flavi.

dubius. 16. *B. niger*, subtus ruber, fascia pectorali crissoque nigris.
Barbican. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 132.
Barbican des côtes de Barbarie. Buff. pl. enlum. n. 602.
Doubtfull Barbet. Lath. syn. I. 2. p. 506. n. 16.
Habitat in maritimis Barbariæ, 9 pollices longus, inter
Ramphaston & Bucconem ambiguus, huic tamen patria,
lingua carnosâ, setisque basin rostri obsidentibus propior.
Rostrum rubens; pedes breves, ex rubente fusci.

cinereus, 17. *B. niger*, subtus cinereus, rostro miniato, cauda
 rotundata.
Wax billed Barbet. Lath. syn. I. 2. p. 507. n. 17.
Habitat in Cayenna, 11½ pollices longus.
Tectrices alarum corpori proximæ ex nigro & albo variæ;
pedes obscuri.

57. CUCULUS. *Rostrum teretiusculum,*
Nares margine prominulæ.
Lingua sagittata, plana, integra,
Pedes scanforii.

canorus. 1. *C. cauda rotundata nigricante albo-punctata. Fn. suec.*
96. Scop. ann. I. p. 44. n. 48. Nozem. nederl. Vogel, t. 16.
Cuculus. Gesn. av. 363. Aldrov. ornith. I. p. 409. 415.
t. 414. 416. Bell. av. 22. Briss. av. 4. p. 105. n. 1.
Cuculo. Olin. ucell. p. 38.
Coucou. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 305. pl. enlum.
n. 811.
Cuckow. Brit. zool. I. n. 82. t. 36. Arct. zool. 2. p. 266.
n. A. Raj. av. p. 23. Will. orn. p. 97. t. 10. 77.
Albin. av. 1. t. 8. Hayes brit. Birds t. 17. 18. Lath.
syn. I. 2. p. 509. n. 1.
Kuckuk. Frisch. av. t. 40. 41. Kram. el. p. 337. Bloch
Besch. der berl. Naturf. 4. p. 582. t. XVIII. f. 1.
 2. *Cuculus rufus. Briss. av. 4. p. 110. n. 1. A.*
 3. *Cuculus griseo-undulatus, rectricibus-intermediis ordine*
punctorum alborum duplici notatus, rostro, orbitis
pedibusque sulphureis. Beseke Schr. der berl. naturf.
Gef. 7. f. 452.
Habitat in Europa & septentrionali Asia, 14 pollices
longus, passeribus & insectis eorumque larvis victitans,
non raro migratorius; more aliarum avium ventricu-
lum ante intestina positum habens.

Incubare ipse impotens, ova sordide alba, maculis chalybeis & ferrugineis notata bina vel unum in alienis nidis parit, inprimis in motacillarum, quæ incubant, & nutriunt enixum pullum mensibus æstatis pulcherrimis frondescentiæ, florecentiæ, grossificationis, dum cuculus aridis insidens arborum ramis famelicus semper cuculans advocat nutricem.

capensis. 23. C. virente fuscus, subtus albus nigro lineatus, genis, gula, jugulo, cauda & rectricibus alarum superioribus rufis, rectricum apice albo.

Coucou du Cap de bonne espérance. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 353. pl. enlum. n. 390.*

Capé Cuckow. *Lath. syn. I. 2. p. 513. n. 2.*

Habitat in Capite bonæ spei, canoro minor.

Rostrum & pedes fusca; irides flavæ.

orientalis. 2. C. cauda rotundata, corpore nigro-virente nitente, rostro fusco.

Cuculus indicus niger. *Briss. av. 4. p. 142. n. 18. t. 10. f. 1.*

Coucou noir des Indes. *Buff. pl. enlum. n. 274. f. 1.*

Coukeel. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 383. n. 1.*

Eastern black Cuckow. *Lath. syn. I. 2. p. 518. n. 10.*

β. C. corpore nigro-cærulescente, rostro nigro.

Coukeel. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 383. n. 2.*

Habitat in India, 16, β. 14 pollices longus.

Pedes ex griseo fusci; ungues nigri.

mindanensis. 3. C. cauda rotundata, corpore viridi aureo fusco albo maculato, subtus albo nigricanteque undulato.

Cuculus mindanensis nævius. *Briss. av. 4. p. 130. n. 12. t. 12. f. 1.*

Coucou varié de Mindanao. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 373. pl. enlum. n. 277.*

Mindanao Cuckow. *Lath. syn. I. 2. p. 515. n. 5.*

Habitat in insulis Philippinis, præsertim Mindanao, 14½ pollices longus.

Gula jugulumque fusca, maculis albis; remiges fuscae, barba exteriore maculis rufis, interiore albis notata; cauda fusco-aurea, fasciis transversis rufis; rectricum quarundam apex albus. Pedes cum unguibus grisei.

Vetula. 4. C. cauda cuneiformi, corpore subfusco, subtus testaceo, ciliis rubris.

Cuculus jamaicensis longirostris. *Briss. av. 4. p. 116. n. 5. t. 17. f. 2.*

AVES PICÆ. Cuculus.

411

Cuculus cinereus rostro longiore. *Feuillée per. p. 416.*
 Picus major leucophæus f. canescens, pluvix avis & senex dictus. *Raj. av. p. 182. n. 13.*

Cacco, *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 402.*

Coucou à long bec de la Jamaïque. *Buff. pl. enlum. n. 772.*

Other sort of Old man or Rain-Bird. *Sloan. jam. p. 313. n. 53. t. 258. f. 2.*

Long billed Rain Cuckow. *Latham syn. I. 2. p. 535. n. 32.*

Habitat in Jamaicæ silvis & dumetis, mansuetus, pluvia instante, clamitans, breviter volans, picæ instar incedens, seminibus, vermibus, scarabæis, serpentibus minoribus, ranis, lacertis, aviculis, rattis victitans, 15 pollices longus.

Rostrum sesquipollice longius, mandibula superiore nigra, inferiore albicante; vertex fuscus; palpebræ punctis coccineis; gula jugulumque albida; rectrices 2 intermediæ ex cinereo olivaceæ; reliquæ nigrae, apice albo; pedes ex cæruleo atrii.

pluvialis. 24. C. ex cinereo olivaceus, subtus rufus, gula juguloque albis.

Cuculus jamaicensis. *Briss. av. 4. p. 114. n. 4.*

Coucou dit le Vieillard ou l'oiseau de pluie. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 398.*

Old man or Rainbird. *Raj. av. p. 182. n. 12. Sloan. jam. p. 312. n. 52. t. 258. f. 1. Brown. jam. p. 476.*

Rain Cuckow. *Lath. syn. I. 2. p. 536. n. 33.*

Habitat in Jamaica, vetulæ affinis, 16-17 pollices longus. Rectrices extimæ margine albo.

minor. 25. C. ex cinereo olivaceus, subtus rufescens, mento albo.

Petit vieillard. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 401.*

Coucou des Paletuviers de Cayenne. *Buff. pl. enlum. n. 813.*

Mangrove Cuckow. *Lath. syn. I. 2. p. 537. n. 34.*

Habitat in Cayenna, 12 pollices longus, insectis potissimum coleopteris victitans, ceterum pluviali similis.

glandarius. 3. C. cauda cuneiformi, capite subcristato, fascia oculari nigra. Cuculus Andalusæ. *Briss. av. 4. p. 126. n. 10.*

Grand Coucou tacheté. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 361.*

Great spotted Cuckow. *Edw. av. t. 57. Latham syn. I. 2. p. 513. n. 3.*

Habitat in Andalusia, picæ magnitudine.

Rostrum nigrum; crista ex cærulescente cinerea; humeri, rectrices alarum superiores & caudæ fusca, maculis

AVES PICÆ. Cuculus.

exiguus albis & pallide cinereis ; remiges fusca ; cauda nigricans , apice albo.

ferratus. 26. *C. niger*, speculo alarum albo. *Sparrmann mus. Carlson.* n. 3.

Habitat ad Caput bonæ spei, ex virescente & cærulescente splendide niger.

Macula alarum superne & infra ferrata ; cauda corpore longior.

tabitius. 27. *C. fuscus*, subtus albus fusco striatus, superciliis albis, remigibus ferrugineo maculatis.

Coucou brun varié de noir. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 378.

Ara Wereroa, Cook it, 4. p. 272.

Society Cuckow. Lath. syn. I. 2. p. 514. n. 4.

Habitat in insulis Societatis, picæ magnitudine, 19 pollices longus.

Rostri mandibula superior nigricans, inferior pallida ; irides pallide flavæ ; crissum album ; cauda cuneiformis, lineis transversis ex ferrugineo fuscis, apicibus albis ; pedes virescentes.

senega-
lenis. 6. *C. cauda cuneiformi*, corpore griseo subtus albo, pilea reatricibusque nigricantibus.

Cuculus senegalensis. Briss. av. 4. p. 120. n. 7. t. 8. f. 1.

Coucou du Sénégal. Buff. pl. enlum. n. 332.

Rufalbin. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 370.

Strait-heeled Cuckow. Lath. syn. I. 2. p. 525. n. 18.

Habitat ad fluvium Senegal ; canoro major, 15½ pollices longus.

Rostrium nigrum ; uropygium & rectrices caudæ superiores fusca, striis profundioribus ; remiges rufa, apice subfusco ; pedes & ungues grisei ; posteriorum internus rectus, longior.

benga-
lenis. 28. *C. ferrugineus albo lineatus*, subtus ex flavicante fuscus, cauda cuneiformi.

Lark-heeled Cuckow. Brown. illustr. p. 26. t. 13. Lath. syn. I. 2. p. 525. n. 19.

Habitat in Bengala, alauda major.

Rostrium obscurum ; remiges ex rubente fusca, & præter 1 & 2 nigro lineata ; rectrices exteriores obscuræ apice fusco, reliquæ lineis nigris & angustioribus fuscis notatæ ; pedes nigri ; unguum posteriorum interior longus rectus.

- honoratus.** 7. *C. cauda cuneiformi, corpore nigricante albo maculato, subtus albo cinereoque fasciato.*
Cuculus malabaricus nævius. Briss. av. 4. p. 136. n. 15. t. 11. A. f. 2.
Cuil. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 375.
Coucou tacheté de Malabar. Buff. pl. enlum. n. 294.
Sacred Cuckow. Lath. syn. I. 2. p. 526. n. 20.
Habitat in Malabar, reptilibus victians, hinc forte incolis sacratus, canoro minor, 11 ½ pollices longus.
Remiges & cauda cinereæ, transversim albo maculatæ; pedes & ungues pallide cinerei.
- punctatus.** 8. *C. cauda cuneiformi, corpore nigricante rufo-punctato, subtus rufo strigis nigris, rectricibus rufo-fasciatis.*
Cuculus indicus nævius. Briss. av. 4. p. 134. n. 14. t. 10. f. 2.
Coucou brun piqueté de roux. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 377.
Coucou tacheté des Indes orientales. Buff. pl. enlum. n. 771.
Rufous spotted Cuckow. Lath. syn. I. 2. p. 517. n. 8.
Habitat in India & insulis Philippinis, canoro major, 16 ½ pollices longus.
Rostrum corneum; a basi ejus ad aures infra oculos fascia rufa; pedes ex griseo fusci; ungues nigricantes.
- panayanus.** 29. *C. ex atro fuscus, maculis ex rufo flavis, subtus rufus; striis transversis nigris, gula nigra, cauda æquali.*
Coucou tacheté de l'île de Panay. Sonner. it. p. 120. t. 78.
Panayan spotted Cuckow. Lath. syn. I. 2. p. 517. n. 9.
Habitat in insula Panay, punctato satis similis, canoro major.
Rostrum nigrum; irides flavæ; maculæ capitis, colli; dorfi, gulæ, rectricum alarum ex rufo flavæ oblongæ; remigum transversæ flavicantes, nigris admixtis; caudæ ex rufo flava, nigro cancellata; pedes plumbei.
- nævius.** 9. *C. cauda cuneiformi, corpore fusco ferrugineoque, jugulo strigis fuscis, rectricibus apice rufescentibus.*
Cuculus cayanaensis nævius. Briss. av. 4. p. 128. n. 11. t. 9. f. 1.
Coucou brun varié de roux. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 411.
Coucou tacheté de Cayenne. Buff. pl. enlum. n. 812.
Spotted Cuckow. Lath. syn. I. 2. p. 539. n. 38.
- β. *Cuculus gula grisea, rectricibus lateralibus apice; & abdomine albis.*

Habitat in Cayenna, β. etiam in Gujana, coturnices venans, 12 fere pollices longus.

Mandibula superior dorso nigra, lateribus rufa, inferior tota rufa; corpus subtus ex rufo album; verticis pennæ longæ, fuscæ, apice ruscæ; cervix ex rufo grisea; remiges ex griseo fuscæ, margine & apice ruscæ; pedes cinerei; ungues ex griseo fuscis.

punctu- 30. *C. cauda cuneiformi, corpore fusco pennarum apice rufus.*
larus. *feiscente, subtus fordide albo.*

Punctated Cuckow. Lath. syn. I. 2. p. 541. n. 39.

Habitat in Cayenna, 9 pollices longus.

Rostrum nigrum, pollicem longum; pedes satis longi.

ridibun- 31. *C. fulvus, gula, jugulo, & pectore cinereis, abdomine, dus.*
femoribus & tectricibus caudæ inferioribus nigris.

Cuculus mexicanus. Briss. av. 4. p. 119. n. 6.

Quapactol ou Rieur. Buff. hist. nat. des ois. 4. p. 408. n. 4.

Laughing Bird or Quapactotl. Raj. av. p. 174. Will. orn. p. 387.

Laughing Cuckow. Lath. syn. I. 2. p. 539. n. 37.

Habitat in nova Hispania; vox hominis ridentis, incolas terrens.

Longitudo 16 pollicum; rostrum ex cærulescente atrum; irides albæ; cauda dimidia corporis longitudine.

Guira. 32. *C. cristatus ex flavicante albus, cauda alisque fuscis, capite in medio fusco ad latera flavicante, collo in medio flavicante, ad latera fusco.*

Cuculus cristatus brasiliensis. Briss. av. 4. p. 144. n. 19.

Guira cantara. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 407.

Guira acantagata. Raj. av. p. 45. n. 5. Will. orn. 140. n. 9. t. 22.

Habitat in Brasiliæ silvis, valde clamorosus, picæ magnitudine, 14½ pollices longus.

Rostrum obscure flavum, pollicem longum; irides fuscæ; cauda apice albæ; pedes thalassini.

america- 10. *C. cauda cuneiformi, corpore surpra cinereo subtus albo, nus.*
mandibula inferiore lutea.

Cuculus carolinianus. Briss. av. 4. p. 112. n. 5.

Vieillard à ailes rousses. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 400.

Coucoun de la Caroline. Buff. planch. enlum. n. 816.

Caroline Cuckow. Arct. zool. 2. p. 265. n. 155. Catesb.

Carol. 1. t. 9. Lath. syn. I. 2. p. 537. n. 35.

Habitat in America septentrionali, migratorius, Majo adveniens, autumno discedens; nidum ut plurimum in malis ex baculis radicibusque struens, & 4 ova ex caerulefcente alba pariens, 12 pollices longus.

Remiges primariae extrinsecus fuscae interius aurantiæ; rectrices, exceptis 2 intermediis, apice albæ; pedes obscuri.

Scolopaceus. 11. *C. cauda cuneiformi, corpore undique griseo fuscoque nebuloso.*

Cuculus bengalensis navius. Priss. av. 4. p. 132. n. 13.

Boutfallick. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 372.

Brown and spotted indian Cuckow. Edw. av. t. 59.

Indian spotted Cuckow. Lath. syn. I. 2. p. 516. n. 6.

Habitat in Bengala, turdo vix major, 14 pollices longus. Rostrum & pedes ex luteo sordide virent; remiges & humeri striis transversis fuscis & rufis; cauda rufescens, tæniis obliquis fuscis.

maculatus. 33. *C. cauda cuneiformi, corpore supra ex virefcente griseo maculis albis, subtus ex fusco alboque vario.*

Coucou tacheté de la Chine. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 378. pl. enlum. n. 764.

Chinese spotted Cuckow. Lath. syn. I. 2. p. 516. n. 7.

Habitat in Sina, 14 pollices longus.

Rostrum supra nigricans, subtus flavum; caput collumque nigricantia, maculis circa oculos albis; nitor supra fusco-aureus; pedes flavicantes.

niger. 12. *C. cauda cuneiformi, corpore nigro nitido, rostro flavo. Cuculus bengalensis niger. Briss. av. 4. p. 141. n. 17.*

Couckeel. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 384. n. 3.

Black indian Cuckow. Edw. av. t. 58.

Habitat in Bengala, 9 pollices longus; an mera orientalis varietas?

Nitor viridis & violaceus; pedes ex rubicundo fuscis; ungues nigricantes.

ater. 34. *C. cauda cuneiformi, corpore splendide nigro, capite pennis elongatis cristato, remigum quinque primarum basi alba.*

Crested black Cuckow. Lath. syn. I. 2. p. 519. n. 11.

Habitat in Promontorio bonæ spei, an forte idem cum serrato?

melano- 35. *C. niger*, subtus albus, cauda cuneiformi; apice alba, leucos: macula alarum alba, capite subcristato.

Jacobin huppé de Coromandel. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 380. *pl. enlum. n.* 872.

Coromandel Crested Cuckow. *Lath. syn.* I. 2. p. 520. *n.* 12.

Habitat in Coromandel, 11 pollices longus.

Pedes fuscii.

pifanus. 36. *C. cauda cuneiformi*, corpore supra ex albo & nigro vario, subtus albo, capite nigro cristato, gula & pectore rufis.

Cuculus ex albo & nigro mixtus. Orn. ital. p. 81. *t.* 1.

Coucou huppé noir & blanc. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 362.

Pifan Cuckow. *Latham syn.* I. 2. p. 520. *n.* 13.

Habitat Pisis, semel tantum deprehensus, ova 4 partens, canoro paulo major.

Rostrum ex virecente fuscum; testrices caudæ inferiores rufæ; remiges rufæ, rectrices nigrae, utraque apice alba; pedes virides.

madagaf- 37. *C. olivaceus fusco undulatus*, subtus fulvus, gula olivacea carienfis. flavo temperata.

Coucou verdâtre de Madagascar. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 364. *pl. enlum. n.* 815.

Great Madagascar Cuckow. *Lath. syn.* I. 2. p. 521. *n.* 14.

β. *Cuculus area capitis cærulecente fulcata circulo nigro cincta.*

Habitat in Madagascar; 21 ½ pollices longus.

Rostrum nigrum; irides aurantiæ; abdominis pars posterior, & caudæ testrices inferiores fusca; femora cinerea; cauda 10 pollices longa; rectricum lateralium aliquæ apice albo; pedes ex flavicante fuscii.

domini- 13. *C. cauda cuneiformi*, corpore griseo fusco subtus exalbido, rectricibus lateralibus tribus apice albis.

Cuculus dominicensis. Briss. av. 4. p. 110. *n.* 2. *t.* 9. *f.* 2.

Cendrillard. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 413.

St. Domingo Cuckow. *Lath. syn.* I. 2. p. 541. *n.* 40.

β. *Cuculus subtus candidus.*

Habitat in Gujana, insula S. Dominici & Louisiana, turdi magnitudine, 10 ½ pollices longus.

Remiges rufæ, apice & margine ex griseo fusco; rectrices præter 2 intermedias nigrae apice albo, extremae margine quoque albo; rostrum, pedes & ungues ex griseo fusca.

- cayanus. 14. *C. cauda cuneiformi*, corpore castaneo purpurascente
tubtus cinereo, rectricibus omnibus apice albis.
Cuculus cayanensis. Briss. av. 4. p. 122. n. 8. t. 8. f. 2.
Coucou piaye. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 414.
Coucou de Cayenne. Buff. pl. enlum. n. 211.
Cayenne Cuckow. Latham syn. I. 2. p. 542. n. 41.
β. *Cuculus cayanensis minor. Briss. av. 4. p. 124. n. 9.*
t. 16. f. 2.
γ. *Cuculus rostro rubro*, capite cinereo, gula & pectore
rufis, abdomine ex cinereo nigro.
Habitat in Cayenna, ad ripas, mansuetus, visitans
insecis, 16 fere, β. 10½ pollices longus.
Rostrium, pedes & ungues ex griseo fusca; remiges apice
fusca; rectrices castaneæ, versus apicem nigra, apice
albæ; cauda 10 pollices longa.
- tranquil- 38. *C. niger*, subtus in cinereum vergens, cauda cunei-
lus. formi, tectricum alarum superiorum margine albo.
Coucou noir de Cayenne. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 416.
pl. enlum. n. 512.
Cayenne black Cuckow. Latham syn. I. 2. p. 543. n. 42.
Habitat in Cayenna, solitarius, reliquis speciebus minus
inquietus, 11 pollices longus.
Rostrium & irides rubent.
- tenebro- 39. *C. niger*, abdomine & femoribus ferrugineis, uropygio
fus. crissoque albis, cauda æquali. *Pall. n. nord. Beytr. 3.*
p. 3. t. 1. f. 1.
Petit Coucou noir de Cayenne. Buff. hist. nat. des ois. 6.
p. 417. pl. enlum. n. 505.
White-rumped black Cuckow. Lath. syn. I. 2. p. 544. n. 43.
Habitat in Cayennæ arborum ad aquas crescentium ramis
solitarius, immotus, visitans insecis; nidificat in
cavis arborum aut terræ, 8½ pollices longus.
Rostrium obscurum subulatum; nares setis circiter 10 cinctæ,
ridus setis circiter 8; fascia inter pectus & abdomen
aurantia; pedes flavi, breves; trogoni affinis.
- pyrrhoe- 40. *C. niger*, subtus albus, vertice genarumque parte cocci-
phalus. neis circulo albo cinctis, caudæ prælongæ apice albo.
Red-headed Cuckow. Ind. zool. t. 6. Latham syn. I. 2.
p. 544. n. 44.
Habitat in Zeylon, fructibus visitans, 16 pollices longus.
Rostrium arcuatum, ex virefcente flavum; caput collumque
maculis exilibus albis; pedes cærulefcentes.

cæruleus. 15. *C. cauda rotundata*, corpore cæruleo.

Cuculus madagascariensis cæruleus. *Briss. av. 4. p. 157. n. 26. t. 13. f. 1.*

Tait-fon. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 191. t. 18.*

Coucou bleu de Madagascar. *Buff. pl. enlum. n. 295. f. 2.*

Blue Cuckow. *Lath. syn. I. 2. p. 531. n. 29.*

Habitat in Madagascar, canori magnitudine, 17 pollices longus.

Rostrum, pedes & ungues nigra; remiges & cauda nitore viridi & violaceo.

finensis. 16. *C. cauda cuneiformi longa*, corpore cæruleo subtus albo, restrium apicibus macula alba.

Cuculus finensis cæruleus. *Briss. av. 4. p. 157. n. 27. t. 14. A. f. 2.*

San-hia de la Chine. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 389.*

Chinese Cuckow. *Latam syn. I. 2. p. 530. n. 28.*

Habitat in Sina, 13 pollices longus.

Rostrum, irides, pedes & ungues rubent; vertex albus, pundis cæruleis; reliquum caput & gula nigricans; area alba rotunda ad genas.

afer.

41. *C. viridi-æneus*, subtus splendide griseus, capite colloque cinereis, vertice nigricanti-æneo, cauda æquali viridi-aurea, subtus nigra.

Cuculus madagascariensis major. *Briss. av. 4. p. 160. n. 28. t. 15. f. 1.*

Grand Coucou de Madagascar. *Buff. pl. enlum. n. 587.*

Vaurou-driou. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 395.*

African Cuckow. *Latham syn. I. 2. p. 532. n. 30.*

β. Cuculus fuscus subtus rufescens, capitis collique striis transversis fuscis rufisque.

Grand Coucou de Madagascar. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 396.*

Habitat in Madagascar, columbæ majoris magnitudine, 15 pollices longus.

Rostrum rectum, 2 pollices longum, nigricans; ab eo ad osulum utrinque linea nigra; remiges majores nigricantes, minores obsolete virides; pedes rubicundi; ungues nigri.

indicator. 42. *C. ex ferrugineo griseus*, subtus albus, palpebris nudis nigris, humerorum macula flava, caudâ cuneiformi ferruginea. *Mill. illust. t. XXIV. f. A.*

Coucou indicatetur. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 392. n. 22.*

Honey Guide: *Sparrmann* *ad. angl.* 67. p. 38. t. 1.

Honey Cuckow: *Lat. syn.* 1. 2. p. 533. n. 31.

Habitat in interiore Africa, mellis causa apium sylvestrium alvearia exquirens; & voce sua hominibus indicans; nidam lagenæ forma, ex gracilibus corticis filamentis fruit, incolis magni æstimatus, ut trucidare nefas sit, 6 pollices longus.

Rostrum basifusum, apice luteum, setis basin cingentibus; femorum pennæ albæ, stria longitudinali nigra; remiges supra fuscæ, subtus ex griseo fuscæ; rectrices 1, 1 angustissima, ferrugineæ, 2, 2 fuliginosæ margine interiori albida, 3, 3 albæ, apice fuscæ, macula nigra ad interiorem rhachin notatæ; reliquæ similes; macula tamen nigra sensim diaphanta.

17. *C. cauda æquali, capite cristato, corpore viridi cæruleiscente, remigibus sanguineis.*

Cuculus guineensis cristatus viridis. Briss. av. 4. p. 152. n. 24.

Crown Bird from Mexico. Albin. av. 2. p. 19. t. 19.

Touraco. Edw. av. 1. t. 7. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 300. t. 15. Lath. syn. 1. 2. p. 545. n. 46.

Touraco de Guinée. Buff. pl. enlum. n. 601.

Habitat in variis Africæ partibus, vegetabilibus, potissimum fructibus victans, picæ magnitudine, trogoni perquam affinis.

Rostrum obscure rubrum, breve, subconicum, margine, mandibulæ præsertim superioris, serratum; lingua cartilaginea, plana, acuta; nares pennæ recumbentibus testæ; irides badia; palpebræ carunculæ rubris cinctæ; crista mobilis apice rubens fere conica; penæ molles, quasi sericeæ; fascia ocularis nigra; lineæ alba supra & infra oculos; humeri, dorsi pars inferior, uropygium, cauda, rectrices caudæ superiores alarumque majores ex cærulescente purpurea; abdominis pars infima & latera, femora, rectricesque caudæ inferiores nigricant; pedes tum unguibus cinerei; posticorum digitorum exterior vix retroversus cum anteriore plica cutaneâ coherens.

18. *C. cauda subæquali, capite cristato, corpore rubro, remigibus flavescens.*

Cuculus brasiliensis cristatus ruber. Briss. av. 4. p. 154. n. 25.

Cuculus brasiliensis venustissime pictus. Seb. mus. 1. p. 102. t. 66. f. 2.

AVES PICÆ. Cuculus.

Couroucoucoun. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 298.

Red-crested Cuckow. *Lath. syn.* I. 2. p. 545. n. 45.

Habitat in Brasilia, pyrrocephalo paulo minor, 10 pollices longus.

Rostrum dilute rubrum ; crista nigro-varia ; abdominis rubori flavedo intermixta ; remiges & cauda flava cum tinctura nigra.

cristatus. 19. C. cauda rotundata, capite cristato, corpore cinereovirescente nitente.

Cuculus madagascariensis cristatus. *Briss. av.* 4. p. 149. n. 22. t. 12. f. 2.

Coucoun huppé de Madagascar. *Buff. pl. enlum.* n. 589.

Coua. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 365. n. 4. t. 16.

Madagascar crested Cuckow. *Lath. syn.* I. 2. p. 522. n. 15.

Habitat in Madagascar, corvi glandarii magnitudine, 14 pollices longus.

Rostrum & pedes nigra ; irides aurantiæ ; pectus vinaceum ; abdomen albidum cum tinctura rufa ; remiges & cauda virescentes, subtus cinereæ, rectrices exteriores apice albo.

ægyptius.

43. C. fuscus, subtus ex rufo albus, capite & cervice obscure, cauda cuneiformi splendide viridi, remigibus rufis.

Houhou d'Egypte. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 367.

Egyptian Cuckow. *Lath. syn.* I. 2. p. 522. n. 16.

β. Cuculus splendide niger, alis rufis.

Coucoun des Philippines. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 369. pl. enlum. n. 824.

γ. Cuculus alis spadiceis.

Coucoun vert d'Antique. *Sonner. it.* p. 181. t. 80.

Habitat in Ægypto β. in insulis Philippinis, γ. in Antigua solitarius, aut geminus in dumetis ad aquas positus, visitans locustis, 14-15 pollices longus.

Rostrum nigrum ; irides splendide rubra, in γ. nigra ; caput & cervix, in β. quoque gula, jugulum, pectus & abdomen obscure viridia, in hoc in atrum vergentia ; rectrices alarum superiores rufa in viridem vergentes ; remiges 3 ultimæ totæ rufæ, reliquæ apice splendide viridi ; pedes nigricantes.

radiatus. 44. C. ex fusco ater, subtus flavus nigro-lineatus, gula genisque vinaceis, vertice ex nigricante griseo.

Coucoun brun & jaune à ventre rayé. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 379.

Coucou à ventre rayé de l'île de Panay. *Sonner.it. p. 120. t. 79.*

Panayan Cuckow. *Lath. syn. I. 2. p. 527. n. 21.*

Habitat in insula Panay, canori magnitudine.

Rostrum nigrum; irides aurantiæ; remigum pars inferior albo-maculata; cauda nigra lineis & apice albis, æqualis; pedes rubicundi.

flavus. 45. *C. testaceus*, subtus flavescens, vertice gulaque dilute griseis, cauda cuneiformi nigra albo-lineata.

Petit coucou à tête grise & ventre jaune. *Buffon hist. nat. des ois. 6. p. 382. n. 15.*

Coucou petit de l'île de Panay. *Buff. pl. enlum. n. 814. Sonner. it. p. 122. t. 81.*

Yellow bellied Cuckow. *Lath. syn. I. 2. p. 527. n. 22.*

Habitat in insula Panay, ultra 8 pollices longus.

Rostrum pedesque flavescunt, apice illius nigro; irides flavæ.

auratus. 46. *C. cauda cuneiformi*, corpore supra viridi-aureo, subtus albo, capitis strigis quinque, testricumque alarum, remigum secundariorum testricumque apicibus albis.

Coucou vert doré & blanc. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 385.*

Coucou vert du Cap de bonne espérance. *Buff. pl. enlum. n. 657.*

Gilded Cuckow. *Lath. syn. I. 2. p. 527. n. 23.*

Habitat ad Caput bonæ spei, 7 pollices longus.

Rostrum ex virescente fuscum; pedes grisei.

lucidus. 47. *C. supra viridis*, subtus albus, utrinque viridi-aureo-lunulatus, remigibus caudaque fuscis.

Shining Cuckow. *Lath. syn. I. 2. p. 528. n. 24. t. 23.*

Habitat in nova Seelandia, præcedenti affinis, 7 pollices longus.

Rostrum pedesque cærulescentes; irides badia; testrices cauda inferiores albæ.

coroman- 20. *C. cauda cuneiformi*, corpore nigro-subtus albo, torquedus. candido.

Cuculus coromandelanensis cristatus. *Briss. av. 4. p. 147. n. 21. t. II. A. f. 1.*

Coucou huppé de Coromandel. *Buff. pl. enlum. n. 274.*

Coucou huppé à collier. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 388.*

Collared Cuckow. *Lath. syn. I. 2. p. 529. n. 26.*

Habitat in Coromandel, 12½ pollices longus.

AVES PICÆ. Cuculus.

Rostrum & pedes cinerea; irides flavicantes; caput cristatum, macula ad utrumque latus parva rotunda grisea; gula & femora nigricantia; remiges primariae rufae, secundariae nigricantes, margine rufo; cauda nigricans.

cornutus. 21. C. cauda cuneiformi, capite crista bifida, corpore fuliginoso.

Cuculus brasiliensis cornutus. *Bris. av.* 4. p. 145. n. 20.

Atingacu camucu. *Maregr. bras.* p. 256. *Will. orn.* p. 146.

t. 38. *Raj. av.* p. 165. n. 5.

Atingacu du Brésil. *Buffon hist. nat. des ois.* 4. p. 409.

Horned Cuckow. *Lath. syn.* 1. 2. p. 530. n. 27.

Habitat in Brasilia, 12 pollices longus.

Rostrum ex virente flavum; irides sanguineae; crista cornu æmula mobilis; corpus subtus cum pedibus & unguibus cinereum; cauda apice alba.

paradi- 22. C. caudæ rectricibus extimis binis longissimis apice dilata-
seus. tatis, capite cristato, corpore viridi.

Cuculus siamensis cristatus viridis. *Briss. av.* 4. p. 141. n. 23. t. 14. A. f. 1.

Coucou à longs brins. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 387.

Paradise Cuckow. *Lath. syn.* 1. 2. p. 529. n. 25.

Habitat in Siam, corvi glandarii magnitudine, 17 pollices longus.

Rostrum nigricans; irides caeruleae; pedes & ungues grisei.

Tolu. 48. C. nigricans, uropygio & abdomine ex virescente nigris, humeris remigibusque castaneis, cauda cuneiformi atroviridi, subtus nigra.

Cuculus madagascariensis. *Briss. av.* 4. p. 138. n. 16. t. 13. f. 2.

Coucou de Madagascar. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 369. t. 17.

Coucou de Madagascar, appelé Toulou. *Buff. planch. enlum.* n. 295. f. 1.

Long-heeled Cuckow. *Lath. syn.* 1. 2. p. 524. n. 17.

Habitat in Madagascar 14½ pollices longus, ægyptio valde affinis.

Rostrum fuscum; pennae superiores longiusculae, angustae, rigidae, striae per longitudinem ex rufo alba notatae; rectrices alarum castaneae, scapis purpurascens; remiges apice fusco; pedes & ungues nigri; digitorum posteriorum interior altero longior.

58. YUNX. *Rostrum* teretiusculum acuminatum,
debilius paulisper incurvum.
Nares concavæ denudatæ.
Lingua teres lumbriciformis longissima
apice mucronata.
Rectrices decem flexiles.
Pedes scanforii.

Torquill- I. Y. ex albo, griseo, nigro, & ferrugineo varia. *Fn. succ.*
la. 97. t. 1. f. 97. *Bell. av.* 76. a. *Gefn. av.* 573. *Aldr.*
orn. 1. p. 863. t. 866. *Johnst. av.* t. 42. *Raj. av.* p. 44.
A. 8. *Rudd. lapp.* 66. t. 66. *Briss. av.* 4. p. 4. n. 1. t. 1.
f. 1. *Scop. ann.* 1. n. 50.

Cuculus subgriseus maculatus, rectricibus nigris fasciis
undulatis. *Fn. succ.* 1. p. 78. t. 1. f. 78.

Torcol. *Buff. hist. nat. des ois.* 7. p. 84. t. 3. *planch. enlum.*
n. 698.

Wryneck. *Brit. zool.* n. 83. *Arch. zool.* 2. p. 267. *Albin.*
av. 1. t. 21. *Will. orn.* p. 138. t. 22. *Lath. syn.* 1. 2.
p. 548. t. 24. *Hayes brit. birds* t. X.

Drehhals. *Frisch. av.* t. 38.

β. Yunx supra maculis transversis, subtus striis longitudi-
nalibus flavis.

Jynge congener. *Aldr. orn.* 1. p. 868. t. 869. *Will. orn.*
t. 22.

Torquilla striata. *Briss. av.* 4. p. 7.

Habitat in Europæ & Sibirix, Persiæ & Indiæ truncis
arborum putrescentibus, ex quibus larvas extrahit, his
formicisque potissimum victitans, migratoria; collum
contorquendo circumspiciens; ova parit eburnei candoris
8 - 10.

Magnitudo *alaudæ*; longitudo 7 pollicum; corpus supra ex
griseo, nigro, albo & ferrugineo varium; cauda grisea,
maculis nigris, fasciis 4 latis nigris.

minutif- 2. Y. supra ex atro cinerea, subtus forde alba.

suma.

Picus minutissimus. *Pallas n. nord. Beytr.* 3. p. 5. t. 1. f. 2.

Picus cayennensis minor. *Briss. av.* 4. p. 83. n. 32.

Petit pic de Cayenne. *Ferm. Surin.* 2. p. 170. *Buff. planch.*
enlum. n. 786. f. 1.

Très-petit pic de Cayenne. *Buff. hist. nat. des ois.* 7. p. 37.

Minute Woodpecker. *Lath. syn.* 1. 2. p. 596. n. 48.

AVES PICÆ. Picus.

Habitat in Cayenna, 3½ pollices circiter longus, ceteris familiaris magnitudine.

Rostrum nigricans, basi flavum; caput nigrum albo-guttatum; mari ad frontem area miniata; genæ ex nigricante cinereæ; alæ extus nigricantes, intus cinereæ; rectrices 1, 1 rachi interna albæ, margine angusto subfusco; 2, 2 totæ nigre; reliquæ ad apicem fere fascia obliqua albâ; pedes nigri, robusti.

59. PICUS. Rostrum polyedrum, rectum, apice cuneato.

Nares pennis setaceis recumbentibus oblectæ.

Lingua teres, lumbriciformis, longissima, ossea, missilis, mucronata, apice retrorsum aculeata setis.

Rectrices 10 duræ rigidæ acuminatæ.

Pedes scanforii.

martius. F. P. niger, pileo coccineo. Fn. suec. 98. Scop. ann. I. p. 46. n. 51.

Picus niger. Briss. av. 4. p. 21. n. 6.

Picus niger maximus. Gesn. av. 708. Aldr. orn. I. p. 843. t. 844. Raj. av. p. 42. n. 1.

Pic noir. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 41. t. 2. pl. enlum. n. 596. orn. de Salern. t. 10. f. 2.

Greatest black Woodpecker. Arch. zool. 2. p. 276. A. Will. orn. p. 135. t. 21. Albin. av. 2. t. 27. Lath. syn. I. 2. p. 552. n. 1.

Schwarzspecht. Frisch. av. t. 34.

Habitat in Europæ, Sibiria & regni Chilenis populis, nidus magnus & profundos struens, ovaque pariens 2-3 candida; 17-18 pollices longus, formicis aliisque insectis, eorumque larvis victitans.

Femina occipite modo rubra.

lignatus. 22. P. pileo coccineo, corpore albo cæruleoque vittato. Molina hist. nat. Chil. p. 209.

Habitat in regni Chilenis arboribus, quas tum emortuas tum vegetas rostro robusto perforat adeo, ut nidum in fossis foraminibus struat; hinc arboribus pœniferis infestus.

principa- 2. P. niger, crista coccinea, linea utrinque collari, remigibus-
que secundariis albis.

Picus niger carolinensis. Briss. av. 4. p. 26. n. 9.

Picus imbrifactus. Nieremb. nat. p. 223. Will. orn. 301.

Quatotomomi. Raj. av. p. 162. Will. orn. p. 390.

Grand pic noir à bec blanc. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 46.

Pic noir huppé de la Caroline. Buff. pl. enlum. n. 690.

Largest white-billed Woodpecker. Catesb. car. 1. t. 16.

White-billed Woodpecker. Arct. zool. 2. p. 268. n. 156.

Lath. syn. 1. 2. p. 553. n. 2.

Habitat in America a nova Jersey ad Brasiliam usque, cornicis magnitudine, 16 pollices longus; foramina spiralia excavat.

Rostrum eburneum, 3 pollices longum; irides flavæ; crista occipitis conica; dorsi pars inferior alba.

pileatus. 3. P. niger, crista rubra, temporibus alisque maculis albis.

Picus virginianus pileatus. Briss. av. 4. p. 29. n. 10.

Pic noir à huppe rouge. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 48.

Pic noir huppé de la Louisiane. Buff. pl. enlum. 718.

Larger red-crested Woodpecker. Catesb. car. 1. p. 17. t. 17.

Pileated Woodpecker. Arct. zool. 2. p. 269. n. 157. Lath.

syn. 1. 2. p. 554. n. 3.

Habitat in Americæ septentrionalis silvis, ætæ spicas rostro destruens, 6 ova pariens, ex quibus Junco exeunt pulli.

Longitudo 18 pollicum; rostrum 2 pollices longum, mandibula superiore obscura, inferiore albida; irides aureæ; crista linea fuscescente cincta; tænia nigra ab oculis ad occiput ducta; infra hanc linea fuscescens ab ortu rostri per collum ad alarum initium; mentum & gula alba; pedes obscuri. Femina frons fusca.

lineatus. 4. P. niger, crista coccinea, linea a rostro utrinque collari ad medium dorsum alba.

Picus niger cayanensis cristatus. Briss. av. 4. p. 31. n. 11. t. 1. f. 2.

Ipecu. Marcgr. bras. 207.

Picus varius brasiliensis, Ipecu dictus. Raj. av. p. 43. n. 7.

Pici, Alberto M. jam satis noti, & memorati, arbores, potissimum ærotantes & emortuas, aliquando tamen etiam sanas conscindunt, insecta larvasque insectorum, lignum intus rodentes, arboremque destruunt, rostro secante, sono stridulo terre-faciente, auditu percipiente, lingua acuta hastata intrante extrahunt (ad. angl. 350. p. 509.) injussu proscripti & filivis expulsi.

- Onantou ou pic noir huppé de Cayenne. *Buff. hist. nat. des ois.* 7. p. 50. *pl. enlum.* n. 717.
- Pic noir ou charpentier. *Fermin Surin.* 2. p. 170.
- Brazilian Woodpecker, called Ipecu. *Will. orn.* p. 138. t. 22.
- Lineated Woodpecker. *Lath. syn.* I. 2. p. 556. n. 4.
- Habitat in Cayenna, magnitudine viridis, 14 fere pollices longus.*
- Rostrum *sesquipollicare, corneum; mandibula inferior stria coccinea; caput coccineum; genæ cinerascens; gula, abdomen, & crissum ex rufo alba, stigiis transversis nigris; cauda cuneiformis; pedes & ungues grisei.*
- rubricol- 23. P. fuscus, subtus fulvus, capite cristato colloque sanguineis-
lis. Pic à cou rouge. *Buff. hist. nat. des ois.* 7. p. 53.
- Grand pic huppé à tête rouge de Cayenne. *Buff. pl. enlum.* n. 612.
- Red-necked Woodpecker. *Lath. syn.* I. 2. p. 558. n. 5.
- Habitat in Cayenna, 16 pollices longus.*
- Rostrum *pallidum; crista occipitalis; pedes plumbei.*
- melano- 24. P. niger, subtus, linea collari utrinque, nucha & uropy-
leucos. gio albus, crista posterior ex luteo fuscescente.
- Buff-crested Woodpecker. *Lath. syn.* I. 2. p. 558. n. 6. t. 25.
- Habitat in Surinamo, 12½ pollices longus.*
- Pectus & abdomen *sordide album, lineis transversis nigris.*
- hirundi- 5. P. niger, occipite coccineo, humeris albido punctatis.
naceus. Picus niger novæ Angliæ. *Briss. av.* 4. p. 24. n. 7.
- Petit pic noir, var. *Buff. hist. nat. des ois.* 7. p. 54.
- Lesser black Woodpecker. *Albin. av.* 3. t. 23. *Lath. syn.* I. 2. p. 559. n. 7.
- β. P. pectoris area rubra, abdomine ex nigro & griseo vario.
- Petit pic noir. *Buff. hist. nat. des ois.* 7. p. 54.
- Petit pic noir de Cayenne. *Buff. pl. enlum.* n. 694. f. 2.
- γ. Picus verticis area rubra, oculorum alba, occipite aureo.
- Habitat in America septentrionali, β. & γ. in Cayenna, hirundinis circiter magnitudine.*
- Rostrum *fuscum; irides albidæ; alarum anguli, & abdominis postrema pars alba; pedes strigantes; in β. supra oculos intermixtus candor; dorli pars inferior, & uropygium alba; femina neque rubri, neque flavi aliquid monstrat; in . universum pedus area sanguinea; crissum albo & nigro lineatum; remiges nonnullæ secundariæ apice albo - punctatæ.*

- passerinus.** 6. *P. olivaceo-flavicans*, subtus fusco candicanteque fasciatus. Picus dominicensis minor. *Briss. av. 4. p. 75. n. 29. t. 4. f. 2.*
 Petit pic olive de S. Domingue. *Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 29.*
Passerine Woodpecker. Latham syn. I. 2. 388. n. 37.
Habitat in insula S. Dominici, alaudæ magnitudine, 6 pollices longus.
 Rostrum, pedes & ungues grisei; vertex ruber; tempora ex rufo grisea; tectrices alarum majores plurimæ macula ochroleuca; remigum majorum margo interior fuscus, albido dentatus.
- striatus.** 25. *P. niger*, olivaceo striatus, subtus olivaceus, fronte, genis, gula, jugulo, & pectore griseis, vertice, occipite, uropygio & tectricibus caudæ superioribus rubris.
 Picus dominicensis striatus. *Briss. av. 4. p. 65. n. 25. t. 4. f. 1.*
 Pic rayé de S. Domingue. *Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 27. pl. enlum. n. 281.*
Rayed Woodpecker. Latham syn. I. 2. p. 387. n. 36.
 β. *Picus vertice nigro.*
Picus dominicensis striatus minor. Briss. av. 4. p. 67. n. 26. t. 3. f. 2.
 Pic rayé à tête noire de S. Domingue. *Buff. pl. enlum. n. 614.*
Habitat in insula S. Dominici, 9 fere pollices longus.
 Rostrum corneum; remiges nigricantes, rhachi exteriore flavo, interiori albido-maculata, pedes & ungues nigricantes.
- melano-chloros.** 26. *P. ex nigro & flavo varius*, crista aurea, cauda nigra. Picus varius americanus cristatus. *Briss. av. 4. p. 34. n. 12.*
 Grand pic rayé de Cayenne. *Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 30. pl. enlum. n. 719.*
Gold-crested Woodpecker. Lath. syn. I. 2. p. 389. n. 38.
Habitat in Cayenna, magnitudine viridis.
 Rostrum obscurum; genæ rubicundæ; inter basin rostri & oculos area purpurea; corpus nigro & flavo undulatum, striatum, & post solum subtus maculatum.
- flavescons.** 27. *P. niger*, crista, genis, cervice, gula, tectricibus caudæ superioribus & alarum interioribus, strigisque alarum & dorsi transversis flavis.

AVES PICÆ. Picus.

Yellow-crested Woodpecker. *Brown. Illust. t. 12. Lath. syn. I. 2. p. 589. n. 39.*

Habitat in Brasilia, monedula magnitudine.

Crista longa, laxa, pendula; pedes obscure virides.

cayennensis-28. *P. olivaceus, pennis versus apicem macula nigra notatis, vertice, gula, caudaque nigris, occipite rubro, genis albidis, abdomine flavisante.*

Picus striatus cayennensis. Briss. av. 4. p. 69. n. 27.

Petit pic rayé de Cayenne. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 31.

Pic rayé de Cayenne. Buff. pl. enlum. n. 613.

Cayenne Woodpecker. Latham syn. I. 2. p. 590. n. 40.

Habitat in Cayenna, 7½ pollices longus.

Rostrum nigricans; gula albo-maculata; femora & testrices caudæ inferiores maculis rarioribus nigris; humeri testricesque alarum striis transversis nigricantibus; remiges nigricantes, scapis flavis; testrices 2 extimæ scapis flavis, lineis nigris & rufis; pedes grisei.

exalbidus. 29. *P. exalbidus cristatus, tænia mandibulæ inferioris longitudinali rubra, alis fuscis rufisque, cauda nigra.*

Picus cayennensis albus. Briss. av. 4. p. 81. n. 31.

Charpentier jaune. Firmin Surin. 2. p. 171.

Pic jaune de Cayenne. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 32. planch. enlum. n. 509.

Yellow Woodpecker. Lath. syn. I. 2. p. 591. n. 41.

Habitat in Cayenna, viridi minor, 9 pollices longus, 3. ovæ alba fere globosa pariens, ex quibus Aprili exeunt pulli.

Rostrum ochroleucum; occiput cristatum; color sordide albus, nonnunquam flavescens; tænia rubra femina nulla; testrices alarum fuscae, margine flavicante; pedes & unguis grisei.

cinnamomeus. 30. *P. cinnamomeus, maculis rarioribus ochroleucis, crista & dorsi parte inferiore obscure flavicante, gula utrinque macula lata sanguinea, rostro, caudæ pedibusque nigris.*

Pic mordoré. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 34.

Pic jaune tacheté de Cayenne. Buff. pl. enlum. n. 524.

Ferruginous Woodpecker. Arch. zool. 2. p. 271. n. 159. t. 13. Lath. syn. I. 2. p. 592. n. 42.

Habitat in Cayenna, Gujana, Carolina australi, viridis magnitudine, 11 pollices longus.

Femina rubor nullus.

AVES PICÆ. Picus.

429

- multicolor. 31. P. cristatus rufus, subitus pallide ferrugineus, capite, gula & cervice aurantiis, nucha, jugulo, pectore alarumque maculis nigris.

Pic à cravate noire. *Buff. hist. nat. des ois.* 7. p. 35.

Pic à cravate noire de Cayenne. *Buff. pl. enlum. n.* 863.

Black-breasted Woodpecker. *Lath. syn.* 1. 2. p. 593. n. 43.

Habitat in Cayenna & Gujana, viridis magnitudine.

Rostrum pallidum; caudæ apex maculæque nigra; pedes plumbei.

- erythrocephalus. 7. P. capite toto rubro, alis caudaque nigris, abdomine albo. *Mus. Ad. Fr.* 2. p. 21.

Picus erythrocephalus virginienfis. *Briff. av.* 4. p. 53. n. 19. t. 3. f. 1.

Picus capite toto rubro. *Kalm-ut.* 3. p. 43.

Pic noir à domino rouge. *Buff. hist. nat. des ois.* 7. p. 55.

Pic de Virginie. *Buff. pl. enlum. n.* 117.

Red-headed Woodpecker. *Arch. zool.* 2. p. 271. n. 160.

Catesb. Car. 1. t. 20. *Latham syn.* 1. 2. p. 562. n. 3.

Habitat in America septentrionali, migratorius, glandibus, & æa, pomisque viditans, hinc per quam infestus, ideo olim lege, nunc tamen abrogata proscriptus; prius & altius reliquis speciebus nidificans, 9½ pollices longus.

Rostrum plumbeum; dorsum nigrum; remiges secundariæ albæ, fasciis duabus nigris transversis; pedes nigri; femina caput fuscum.

- ruber. 31. P. capite, collo & pectore rubris, dorso alisque nigris, abdomine ochroleuco.

Red breasted Woodpecker. *Lath. syn.* 1. 2. p. 562. n. 9.

Habitat in Cayenna, erythrocephalo paulo minor.

Rostrum corneum; a naribus ad vel infra oculos linea fuscescens; testrices alarum minores complures albo punctatæ, majores nonnullæ exteriori rachi albæ, inferiores ex albo & nigro variæ; remiges nigrae albo maculatæ.

- obscurus. 32. P. obscurus, exalbido striatus & undulatus, subitus albus, remigibus primæribus nigris, secundariis albis versus apicem nigro fasciatis.

White-rumped Woodpecker. *Latham syn.* 1. 2. p. 563. n. 10.

Habitat in insula longa (Long Island), 9 pollices longus.

Rostrum corneum; testrices alarum majores nigrae; pedes nigri; uropygium album.

7. *Picus maculis gulæ & subocularibus rubris.*
Epeiche ou Pic rayé de la Louisiane. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 73. pl. enlum. n. 692.
Habitat in America septentrionali, & Antillis majoribus, majore major, 10½ pollices longus.
Rostrum, cauda, pedes & ungues nigra; irides badia; vertex in femina ex rufo albus; genæ ochroleuca; gula & jugulum olivacea, colore versus abdomen sensim in rubrum abeunte; pars abdominis inferior lineis transversis fuscis notata.
- undatus. 11. *P. testaceus nigro-undulatus, temporibus sanguineis.*
Red-cheeked Woodpecker. Edw. glean. t. 332. Latham syn. I. 2. p. 594. n. 44.
Habitat in Gujana & Surinamo, 9 pollices longus.
Rostrum fuscescens; pedes obscuri.
- rufus. 38. *P. rufus nigro undulatus.*
Pic roux. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 36.
Pic roux de Cayenne. Buff. pl. enlum. n. 694. f. 1.
Rufous Woodpecker. Latham syn. I. 2. p. 594. n. 45.
Habitat in Cayenna & Gujana, vix torquillæ magnitudine.
Rostrum pallidum; alæ & cauda obscuriores; dorsum pallidius; pedes plumbei.
- chlorocephalus. 39. *P. olivaceus subtus albo-maculatus, collo & capite subcristato flavis, vertice rubro.*
Petit pic à gorge jaune. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 37.
Pic à gorge jaune de Cayenne. Buff. pl. enlum. n. 784.
Yellow headed Woodpecker. Lath. syn. I. 2. p. 595. n. 46.
Habitat in Gujana, torquillæ magnitudine.
Rostrum & pedes plumbei; ad angulos oris stria rubra.
- miniatus. 40. *P. cristatus ruber, subtus albus, jugulo roseo, rostro caudaque cæruleis, testricibus caudæ viridibus.*
Red-winged Woodpecker. Ind. zool. t. 4. Lath. syn. I. 2. p. 595. n. 47.
Habitat in Java, 9 pollices longus.
Menti macula flava; remiges nigra, maculis magnis albis; pedes obscuri.
- Pitius. 41. *P. fuscus, albo guttatus, cauda brevi. Molina hist. nat. Chil. p. 209.*
Habitat in Chili, columbæ habitu, non in cavis arboribus, sed ad ripas, montiumque declivia nidificans, ova plerumque 4 pariens; caro incolis æstimata.

viridis. 12. *P. viridis*, vertice coccineo. *Fn. suec.* 99. *Scop. ann.* 1. p. 47. n. 52.

Picus viridis. *Gesn. av.* 710. *Aldr. orn.* 1. p. 848. t. 849. *Raj. av.* p. 42. A. 2. *Briff. av.* 4. p. 9. n. 1. *Nozem, nederl. Vogel.* t. 23.

Pic vert. *Buffon hist. nat. des ois.* 7. p. 7. t. 1. pl. enlum. n. 371. 879.

Woodspite, Rainfowl, Highhoe, Hewhole. *Will. orn.* p. 135. t. 21.

Green Woodpecker. *Brit. zool.* n. 84. *Arct. zool.* 2. p. 277. B. *Albin. av.* 4. t. 18. *Latham syn.* 1. 2. p. 577. n. 25. *Hayes brit. Birds* t. X.

Grünspecht. *Frisch av.* t. 35. *Günth. Nest. u. Eyer.* t. 5. f. inf.

β. *Pic vert.* *Fermin Surin.* 2. p. 169.

Habitat in Europa, 13 pollices longus, foraminibus exactissime rotundis arborem pertundens ad partem emortuam usque, ova 5-6 virescentia nigro-maculata pariens, apibus in silvis delectatur.

Rostrum obscurum, 2 pollices longum; iridium circulus interior rubicundus, exterior albus; tempora nigricantia; remiges obscuræ, maculis albidis; cauda obscura & virescente cancellata, apice nigra; pedes ex virescente cinerei.

bengalensis. 13. *P. viridis*, crista rubra, nucha nigra, subtus anticequæ albus nigro-maculatus.

Picus viridis bengalensis. *Briff. av.* 4. p. 14. n. 2.

Pic vert de Bengale. *Buff. hist. nat. des ois.* 7. p. 23. planch. enlum. n. 695.

Bengal Woodpecker. *Alb. av.* 3. p. 21. t. 22. *Lath. syn.* 1. 2. p. 580. n. 26.

Spotted Indian Woodpecker. *Edw. av.* 4. t. 182.

β. Zeylonischer Specht. *Naturf.* 13. p. 14. t. 1. 17. p. 16.

γ. *Pic grivelé* ou grand pic de l'île de Luçon. *Sonner. it.* p. 73. t. 37.

Palalaca ou pic vert tacheté des Philippines. *Buff. hist. nat. des ois.* 7. p. 21.

Pic vert des Philippines. *Buff. pl. enlum.* n. 691.

Habitat in Bengala, β. in Zeylon, γ. in insula Luzonia, viridi minor, γ. æqualis.

Rostrum pedesque nigricant; irides γ. rubens; vertex niger, maculis albis, in β. numerosioribus, in γ. caput cum crista & collo, dorso & alis splendide fuscum viridi inter-

mixto; gula & jugulum ex nigro alboque varia; pectus abdominisque pars superior alba, pennarum margine fusco; inferior cum cristo alba, in β. gula & pectus fusca, maculis anomalis albis; in γ. gula, jugulum, pectus & abdomen alba, pennarum margine nigro; dorsi pars superior flava, in β. nigra; inferior viridis, in β. una cum tectricibus alarum rubra; alæ virides dilutius maculatæ, tectricibus inferioribus & minoribus superioribus fuscis albo maculatis; in β. remiges majores fusca, albo-maculatæ; alia nigra strigis albis; cauda ex virente nigra, in β. fusca, in γ. ex atro fusca, fascia alba, tectricibus superioribus rubris.

goensis. 42. *P. viridis, subtus albidus, vertice & occipite cristato rubris, cauda tæniæque ab oculis ad alas ducta nigris, alis aureis.*

Pic vert de Goa. Buffon hist. nat. des ois. 7. p. 22. pl. enlum. n. 696.

Goa Woodpecker. Lath. syn. I. 2. p. 582. n. 27.

Habitat in Goa, bengalensi affinis, viridi minor.

Rostrum nigrum; occiput linea alba circumscriptum; tectrices alarum minores nigra; remiges minores ex nigro & albo varia; pennæ subtus nigro marginatæ; pedes plumbei.

manil- 43. *P. fordide viridis, vertice griseo-maculato, remigibus lenfis. caudæque nigricantibus, tectricibus caudæ superioribus rubris.*

Pic vert de l'île de Luçon. Sonner. it. p. 73. t. 36.

Manilla green Woodpecker. Lath. syn. I. 2. p. 583. n. 28.

Habitat in insula Luzonia, goensi minor.

Rostrum pedesque plumbei.

Goertan. 44. *P. supra ex griseo-fuscus, subtus ex flavicante griseus, alarum maculis sordide albis, vertice & uropygio rubris.*

Goertan ou pic vert du Sénégal. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 25.

Pic appelé Goertan du Sénégal. Buff. pl. enlum. n. 320.

Crimson-rumped Woodpecker. Latham syn. I. 2. p. 583. n. 29.

Habitat ad fluvium Senegal, viridi multo minor.

Rostrum cum pedibus plumbeum.

cannus. 45. *P. cinereus fronte obsoleta rubro maculata, dorso humeris & tectricibus alarum & caudæ viridibus uropygio flavo, remigibus caudæque fuscis, gula albida.*

Picus viridis norwegicus. *Briff. av. 4. p. 18. n. 4.*
 Grey-headed green Woodpecker. *Edw. av. 2. p. 65. Lath.*
syn. 1. 2. p. 583. n. 30.
Habitat in Norwegia, Russia, Sibiria & Helvetia, magnitudi-
dine viridis, Tungusis edulis.
Rostrum basi flavicans; remiges maculis flavicantibus,
cauda lineis obscuris notata; pedes & ungues nigri.

perficus. 46. *P. luteus, supra, remigum apicibus & oculorum areis*
ferrugineus.

Picus luteus perficus. *Briff. av. 4. p. 20. n. 5.*
Picus luteus cyanopus perficus. *Raj. av. p. 44. n. 9.*
 Persian Woodpecker. *Will. orn. p. 141. Lath. syn. 1. 2.*
p. 584. n. 31.
Habitat in Persia, viridis circiter magnitudine, capite
tamen colloque crassioribus, rostro longiore, ferrugineo;
pedes cærulecentes; ungues nigri.

semiro- **14.** *P. maxilla superiore brevior.* *Mus. Ad. Fr. 1. p. 16.*
stris. *Halfbilled Woodpecker. Lath. syn. 1. 2. p. 586. n. 35.*
Habitat in India, rostro forsan lusu naturæ mutilato,
Martii magnitudine.

Rostrum pallidum; caput fuscum, singulis pennis apice
flavicantibus; corpus supra fuscum in cinereum vergens,
subtus album; cauda alæque fusæ; remigum margo
exterior albo-maculatus.

pubes- **15.** *P. dorso longitudinali villosa, rectrice extima alba*
gens. *maculis quatuor nigris.*

Picus varius virginianus minor. *Briff. av. 4. p. 50. n. 18.*
Epeiche ou pic varié de Virginie. *Buff. hist. nat. des ois. 7.*
p. 76.

Smallest Woodpecker. *Catesb. Carol. 1. p. 21. t. 21. f. 1.*
Downy Woodpecker. *Arct. zool. 2. p. 264. n. 165.*

Little Woodpecker. *Lath. syn. 1. 2. p. 573. n. 19.*

Habitat in America septentrionali, numerosissimus, audax
gregatim invadit arbores, quas innumeris foraminibus
perfundit, & trucidat, hinc, pomariis potissimum, in-
festissimus, passeris magnitudine, villosa cetera multum
similis, sed minor.

Mas occipite rubro.

villosus. 16. *P. dorso longitudinali subvillosa, rectricibus extimis totis*
albis. *Kalm. it. 3. p. 43.*

Picus varius virginianus. *Briff. av. 4. p. 48. n. 17,*

Epeiche ou Pic chevelu de Virginie. *Buff. hist. nat. des ois.* 7. p. 75.

Pic varie mâle de Virginie. *Buff. pl. enlum. n.* 754.

Hairy Woodpecker. *Arct. zool. 2. p.* 263. *n.* 164. *Catesb.*

Car. 1. t. 19. *f.* 2. *Lath. syn. 1. 2. p.* 572. *n.* 18.

Habitat in America septentrionali a sinu Hudsonis ad Carolinam frequentissimus, pomariis similiter infestissimus, a 9-12 fere pollices longus.

Rostrum corneum; caput nigrum, occipitis fascia, in mare, transversa rubra, genæ lineis duabus albis, totidemque nigris; corpus subtus album; dorsum nigrum; alæ nigra, maculis albis in series dispositis; rectrices 2 intermedia totæ nigrae, 2 extrema totæ albae, reliquæ nigrae striis albis decussantibus.

major. 17. P. albo nigroque varius, crisso occipiteque rubro. *Fn. suec. 100. Scop. ann. 1. p.* 47. *n.* 53. *Kram. el. p.* 335. *n.* 3.

Picus albo nigroque varius, rectricibus tribus lateralibus utrinque albescentibus. *Fn. suec. 1. n.* 81.

Picus albo-nigroque varius major. *Nozem. nederl. Vogel. t.* 22.

Picus varius major. *Raj. av. p.* 43. *A. 4. Briss. av. 4. p.* 34. *n.* 13.

Epeiche ou Pic varié. *Buff. hist. nat. des ois. 7. p.* 57. *pl. enlum. n.* 196. & 595.

Greater spotted Woodpecker or Witwall. *Brit. zool. n.* 85.

t. E. Arct. zool. 2. p. 272. *n.* 162. *Albin. av. 1. t.* 19.

Will. orn. p. 137. *t.* 21. *Hayes brit. birds. t. 9. Lath. syn. 1. 2. p.* 564. *n.* 12.

Buntspecht. *Frisch. av. t.* 36.

Habitat in Europa, septentrionali America & Sibiria orientali, 9 pollices longus.

Frons ex rufescente lutescens; vertex niger; occiput feminae pariter nigrum; dorsum nigrum; humeri albi; alæ & cauda lineis nigris & albis; pectus & abdomen alba, in flavicantem colorem vergentia.

medius. 18. P. albo nigroque varius, crisso pileoque rubris. *Fn. suec. 101. Scop. ann. 1. p.* 48. *n.* 34.

Picus albo nigroque varius, rectricibus tribus lateralibus apice albo variegatis. *Fn. suec. 1. n.* 82.

Picus major. *Aldr. orn. 1. p.* 845. *t.* 846.

Picus varius ex albo & nigro. *Gesn. av. 709.*

Picus varius minor. *Raj. av. p. 43. Briss. av. 4. p. 38. n. 14. t. 2. f. 1.*

Pic varié à tête rouge. *Buff. pl. enlum. n. 611.*

Middle spotted Woodpecker. *Brit. zool. n. 86. t. 37. Arch. zool. 2. p. 278. D. Lath. syn. 1. 2. p. 565. n. 13.*

Habitat in Europa, majori satis similis, sed minor, & 8½ pollices longus.

minor. 19. *P. albo nigroque varius, vertice rubro, crisso testaceo.* *Fn. succ. 102. Scop. ann. 1. 49. n. 55.*

Picus albo nigroque varius, rectricibus tribus lateralibus seminigris. *Fn. succ. 83. Hasselq. it. 242.*

Picus varius tertius. *Raj. av. p. 43. n. 6.*

Picus alius minor. f. graminis. *Gesn. av. 709.*

Picus varius minor. *Aldr. orn. 1. p. 847. Raj. av. p. 43. n. 5. Briss. av. 4. p. 41. n. 15.*

Petit Epeiche. *Buffon hist. nat. des ois. 7. p. 62. planch. enlum. n. 598.*

Lesser spotted Woodpecker. *Brit. zool. n. 89. t. 37. Brit. zool. 2. p. 278. E. Will. orn. 138. t. 31. Albin. av. 1. t. 20. Lath. syn. 1. 2. p. 566. n. 14.*

Kleiner Buntpecht. *Frisch. av. t. 37.*

Habitat in Europa & Asia, ipsa adeo australi, hujus generis minimus, ut 5½ modo pollices longitudine aquet, ceterum medio satis similis.

Dorsum lineis albis & nigris; alæ areis latis albis.

tricolor. 47. *P. niger striis transversis albis, pectore & abdomine rubris,* *Picus varius mexicanus major, & picus varius mexicanus minor.* *Briss. av. 4. p. 57. & 59. n. 21. 22.*

Quauchochopitli, seu avicula ligna excavans. *Fern. hist. n. Hisp. c. 94. Raj. av. p. 163.*

Epeiche du Mexique. *Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 70.*

Varied Woodpecker. *Lath. syn. 1. 2. p. 568. n. 15.*

Habitat in nova Hispania, magnitudine medii.

canaden-48. *P. albus, vertice, dorso, humeris & rectricibus duabus* *lis.* *intermediis nigris, reliquis & alis ex albo & nigro variis.*

Picus varius canadensis. *Briss. av. 4. p. 45. n. 16. t. 2. f. 2.* *Quauhnotopotli alter.* *Fern. hist. n. Hisp. c. 165. p. 47.*

Raj. av. p. 162.

Epeiche du Canada, première espèce. *Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 69.*

Pic du Canada. *Buff. pl. enlum. n. 345. f. 1.*

AVES PICÆ. Picus.

Canada spotted Woodpecker. *Arct. zool. 2. p. 273. n. 163.*

Lath. syn. 1. 2. p. 569. n. 16.

Habitat in Canada, majoris magnitudine.

Tænia alba caput circumscribens; altera nigra albomarginata ab oculis per cervicem; humeralibus intermixtae paucae pennæ albæ.

varius. 20. *P. albo nigroque varius, vertice rubro, crisso albo fusco-fasciato.*

Picus varius carolinus. Briss. av. 4. p. 62. n. 24.

Pic varié de la Caroline. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 77. pl. enlum. n. 785.

Yellow-bellied Woodpecker. *Arct. zool. 2. p. 275. n. 166.*

Catesb. Carol. 1. t. 21. f. 2. Lath. syn. 1. 2. p. 574. n. 20.

Habitat in America septentrionali numerosissimus, & fructibus infestissimus; 9 pollices longus.

Femina rubor nullus; maris vertex linea nigra circumseptus; mentum rubrum; pectus & abdomen flavicans; illud nigro-maculatum; tectrices alarum nigrae, lineis duabus transversis albis; remiges primariae ex albo & nigro variae; cauda nigra.

flavipes. 49. *P. niger subtus albus, pedibus flavis.*

Yellow-legged Woodpecker. *Arct. zool. 2. p. 275. n. 167.*

Magnitudo p. minoris; occiput nigrum; alarum margo superior albus.

bicolor. 50. *P. ex griseo & albo varius, capitis cristati lateribus albis, remigibus fuscis albo maculatis.*

Epeiche ou Pic varié de la Encénada. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 74. pl. enlum. n. 748. f. 1.

Encenada Woodpecker. Lath. syn. 1. 2. p. 575. n. 21.

Pico minore paulo major; rostrum plumbeum, uti & pedes; irides albæ; corpus supra transversim, subtus perpendiculariter varium; femina tota fusca, crista carens.

Cardina- 51. *P. niger, subtus albus nigro-maculatus, vertice & occipite rubris.*

Pic Cardinal de l'île de Luçon. Sonner. it. p. 72. t. 35.

Grand pic varié de l'île de Luçon. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 67.

Cardinal Woodpecker. Lath. syn. 1. 2. p. 576. n. 22.

Habitat in insula Luzonia, viridis magnitudine.

Pedes & rostrum nigricant; mandibulae superioris basis pen- nis griseis cincta; ad utrumque capitis latus pone oculos

per collum ad alas stria alba ; pennæ colli inferiores , dorsique superiores albo-marginatæ ; alæ maculis albis ; remigum rectricumque scapi flavi.

nubicus. 52. P. ex albo, rufo & fusco varius, vertice nigro albo-maculato, occipite rubro subcristato, pectore albedo nigro-guttato, cauda rufo fuscoque lineata.

Epeiche de Nubie ondé & tacheté. *Buff. hist. nat. des ois.* 7. p. 66.

Pic tacheté de Nubie. *Buff. pl. enlum. n.* 667.

Habitat in Nubia, majore minor, 7½ pollices longus.

Rostrum nigrum ; irides pallide fuscæ ; frons subfusca ; mentum & crissum albidum ; pedes glauci.

moluc- 53. P. fusco-ater albo-undulatus, suhtus albidus fusco sagit-
censis. tatus, remigibus rectricibusque fuscis albo-maculatis.

Petit epeiche brun des Moluques. *Buff. hist. nat. des ois.* 7. p. 68.

Petit pic des Moluques. *Buff. pl. enlum. n.* 748. f. 2.

Brown Woodpecker. *Lath. syn. I. 2. p.* 577. n. 24.

Habitat in insulis Moluccis, minoris magnitudine.

Rostrum & pedes obscura ; genæ albæ ; infra oculos macula fusca.

tridactyl- 21. P. albo nigroque varius, pedibus tridactylis. *Fn. succ.*
lus. 103. *Af. Stockh.* 1740. p. 222. *Scop. ann. I. p.* 49.

n. 56. *Forster af. angl.* 62. p. 388.

Picus tridactylus anomalos. *Mus. petrop.* 368.

Threetoed Woodpecker. *Arct. zool. 2. p.* 275. n. 168. *Edw.* av. 3. t. 114. *Lath. syn. I. 2. p.* 600. n. 51.

β. Picus varius cayanensis. *Briss. av. 4. p.* 54. n. 20.

Epeiche ou pic varié ondé. *Buff. hist. nat. des ois.* 7. p. 78.

Pic tacheté de Cayenne. *Buff. pl. enlum. n.* 553.

Woodpecker with three toes. *Bancr. Gij. p.* 164.

Habitat in America, Europa & Sibiria, rarius in australi,
11 pollices longus.

Vertex europæo aureus, americano ruber ; irides glaucæ ; genæ lineis longitudinalibus 3 nigris, 2 albis ; occiput dorsumque nigra ; hoc superius albo maculatum ; alæ caudæque nigre ; remiges primariæ & rectrices extimæ maculis albis ; corpus subtus album ; pedes obscuri.

60. SITTA. *Rostrum* subulatum teretiusculum, rectum, porrectum, integerrium, mandibula superiore paulo longiore, apice compresso.

Lingua emarginato-lacera, brevis, apice cornea.

Nares exiguae vibrissis tectæ.

Pedes ambulatorii.

europæ. 1. S. rectricibus nigris, lateralibus quatuor infra apicem albis. *Fn. succ.* 104. *Scop. ann.* 1. p. 50. n. 57. *Kram. elench.* p. 362.

Sitta f. *Picus cinereus*. *Gesh. av.* 711. *Aldr. orn.* 1. p. 852. t. 853. *Raj. av.* p. 47. A. 4. *Briss. av.* 3. p. 588. n. 1. t. 29. f. 3.

Sittelle ou Torchepot. *Buff. hist. nat. des ois.* 5. p. 460. t. 20. pl. enlum. n. 623. f. 1.

Woodcracher. *Plot. Oxfordsh.* p. 175.

Nutbreaker. *Albin. av.* 2. t. 28.

Nuthatch or Nutjobber. *Brit. zool.* 1. n. 89. t. 38.

European Nuthatch. *Lath. syn.* 1. 2. p. 648. n. 1.

Blaupecht. *Frisch av.* t. 39.

β. Sitta minor. *Briss. av.* 3. p. 592.

Petit torchepot. *Belon ois.* p. 305.

Petite Sittelle. *Buffon hist. nat. des ois.* 5. p. 470.

γ. Sitta carolinensis. *Briss. av.* 3. p. 596. n. 4.

Sittelle à tête noire. *Buff. hist. nat. des ois.* 5. p. 473. var. 5.

Smaller Loggerhead. *Brown jam.* p. 475.

Nuthatch. *Catesb. Carol.* 1. t. 22.

Blackheaded Nuthatch. *Arch. zool.* 2. p. 281. n. 171.

δ. Sitta carolinensis minor. *Briss. av.* 3. p. 598. n. 4.

Petite Sittelle à tête brune. *Buff. hist. nat. des ois.* 5. p. 474. var. 6.

Loggerhead. *Sloane jam.* p. 301. t. 259. f. 2.

Small Nuthatch. *Catesb. Carol.* 1. t. 22.

Less Nuthatch. *Arch. zool.* 2. p. 282. n. 172.

ε. Sitta subtus alba, capite colloque fuliginoso, dorso nigro.

Beseke Schr. der naturf. Berl. Ges. 7. p. 455.

Habitat in Europæ, Russiæ asiaticæ, γ. & δ. Americæ septentrionalis temperatoris arborum truncis, hieme habitaculis hortisque appropinquans, caudam motacillæ instar

motitans, solitarius, moribus ceterum picis multum similis, coleoptera & larvas insectorum sub cortice arborum latentes effodiens, nuces rostro perforans & comedens; nidum struens reperto congruo foramine arboris, aliquando a picco relicto, illudque limo obliniens pro capacitate introitus; ova pariens 6-7 fœdide alba rufo maculata, fidissima mater; junioris caro sapida; noctu cantillans. Longitudo 6 fere pollicum; femina paulo minor; corpus ex cano cærulefcens, subtus album; linea atra per oculos & aures; hypochondria & femora ferruginea; uropygium ex albo & ferrugineo varium; rectrix 1 fascia alba, 2 macula alba, 3 & 4 apice albo; 5 dorso concolor. β. minor, per paria conspicua, pugnax; γ. capite colloque nigris, δ. fuscis potissimum distinctæ.

canaden- 2. S. superciliiis albis.

sis.

Sitta canadensis. Briss. av. 3. p. 592. n. 2. t. 29. f. 4. Sittelle du Canada. Buff. hist. nat. des ois. 5. p. 471. Torcheput du Canada. Buff. pl. enlum. n. 623. f. 2. Canada Nuthatch. Arch. zool. 2. p. 281. n. 170. Latham syn. 1. 2. p. 651. n. 2.

Habitat in America, Asia, Europa septentrionali, non migrans, europææ magnitudinæ, cujus forsitan varietas. Vertex, cervix & humeri nigra; dorsum & uropygium glauca; genæ, pectus & abdomen alba; remiges primariæ obscuræ, margine griseo; rectrices duæ intermedia griseæ; reliquæ nigrae, macula ad apicem alba; cristum ferrugineum.

jamaicensis.

3. S. pileo nigro.

Sitta jamaicensis. Briss. av. 3. p. 394. n. 3.

Sitta major, capite nigro. Raj. av. p. 185. n. 33.

Sitta f. Picus cinereus major capite nigro. Sloan. jam. 2. p. 300. t. 259. f. 1.

Sittelle à huppe noire. Buff. hist. nat. des ois. 5. p. 472.

Loggerhead. Brown jam. p. 475.

Jamaica Nuthatch. Lath. syn. 1. 2. p. 652. n. 3.

β. *Sitta jamaicensis minor. Briss. av. 3. p. 596.*

Petite Sittelle à huppe noire. Buff. hist. nat. des ois. 5. p. 473.

Least Loggerhead. Brown jam. p. 475.

Habitat in Jamaicae dumetis, stupida, 5½ pollices longa, β. minor.

Corpus supra cinereum, subtus album; remiges nigricantes, margine cinereo; cauda nigricans, lineis transversis albis; rostrum, pedes & ungues nigra.

major.

4. *S. subtus albida*, capite dorsoque griseis, gula alba, remigibus caudaque nigris margine aurantiis.

Sitta f. *picus cinereus major*, rostro curvo. *Raj. av.* p. 186. n. 34.

Grande Sittelle à bec crochu. *Buff. hist. nat. des ois.* 5. p. 475.

An other sort of Loggerhead. *Sloane jam.* p. 301. n. 19.

Great Nuthatch. *Lath. syn.* 1. 2. p. 653. n. 4.

Habitat in Jamaica, *vermibus*, *cimicibus* e. t. *viditans*, $7\frac{1}{2}$ pollices longa.

Rostrium medio crassius, apice aduncum.

nævia.

5. *S. supra plumbea*, subtus glauca, gula alba, testricibus alarum supra albo-punctatis.

Sittelle grivelée. *Buff. hist. nat. des ois.* 5. p. 476.

Wall-creeper of Surinam. *Edw. glean.* t. 346.

Spotted Nuthatch. *Lath. syn.* 1. 2. p. 654. n. 5.

Habitat in Surinamo, 6 pollices longa.

Caput ex *cærulescente plumbeum*; testrices alarum interiores *obscuræ albo-marginatæ*; pennæ inferiores *linea media longitudinali alba in punctum terminatæ*; pedes *obscuræ fusci*.

furina-
mentis.

6. *S. subtus fordide alba*, capite colloque ex rufo castaneis, dorsi medio albo, alis caudaque nigris, testricum alarum testricumque apicibus, & remigum secundariorum margine albis.

Surinam Nuthatch. *Latham syn.* 1. 2. p. 654. n. 6. t. 28.

Habitat in Surinamo, *hujus generis minima*, $3\frac{1}{2}$ pollices longa.

Rostrium paulisper incurvum, obscure fuscum; occiput & cervice maculis oblongis nigris notata.

castra.

7. *S. corpore subtus flavo*, superne flavo nigroque vario, pedibus nigris. *Sparrm. mus. Carlson.* t. 4.

Habitat ad Caput bonæ spei.

Rostrium *retriusculum*, *subdepressum*, mandibula superiore *convexiuscula*, *subtriquetra*; color *subtus lutescens*; testrices *supra nigricantes*, *subtus olivaceæ*, apice *flavicantes*; ungues *lutescentes*.

sinensis.

8. *S. palpebra inferiore purpurea.* *Osb. it.* 2. p. 12.

Chinese Nuthatch. *Lath. syn.* 1. 2. p. 655. n. 7.

Habitat in Sina, *sæpius cicuratus*, *oryzæ seminibus viditans*.

Caput eum rostro nigrum cristatum; dorsum obscure ferrugineum, glauco colore internitente; abdomen & pectus alba, gulam versus nigra; prope oculos macula exigua coccinea & proxima huic area magna nivea; a temporibus ad gulam linea nigra; mentum & gula alba, limitibus nigris; uropygium flavum; rectrices alarum ferrugineæ; rectrices nigricantes, apice albæ.

61. TODUS. Rostrum subulatum depresso-sculum, obtusum, rectum, basi setis patulis.

Lingua — —

Pedes gressorii.

viridis. 1. T. viridis, pectore rubro.

Todus. *Briss. av. 4. p. 528. n. 1. t. 41. f. 2.*

Rubecula viridis elegantissima. *Sloane jam. 2. p. 306.*

t. 263. f. 1. Raj. av. p. 187. n. 40.

Todier de l'Amérique septentrionale. *Buff, hist. nat. des ois. 7. p. 225. t. 11.*

Todier de S. Domingue. *Buff. pl. enlum. n. 585. f. 1. 2.*

Green Sparrow or green Hummingbird. *Brown. jam. p. 476. Edw. av. 3. t. 121.*

Green Tody. *Gen. of birds p. 61. t. 6. f. 1.*

Habitat in calidiori America, insulisque vicinis, solitarius, stupidus, mollioribus insectis victitans, 4 pollices longus.

Mandibula superior fusca, inferior aurantia; irides castaneæ; corpus subius ochroleucum; gulæ macula rubra; pedes & ungues grisei. Mari corpus supra cærulescens, abdomen album, pectus roseum.

cinereus. 2. T. cinereus subtrus luteus.

Todus cinereus. *Briss. av. app. p. 134. Pall. spic. 6. t. 3. A.*

Tic-tic ou Todier de l'Amérique méridionale. *Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 223.*

Todier de Cayenne. *Buff. pl. enlum. n. 585. f. 3.*

Grey and yellow Fly-catcher. *Edw. glean. t. 262.*

Cinereous Tody. *Latham syn. 1. 2. p. 658. n. 2.*

Habitat in Surinami & Gujanæ locis apertis, insectis victitans, viridi paulo major.

Todi genus in calidiori præsertim America habitat, muscipapæ satis affine, cui tamen anteriorum digitorum mediis ab ortu inde discretus.

Rostrum obscurum, basi rubens; frons atra; rectrices alarum superiores & remiges ex atro fusca margine luteo; cauda subcuneata; rectrices 2 intermedia nigra, reliqua fusca, apice (in mare) albo; pedes incarnati.

fuscus. 3. T. ferrugineus subtus olivaceus albo-maculatus, rectricibus alarum fascia obscura notatis.

Brown Tody. *Gener. of Birds*, p. 62. t. 6. f. 2. *Lath. syn.* I. 2. p. 659. n. 3.

Habitat in calidiori America; viridi minor.

cæruleus. 4. T. cæruleus, gula alba; temporibus, gula & abdomine aurantiis.

Todier bleu à ventre orangé. *Buffon hist. nat. des ois.* 7. p. 229.

Todier de Juda. *Buff. pl. enlum. n.* 783. *Salern. orn.* p. 126. n. 16.

Blue Tody. *Lath. syn.* I. 2. p. 659. n. 4.

Habitat in America, viridis magnitudine, $3\frac{1}{2}$ pollices longus.

Rostrum & pedes incarnati; infra oculum area purpurascens.

varius. 5. T. ex cæruleo, nigro & viridi varius, rostro; capite, gula, cervice, pedibus, unguibus & cauda nigris, caudæ margine rectricibus alarum superioribus viridibus.

Todus varius. *Briss. av.* 4. p. 531. n. 2.

Isipida indica. *Aldr. av.* 3. p. 520.

Todier varié. *Buff. hist. nat. des ois.* 7. p. 229.

Habitat in India, reguli magnitudine.

leucocephalus. 6. T. ater, capite subcristato gulaque lacteis. *Pall. spicil.* 6. p. 19. t. 3. f. 2.

White-headed Tody. *Lath. syn.* I. 2. p. 660. n. 6. t. XXIX.

Habitat in America, phœnicuri magnitudine.

Rostrum nigrescens; mandibula inferior alba, apice nigrescens; alæ breves; remiges interius & subtras, apicibusque obsoletæ, fuscescentes; cauda brevis, æqualis.

brachyurus. 7. T. niveus, vertice, cervice, dorso caudaque brevi nigris. *Pall. spic.* 6. p. 18. 19.

Short-tailed Tody. *Lath. syn.* I. 2. p. 660. p. 7.

Habitat in America, præcedentis habitu & magnitudine.

plumbeus. 8. T. supra ex plumbeo canus, subtus lacteus, remigibus rectricibusque nigris. *Pall. spicil.* 6. p. 17.

Plumbeous Tody. *Latham syn.* I. 2. p. 661. n. 8.

Habitat in Surinamo, reguli magnitudine, cinerei rostro. Remigum & tectricum secundariorum, rectricumque lateralia margo albus; color verticem versus sensim nigricans.

- obscu- 9. *T. supra ex fusco niger, subtus sordidissime albus.*
rus. Dusky Tody. *Arch. zool.* 2. p. 283. n. 173. *Lath. syn.* I. 2. p. 661. n. 9.
Habitat in insula Rhode, lusciniæ magnitudine, insectis visitans, arbores emortuas frequentans, cantu suavi. Remiges & tectrices margine griseæ; cauda æqualis.
- regius. 10. *T. ex atro fuscus, subtus rufescens, crista spadicea apice nigro-maculata, mento, superciliis & pectore albis.*
Roi des Gobe-mouches. *Buff. hist. nat. des ois.* 4. p. 552.
Tyrann huppé de Cayenne. *Buff. pl. enlum.* n. 289.
King Tody. *Latham. syn.* I. 2. p. 662. n. 10.
Habitat in Cayenna, 7 pollices longus.
Rostrum obscure fuscum; crista verticis transversa, 4-5 ordinibus pennarum apice rotundatarum constans; tectrices alarum ex rubicundo fusce; remiges obscuræ; pedes lineis transversis nigricantibus; pedes incarnati.
- paradi- 11. *T. capite cristato nigro, corpore albo, cauda cuneata, iæus. rectricibus intermediis longissimis.*
Muscicapa paradisi. Syst. nat. XII. 1. p. 324. n. 1.
Corvus paradisi. Syst. nat. X. 1. p. 107.
Pica Papoensis, Icterus maderaspatarum cristatus, & Muscicapa cristata alba Capitis bonæ spei. Briss. av. 2. p. 45. n. 6. p. 92. n. 7. p. 414. n. 20. t. 41. f. 2.
Manucoditota cristata ex albo nigroque varia. Raj. av. 195. t. 2. f. 13.
Avis paradisi. Seb. mus. I. p. 85. t. 52. f. 3.
Verdiolle, & Moucherolle huppée à tête couleur d'acier poli. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 105. 4. p. 558.
Gobe-mouche blanc huppé du Cap de bonne espérance. Buff. pl. enlum. t. 234. f. 2.
Pied bird of paradise. Edw. av. t. 113.
Paradise Fly-catcher. Lath. syn. II. 1. p. 345. n. 44.
- β. *Todis alis caudaque helvolis.*
Muscicapa cristata Capitis bonæ spei. Briss. av. 2. p. 418. n. 31. t. 41. f. 1.
- γ. *Todis subtus albus, pectore ex cærulescente cinereo.*
Crested long-tailed Pie. *Edw. glean.* t. 325.

J. Todus cristatus brasilianus.

Muscicapa brasiliensis cristata. *Briss. av. 2. p. 416. n. 30.*

Avis paradisiaca brasiliensis, seu Curiri Atamaky cristata.

Seb. mus. 2. t. 87. f. 2.

Habitat in Africa & insula Madagascar, muscis visitans, alaude magnitudine, 7 plerumque pollices longitudine superans.

Caput azureum, crista declinata; corpus album, rachi pennarum nigra; remiges nigrae utroque margine albae; rectrices niveae, rachi & margine exteriori nigrae.

ferrugi- 12. T. ex ferrugineo niger, subtus ferrugineus, cauda fusca, neus. temporibus obscuro & albo variis.

Ferrugineous bellied Tody. *Lath. syn. I. 2. p. 662. n. 11.*

Habitat in Cayenna, 7½ pollices longus.

Rostrum nigrum; nares ovatae; supercilia pallida; remiges cum pedibus obscura.

novus. 13. T. fuscus, subtus albus, jugulo & pectore fusco maculatis, unguibus flavis.

White-chinned Tody. *Lath. syn. I. 2. p. 663. n. 12.*

Longitudo 9 pollicum; nares ovales; cauda rotundata; pedes fusci.

platyrhyn- 14. T. ex fusco lutescens, subtus luteus, gula albicante, ver- chos. tice plumbeo, alis caudae fuscis, rostro maximo.

Pall. spicil 6. p. 19. t. 3. C.

Broad-billed Tody. *Lath. syn. I. 2. p. 664. n. 13.*

Magnitudo Lusciniae; rostrum semiovale, acutum, planum; naribus late excavatis albicantibus; pedes cum unguibus flavescens.

macro- 15. T. niger, mento, genarum lateribus, abdomine, crisso, rhynchos. uropygioque rubris.

Great-billed Tody. *Lath. syn. I. 2. p. 664. n. 14. t. 30.*

Magnitudo praecedentis, longitudo 8 pollicum; rostrum basi latum, ceterum praecedentis; ex atro caeruleum apice, mandibularumque marginibus albidis; rectrices caudae superiores rubrae; scapularium pennarum sex albae, acuminatae, supra alas pendulae.

cristatus. 16. T. crista coccinea, corpore fusco albo-maculato. *Naturf.*

17. p. 21. n. 5. t. I.

Habitat in Guinea.

Pennæ cristæ apice nigro-marginatæ; rostrum depressum, tenue, lanceolatum, obtusum; nares exiguæ, parum tectæ; corpus supra obscurum ex griseo fuscum; tectrices alarum adperso albo; remiges nigricantes; gula ex albido cinerea; pectus & abdomen fusco & obscure cinereo undulata; rectrices fuscæ, subtus dilutius, 2 intermediæ nigricantes.

62. ALCEDO. *Rostrum trigonum, crassum, rectum, longum, acuminatum.*

Lingua carnosa, brevissima, plana, acuta.

Pedes gressorii plerisque.

cristata. **I.** *A. brachyura subcristata cærulea, subtus rufa, cristâ nigro-undulata.*

Alcedo amboinensis cristata. Seb. mus. I. t. 63. f. 4.

Ispida philippensis cristata. Briss. av. 4. p. 483. n. 6. t. 37. f. 3.

Petit Martin-pêcheur huppé des Philippines. Buff. planch. enlum. n. 756. f. 1.

Vintsi. Buffon hist. nat. des ois. 7. p. 205.

Crested Kingfisher. Lath. syn. I. 2. p. 632. n. 22.

β. *Ispida indica cristata. Briss. av. 4. p. 506. n. 17.*

Alcedo cristata orientalis elegantissime picta. Seb. mus. I. p. 104. t. 67. f. 4.

Habitat in Amboina & insulis Philippinis, 5 pollices circiter longa.

Rostrum nigrum; cristâ virens; ad utrumque colli latus stria cærulea ab oculo incipiens; humeri, tectrices alarum superiores, remigum minorum, rectricumque margines, & rectrices 2 intermediæ totæ violaceæ; genæ rufæ; gula ex rufa alba; remiges fuscæ; pedes cum ungibus rubicundi. In Germania visam referunt Sander & Goeze. Naturf. 13. p. 182. & 15. p. 157.

orientalis. **16.** *A. viridis subtus rufa, vertice, gula, fascia oculari, remigibusque cæruleis.*

Ispida indica. Briss. av. 4. p. 479. n. 4. t. 37. f. 1. A.

Eastern Kingfisher. Latham syn. I. 2. p. 633. n. 23.

Habitat in India, 4½ pollices longa.

Rostrum rubrum; supra oculos stria alba; infra area rufa; rectricum margo exterior viridis; pedes & ungues nigri.

inda.

2. *A. brachyura virens subtus fulva, fascia pectorali nebulosa*,
Spotted Kingfisher. *Edw. glean. t. 335. Lath. syn. I. 2.*
p. 642. n. 32.

Habitat in Gujana, 7 pollices longa.

Rostrum nigrum; linea supra infraque oculos fulva; alæ albo punctatæ; pedes rubri.

(urina-
menfis.

17. *A. brachyura cærulea, subtus albicans, pectore rufo*,
vertice ex virescente atro: maculis transversis viridibus.

Martin-pêcheur. Fernin surin. 2. p. 181.

Surinam Kingfisher. Lath. syn. I. 2. p. 642. n. 33.

Habitat in Gujana, in foveis prope aquas nidificans, 5-6 ova pariens, & piscibus viditans.

Rostrum nigrum; rictus croceus; dorsum lineis obsoletis nigris; menti medique abdominis candori admixtus rubor; pennarum pectoris apex dilute cæruleus.

Ispida.

3. *A. brachyura supra cyanea, subtus fulva, loris rufis.*
Scop. ann. I. p. 55. n. 64.

Ispida supra cærulea subtus ferruginea. Mus. Ad. Fr. I. p. 16.

Ispida. Gefn. av. 571. Raj. av. p. 48. n. A. I. Olin. av. 39. Aldr. orn. 3. p. 518. t. 520. Briss. av. 4. p. 471. n. I.

Alcyon. Gefn. av. 85. Aldr. orn. 3. p. 497.

Martin-pêcheur ou Alcyon. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 64. pl. enlum. n. 77.

European Kingfisher. Brit. zool. I. p. 246. t. 38. Arct. zool. 2. p. 284. A.

Common Kingfisher. Lath. syn. I. 2. p. 626. n. 16.

Kingfisher. Albin. av. I. t. 54. Will. orn. p. 146. t. 24.

- β. *Ispida senegalensis. Briss. av. 4. p. 485. n. 7. t. 39. f. I.*
Baboucard. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 193.

Habitat in Africa, Asia & Europa, frigoris patientissima, ova 7 aut plura in fovea ad aquam posita pariens, pisces integros devorans, quorum reliquias indigestas glomeratim evomit; gentium borealium philtrum; 7 pollices longa.

Rostrum nigrum; vertex testricelque alarum virides, maculis cæruleis; cauda elegantissime cærulea; pedes rubri.

Genus hoc per omnem terrarum orbem dispersum, aquas potissimum habitat, piscibus viditans, quos mira arte capit, integros deglutit, & partium indigestarum glomeres evomit; alis, quamvis plerumque brevibus, celeriter volat; color cæruleus cum varietatibus dominans; nates exigua, in plurimis speciebus sedæ.

- Erithaca.** 3. *A. brachyura*, dorso cæruleo, abdomine luteo, capite uropygioque purpureis; gula nuchaque albis.
Ispida bengalensis torquata. Buff. av. 4. p. 503. n. 15.
 Martin-pêcheur à front jaune. *Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 195.*
Bengal Kingfisher. Alb. av. 3. p. 28. t. 29.
 Red-headed Kingfisher. *Lath. syn. I. 2. p. 629. n. 17.*
 3. *Alcedo minor*, capite & cervice ex aurantio rubris.
 Red-headed Kingfisher. *Gener. of birds. p. 61. t. 5.*
Habitat in Bengala, ispida magnitudine, ultra 6 pollices longa.
Rostrum pedesque rubri.
- purpurea.** 18. *A. subtus rufescente-aurea*, capite, uropygio caudaque rufo-aureis, dorso tectricibusque alarum ex cæruleo atris, remigibus nigris, gula alba.
 Martin-pêcheur pourpré. *Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 199.*
 Martin-pêcheur de Pondichery. *Buff. pl. enlum. n. 778. f. 2.*
 Purple Kingfisher. *Lath. syn. I. 2. p. 630. n. 18.*
Habitat in India, erithacæ magnitudine.
Rostrum pedesque rubri; pone oculos versus dorsum procedens linea purpurea, cæruleo terminata.
- madagascariensis.** 5. *A. subbrachyura rufa*, gula alba, remigibus nigricantibus.
Ispida madagascariensis. Buff. av. 4. p. 508. n. 18. t. 38. f. 1.
 Martin-pêcheur de Madagascar. *Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 199.*
 Martin-pêcheur roux. *Buff. pl. enlum. n. 778. f. 1.*
 Rufous Kingfisher. *Lath. syn. I. 2. p. 630. n. 19.*
Habitat in Madagascar, 5½ pollices longa.
Rostrum pedesque rubri; corpus subtus ex rufo album; cauda nigricans, rectricum margo exterior, & 2 intermediae totæ rufæ.
- cæruleo-cephala.** 19. *A. cærulea*, subtus rufa, gula alba, remigibus nigricantibus.
 Martin-pêcheur à tête bleue. *Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 198.*
 Petit Martin-pêcheur du Sénégal. *Buff. pl. enlum. n. 356. f. inf.*
 Blue headed Kingfisher. *Lath. syn. I. 2. p. 631. n. 20.*
Habitat in Madagascar, 4 pollices longa.
Rostrum pedesque rubri; vertex splendide cæruleus; dilutius undulatus.

β *Ispida ludoviciana.*

Martin-pêcheur de la Louisiane. *Buff. pl. enlum. n. 715.*
Crab catcher. *Sloan. jam. 2. p. 313. n. 54. t. 55. f. 3.*

γ. *Ispida dominicensis cristata. Briss. av. 4. p. 415. n. 22.*
Martin-pêcheur huppé de S. Domingue. *Buff. pl. enlum. n. 593.*

Jaguacati. *Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 210.*

American Kingfisher. *Edw. av. 3. t. 115.*

δ. *Ispida brasiliensis cristata. Briss. av. 4. p. 511. n. 20.*
Jaguacati guacu. *Marcgr. bras. 194. Raj. av. p. 49. n. 2.*
Will. orn. p. 147. n. 2. t. 24.

Habitat in America a sinu Hudsonis ad novam Hispaniam usque, β. in Louisiana & Jamaica, γ. in insula S. Dominici, vere versus sinum Hudsonis migrans, δ. in Gujana & Brasilia, piscibus, aliquando etiam lacertis visitans, ad ripas altiores nidificans, foramine profundo horizontali, ova 4 alba pariens, ex quibus Junio prodeunt pulli; caro rancida; longitudo 13 pollicum.

Rostrum nigrum, in β. ex atro fuscum; in γ. mandibula inferioris basi rubicunda; caput in β. plumbeum, in γ. cum superiore corporis parte splendide ferrugineum; torquis albus; in β. mentum, gula jugulumque alba; pectoris fascia transversa ferruginea, in γ. punctata; rectrices alarum, remiges rectricesque apice albæ; in β. remiges secundaria cum rectricibus, in γ. & δ. remiges omnes albo maculata; remiges primaria nigra, maculis transversis albis; in δ. remiges rectricesque nigra; pedes & ungues fusci; in β. pedes rubri, abdomine ferrugineo; in γ. pedes rubri, ungues nigri; in δ. pedes & ungues nigri.

torquata. 8. *A. macroura subcristata cano-cærulefcens, torque albo, alis caudaque albo-maculatis.*

Ispida mexicana cristata. Briss. av. 4. p. 518. n. 23. t. 41. f. 1.
Achalactli f. Piscium vorax. Hernand. mex. 13. Will. orn. p. 390. Raj. av. p. 126.

Alatii. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 208.

Martin-pêcheur huppé du Mexique. *Buff. pl. enlum. n. 284.*
Cinereous Kingfisher. *Lath. syn. 1. 2. p. 636. n. 26.*

Habitat in Martinica & Mexico, picæ magnitudine, 15½ pollices longa.

Rostrum ex atro fuscum basi rubens. Pedes rubri.

cayennensis. 26. *A. cærulea subtus alba, fascia infra occiput transversa nigra.*
Ispida cayennensis. Briss. av. 4. p. 492. n. 10.

Taparara. *Buff. hist. nat. des ois.* 7. p. 207.

Cayenne Kingsfisher. *Lath. syn.* I. 2. p. 635. n. 25.

Habitat in Cayenna & Gujana, numerosa, solitaria, in riparum antris ova pariens, sturno vix minor, 9 $\frac{1}{2}$ pollices longa.

Mandibula superior nigra, inferior rubra; uropygium cyaneum; remigum caudæque margo cæruleus; pedes rubri.

attrica- 27. A. ex violaceo cærulea, subtus alba, capite, cervice, pilla. humeris, alarumque apicibus nigris, abdomine rufescente. Martin-pêcheur à coiffe noire. *Buff. hist. nat. des ois.* 7. p. 189.

Martin-pêcheur de la Chine. *Buff. planch. enlum.* n. 673.

Black-capped Kingsfisher. *Lath. syn.* I. 2. p. 624. n. 15.

β. Alcedo luzonica.

Martin-pêcheur de l'île de Luçon. *Sonner. it. p.* 65. t. 31.

Alcedo australis, supra nigra, subtus alba, abdomine ferrugineo.

Habitat in Sina, β. in insula Luzonia, 10 pollices longa.

Rostrum pedesque rubri.

tuta. 28. A. macroura, supra olivacea, subtus alba, superciliis albis, torque ex virecente nigro.

Respected Kingsfisher. *Lath. syn.* I. 2. p. 624. n. 14.

Habitat in insula Tahiti, incolis sacra, 8 $\frac{1}{2}$ pollices longa.

Rostrum nigrum, mandibula inferiore alba; pedes nigri.

venerata. 29. A. fusca, subtus pallida, cauda rotundata, remigum, rectricum, rectricumque margine viridi.

Venerated Kingsfisher. *Lath. syn.* I. 2. p. 623. n. 13.

Habitat in insula amica, Apye, incolis sacra, 9 pollices longa.

Rostrum nigrum, mandibulæ inferioris basi alba; remigum rectricumque scapi badii; pedes obscuri.

sacra. 30. A. ex dilute cæruleo viridis, subtus alba, superciliis pallide ferrugineis, remigibus caudaque nigricantibus.

Sacred Kingsfisher. *Lath. syn.* I. 2. p. 621. n. 12.

β. Alcedo superciliis albis.

γ. Alcedo vertice ex virecente nigro, subtus & nucha pallide ferruginea. *Lath. syn.* I. 2. t. 27.

δ. Alcedo capite nigro, vertice cæruleo, superciliis, cervice & abdomine lutescentibus, alis caudaque cæruleis.

ε. Alcedo torque albo.

Martin-pêcheur à collier blanc des Philippines. *Sonner. it. p.* 67. t. 33. *Buff. hist. nat. des ois.* 7. p. 192.

AVES PICÆ. Alcedo.

Habitat in insulis Societatis, ♂. in nova Seelandia, & in insulis Philippinis, incolis sacra, ispida major, 9 $\frac{1}{2}$ pollices longa.

Rostrum plumbeum, in ♂. nigrum, mandibula inferiore subtus alba, in ♀. basi flavicante; infra oculos striga angusta ex aurantio ferruginea, infraque hanc in nucha altera cærulea, in β. & γ. nigra; colli laterumque pectoris pennæ albæ in β. cinereo, in γ. obscuro marginatæ; mentum in γ. album; in δ. gula collumque albæ; cristum in δ. nigrum; remigum caudæque margo exterior cæruleus; uropygium in γ. pallide cyaneum; pedes nigri, in γ. obscuri, in δ. fuscæ, in ♀. nigricantes.

chloroce- 31. *A. viridis, collo albo, torque nigro, alis caudaque thalassinis.*

Martin-pêcheur à tête verte. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 190.

Martin-pêcheur à tête verte du Cap de bonne espérance.

Buff. pl. enlum. n. 783.

Green-headed Kingfisher. Lath. syn. I. 2. p. 620. n. 11.

Habitat in insula Molucca Bouro, 9 pollices longa.

Rostrum, cauda subtus, pedesque nigricant.

cærulea. 32. *A. cærulea, subtus rufa, superciliis & torque albis.*

Ispida indica torquata. Briss. av. 4. p. 481. n. 5. t. 37. f. 2. A.

White collared Kingfisher. Lath. syn. I. 2. p. 620. n. 10.

Habitat in India, ispida major, 7 fere pollices longa.

Rostrum griseum, apicem versus nigricans; sub oculo macula rufa; gula pallide rufescens; uropygium caudæque tectrices superiores egregie virent; pedes grisei; ungues nigricantes.

fusca. 33. *A. cristata olivacea subtus exalbida obscure striata, temporibus & occipite fordide albis, cauda rotundata ferrugineo & chalybeo lineata apice alba.*

Le plus grand Martin-pêcheur. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 181.

Grand martin-pêcheur de la nouvelle Guinée. Buff. pl. enl. n. 663. Sonner. it. p. 171. t. 106.

Great brown Kingfisher. Lath. syn. I. 2. p. 609. n. 1.

Habitat in nova Guinea, hujus generis maxima, 18 pollices longa.

Rostrum mandibula superior nigra, inferior alba, basi nigra; crista femina nulla, maris constans pennis angustis fuscis dilutius striatis; femina vertex, utriusque sexus genæ collique latera ex atro fusca; femina torques albus, &

dorsum integrum olivaceum ; mari hujus pars inferior cum uropygio pallide thalassina ; ejusdem coloris macula in rectricum alarum media ; remiges in femina ex virente fusca , in mare margine exteriori cœruleæ , intus & apice nigra , basi in nonnullis alba ; pedes flavi , femina ex atro fusci ; unguis nigri.

capensis. 9. A. macroura cinereo-cœrulea , subtus fulva , pectore testaceo , rostro rubro.

Ispida Capitis bonæ spei. *Briss. av.* 4. p. 488. n. 8. t. 36. f. 3.

Martin-pêcheur du Cap de bonne espérance. *Buff. pl. enl.* n. 590.

Martin-pêcheur à gros bec. *Buff. hist. nat. des ois.* 7. p. 184.

Habitat ad Caput bonæ spei , 14 pollices longa.

Rostrium apice nigricans ; caput cinereum in fulvum vergens ; corpus supra ex cœruleo viride , dorso parte superiore in cinereum vergente ; pedes & unguis rubri.

maxima. 34. A. subcristata ex plumbeo nigra albo-punctata , gula alba , jugulo nigro , pectore & abdomine sanguineis.

Pall. spicil. 6. p. 15.

Oiseau. *Bosman it. guin.* p. 273. f. n. 13.

Great african Kingsfisher. *Lath. syn.* 1. 2. p. 611. n. 3.

β. Alcedo ex nigricante grisea albo-maculata , subtus rufa , postice alba.

Martin-pêcheur huppé. *Buff. hist. nat. des ois.* 7. p. 188. *pl. enlum.* n. 679.

Habitat in Africa , cornicis magnitudine.

Rostrium atrum , naribus linearibus ; verticis nuchæque plumæ in cristam elongatæ ; latera colli litura potissimum alba notata ; femina pars colli & jugulum ex testaceo ferruginea ; pectus & abdomen alba , lineolis transversis nigris , lacerti alarum albi guttis raris nigris notati ; remiges nigra apice punctisque in seriem dispositis albis ; rectrices nigra apice albo , geminaque guttarum albarum serie ; pedes nigerrimi.

senegalensis. 10. A. macroura cyanea subtus alba , capite cano , rectricibus alarum nigris.

Ispida senegalensis major. *Briss. av.* 4. p. 494. n. 11. t. 40. f. 1.

Alcedo semicærulea. *Forsk. Fn. arab.* p. 2. n. 5.

Martin-pêcheur à tête grise. *Buff. hist. nat. des ois.* 7. p. 194.

Martin-pêcheur à tête grise du Sénégal. *Buff. pl. enl.* n. 594.

β. Alcedo ex cœruleo viridis , subtus ex fulvescente flava.

Martin-pêcheur Crabier. *Buff. hist. nat. des ois.* 7. p. 183.
pl. enlum. n. 334.

Crab-eating Kingfisher. *Lath. syn.* I. 2. p. 618. n. 9.

γ. Alcedo capite colloque obscure albis.

δ. Alcedo supra cærulea, subtus ex rufo flava, gula alba.

Martin-pêcheur bleu & noir du Sénégal. *Buff. hist. nat. des ois.* 7. p. 194.

Martin-pêcheur du Sénégal. *Buff. pl. enl. n.* 356. f. 1.

Habitat in Africa & Arabia, potissimum ad fluvium Senegal,

γ. in S. Jago & Abyssinia, 9, β. 12, δ. 7. pollices longa.

Rostri mandibula superior rubra, inferior nigra, in β. utraque ferruginea, in γ. rubra, in δ. rufa; caput collumque cana, genarum macula nigra, in δ. cærulea; in β. pone utrumque oculum stria & in alarum tectricibus area nigra; remiges nigra, basi intus alba, margine exteriore ex cæruleo virides; in γ. alæ nigra fasciata transversa media cærulea, intus ferruginea albida & obscura; pectus & abdomen in γ. ferruginea; tectrices nigra, margine exteriore ex cæruleo virides, in β. tota ex cæruleo virides, in δ. cærulea, in γ. supra cærulea, subtus obscura; pedes nigri, in β. ferruginei, in γ. & δ. rubri.

leucocephala. 35. A. ex cæruleo viridis, capite, collo & subtus alba, remigibus fuscis.

Martin-pêcheur à tête & cou couleur de paille. *Buffon hist. nat. des ois.* 7. p. 190.

Martin-pêcheur de Java. *Buffon pl. enlum. n.* 757.

White-headed Kingfisher. *Lath. syn.* I. 2. p. 617. n. 8.

Habitat in Java, 12 pollices longa.

Candor in stramineum colorem vergens; vertex striis nigris; dorsum ex cæruleo viride; cauda & alæ ex viridi profunde cærulea; remigum margo cæruleus.

flavicans. 36. A. subtus flavicans, capite dorsoque viridibus, rostro rubro, cauda cærulea.

Habitat in insula Celebes, Tén-rou-joulan incolis dida.

smyrnensis. II. A. macroura ferruginea, alis, cauda, dorsoque viridibus. *Scop. ann.* I. p. 55. n. 65.

Isipda smyrnensis. *Briss. av.* 4. p. 499. n. 13.

Smyrna Kingfisher. *Albin. av.* 3. t. 37. *Lath. syn.* I. 2. p. 615. n. 7.

β. Isipda madagascariensis cærulea. *Briss. av.* 4. p. 496. n. 12. t. 38. f. 2.

Martin-pêcheur bleu & roux. *Buffon hist. nat. des ois.* 7. p. 182.

Grand-Martin-pêcheur de Madagascar. *Buff. pl. enl. n. 232.*

Great Gambia Kingfisher. *Edw. av. 1. t. 8.*

7. *Ispida major bengalensis. Briss. av. 4. p. 501. n. 14.*

Martin-pêcheur de la côte de Malabar. *Buff. pl. enl. n. 894.*

Great Bengal Kingfisher. *Albin. av. 3. t. 28.*

Habitat circa Smyrnam, β. ad Gambiam & in Madagascar, γ. in Bengala, 8½ β. 10, γ. 10½ pollices longa.

Rostrum rubrum; irides albidæ, in γ. flavæ; gula alba, in β. ochroleuca; fascia pectoralis, in γ. jugulum quoque, pectus & abdominis anterior pars alba; testrices alarum corpori proximæ in β. violaceæ, exteriores, remiges 10 primariæ media parte extus; reliquæ barba tota exteriore, & cauda supra thalassina, hæc subtus nigra; in γ. testrices alarum partim cæruleæ, partim ferrugineæ; remiges primariæ intus & subtus nigricantes; pedes rubri, in γ. cum unguibus aurantii; alias ungues nigricantes, in β. fusci.

novæ 37. *A. nigra, albo-maculata.*

Guineæ. Martin-pêcheur de la nouvelle Guinée. *Sonner. it. p. 171. t. 107.*

New Guinea Kingfisher. *Lath. syn. 1. 2. p. 614. n. 6.*

Habitat in nova Guinea.

Rostrum, irides, pedesque nigricant; maculæ irregulares, in capite, dorso, alis, & cauda rotundæ; in collo & abdomine oblongæ; ad utrumque colli latus binæ amplæ.

ægyptia. 38. *A. fusca maculis ferrugineis, subtus albida maculis cinereis. Hasselq. it. p. 245. n. 23.*

Egyptian Kingfisher. *Latham syn. 1. 2. p. 613. n. 5.*

Habitat in Ægypto, in sycomoro & phœnice nidificans, ranis, piscibus, insectis victitans.

Rostrum nigricans; gula ferrugineæ alba; testrices caudæ superiores totæ albæ; cauda æqualis cinerascens; pedes virescentes; ungues nigricantes.

femicæru-41. *A. brachyura, dorso postico, cauda medioque alarum lea. cæruleis, humeris nigris, capite pectoreque cinereo,*

ventre ferrugineo. Forsk. Fn. arab. p. 2.

Habitat circa Yemen Arabiæ, picæ minoris magnitudine, spithamam circiter longa.

Rostrum pedesque miniati.

rudis. 12. *A. macroura nigra albido varia, subtus alba.*

Ispida ex albo & atro varia. Briss. av. 4. p. 520. n. 24. t. 39. f. 2.

AVES PICÆ. Alcedo.

Martin-pêcheur pie. *Buffon hist. nat. des ois. 7. p. 185.*

Martin-pêcheur huppé du Cap de bonne espérance. *Buff. pl. enlum. n. 716.*

Black and white Kingfisher. *Edw. av. 1. t. 9. Latham syn. 1. 2. p. 612. n. 4.*

Habitat in Asia & Africa, 11 pollices longa.

Rostrium & pedes cum unguibus nigri; supercilia alba; penna capitis & cervicis nigra albo-marginata; remiges majores apice nigra; cauda alba, fascia versus apicem nigra; rectrices 2 extimæ maculis 2 semicircularibus nigris.

Dea. 13. A. rectricibus duabus longissimis medio attenuatis, corpore nigro-cærulescente, alis virefcentibus.

Ispida ternatana. *Briss. av. 4. p. 525. n. 26. t. 40. f. 2.*

Avis paradisiaca ternatana. *Seb. mus. 1. p. 74. t. 46. f. 3.*

Martin-pêcheur des Moluques. *Salern. orn. p. 126. n. 10.*

Martin-pêcheur de Ternate. *Buff. pl. enlum. n. 116.*

Martin-pêcheur à longs brins. *Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 196.*

Ternate Kingfisher. *Lath. syn. 1. 2. p. 634. n. 24.*

Habitat in insula Ternate, sturni magnitudine, ultra 13 pollices longa.

Rostrium aurantium; caput, cervix & alæ splendide cærulea; dorsum & humeri fusca, margine cæruleo; uropygium corpulque subtus album in roseum vergens; rectrices intermedia cærulea, basi & apice rosea, reliqua ex roseo alba, exteriori margine fusco; pedes & ungues rubicundi.

paradisea. 14. A. rectricibus intermediis duabus longissimis, corpore viridi-aureo, pedibus scanforiis.

Galbula longicauda. *Briss. av. 4. p. 89. n. 2. t. 5. f. 2.*

Jacamar à longue queue. *Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 22. pl. enlum. n. 271.*

Swallow-tailed Kingfisher. *Edw. av. 1. t. 10.*

Paradise Jacamar. *Lath. syn. 1. 2. p. 605. n. 3.*

Habitat in Surinamo, insectis victitans, per paria volans, alauda magnitudine, 11½ pollices longa.

Rostrium quadrangulare, acuminatum, cum pedibus ad digitos usque plumosis nigrum; caput ex violaceo fuscum; gula, jugulum, rectricisque alarum inferiores alba; rectrices 2 intermedia 6, reliqua unum pollicem longa.

grandis. 39. A cupreo-aurea, subtus ferruginea, capite artubusque viridi aureis, pedibus scanforiis. *Pall. spicil. 6. p. 10.*

Great Jacamar. *Lath. syn.* I. 2. p. 605. n. 2.

Magnitudo *pici viridis* ; rostrum *tetraëdrum*, *planilaterum*, *naribus nudis* ; *digiti anteriores fissi* ; *cauda cuneiformis*, *corpore longior*.

Galbula. 15. *A. cauda cuneiformi*, *corpore viridi-aureo*, *subtus rufo*, *pedibus scanforiis*.

Galbula. Briss. av. 4. p. 86. n. 1. t. 5. f. 1.

Jacamaciri. Marcgr. bras. 202. *Raj. av.* p. 44. n. 3. *Will. orn.* p. 139. t. 22. *Edw. glean.* t. 334.

Jacamar. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 220. t. 10. *pl. enlum.* n. 238.

Cupreous Jacamar. Gener. of birds, p. 60. t. 3.

Green Jacamar. Lath. syn. I. 2. p. 603. n. 1.

β. *Galbula cauda longiore. Lath. syn.* I. 2. t. 26.

Habitat in Gujanæ & Brasiliæ silvis humidis densifloribus frequens, & *solitaria*, *visitans insectis*, *velociter*, *sed breviter volans*, *voce brevi*, *suavi*, *edulis*, *alaudæ fere magnitudine*, & *vix 9 pollices longa*.

Rostrum quadrangulare, 2 *pollicum*, *acuminatum*, *nigrum*, *naribus ad basin ovatis* ; *irides glaucæ* ; *mentum album*, *nonnunquam flavicans* ; *corpus subtus in β. dilute ferrugineum* ; *pedes breves*, *debiles*, *plumosi*, *ex virescente flavi*, *unguibus nigris*.

tridactyla. 40. *A. pedibus tridactylis. Mantiss.* 1771. p. 524. *Pall. spic.* 6. p. 10. t. 2. f. 1. *Vosm. monogr. Amstel.* 1768. t. 1.

Martin-pêcheur de l'île de Luçon. Sonner. it. p. 66. t. 32.

Three-toed Kingsfisher, Lath. syn. I. 2. p. 645. n. 36.

Habitat in Surinamo & India, insulisque oceani indici, ispidæ magnitudine, 4 *circiter pollices longa*.

Rostrum tetraëdrum cum pedibus ochroleucum ; *corpus subtus album* ; *in aliis vertex ferrugineus*, *cinctu violaceo* ; *macula temporum æurea*, *infra hanc alia longitudinalis alba* ; *genæ ochroleucæ* ; *gula nivea*, *remiges ex ferrugineo nigra*, *marginē interiore ferrugineæ*, *apice æureæ* ; *cauda ferruginea* ; *in aliis corpus supra æ rufo ferrugineum*, *vertice tamen*, *uropygio*, & *penarum dorsalium nonnullarum apice violæ in modum tinctis* ; *pectus ferrugineum* ; *in aliis caput & corpus supra colore florum syringæ* ; *alæ ex cæruleo atræ*, *remigum margine cæruleo* ; *pedes rubicundi*.

63. MEROPS. *Rostrum* curvatum, tetraedrum, compressum, carinatum, acutum.
Nares exiguæ ad basin rostri.
Lingua gracilis apice (plerumque) laciniata.
Pedes gressorii.

Apiaster. 1. M. dorso ferrugineo, abdomine caudaque viridi-cæruleo, reſtricibus duabus longioribus, gula lutea.

Muf. Ad Fr. 2. p. 21. *Scop. ann.* 1. p. 54. n. 63.

Merops. *Bell. av.* 16. *Gefn. av.* 599. *Aldr. orn.* 1. p. 871.

t. 872. & 873. *Charl. onom.* 87. t. 87. *Raj. av. p.* 49. n. 3.

Merops galilæus. *Haffelq. it.* 247. n. 24. *Forsk. Fn. arab.* p. 1. n. 3.

Apiaster. *Briff. av.* 4. p. 532. n. 1.

Ispida cauda molli. *Kram. el. p.* 337.

Guêpier. *Buff. hiſt. nat. des oif.* 6. p. 480. t. 23. pl. enlum. n. 938.

Bee-eater. *Alb. av.* 2. t. 44. *Will. orn.* p. 147. t. 24.

Common Bee-eater. *Latham ſyn.* 1. 2. p. 667. n. 1.

β. Schaeghaghi. *Forsk. Fn. arab.* p. 1.

Habitat in Europa & Aſia, cicadis, culicibus, muſcis, apibus præſertim, inſectorum defeſu ſeminibus viſitans, gregaria, nidum ſtruit in cavernis ſubterraneis ad aquas ex muſcis, & 5-7 ova alba parit, 10 pollices longa.

Roſtrum nigrum; irides rubræ; frons ex cæruleo virens; vertex, occiput & cervix badia; a roſtro ad occiput ſtria nigra; cauda cuneiformis, thalaffina, reſtricum margine intus cinereo; pedes ſpadicei, unguibus ex rubicundo nigris.

viridis. 2. M. virens, fascia pectorali nigra, gula caudaque cæruleis, reſtricibus duabus elongatis.

Merops viridis ſupra ferruginea. *Amæn. acad.* 4. p. 237.

Ispida viridis ſupra ferruginea. *Osb. it. p.* 96.

Apiaster madagſcariensis torquatus. *Briff. av.* 4. p. 549. n. 8. t. 42. f. 2.

Guêpier à collier de Madagaſcar. *Buff. pl. enlum. n.* 740.

Guêpier vert à gorge bleue. *Buff. hiſt. nat. des oif.* 6. p. 497.

Indian Bee-eater. *Gen. of birds p.* 60. t. 7. *Edw. av.* 4. t. 183. *Lath. ſyn.* 1. 2. p. 670. n. 2

β. Apiaster bengalensis torquatus. *Briff. av.* 4. p. 552. n. 9. Bengal Bee-eater, *Albin, av.* 3. t. 30.

- γ. Merops ægyptius. Forsk. *Fn. arab.* p. 1. n. 2.
 δ. Apiaſter philippenſis minor. *Briff. av.* 4. p. 555. n. 10.
 t. 43. f. 2.
Habitat in Bengala & Java, γ. in Ægypto, δ. in inſulis Philippinis, paſſeris magnitudine, fere 10 pollices longus. β. ultra 11 pollices, δ. 7½.
Roſtrum nigrum; gula in γ. flava, caudaque æqualis; fascia pectoralis in δ. cærulea, & cauda pariter æqualis; pedes fuſci, in γ. incarnati.
- conge- 3. M. flavescens, uropygio virescente, remigibus apice rubris,
 ner. rectricibus basi luteis.
Merops alter. Geſn. av. 601. t. 602. *Aldr. orn.* 1. p. 875. t. 876. *Raj. av.* p. 49. n. 4.
Apiaster iſterocephalus. Briff. av. 4. p. 537. n. 2.
Guêpier à tête jaune. Buff. hiſt. nat. des ois. 6. p. 510.
Other Bee-eater of Aldrovandus. Will. orn. p. 148.
Yellow-headed Bee-eater. Lath. ſyn. 1. 2. p. 672. n. 3.
Habitat in Europa australi, apiastro paulo minor.
Tænia ocularis nigra; dorsum & humeri badia; tectrices alarum minores cæruleſcentes, majores flava; remiges nigra; pedes flavi.
- superci- 4. M. viridis, linea frontis supra infraque oculos alba, gula
 liosus. flavicante, rectricibus duabus elongatis.
Apiaster madagascariensis. Briff. av. 4. p. 546. n. 7. t. 42. f. 1.
Guêpier de Madagascar. Buff. pl. enlum. n. 259.
Patirich. Buff. hiſt. nat. des ois. 6. p. 495.
Supercilious Bee-eater. Lath. ſyn. 1. 2. p. 673. n. 4.
 β. Merops persica. *Pall. it.* 2. p. 708. n. 16. t. D.
Habitat in Madagascar, β. migratorius ad mare caspium, ultra 11 pollices longus, β. apiastri magnitudine.
Roſtrum & oculorum area nigra; vertex ex virescente badius; pedes fuſci; ungues nigri; in β. frons cyanea, lora nigra; area sub collo magna ex sanguineo rufa.
- philippi- 5. M. viridis, subtus flavescens, uropygio cæruleo, cauda
 nus. æquali.
Apiaster philippenſis major. Briff. av. 4. p. 560. n. 12. t. 43. f. 1.
Grand guêpier des philippines. Buff. pl. enlum. n. 97.
Guêpier vert à queue d'azur. Buff. hiſt. nat. des ois. 6. p. 404.
Philippine Bee-eater. Lath. ſyn. 1. 2. p. 674. n. 5.
Habitat in inſulis Philippinis, apiastro minor, ultra 8½ pollices longus.
Roſtrum nigrum; linea ocularis nigra; pedes & ungues fuſci.

cinereus. 6. *M. rubro flavoque variegatus, subtus flavo-rubescens*,
rectricibus duabus longissimis rubris.

Apiaster mexicanus. Briss. av. 4. p. 541.

Avicula de Quauhcului. Seb. Mus. 1. p. 50. t. 31. f. 10.

Guépier à tête grise. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 491.

Cinereous Bee-eater. Latham syn. 1. 2. p. 675. n. 6.

*Habitat in nova Hispania, alaudæ magnitudine, 9½
pollices longus.*

Rostrum viride; caput, remiges & rectrices exteriores cinereæ.

easer. 7. *M. griseus, crisso flavo, cauda longissima.*

Merops fuscus, ani regione flava. Koelreuter n. comm.

ac. Petrop. II. p. 429. t. 14. f. 1.

Guépier gris d'Ethiopie. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 492.

Habitat in Æthiopia.

*Inter pulchre delineatas icones animalium ultra 150, quas
misit amicissimus I. Burmannus, visa est hæc avis. An
idem cum promerope?*

flavicans. 8. *M. albidus, capite albo & fulvo vario, pectore rubicundo,*
dorso flavo, uropygio, alis, caudaque rufis, rectricibus
2 intermediis longissimis.

Apiaster flavicans. Briss. av. 4. p. 539. n. 3.

Manucodiata secunda Aldrovandi. Raj. av. p. 21. n. 2.

*Guépier à tête jaune & blanche. Buff. hist. nat. des ois. 6.
p. 490.*

Aldrovandus's second bird of Paradise. Will. orn. p. 91. t. 11.

Yellow Bee-eater. Lath. syn. 1. 2. p. 676. n. 7.

*Apiastro major, 20 pollices longus; rostrum breve, ex
flavicante virens; lingua longa, acuta; oculi flavi;
palpebræ rubræ; rectrices 2 intermediæ 8 pollicibus
reliquis longiores.*

brasiliensis. 9. *M. rutilus, supra ex fusco & nigro varius, cauda*
remigibusque pallide cæruleis.

Apiaster brasiliensis. Briss. av. 4. p. 540. n. 4.

Pica brasiliensis. Seb. Mus. 1. t. 66. f. 1.

Merops rouge & bleu. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 479.

Brasilian Bee-eater. Latham syn. 1. 2. p. 676. n. 8.

Habitat in Brasilia, apiastri magnitudine, 9 pollices longus.

*Rostrum, alæ subtus & pedes cum unguibus flavi; rectrices
alarum minores obscure rubræ.*

badius. 10. *M. ex cæruleo viridis, capite, cervice, humerisque*
badiis, rectricibus supra cæruleis, subtus ex griseo fulcis,
intermediis duabus longioribus acuminatis.

Apiaster ex Franciæ insula. *Briss. av.* 4. p. 543. n. 6. t.

44. f. 2.

Guépier de l'île de France. *Buff. pl. enlum.* n. 252.

Guépier marron & bleu. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 493.

Cheltnut Bee-eater. *Lath. syn.* 1. 2. p. 677. n. 9.

β. *Merops* alis caudaque badiis.

Guépier marron & bleu du Sénégal. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 494.

Guépier à longue queue du Sénégal. *Buff. pl. enlum.* n. 314.

Habitat in Franciæ Insula, β. *ad fluvium* Senegal, 10-12 pollices longus.

Fascia infraocularis fusca; *testrices alarum superiores virides, subtus fulvæ*, in β. *badiæ*; *remiges subtus griseæ*, 4 *intimæ totæ virides*, 13 *mediarum apice nigræ*; *testrices margine interiori griseæ*; 2 *intermediæ 2 pollicibus & ultra longiores*, in β. *nigræ*; *rostrum nigrum*; *pedes rubicundi*; *ungues nigricantes*.

chrysoce- 11. *M. viridi-aureus*, *subtus ex cæruleo viridis*, *capite & phalus.* *cervice fulvis*, *gula flava*, *testricibus duabus intermediis longioribus*.

Grand guépier verd & bleu à gorge jaune. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 502.

Yellow-throated Bee-eater. *Lath. syn.* 1. 2. p. 678. n. 10.

Longitudo 10 pollicum; *frons & supercilia ex cæruleo viridia*; *testrices caudæ superiores virides*.

angolen- 12. *M. viridis aureo-nitens*, *fascia oculari cinerea nigro lis.* *maculata*, *alis caudaque cuneiformi subtus cinereis*, *gula flava*, *jugulo badio*.

Apiaster angolenis. *Briss. av.* 4. p. 558. n. 11. t. 44. f. 1. A.

Petit guépier vert & bleu à queue étagée. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 503.

Angola Bee-eater. *Lath. syn.* 1. 2. p. 679. n. 11.

Habitat in Angolâ, 5½ pollices longus.

Rostrum & unguis nigri; *pedes cinerei*; *color subtus in cæruleum vergens*.

erythro- 13. *M. viridis*, *subtus flavicans*, *capite & cervice rubris,* *cephalus.* *gula flava*, *alis caudaque æquali subtus cinereis*.

Apiaster indicus erythrocephalus. *Briss. av.* 4. p. 563. n. 13. t. 44. f. 3. A.

Guépier à tête rouge. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 508.

Red-headed Bee-eater. *Lath. syn.* 1. 2. p. 679. n. 12.

Habitat in India, 6 pollices longus.

Rostrum nigrum; irides rubræ; fascia ocularis nigra;
rectrices 2 intermediæ remigefque margine cinereæ;
pedes cinerei; ungues nigricantes.

nubicus. 14. M. ex cæruleo viridis subtus ruber, dorso, alis caudaque
furcata lateritiis.

Guêpier rouge à tête bleue. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 506.*

Guêpier de Nubie. *Buff. pl. enlum. n. 649.*

Blue headed Bee-eater. *Lath. syn. I. 2. p. 680. n. 13.*

Habitat in Nubia, apiastro vix minor, 10 pollices longus.

Rostrum nigrum; remiges majores apice ex cærulefcente cinerea, secundaria ex atro fusca; pedes dilute cinerei.

erythro- 15. M. olivaceus subtus exalbidus, gula flava, alis caudaque
pterus. rubris apice nigris.

Guêpier rouge & vert du Sénégal. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 507.*

Petit guêpier du Sénégal. *Buff. pl. enlum. n. 318.*

Redwinged Bee-eater. *Lath. syn. I. 2. p. 681. n. 14. t. 31.*

Habitat ad fluvium Senegal, 6 pollices longus.

Rostrum pedesque nigri.

cayen- 16. M. viridis, alis caudaque apice nigra rufis.

nensis. Guêpier vert à ailes & queue rouffes. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 509.*

Guêpier à queue & ailes rouffes de Cayenne. *Buff. pl. enl. n. 454.*

Cayenne Bee-eater. *Lath. syn. I. 2. p. 681. n. 15.*

Habitat in Cayenna.

• Rostrum nigrum; remiges basi albæ, & prouti rectrices,
ad latera nigra; pedes ex flavescente solito longiores.

furina- 17. M. varius, occipite rubente, cervice ex virente flavo,
menfis. remigibus virentibus, nigro & cæruleo variis.

Guêpier. *Fermin surin. 2. p. 184.*

Surinam Bee-eater. *Lath. syn. I. 2. p. 682. n. 16.*

Habitat in Surinamo.

Irises spadiceæ; ungues nigri.

novæ 18. M. ex virefcente splendide niger, tectricibus alarum
Seelan- majoribus & fasciculo pennarum crispæ ad utrumque
diæ. colli latus albis, tectricibus caudæ æqualis cæruleis.

New Zealand Creeper. *Brown. zool. illustr. p. 18. t. 9.*

Cook it. I. p. 48.

Poë Bee-eater. *Lath. syn. I. 2. p. 682. n. 17.*

Habi-

Habitat in nova Seelandia, 11 pollices longus, incolis sacer, egregie cantans, carne delicata.

Pedes & ungues nigri; os intertus cum lingua flavum; hæc apice nigra, setis horrida; pennæ colli laxæ, longæ, aliquantum crispatæ, stria per mediam scâpi longitudinem alba.

niger: 19. *M. niger*, fasciculo plumarum magno pone alas, crissoque flavis, cauda cuneiformi, rectricibus duabus extimis extus & apice albis.

Yellow-tufted Bee-eater. *Lath. syn. I. 2. p. 683. n. 18.*

Habitat in insula O-why-hi & vicinis, alaudæ magnitudine, 14 pollices longus, frequens; flavæ pennæ ornamenti loco inserviunt incolis.

Nares membrana teatæ; lingua apice filamentosa; pennæ capitis gulæque breves, rectricesque acuminatæ; duæ intermediæ 7, extimæ 2 pollices longæ.

rufus: 20. *M. rufus*, remigibus fuscis exteriore margine rufis.

Fournier. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 476.*

Fournier des Buenos Ayres. *Buff. pl. enlum. n. 739.*

Rufous Bee-eater. *Lath. syn. I. 2. p. 683. n. 19.*

Habitat in Bonariis, 8½ pollices longus.

Corpus subtus in flavum vergens; cauda 3 pollicum; digiti pedum ab ortu inde separati, uti promeropis; unguis digiti posterioris reliquis major.

moluccensis: 21. *M. griseus*, orbitis nudis, genis nigris, cauda subæquali.

Polochion. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 477.*

Molucca Bee-eater. *Lath. syn. I. 2. p. 684. n. 20.*

Habitat in insula Bourò, ex Moluccis una, cuculi canori circiter magnitudine, 14 pollices longus.

Rostrium nigricans, 2 pollicum, naribus in ejus medio perviis, postice membrana teatis; lingua rostri longitudine; penicillo pilorum terminata; occipiti candor admixtus; gulæ pennæ nonnullæ apice argenteæ; rectrices 5½ pollices longæ, extimis paulo brevioribus; pedes obscuri; digitus exterior basi cum medio connexus; posterioris unguis reliquis multo major.

Merops in America rariores, in sedis, nonnulli apibus vespiisque potissimum videntur; alcedines imitantur struendo nidum, voce plerique ingrata. Upupa a promeropo vix differt, nisi crista.

64. UPUPA. *Rostrum* arcuatum, longum, gracile, convexum, subcompressum, obtusiusculum.

Nares exiles ad basin rostri.

Lingua obtusa, integerrima, triquetra, brevissima.

Pedes ambulatorii.

Epops. 1. U. cristata variegata. *Fn. suec.* 105. *Scop. unn.* 1. p. 53. n. 62.

Upupa. *Bell. av.* 72. a. *Gesn. av.* 776. *Aldrov. orn.* 2. p. 702. *Jonst. av.* t. 42. *Raj. av.* p. 48. A. 6. *Kram. el.* p. 337. *Charl. onom.* 63. t. 63. *Briss. av.* 2. p. 455. n. 1. t. 43. f. 1. *Nozem. nederl. Vog.* t. 66.

Huppe ou Puput. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 439. pl. enlum. n. 52.

Bubbola. *Olin. ucc.* p. 36.

Ter-choous or Messenger-bird. *Pocock it.* 1. p. 209.

Heop or Hoopoe. *Brit. zool.* 1. n. 90. *Arch. zool.* 2. p. 283. A. *Will. ornith.* p. 145. *Albin. av.* 2. t. 42. 43. *Edw. glean.* t. 345.

Wiedhopf. *Frisch av.* t. 43. *Günth. Nest. u. Eyer,* t. 27. *Habitat* in Europa, Asia & Africa, solitaria, migratoria, visitans insectis, putoris amans, in cavis arborum, vel murorum, ipsa tellure, bis vel ter per annum ovipariens 2-7 cinerea, perdricis ovis paulo minora, sed longiora; non nisi terrefacta cristam erigit, 12 pollices longa.

Crista pallide aurantia, apice nigra; dorsum & alæ lineis nigris albisque; collum ex rubente fuscum; pectus & abdomen alba; rectrices 10 nigrae, lunula in medio alba; pedes nigri.

capensis. 4. U. cristata fusca, subtus alba, alarum macula alba.

Huppe noire & blanche du Cap de bonne espérance. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 463.

Huppe du Cap de bonne espérance. *Buff. pl. enlum.* n. 697.

Madagascar Hoopoe. *Lath. syn.* 1. 2. p. 690. n. 2.

Habitat in insularum Madagascar & Bourbon, nec non Capitis bonæ spei densis silvis, 16 pollices longa.

Rostrum flavicans; lingua apice filamentosa; palatum tuberculis plenum; cristam minor, quam epopi, acuminata, alba; rectrices 12, 2 intermediæ reliquis paululum brevior.

res; pedes & ungues flavicantes; posterioris digiti unguis magnus, valde uncinatus.

Promerops.

2. U. rectricibus sex, intermediis longissimis. *Mill. illustr. t. VI. A.*

Promerops superne fuscus, inferne albus, pectore rufescente. *Briss. av. 2. p. 461. n. 1. t. 43. f. 2.*

- Promerops gris à ventre tacheté. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 469.*

Promerops du Cap de bonne espérance. *Buff. pl. enl. n. 637.*
Cape promerops. *Lath. syn. 1. 2. p. 692. n. 5.*

Habitat frequens ad Caput bonæ spei, alaudæ circiter magnitudine, 17 pollices longa.

Rostrum, pedes & ungues nigra; uropygium & rectrices caudæ superiores olivaceæ, inferiores flavæ; gula alba; jugulum & pectus rufescentia; abdomen albidum, in mare una cum pectore maculatum; rectrices 12, intermedia, 6 $12\frac{1}{2}$ pollices, extrema 2 tantum longa.

mexicana.

5. U. grisea, thalassino & purpurascens admixto, subtus flava, remigibus majoribus cæruleis, rectricibus quatuor intermediis longioribus.

Promerops mexicanus. *Briss. av. 2. p. 463. n. 2.*

Avis Ani mexicana cauda longissima. *Seb. mus. 1. p. 73. t. 45. f. 3.*

Promerops à ailes bleues. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 467.*

Mexican Promerops. *Latham syn. 1. 2. p. 691. n. 4.*

Habitat in novæ Hispaniæ montibus altioribus, muscis, apibus, aliis insectis larvisque victitans, 18 $\frac{1}{2}$ pollices longa.

Rostrum nigricans, ad latera flavicans; supra oculos macula flava; cauda $12\frac{1}{2}$ pollices longa ex nigricante grisea, viridi & purpureo tinctu intermixto.

- paradisea. 3. U. castanea cristata, rectricibus duabus longissimis.

Promerops indicus cristatus. *Briss. av. 2. p. 464. n. 3.*

Avis paradisiaca cristata orientalis rarissima. *Seb. mus. 1. p. 48. t. 30. f. 5.*

Promerops: *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 465.*

Crested Promerops. *Lath. syn. 1. 2. p. 691. n. 3.*

Habitat in India, rarior, sturni magnitudine, 19 pollices longa.

Rostrum, pedes & ungues plumbei; caput & collum egregie nigra; verticis pennæ 2 pollicum in cristam elongata; dorsum, uropygium, humeri, alæ & cauda pallide badia;

pectus, abdomen & rectrices caudæ inferiores pallide cinerea; rectrices 2 intermedia 14, reliquæ 3 pollices longa.

fusca.

6. U. fusca, subtus grisea albo nigroque striata, vertice chalybeo, gula juguloque nigris, rectricibus duabus intermediis longissimis.

Promerops brun de la nouvelle Guinée. *Sonner. it. p. 164. t. 100.*

Promerops brun à ventre rayé. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 471. t. 22.*

Promerops de la nouvelle Guinée. *Buff. pl. enlum. n. 638.*
New Guinea brown Promerops. *Lath. syn. I. 2. p. 694. n. 6.*

Habitat in nova Guinea, 22 pollices longa.

Rostrum, irides & pedes nigra; feminae caput collumque fusca, occipiti, dorso, alisque viror admixtus; rectrices 12, intermediae duæ 13, extimæ brevissimæ 4 pollices longa.

magna.

7. U. nigra, capite, cervice & pectore, pennarumque humeralium, subalarium & ad caudæ latus positarum falcatarum parte exteriori viridi-aureis, cauda longissima.

Grand Promerops de la nouvelle Guinée. *Sonn. it. p. 166. t. 101. Buff. planch. enlum. n. 639.*

Grand Promerops à paremens frisés. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 472.*

Grand Promerops. *Lath. syn. I. 2. p. 695. n. 7. t. 32.*

Habitat in nova Guinea, 4 fere pedes longa.

Rostrum 3 pollicum, & pedes nigri; nigredini supra violaceus, ad alas caruleus tinctus adpersus; rectrices 12, binæ intermediae 21 pollices, extimæ 5 modo longa.

aurantia.

8. U. fulva, capite colloque aureis, cauda æquali.

Promerops barbadensis. *Briss. av. 2. p. 466. n. 4.*

Avis paradisiaca americana elegantissima. *Seb. mus. I. p. 102. t. 66. f. 3.*

Promerops orangé. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 474.*

Orange Promerops. *Latham syn. I. 2. p. 697. n. 8.*

- β. Promerops mexicanus luteus. *Briss. av. 2. p. 467. n. 5.*

Cochitoloel. *Fern. hist. n. Hisp. c. 161. Raj. av. p. 168.*

Promerops orangé (fem.). *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 472.*

Habitat in Barbados, β. in novæ Hispaniæ calidioribus, vermibus & seminibus visitans, sturni magnitudine, 9½ pollices longa.

Rostrum aureum, basi plumis rubris cinctum, in β. nigrum; remiges majores ex rubro aurantiæ; in β. alæ, collum & caput ex cinereo nigroque varia; pedes flavi, in β. cinerei, unguibus nigris.

65. **CERTHIA.** *Rostrum arcuatum, tenue, subtrigonum, acutum.*

Lingua acuta.

Pedes ambulatorii.

familia- I. C. grisea, subtus alba, remigibus fuscis : decem macula-
ris. alba. *Fn. suec.* 106. *Scop. ann.* 1. p. 52. n. 59.

Certhia. Gesn. av. 251. *Aldrov. orn.* 1. p. 869. t. 870. *Bell. av.* 98. a. *Raj. av.* p. 47. n. 5. *Briff. av.* 3. p. 603. n. 1. *Nozem. nederl. Vogel,* t. 30. *Günth. Nest. u. Eyer,* t. 11. f. sup.

Ispida cauda rigida. Kram. el. p. 337. n. 2.

Grimpereau. Buff. hist. nat. des ois. 5. p. 481. t. 21. f. 1. *pl. enlum.* n. 681. f. 1.

Creeper. Brit. zool. n. 91. t. 39. *Arch. zool.* 2. p. 285. n. 174. *Will. orn.* p. 144. t. 23. *Albin. av.* 3. t. 25.

Lath. syn. 1. 2. p. 701. n. 1.

β. *Certhia major.*

Grand Grimpereau. Buff. hist. nat. des ois. 5. p. 486.

Grauspecht. Frisch av. t. 39.

Habitat in Europæ & septentrionalis Asiæ atque Americæ arboribus reptans, ex rimis corticis muscisque adhærentibus insecta, eorumque ova & larvas exquirens, quibus viçitat; primo vere nidificat, & 20 ova parit.

Caput collumque fuscum, striis nigris; uropygium mustelinum; rectrices alarum ex fusco & nigro variæ; remiges obscuræ, margine albo, lineis ferrugineis, 4-14 macula alba notatæ; pectus & abdomen argentea; cauda prælonga mustelina; rectrices acuminatæ.

viridis. 26. C. supra virens, subtus pallide luteo viridique varia, remigum fuscarum margine exteriore viridi. *Scop. ann.* 1. p. 52. n. 60.

Certhia genus per omnem tellurem dispersum, in sedis potissimum viçitat; naribus exiguis rectricibus 12, pedibus majoribus, digito posteriore magno, unguibus uncinatis & longis conspicuum; plurimis speciebus lingua acuta, aliis apice æmplanata, aliis ciliata, paucis tubulosa.

AVES PICÆ. Cernithia.

Green Creeper. *Lath. syn.* I. 2. p. 702. n. 2.
Sturna familiaris; *stria cærulea a basi rostri utrinque*
descendens; *gula macula rufa*; *pedes nigri*.

pacifica. 27. *C. nigra*, subtus obscura, humeris, dorso inferiore, uropygio crissoque flavis, tectricibus alarum inferioribus niveis.

Great hook-billed Creeper. *Lath. syn.* I. 2. p. 703. n. 3.

Habitat in insulis amicis maris australis, 8 pollices longa;
rostrum valde curvatum fuscum, basi pallidius; *teſtrices*
caudæ superiores & nonnullæ alarum interiores flavæ;
alæ spuria ochroleuca; *pedes ex atro fusci*.

obscura. 28. *C. olivacea*, remigibus caudaque æquali viridi-marginata obscuris.

Hookbilled green Creeper. *Lath. syn.* I. 2. p. 703. n. 4. t. 33. f. 1.

Habitat in insulis Sandwich, ab incolis ad vestimenta eorum plumosa adhibita, 7 pollices longa.

Rostrum ex fusco atrum, semicirculi ad instar curvatum;
nares membrana testæ; *inter oculos nareſque stria*
fusca; *abdominis color in flavum paulisper vergens*;
pedes obscure fusci, *genubus albis*; *digiti posterioris*
unguis prælongus.

coccinea. 29. *C. coccinea*, alis caudaque nigris. *Forſter Goett. Magaz.*
I. 6. p. 346. Blumenb. Naturg. ed. 2. p. 190.

Hookbilled red Creeper. *Lath. syn.* I. 2. p. 704. n. 5.

Carmosinrother Honifauger. *Merrem Beytr.* I. p. 16. t. 4.

Habitat in insulis Sandwich, ab incolis similiter ad vestimenta plumosa adhibita, longitudine vix 6 pollices adæquans; magnitudine passeris.

Rostrum capite longius, acinacis modo curvatum, albidum;
pedes cum unguibus longis albicantes; *teſtrices breves*;
acuminatæ; *alarum margo & pennarum gularium radix*
alba.

falcata. 30. *C. viridis*, subtus caudaque violacea, remigibus, abdomine & crisso pallide fuscis.

Sickle billed Creeper. *Lath. syn.* I. 2. p. 705. n. 6.

Longitudo 5½ pollicum; *rostrum obscurum, falcatum*;
capitis nitor violaceus; *teſtrices alarum majores pedes*
que pallide fusca; *ungues nigri*.

- Sovi-manga.** 31. *C. viridis* subtus flavescens, uropygio olivaceo, pectore fusco: fasciis duabus transversis altera cærulea, altera badia, cauda nigra.
Certhia madagascariensis violacea. *Briss. av.* 3. p. 638. n. 18. t. 32. f. 2. 3.
Sovi-manga. *Buff. hist. nat. des ois.* 5. p. 494.
Violet Creeper. *Lath. syn.* 1. 2. p. 705. n. 7.
Habitat in Madagascar, reguli magnitudine, 4 pollices longa.
Rostrum, cum pedibus & unguibus nigrum, lingua apice bifida paulo brevius; femina subtus flava, supra olivacea; mari rectrices alarum subtus ochroleuca; dorsum inferius caudæque rectrices superiores olivacea, inferiores cum macula humerorum flava; rectrices margine virides.
- manillensis.** 32. *C. viridis*, cæruleo & violaceo nitens, subtus ex olivaceo grisea, collo ex viridi, cæruleo, violaceo, flavo fasciatim vario remigibus fuscis.
Habitat in Manilla, 4 pollicibus brevior.
Inter humeros duæ maculae flavae; rectrices alarum superiores fusca.
- burbonica.** 33. *C. ex virente fusca*, subtus griseo varia, uropygio flavo, remigibus caudaque nigris.
Sovi-manga de l'île de Bourbon. *Buff. hist. nat. des ois.* 5. p. 516.
Grimpereau de l'île de Bourbon. *Buff. pl. enlum.* n. 681. f. 2.
Yellow-rumped Creeper. *Lath. syn.* 1. 2. p. 736. n. 41.
Habitat in insula Bourbon, 5 pollices circiter longa.
Rostrum & pedes nigri; hypochondria rufa.
- fannio.** 34. *C. olivacea*, vertice subviolaceo, genarum macula alba, remigibus caudaque subfurcata fuscis.
Mocking Creeper. *Lath. syn.* 1. 2. p. 735. n. 39.
Habitat in nova Seelandia, 7½ pollices longa, voce grata varia, imitabunda; capite a purpureo antherali polline florum, quibus immiscet avis, nonnunquam purpureo.
Rostrum obscurum; nares magnæ, membrana testæ; irides fusca; corpus supra magis in viridem, subtus in flavum colorem vergens; remigum secundariorum rectricumque margo olivaceus; pedes obscure glauci, unguibus nigris, posteriore longiore.

aurantia. 35. *C. viridis* subtus flavicans, jugulo aurantio, remigibus caudaque nigris.

Orange breasted Creeper. *Lath. syn.* I. 2. p. 734. n. 38.

Habitat in Africa, 4 pollices longa. Smeathman.

Rostrum nigrum; pedes obscuri.

flavipes. 36. *C. viridis* subtus cærulea, alis caudaque nigris.

Blue-throated Creeper. *Lath. syn.* I. 2. p. 734. n. 37.

Habitat in Cayenna, 4½ pollices longa.

Rostrum & ungues nigri; abdomen pallidius cæruleum; lateribus colli intermixtus color ochroleucus; pedes flavi.

ochrochlo- 37. *C. viridis*, genis, gula & abdomine flavis, pectore & ra. hypochondriis ex flavicante viridibus cærulescente-macularis.

Yellow-cheeked Creeper. *Gen. of birds* p. 60. t. 3. f. 2.

Lath. syn. I. 2. p. 734. n. 36.

Habitat in Surinamo, familiari dimidio minor.

Cardinalis. 38. *C. niger*, capite, collo, pectore & linea per mediam dorfi longitudinem rubris, cauda æquali.

Cardinal Creeper. *Lath. syn.* I. 2. p. 733. n. 35. t. 33. f. 2.

Habitat frequens in cultis insula Tannæ, nectarque e floribus sugere fertur; familiaris magnitudine.

Rostrum nigrum, basi albicans; lingua longa, extensilis, altera media parte cilata; stria nigra a rostro ad oculos; irides spadiceæ; pedes plumbei; ungues nigri.

caruncu- 39. *C. olivacea*, mento gulaque aurantiis, pectore ferrugineo, lata. abdomine cinerascente, caruncula ad basin mandibulæ inferioris flavicante.

Wattled Creeper. *Lath. syn.* I. 2. p. 732. n. 34.

Habitat in insula maris australis Tonga Tabu, 7½ pollices longa.

Lingua rostro longior, in quatuor quasi filamenta partita; caruncula fasciculo plumarum flavarum cincta; irides cinereæ; pedes ex glauco atrij; ungues nigri.

fusca. 40. *C. fusca*, gula & pectore fusco alboque lineatis.

Brown Creeper. *Lath. syn.* I. 2. p. 732. n. 33.

Habitat in terra maris australis, 6 pollices longa.

Rostrum medium macula pallide aurantia; pennæ ad colli latera margine albo; abdomen pallidius; cauda æqualis; pedes nigri; ungues nigri, longi, adunci.

- muraria. 2. *C. cinerea*, macula alarum fulva. *S. G. Gmelin it.* 3. t. 19. f. 2. *Scop. ann.* 1. p. 51. n. 58.
Certhia muralis. Briss. av. 3. p. 607. n. 2. t. 30. f. 1.
Picus murarius. Gessn. av. 712, *Aldr. orn.* 1. p. 851. t. 852.
Raj. av. p. 46, n. 1. *Kram. elench.* p. 336. n. 6.
Grimperea de muraille. *Buffon hist. nat. des ois.* 5. p. 487. t. 22. pl. enlum. n. 372. f. 1. 2.
 Wallcreeper or Spider catcher. *Will. orn.* p. 143. t. 23.
Edw. glean. t. 361. *Lath. syn.* 1. 2. p. 730. n. 32.
Mauerfpecht. Goetz Naturf. 17. p. 40.
Habitat in Europæ australioris turribus, arcibus, muris, reptans, solitaria, autumnino migrans, videntis insectis potissimum araneis, volatu vago & incerto, voce acuta; nidificat aliquando in craniis; moribus familiari affinis, passeris magnitudinæ, 6½ pollices longa.
Rostrum subulatum, culcratum, capite longius; collum sub-
tus albidum; remigēs nigræ: 1, 2 latere tenuiore macu-
lis duabus albis; macula alarum rosea et rectricibus & re-
migum latere interiore; rectrices albicantes; unguēs va-
lidi præsertim posterior. Feminae gula jugulumque alba.
- puffilla. 3. *C. fusca*, subtus alba, superciliis candidis, rectricibus fuscis: extimis apice albis.
Certhia indica. Briss. av. 3. p. 621. n. 9.
Sovi-manga brun & blanc. Buff. hist. nat. des ois. 5. p. 498.
 Little brown and white Creeper. *Edw. av.* 1. t. 26.
Habitat in India, familiari dimidio minor, 3½ pollices longa; an sperata varietas?
A rostro ad oculum utrinque stria nigra; remigum margo
aneus.
- capensis. 4. *C. fusca*, rectricibus nigricantibus: extrema exterius albo fimbriata.
Certhia Capitis bonæ spei, Briss. av. 3. p. 618. n. 7.
- melanura. 5. *C. capite dorsoque violaceis, pectore & abdomine vire-*
centibus, alis fuscis, cauda nigra subbifida, tibiis di-
gitisque atris. Sparrmann mus. carls. t. 5.
Habitat ad Caput bonæ spei, reguli magnitudinæ, 4 polli-
cibus longior.
Rostrum, cauda & pedes nigricant.
- olivacea. 5. *C. olivacea*, subtus fusca, orbitis albicantibus.
Certhia olivacea madagascariensis. Briss. av. 3. p. 625. n. 11.
Sovi-manga olive à gorge pourpre. Buff. hist. nat. des
ois. 5. p. 507.

AVES PICÆ. *Certhia*.

Grimpereau olive de Madagascar. Buff. pl. enlum. n. 375 f. 1.

Olive Creeper. Lath. syn. I. 2. p. 713. n. 14.

Habitat in Madagascar, familiari minor, 4 pollices longa. Rostrum nigrum; rectrices extimæ apice albæ; reliquæ cum remigibus fuscæ, tinctu olivaceo; pedes pallide fuscæ.

carrucaria. 6. C. olivacea subtus flavescens, rectricibus æqualibus.

Certhia philippensis. Briss. av. 3. p. 615. n. 5. t. 30. f. 3. Grimpereau gris des Philippines. Buff. hist. nat. des ois. 5. p. 508. pl. enlum. n. 576. f. 2.

Grey Creeper. Lath. syn. I. 2. p. 714. n. 15.

Habitat in insulis Philippinis, 4½ pollices longa.

Rostrum validius, quam congeneribus, cum pedibus unguibusque nigrum; lingua apice bifida; stria a mento ad pedus, rectricesque alarum superiores violacæ; remiges fuscæ; rectrices nigre, margine chalybeo, apice albido.

jugularis. 7. C. subgrisea, subtus lutea, gula violacea, rectricibus duabus extimis apice flavis.

Certhia philippensis minor. Briss. av. 3. p. 616. n. 6. t. 33. f. 5.

Petit grimpereau des Philippines. Buff. hist. nat. des ois. 5. p. 509. planch. enlum. n. 576. f. 3.

Habitat in insulis Philippinis, præcedente minor, 3½ pollices longa; an varietas præcedentis?

Rostrum, pedes & ungues nigricantes.

cærulea. 8. C. cærulea, fascia oculari, gula, remigibus rectricibusque nigris. Mus. Ad. Fr. 2. p. 22. Scop. ann. 1. p. 53. n. 61.

Certhia cayanensis cærulea. Briss. av. 3. p. 626. n. 12. t. 31. f. 4.

Avis Hoitzillin, papilio vocata. Seb. mus. 1. t. 61. f. 5.*

Variété de Guitguit noir & bleu. Buff. hist. nat. des ois. 5. p. 531.

Certhia of Gujana. Bancr. guj. p. 164.

Blue Creeper. Edw. av. 1. t. 21. f. 1. Lath. syn. I. 2. p. 725. n. 27.

Habitat in Cayenna, nidum retortæ forma ex culmis graminum struens, & subtus hiantera ex debili ramusculorum apice suspendens; 4 pollices longa.

brasiliæ. 41. C. nigra, vertice viridi-aureo, uropygio, gula, juguloque violaceis, pectore ex purpureo badio.

- Certhia brasiliensis violacea. *Briss. av.* 3. p. 661. n. 30.
t. 32. f. 4.
Guit-guit noir & violet. *Buff. hist. nat. des ois.* 5. p. 541.
Black and violet Creeper. *Lath. syn.* I. 2. p. 730. n. 31.
*Habitat in Brasilia, reguli cristati magnitudine, 3½ pol-
lices longa.*
Dorsum inferius, tectrices alarum minores, & caudæ
superiores, margo caudæ violacea; femora badia.
- variega- 42. C. cæruleo, nigro, flavo & albo undulata, subtus crocea,
ta. vertice rubro, occipite cæruleo.
Certhia americana varia. *Briss. av.* 3. p. 665. n. 32.
Aquila americana, variis coloribus picta. *Seb. mus.* 2.
t. 3. f. 3.
Guit-guit varié. *Buff. hist. nat. des ois.* 5. p. 540.
Variegated Creeper. *Lath. syn.* I. 2. p. 729. n. 30.
Habitat in America, 5 pollices longa.
Genæ & area infraocularis ex cæruleo & albo mista.
- cayana. 9. C. viridis nitida, subtus albo-striata, rectricibus viridi-
bus: lateralibus interius nigricantibus.
Certhia viridis Cayennensis. *Briss. av.* 3. p. 636. n. 17.
t. 33. f. 2.
Certhia corpore supino viridi, gula lutea. *Nov. comm.*
Petrop. 2. p. 430. t. 14. f. 2.
Guit-guit vert tacheté. *Buff. hist. nat. des ois.* 5. p. 538.
Grimpereau vert tacheté de Cayenne. *Buff. pl. enlum.* n.
682. f. 2.
Cayenne Creeper. *Lath. syn.* I. 2. p. 728. t. 29.
*Habitat in Cayenna, familiaris magnitudine, ultra 4
pollices longa.*
Rostrum nigrum; mandibulæ inferioris linea utrinque;
genæ albæ; macula prope oculos & gula (mari) rufæ;
tectrices caudæ inferiores flavicantes, remiges nigri-
cantes, margine exteriori viridi, interiore griseo;
pedes cum unguibus cinerei.
- chaly- 10. C. viridis nitens, pectore rubro: fascia antica chalybea.
bea. Certhia torquata Capitis bonæ spei. *Briss. av.* 3. p. 643.
n. 20. t. 32. f. 1.
Sovi-manga à collier. *Buff. hist. nat. des ois.* 5. p. 502.
Grimpereau du Cap de bonne espérance. *Buff. pl. enlum.*
n. 246. f. 3.
Purple indian Creeper. *Edw. glean.* t. 265.
Collared Creeper. *Lath. syn.* I. 2. p. 709. n. 10.

AVES PICÆ. *Certhia*.

Habitat ad Caput bonæ spei, egregie cantans, insectis & florum nectare victitans, 4½ pollices longa; an mas capensis?

Rostrum, pedes & ungues nigri; rectrices caudæ superiores viridi-aureæ; inferiores cum abdomine cinereæ; remiges griseæ; rectrices nigricantes apicæ griseæ, 10 media margine exteriori viridi-æneæ, interiore cinereæ.

afra. II. *C. viridis*, abdomine albo, pectore rubro, uropygio cæruleo.

Sovi-manga vert à gorge rouge. *Buff. hist. nat. des ois.* p. 5. 514.

Red-breasted green Creeper. *Edw. glean. t.* 347.

African Creeper. *Lath. syn. I. 2. p.* 717. n. 18.

β. *C. abdomine cinereo, fasciculo plumarum flavarum subalari, lingua apice bifida.*

γ. *C. mento, gutture & pectore ex purpureo cæruleis, fascia pectorali rubra.*

Habitat ad Caput bonæ spei, cantu luscinia, 4½ pollices longa.

Rostrum obscurum; corporis nitor aureo-æneus; remiges majores & cauda obscure fusca; pedes nigri.

Spiza. 12. *C. viridis*, capite remigibusque nigricantibus.

Motacilla Spiza. *Syst. nat. X. 1. p.* 188. n. 27.

Certhia americana viridis atricapilla, Briss. av. 3. p. 634. n. 16.

Avicula americana altera. *Seb. mus. 2. t. 3. f.* 4.

Guit-guit vert & bleu à tête noire. *Buff. hist. nat. des ois.* 5. p. 534.

Black-headed Creeper. *Lath. syn. I. 2. p.* 726. n. 28.

β. *Certhia brasiliensis viridis atricapilla, Briss. av. 3. p.* 633. n. 15.

Guitguit vert & bleu à tête noire, var. 1. *Buff. hist. nat. des ois. 5. p.* 535.

Grimpereau à tête noire du Brésil. *Buff. pl. enlum. n.* 578. f. 2.

Green black-cap Flycatcher. *Bancr. Guj. p.* 182. *Edw. av. 1. t.* 25. f. 1.

Schwarzplattige Spielart des hochbeinigten Bienenfressers. *Merr. Beytr. 1. t.* 5.

γ. *Certhia brasiliensis viridis, Briss. av. 3. p.* 631. n. 14.

Grimpereau vert du Brésil. *Buff. pl. enlum. n.* 578. f. 1.

Guit-guit vert & bleu à gorge blanche. *Buff. hist. nat. des ois.* 5. p. 536.

Blue headed green Fly-catcher. *Edw. av.* 1. t. 25. f. 2.

♂. C. tota viridis.

Guit-guit tout vert. *Buff. hist. nat. des ois.* 5. p. 527.

Grimpereau vert de Cayenne. *Buff. pl. enl. n.* 682. f. 1.

Allgreen Creeper. *Edw. glean. t.* 348.

Habitat in America meridionali, 5½ pollices longa, rostro, naribus, pedibus meropi affinis.

Caput & gula nigra; in β. gula viridis; in γ. vertex cæruleus, gula alba; ♂. tota viridis.

sperata. 13. C. purpurea subtus coccinea, capite, gula, uropygioque purpureis.

Certhia philippensis purpurea. *Briss. av.* 3. p. 655. n. 27. t. 31. f. 2. 3.

Sovi-manga marron-pourpré à poitrine rouge. *Buff. hist. nat. des ois.* 5. p. 497.

Grimpereaux des Philippines. *Buff. pl. enl. n.* 246. f. 1. 2.

Red-breasted Creeper. *Lath. syn.* 1. 2. p. 706. n. 8.

β. C. gula violacea.

Grimpereau troisième de l'île de Luçon. *Sonner. it.* p. 63. t. 30. D.

Sovi-manga à gorge violette & poitrine rouge. *Buff. hist. nat. des ois.* 5. p. 499.

Habitat in insulis philippinis, 4 pollices longa, cantu lusciniæ.

Rostrium nigrum, basi albicans, lingua furcata brevius; abdominis pars posterior ex flavicante olivacea; tectrices alarum minores violacea & viridi-aurea, media fusca apice badia, majores cum remigibus fusca margine rufa; cauda nigra, nitore chalybeo, margine exteriori violaceo aureo-nitente; pedes cum unguibus fusci; femina supra & infra olivacea.

In β. caput pallide virens; dorsum cum tectricibus alarum spadiceum; uropygium cum cauda chalybeum; caudæ tectrices inferiores virides.

fenega- 14. C. nigro-violacea, vertice gulaque viridi-aureis, pectore
lenis. coccineo.

Certhia fenegalensis violacea. *Briss. av.* 3. p. 660. n. 29. t. 34. f. 2.

Sovi-manga violet à poitrine rouge. *Buff. hist. nat. des ois.* 5. p. 500.

Senegal Creeper. *Lath. syn.* 1. 2. p. 709. n. 9.

AVES PICÆ. *Certhia*.

Habitat ad fluvium Senegal, 5 pollices longa;

Rostrum nigrum; juguli, pectorisque pennæ basi nigræ; medio viridi-aureæ, apice coccineæ; alæ & cauda fusca; pedes cum unguibus nigricantes.

purpurea.

43. *C. tota purpurea.*

Certhia virginiana purpurea. Briss. av. 3. p. 654. n. 26.

Avis virginiana phœnicea de Atototl dicta. Seb. mus. 1. t. 72. f. 7.

Oiseau pourpré à bec de grimpereau. Buff. hist. nat. des ois. 5. p. 526.

Purple Creeper. Lath. syn. 1. 2. p. 723. n. 25.

Habitat in Virginia, 4½ pollices longa, egregie cāntans.

gutturalis.

15. *C. nigricans, gutture viridi-nitente, pectore purpureo.*

Certhia brasiliensis nigricans. Briss. av. 3. p. 659. n. 28. t. 23. f. 3.

Grimpereau brun du Brésil. Buff. pl. enlum. n. 578. f. 3.

Oiseau brun à bec de grimpereau. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 525.

Green-faced Creeper. Lath. syn. 1. 2. p. 723. n. 24.

Habitat in Brasilia, ultra 5 pollices longa.

Rostrum pedesque nigri; frons viridi-aurea; pectoris pennæ basi ex atro fusca, medio ex violaceo virides, apice rubræ; tectrices alarum minores purpureæ.

Pitrus.

16. *C. flava supra olivacea, alis cæruleis fasciis duabus albis.*

Parus americanus. Briss. av. 3. p. 576. n. 15.

Figuier des sapins. Buff. hist. nat. des ois. 5. p. 296.

Pine-Warbler. Arch. zool. 2. p. 412. n. 318. Lath. syn. 11. 2. p. 483. n. 107.

Pine-creeper. Oatesb. carol. 1. p. 46. t. 46. Edw. glean. t. 277. f. 2.

Habitat æstate in Americæ septentrionalis, Carolina præsertim & Pensilvaniæ pinetis, 4½ pollices longa.

Lora nigra; pedes cum rostro fusca; abdomen & crissum album; rectrices fusca, extimæ extus albæ. Femina tota fusca.

cruentata.

17. *C. nigro-cærulescens, subtus alba, vertice, cervice, dorso uropygioque rubris.*

Certhia bengalensis. Briss. av. 3. p. 663. n. 31.

Sovi-manga rouge, noir & blanc. Buff. hist. nat. des ois. 5. p. 514.

Black, white and red indian Creeper. *Edw. av.* 2. t. 81.
 Red-spotted Creeper. *Lath. syn.* 1. 2. p. 736. n. 40.
Habitat in Bengala, 3 1/2 pollices longa.
Rostrum pedesque nigri.

Flaveola. 18. *C. nigra* subtus lutea, superciliis exalbidis, rectricibus
 extimis apice albis.

Certhia f. saccharivora jamaicensis. Briss. av. 6. app. p.
 117. n. 33.

Sucrier. *Buffon hist. nat. des ois.* 5. p. 542.

Black and yellow Creeper. *Edw. av.* 3. t. 112. *Lath. syn.*
 1. 2. p. 737. n. 42.

β. *Certhia martinicana f. saccharivora. Briss. av.* 3. p. 611.
 n. 3. t. 34. f. 5.

Luscinia f. Philomela e fusco & luteo varia. Sloan. jam.
 2. p. 307. t. 259. *Raj. av.* p. 187. n. 45.

Yellow bellied Creeper. *Edw. glean.* t. 362. f. 3.

γ. *Certhia bahamensis. Briss. av.* 3. p. 620. n. 8.

Bahama Titmouse. *Catesb. Car.* 1. t. 59.

Bahama Creeper. *Arct. zool.* 2. p. 285. n. 175.

*Habitat in insulis Americae mediae vicinis, reguli circiter
 magnitudine, insectis visitans, succumque ex sacchari
 cannis sugens.*

sanguinea. 44. *C. sanguinea*, remigibus caudaque nigris, abdomine ob-
 scuro, crisso albo.

Crimson Creeper. *Lath. syn.* 1. 2. p. 739. n. 43.

Habitat in insulis Sandwich, 5 pollices longa.

*Rostrum obscurum; remigum secundariorum margo badius;
 rectrices acuminatae, scapis albis; pedes nigri.*

virens. 45. *C. olivacea*, remigum rectricumque margine flavo.

Olive-green Creeper. *Lath. syn.* 1. 2. p. 740. n. 44.

*Habitat in insulis Sandwich, 5 pollices longa; an femina
 sanguinea?*

Rostrum pedesque obscuri.

rubra. 46. *C. rubra*, alis caudaque nigris, crisso albo.

Scarlet Creeper. *Lath. syn.* 1. 2. p. 740. n. 45.

Habitat in insula maris australis, vix 4 pollices longa.

*Rostrum, pedibus & unguibus nigris, abdominis parte in-
 feriore alba distincta a coccinea; an satis?*

cinna-
momea.47. *C. Cinnamomea subtus alba.*

Cinnamom Creeper. Latham syn. I. 2. p. 740. n. 46.
Rostrum nigrum; cauda c. familiaris; pedes obscuri; lon-
gitudo 5 pollicum.

macassa-
rienfis.48. *C. viridi-aurea, subtus ex nigricante fusca.*

Polytmus indicus. Briff. av. 3. p. 675. n. 6.
Avis Tfici indica orientalis. Seb. mus. I. p. 100. t. 63. f. 3.
Macassar Creeper. Lath. syn. I. 2. p. 741. n. 47.
Habitat in insulis Bally & Macassar, 4½ pollices longa.
Rostrum albidum; cauda viridi-aurea; pedes cum ungui-
bus nigri.

indica.

49. *C. cærulea, gutture albedo.*

Polytmus cæruleus indicus. Briff. av. 3. p. 682. n. 10.
Avis colubri orientalis. Seb. mus. 2. p. 20. t. 19. f. 2.
Indian Creeper. Latham syn. I. 2. p. 741. n. 48.
Habitat in India, 4½ pollices longa.
Rostrum pedesque nigri.

amboi-
nenfis.50. *C. cinerea, subtus viridis, capite colloque flavis, pectore rubro, alis nigris.*

Polytmus amboinensis. Briff. av. 3. p. 685. n. 12.
Avis amboinensis, Tfici vel Kakopit dicta. Seb. mus. 2.
p. 62. t. 62. f. 2.
Amboinan Creeper. Latham syn. I. 2. p. 741. n. 49.
Habitat in Amboina, 2½ pollices longa.
Rostrum flavisans.

mexica-
na.51. *C. rubra, gutture viridi, remigum apice cærulescente:*

Trochilus coccineus. Syst. nat. VI. p. 29. n. 76. 3.
Certhia rubra mexicana. Briff. av. 3. p. 651. n. 24.
Avicula mexicana f. Hoitzillin. Seb. mus. I. p. 70. n. 6.
Oiseau rouge à bec de grimpereau. Buffon hist. nat. des ois.
5. p. 522.
Red Creeper. Lath. syn. I. 2. p. 721. n. 23.

52. *Certhia mexicana rubra atricapilla. Briff. av. 3. p. 653. n. 25.*

Avicula de tatac ex nova Hispania. Seb. mus. I. p. 74. t.
70. f. 8
Colius. Moehring gen. av. 16. p. 36.
Grimpereau rouge à tête noire du Mexique. Buff. hist.
nat. des ois. 5. p. 524.
Habitat in nova Hispania, 4½ pollices longa.

Rostrum, femora, pedes & ungues *flavæ*; in β . caput *nigrum*; *rectrices alarum superiores aureæ*.

cinerea. 52. C. cinerea, uropygio & *rectricibus alarum viridibus*, *remigibus fuscis*, abdomine *flavicante*, crisso albo, cauda *nigra*.

Cinereous Creeper. *Lath. syn. I. 2. p. 721. n. 22.*

Habitat ad Caput bonæ spei, 9 pollices longa.

Rostrum *linguæ æquale*, & pedes *nigri*; *mandibulæ inferior utrinque stria flavicante*; *dorsû pars inferior viridis*; *pectoris & abdominis medio viror admixtus*; *cauda cuneiformis*; *rectrices 2 intermediæ 2½ pollicibus reliquis longiores.*

pulchella. 19. C. *rectricibus duabus intermediis longissimis*, corpore *viridi-nitente*, pectore *rubro*.

Certhia longicauda senegalensis. Briss. av. 3. p. 645. n. 21. t. 34. f. 3.

Avicula amboinenfis discolor. Seb. mus. 2. t. 7. f. 2.

Sovi-manga vert doré changeant à longue queue. Buff. hist. nat. des ois. 5. p. 519.

Grimpereau à longue queue du Sénégal. Buff. pl. enl. n. 670. f. 1.

Beautiful Creeper. Latham syn. I. 2. p. 715. n. 20.

Habitat ad Senegal fluvium, 7½ pollices longa.

Rostrum, pedes & *rectrices nigricantes*, *hæ margine aureæ*; *2 intermediæ 2½ pollicibus reliquis apice rotundatis longiores*; *abdomini candor admixtus*; *remiges cum rectricibus alarum majoribus fusca.*

famosa. 20. C. *rectricibus intermediis 2 longissimis*, corpore *viridi-nitente*, axillis *luteis*, loris *nigris*.

Certhia longicauda Capitis bonæ spei. Briss. av. 3. p. 647. n. 22. t. 34. f. 1.

Trochilus afer. Syst. nat. X. 1. p. 119. n. 2.

Grand Sovi-manga vert à longue queue. Buffon hist. nat. des ois. 5. p. 521.

Grimpereau à longue queue du Cap de bonne espérance. Buff. pl. enlum. n. 83. f. 1.

Famous Creeper. Lath. syn. I. 2. p. 720. n. 21.

Habitat ad Caput bonæ spei, 9 pollices longa.

Rostrum, pedes *cum unguibus*, & cauda *nigra*; *rectrices 2 intermediæ 2½ pollicibus longiores*, & *utrumque; reliquæ margine tantum exteriore viridi-aureæ*; *rectrices alarum majores, remigesque nigricantes, margine*

virides. Femina ex virente fusca, subtus flavicans; uropygio viridi, alis caudaque ex atro fuscis.

philippi- 21. C. rectricibus intermediis 2 longissimis, corpore sub-
na. griseo, virecente, subtus albo-flavescens.

Certhia Philippensis. *Briss. av. 2. p. 613. n. 4. t. 30. f. 2.*

Grimpereau des Philippines. *Buff. pl. enlum. n. 576. f. 1.*

Grimpereau second de l'île de Luçon. *Sonner. it. t. 30. B.*

Philippine Creeper. *Lath. syn. 1. 2. p. 711. n. 12.*

Habitat in insulis Philippinis, 4½ pollices longa.

Rostrum & pedes cum unguibus nigri; lingua tubulosa, furcata; remiges fusca, margine pallidior; rectrices 2 intermediae nigrae aureo-nitentes; ceterae nigricantes apice albae.

violacea. 22. C. rectricibus intermediis 2 longissimis, corpore violaceo
nitente, pectore abdomineque luteis.

Certhia longicauda minor Capitis bonae spei. *Briss. av. 3. p. 649. n. 23. t. 33. f. 6.*

Sovi-manga à longue queue & à capuchon violet. *Buff. hist. nat. des ois. 5. p. 517.*

Petit grimpereau à longue queue du Cap de bonne espérance. *Buffon pl. enlum. n. 670. f. 2.*

Violet-headed Creeper. *Lath. syn. 1. 2. p. 718. n. 19.*

Habitat ad Caput bonae spei, ultra 6 pollices longa; nidum struens artificiosum laxum ex materiis sericeis; curruclariae affinis, at rostro longiori.

Rostrum, pedes & ungues nigricantes; dorsum inferius, uropygium & rectrices caudae superiores olivaceae; alarum inferiores griseae, superiores majores cum remigibus fuscae; cauda cuneiformis ex atro fusca.

zeyloni- 23. C. pileo viridi, dorso ferrugineo, abdomine flavo,
ca. gula uropygioque azureis.

Certhia Philippensis olivacea. *Briss. av. 3. p. 623. n. 10. t. 34. f. 4.*

Grimpereau olive des Philippines. *Buff. pl. enl. n. 576. f. 4.*

Sovi-manga olive à gorge pourpre. *Buffon hist. nat. des ois. 5. p. 506.*

Grimpereau premier de l'île de Luçon. *Sonner. it. t. 30. A.*

β. C. viridis subtus alba, mento, gula, pectore, dorso alisque fuscis, cauda nigra.

Habitat in insulis Philippinis, 4, β. 4½ pollices longa.

Rostrum subulatum, nigrum, longitudine capitis; dorsum ex ferrugineo-olivaceum; remiges fuscae; apicis marginae

pallido; rectrices *æquales*, *nigricantes*: *extimis* 1, 2
apicis margine albido; *pedes nigri*.

cyanea. 24. *C. cærulea*, fascia oculari, humeris, alis caudaque ni-
gris, pedibus fuscis.

Certhia brasiliensis cærulea. *Briss. av.* 3. p. 628. n. 13.
t. 31. f. 5.

Avicula de Guit-guit ex insula Cuba. *Seb. mus.* I. p. 96.
t. 60. f. 5.

Guiracoereba. *Marcgr. bras.* 212. *Raj. av.* p. 83. n. 11.
Will. orn. p. 239. c. 20.

Guit-guit noir & bleu. *Buff. hist. nat. des ois.* 5. p. 529.
Grimpereau du Brésil. *Buff. pl. enl.* n. 83. f. 2.

Black and blue Creeper. *Edw. glean.* t. 264. f. 1. *Lath.*
syn. I. 2. p. 724. n. 26.

Habitat in Brasilia & Cayenna, $4\frac{1}{4}$ pollices longa.

Rostrum, occiput & ungues nigra; lingua rostri longi-
tudine, ciliata; vertex beryllinus; remigum latus
interius & rectrices alarum inferiores sulphurea; feminae
aliae subtus ex flavicante cinerea.

Lotenia. 25. *C. cærulea*, fascia pectorali rubro-aurea, loris atris.

Certhia madagascariensis viridis. *Briss. av.* 3. p. 641. n. 19.
t. 33. f. 4. 5.

Angala-Dian. *Buff. hist. nat. des ois.* 5. p. 510.

Grimpereau vert de Madagascar. *Buff. pl. enl.* n. 575. f. 2. 3.

Loten's Creeper. *Lath. syn.* I. 2. p. 715. n. 16.

Habitat in Madagascar & Zeylon. I. G. LOTEN p. m.

Gubernator Zeylon: qui hortum botanicum primus in
India condidit; & tot raris avibus me aliosque dotavit.

Nidum struit formæ calycis ex lanugine plantarum, 5-6
ova pariens, ab araneæ specie aliquando expulsa, $5\frac{1}{4}$
pollices longa, colore varians.

Rostrum subulatum nigrum, capite duplo longius; lingua
apice compressa; caput, collum, dorsum, uropygium,
rectrices caudæ superiores, alias cæruleo-nitentia, alias
viridi-aurea; pectus, abdomen & crissum splendide ni-
gra, in femina sordide alba, nigromaculata, rarius ab-
domen fuscum; fascia pectoralis ignita vel violacea;
rectrices æquales, remigesque nigrae; rectrices alarum
minores violaceæ, mediae viridi-aureæ, majores nigrae,
margine exteriori viridi-aureæ.

omnico- 53. *C. viridis*, omnis generis coloribus intermixtis.

lor. Avis zeylonica omnicolor. *Seb. mus.* I. t. 69. f. 5.

Falcinellus omnicolor zeylanicus. *Klein ord. av.* p. 107. n. 8.

Greengold Creeper. *Lath. syn.* I. 2. p. 716. n. 17.

Habitat in Zeylon, 8 fere pollices longa, ab araneæ majori specie infestata.

Nitor aureus; rostrum $1\frac{1}{2}$, cauda $2\frac{1}{4}$ pollices longa.

caffa 54. C. fusca, pectore abdomineque pallidis, rectricibus intermediis longioribus. *Mantiss. pl. alt. p. 525.*

Habitat ad Caput bonæ spei, turdi magnitudine, & rostro duplo longiori.

Rostrum nigrum, parum compressum, nonnihil incurvum; gula pallida, pilis nigris hirsuta, uropygium exflavescente virescens; cristum flavissimum; cauda nigra, cuneata, longitudine corporis; rectricibus quatuor mediis triplo longioribus, intermediis 2 longissimis; remiges nigrae.

66. TROCHILUS. *Rostrum subulato-filiforme, apice tubulato, capite longius; mandibula superior vaginans inferiorem.*

Lingua filiformis, filis duobus coalitis tubulosa.

Pedes ambulatorii.

* *curvirostres.*

paradiseus. 1. Tr. ruber, alis cæruleis, capite cristato, rectricibus inter mediis longissimis..

Polytmus mexicanus longicaudus ruber cristatus Briss. av. 3. p. 692. n. 16.

Mellivora avis cristata cum duobus pennis longis in cauda.

Seb. mus. 1. p. 67. t. 61. f. 4.

Colibri huppé. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 54.

Paradise Humming Bird. Lath. syn. 1. 2. p. 745. n. 1.

Habitat in nova Hispania, $8\frac{1}{2}$ pollices longa.

Rostrum pedesque nigri; remiges rectricesque alarum cæruleæ.

galeritus. 23. Tr. viridi-aureus, remigibus rectricibusque fuscis, crista purpurea. *Mol. hist. nat. Chil. p. 219.*

Habitat in regno Chilensi.

Corpus subtus colore aurora; collum dorsumque viridia;

tota avis auri nitore resplendet.

exilis. 24. Tr. ex virecente fuscus, coccineo nitens, remigibus caudaque nigris, crista basi viridi apice aurea.

Hummingbird of a black colour. Bancr. Guj. p. 166.

Little Hummingbird. *Lath. syn.* I. 2. p. 764. n. 29.

Habitat in Gujana, 1 ½ pollices longa, & vix 50 grana pondere æquant.

Rostrum nigrum.

- Pella. 2. Tr. ruber, rectricibus intermediis longissimis, capite fusco, gula aurata uropygioque viridi.
Polytmus furinamentis longicaudus ruber. *Briss. av.* 3. p. 690. n. 15.

Grand Colibri. *Fermin Surin.* 2. p. 195.

Colibri topaze. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 46.

Colibri de Cayenne, dit le Topaz. *Buff. pl. enlum. n.* 599. f. 1.

Long-tailed red Hummingbird. *Edw. av.* I. t. 32.

Topaz Hummingbird. *Latham syn.* I. 2. p. 746. n. 2.

Habitat in Surinamo, 6 pollices circiter longus.

Rostrum, caput & cervix nigra; pectus roseum; dorsum rectricesque alarum ex aurantio rubent; remiges & intermedia rectrices purpureæ; reliquæ aurantiæ; femina fere tota viridi-aurea.

- supercili- 3. Tr. fuscus nitens, rectricibus intermediis longis, abdomine
liosus. subincarnato, superciliis albis.

Polytmus cayanensis longicaudus. *Briss. av.* 3. p. 686. n. 13. t. 35. f. 5.

Brin blanc. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 49.

Colibri à longue queue de Cayenne. *Buff. pl. enl. n.* 600. f. 3.

Supercilious Hummingbird. *Lath. syn.* I. 2. p. 747. n. 3.

Habitat in Cayenna, 6 pollices non adsequens.

Rectrices 2 intermedia pollice reliquis longiores, media parte fusco nitentes, altera albæ; reliquæ basi fuscae, altera parte nigra, apice nigro, albo marginato; pedes & ungues fusci.

- cyanu- 25. Tr. viridis, subtus cinereus, fronte, gutture, rectricibus-
rus. que duabus intermediis longioribus cæruleis.

Trochili, aviculæ omnium minimæ, in sola America, & si duas excipias, quæ versus septentrionalem migrant, sola meridionali obvia, pedibus rostroque debilibus, naribus minutis, lingua emissili, rectricibus caudæ 10, coloribus nitidissimis conspicuæ; audaces & pugnaces, volando velocissimæ, suspensæ in acre vidum capiunt, nectar & floribus sugentes, insecta quoque deglutientes, quorum quippe reliquias in ventriculo invenit CL. Brandis; alarum motu magis sonora, quam voce, gragaria, nidum hemisphæricum ex lanugine thapsi eleganter struunt, & ab arborum ramis inter folia latentem suspendunt; ova 2 alba, pisi magnitudine pariunt, quibus mas & femina alternatim incubant; juniores ab araneis infestati, ab America incolis picturis adhibiti; aqua & siphone explosa humidatæ capiuntur; hybernare traduntur.

Polytmus mexicanus longicaudus. Briss. av. 3. p. 688. n. 14.

Avis Yayaquitotl. Seb. mus. 1. p. 84. t. 51. f. 7.

Blue tailed Hummingbird. Lath. syn. 1. 2. p. 749. n. 5.

Brin bleu. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 51.

Habitat in nova Hispania, ficedula magnitudine, 8 1/4 pollices longus.

Rostrum flavicans; rectrices, quo exteriores, eo breviores; intermediæ extimis ultra 2 pollices longiores; pedes flavi.

Polytmus.

4. *Tr. virefcens, rectricibus lateralibus longissimis, pileo rectricibusque fuscis.*

Polytmus viridans, aureo variegatus splendens, pennæ binis uropygii longissimis. Brown. jam. 475.

Mellisuga jamaicensis atricapilla, cauda bifurca. Briss. av. 3. p. 729. n. 19.

Oiseau-mouche à longue queue noire. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 39.

Longtailed Hummingbird. Alb. av. 3. t. 49.

Longtailed black cap Hummingbird. Edw. av. 1. t. 34. Bancr. Guj. p. 169.

Black capped Hummingbird. Lath. syn. 1. 2. p. 748. n. 4.

Habitat in Jamaica & America australi, 9 1/2 pollices longa.

Rostrum flavum, apice nigrum; irides flavæ; cervix nigra; alarum margo albus; rectrices alarum, remigesque ex violaceo fusca; cauda bifurca, rectricibus inæqualibus, nigricantibus; pedes nigri.

forked-tus.

5. *Tr. viridis, rectricibus lateralibus longissimis, pileo rectricibusque cæruleis.*

Polytmus major nigricans aureo variegatus splendens, pennæ binis uropygii longissimis. Brown. jam. p. 475.

Mellisuga jamaicensis, cauda bifurca. Briss. av. 3. p. 728. n. 18.

Oiseau-mouche à longue queue, or, vert & bleu. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 38.

Long tailed green Hummingbird. Edw. av. 1. t. 33.

Forktailed Hummingbird. Lath. syn. 1. 2. p. 750. n. 6.

Habitat in Jamaica; ultra 7 pollices longus.

Rostrum, pedesque nigri; corpus subtus album; remiges ex violaceo fusca, 3 corpori proximæ viridi-aureæ; rectrices extimæ 3 pollicibus longiores, reliquæ, quo interiores, eo breviores.

curved.

26. *Tr. viridi-aureus, rectricibus extimis longioribus, dorso superiore, pectore & rectricibus alarum minoribus splendide violaceis, alis caudaque nigris.*

- Mellisuga jamaicensis violacea, cauda bifurca. *Briss. av.* 3. p. 732. n. 20. t. 37. f. 6.
 Oiseau-mouche violet à queue fourchue. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 37.
 Lesser fork-tailed Hummingbird. *Lath. syn.* I. 2. p. 751. n. 7.
Habitat in Jamaica, Brasilia & Cayenna, 4 pollices longus.
 Rostrum nigrum; rectrices extimæ $1\frac{1}{2}$ pollices longæ; pedes cum unguibus nigricantes.
- macrou- 27. Tr. viridi-aureus, capite & gutture violaceis, abdominis
 rus. area alba, cauda bifurca chalybea.
 Mellisuga cayennensis, cauda bifurca. *Briss. av.* 3. p. 726. n. 17. t. 36. f. 9.
 Mellivora avis maxima. *Sloan. jam.* 2. p. 309. t. 264. f. 4. *Raj. av.* p. 83. n. 3.
 Guainumbi. *Marcgr. bras.* 197. *Raj. av.* p. 187. n. 41. *Will. orn.* p. 231. n. 3.
 Oiseau-mouche à longue queue couleur d'acier bruni. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 36.
 Cayenne forktailed Hummingbird. *Lath. syn.* I. 2. p. 751. n. 8.
Habitat in Jamaica, 6 pollices longus.
 Rostrum pedesque nigri; rectrices extimæ $3\frac{1}{4}$, intermediæ $1\frac{1}{4}$ pollices longæ.
- purpura- 28. Tr. viridis, vertice, alis caudaque bifurca purpureis,
 rus. torque cæruleo.
 Purple-crowned Honeyfucker. *Gen. of birds.* p. 63. t. 8. f. 2.
 Purple crowned Hummingbird. *Lath. syn.* I. 2. p. 764. n. 27.
- auratus. 29. Tr. viridi-aureus, mento, gutture & pectore rubro-aureis,
 abdomine nigro.
 Garnet-throated Hummingbird. *Latham syn.* I. 2. p. 752. n. 9. t. 34.
 β. Tr. genis, nucha gulaque rubro-aureis, capite & corpore
 nigris viridi-nitentibus.
 Grenat. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 48.
 Longitudo $4\frac{1}{2}$, in β. 5 pollicum; rostrum pedesque nigri;
 feminae mentum, guttur & pedes viridi-aurea.
- leucurus. 6. Tr. viridi-aureus, rectricibus æqualibus albis, collari rubro
 Polytmus surinamensis. *Briss. av.* 3. p. 674. n. 5.
 Collier rouge. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 59.
 Colibri à collier de Surinam. *Buff. pl. enl.* n. 600. f. 4.
 White-tailed Hummingbird. *Edw. glcan.* t. 256. *Lath. syn.* I. 2. p. 757. n. 17.

Habitat in Surinam, 4½ pollices longa.

Rostrum & pedes nigri; corpus subtus ex griseo albume; alæ obscure purpureæ; rectrices 8 exteriores albæ, extimæ 2 apice nigricantes.

- granu- 30. Tr. viridi-aureus, subtus albus, gutture smaragdino,
neus. pectore nigro, cauda purpurea.
Hauffe col vert. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 58.*
Black-breasted Hummingbird. *Lath. syn. I. 2. p. 756. n. 16.*
Feminae in pectore areæ duæ albæ.

- viola- 31. Tr. violaceus, alis caudaque viridi-aureis.
ceus. *Polytmus cayennensis violaceus. Briss. av. 3. p. 683. n. II. t. 35. f. 3.*
Colibri violet. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 57.
Colibri violet de Cayenne. Buff. pl. enlum. n. 600. f. 2.
Violet Hummingbird. Lath. syn. I. 2. p. 756. n. 15.
Habitat in Cayenna, 4¼ pollices longus.
Rostrum pedesque nigri.

- macula- 32. Tr. viridi-aureus, subtus albus, colli lateribus rufis,
tus. maculis colli viridi, pectoris nigra, caudæ subtus
violaceis, albis & fuscis.
Colibri à cravate verte. Buffon hist. nat. des ois. 6. p. 56.
Colibri à gorge verte de Cayenne. Buff. pl. enl. n. 671. f. 1.
Green-throated Hummingbird. Lath. syn. I. 2. p. 755. n. 14.
Magnitudo punctulati.

- puncta- 33. Tr. viridi-aureus, gutture & tectricibus alarum albo-
latus. maculatis, remigibus ex violaceo fuscis, cauda ex
virescente fusca apice alba.
Polytmus punctulatus. Briss. av. 3. p. 669. n. 2.
Hoizitziltototl. Fern. hist. mex. p. 705.
Zitzil ou colibri piqueté. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 50.
Spotted Hummingbird. Lath. syn. I. 2. p. 755. n. 13.
Habitat in nova Hispania, 5½-6 pollices longus.
Rostrum & pedes cum unguibus nigri.

- albus. 34. Tr. viridi-aureus, subtus, ad latera colli, & rectricum
6 exteriorum apices albus, cauda violacea.
Colibri à queue violette. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 55.
Colibri à queue violette de Cayenne. Buff. planch. enlum. n. 671. f. 2.
Violet tailed Hummingbird. Lath. syn. I. 2. p. 754. n. 11.
Habitat in Cayenna, 6 pollices longus.
Remiges ex violacco fuscæ; pedes obscuri.

- jugularis. 7. *Tr. cærulescens*, rectricibus æqualibus, collo subtus sanguineo.
 Colibri à gorge carmin. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 56.
 Red-breasted Humming-bird. *Edw. glean. t.* 266. f. 1.
Lath. syn. I. 2. p. 753. n. 10.
Habitat in Surinamo, 4½ pollices longus.
 Rostrum, vertex, occiput, abdomen, femora, cauda nigra;
 pennarum margine cæruleo; tempora splendide rubra;
 alæ virides nitore aureo; uropygium cæruleum; pedes
 breves nigricantes.
- aurantius. 35. *Tr. fuscus*, capite aurantio, gula & pectore flavis, alis purpureis, cauda ferruginea.
 Orange-headed Honey-sucker. *Gen. of birds*, p. 63. t. 8. f. 3.
 Orange headed Humming-bird. *Lath. syn.* I. 2. p. 764. n. 28.
- flavifrons. 36. *Tr. viridis*, fronte flava, remigibus primariis caudaque nigris.
 Yellow fronted Honey-sucker. *Gen. of birds*, p. 62. t. 8. f. 1.
 Yellow-fronted Humming-bird. *Latham syn.* I. 2. p. 763. n. 26.
- Thaumantias. 8. *Tr. viridis nitens*, rectricibus æqualibus albo-fimbriatis: extima exterius alba.
 Polytmus. *Briss. av.* 2. p. 667. n. 1.
 Avicula americana, Colubris. *Seb. mus.* I. t. 59. f. 5.
 Guainumbi 6 species. *Marcgr. bras.* 197. *Raj. av.* p. 83. n. 6. *Will. orn.* p. 232. n. 6.
 Colibri. *Buff. pl. enlum.* n. 600. f. 1.
 Petit Colibri. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 64.
 Admirable Humming-bird. *Lath. syn.* I. 2. p. 763. n. 25.
Habitat in America meridionali, parum ultra 2½ pollices longus.
 Rostrum mandibula superior cum pedibus & unguibus nigra; inferior alba; alæ fuscae; in abdomine inferiore macula alba; rectrices 2 intermediæ totæ viridi-aureæ.
- dominicus. 9. *Tr. viridis nitens*, subtus subcinereus, rectricibus medio ferrugineis, apice albis.
 Polytmus dominicensis. *Briss. av.* 3. p. 672. n. 4. t. 35. f. 4.
 Vert perlé. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 62.
 St. Domingo Humming-bird. *Lath. syn.* I. 2. p. 762. n. 24.
Habitat in insula S. Dominici, vix ultra 4 pollices longus.
 Rostrum pedesque fusci; color subtus margaritaceus; alæ fuscae, tinctu violaceo admixto; cauda subtus colore chalybis polita.

- venustissimi-** 37 Tr. ruber dorso cæruleo, alis nigris.
finus. Polytmus mexicanus cyaneus. *Briss. av.* 3. p. 681. n. 9.
 Avicula mexicana cyaneo colore venustissima. *Seb. mus.*
 1. p. 102. t. 63. f. 3.
 Gros Colibri. *du Tertre antill.* 2. p. 263.
 Colibri bleu. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 61.
 Crimson-headed blue Humming-bird. *Latham syn.* 1. 2.
 p. 762. n. 23.
Habitat in nova Hispania, regulo dimidio minor.
- margari-** 38. Tr. viridi-aureus, subtus margaritaceus, cauda basi
taceus. chalybea, medio ex purpureo fusca, apice alba: fascia
 ex atro fusca.
 Plastron blanc. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 61.
 Colibri de St. Domingue. *Buff. pl. enlum.* n. 680. f. 1.
 Grey-necked Humming-bird. *Lath. syn.* 1. 2. p. 761. n. 22.
Habitat in insula S. Dominici, 4 pollices longus.
- hirsutus.** 39. Tr. viridi-aureus, subtus ex rufo albus, remigibus ex vio-
 laceo fuscis, cauda nigricante apice alba, pedibus hirsutis.
 Polytmus brasiliensis. *Briss. av.* 6. p. 670. n. 3.
 Guainumbi 4ta species. *Marcgr. bras.* p. 197.
 Guainumbi minor, rostro incurvo. *Raj. av.* p. 83. n. 4.
Will. orn. p. 232. n. 4.
 Colibri à ventre roussâtre. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 63.
 Rufous-bellied Humming-bird. *Lath. syn.* 1. 2. p. 760. n. 21.
- β.** Trochilus subtus rufus, rectricibus obscuris, exterioribus
 altera parte rufis.
Habitat in Brasilia, 3½ - 4 pollices longus.
 Rostrum mandibula superior nigra; inferior flava apice nigra;
 pedes ad digitos usque pennati ochroleuci; digitus niger.
- multicolor.** 40. Tr. fuscus subtus miniatus, vertice, mento, pectore &
 dorso medio viridibus, fascia oculari cærulea, cauda
 æquali.
 Harlequin Humming-bird. *Lath. syn.* 1. 2. p. 760. n. 20.
 Longitudo 4½ pollicum; fascia a rostro per oculos ad
 nucham usque, parte inferiore nigro marginata.
- cinereus.** 41. Tr. viridis nitens subtus cinereus, remigibus fuscis, cauda
 rotundata rectricibus 2 intermediis totis viridibus,
 proximis duabus nigris, reliquis altera parte chalybeis,
 altera albis.
 Ash bellied Humming-bird. *Lath. syn.* 1. 2. p. 759. n. 19.
 Longitudo 6 pollicum; rostrum pedesque nigri.

Mango. 10. Tr. viridis nitens, rectricibus subæqualibus ferrugineis, abdomine atro.

Polytmus jamaicensis. *Briss. av.* 3. p. 679. n. 8. 35. f. 1.

Guainumbi 5 species. *Marcgr. bras.* 197.

Guainumbi minor, rostro nigro. *Raj. av.* p. 83. n. 5. *Will. orn.* p. 252. n. 5.

Plastron noir. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 59.

Colibri de la Jamaïque & Colibri du Mexique. *Buff. pl. enlum.* n. 680, f. 3. 2.

Mango Humming-bird. *Alb. av.* 3. t. 49. b. *Lath. syn.* I. 2. p. 758. n. 18.

β. Mellivora avis maxima. *Raj. av.* p. 187. n. 43. *Sloan. jam.* 2. p. 308. t. 264. f. 3.

Habitat in nova Hispania, Brasilia, insulisque S. Dominici & Jamaïca, 4 pollices & ultra longus, nidum ex gossypio struens.

Corpus subtus nigrum; colore hoc per intermediam lineam cæruleam a viredine separato; crissum album; remiges ex violaceo fusæ; rectrices 2 intermedia, pedesque nigri: Aliquando guttur album.

In β. corpus supra ex nigricante virens, pennæ ad apicem æneo-marginatis; mentum, guttur & pectus splendide purpurea, stria media nigra; abdomen obscurum; crissum utrinque fasciculo pennarum albarum stipatum; rectrices 2 intermedia obscure virides; reliquæ purpureæ, apice nigra.

holosericeus. 11. Tr. viridis, rectricibus æqualibus supra nigris, fascia pectorali cærulea, abdomine nigro.

Polytmus mexicanus. *Briss. av.* 3. p. 676. n. 7. t. 35. f. 2.

Avis auricoma mexicana. *Seb. mus.* I. t. 99. f. 4.

Colibri vert & noir. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 53.

Black-bellied green Humming-bird. *Edw. av.* I. t. 36.

Black-bellied american Humming-bird. *Bancroft Guj.* p. 169.

Black-bellied Humming-bird. *Lath. syn.* I. 2. p. 754. n. 12.

Habitat in nova Hispania & Gujana, 4½ pollices longus.

Rostrium, cauda, pedesque nigri; caput, collum, & supra corpus viridi-aurea; abdominis fascia alba, aut utrinque area duæ albæ.

gularis. 42. Tr. flavescens, gula uropygioque cæruleis, abdomine albo, alis caudaque nigris. *Miller illust.* t. 20. A.

Habitat in India?

fulvus. 43. Tr. fulvus, remigibus rectricibusque atris subtus fuscescentibus. *Maerter phys. Arb. der eintr. Fr. zu Wien.* I. p. 76.

Habitat in America meridionali, crassitie fringillæ, ultra 5 pollices longus.

Rostrum pedesque cornei; cauda 2 circiter pollices longa, rectricibus 12 constans, an ideo cum sequente ad certitiæ forsan genus spectat?

varius. 44. Tr. viridi-aureus, subtus ex fusco albicans, fascia pectoris duplici ex viridi cyanea & sanguinea. *Maerter phys. Arb. der eintr. Fr. zu Wien, I. 1. p. 75.*

Habitat in America meridionali, pollicis humani crassitie, 4½ pollices circiter longus.

Rostrum pedesque nigri; remiges pallide fusæ; tectrices caudæ superiores ex viridi cyaneæ; rectrices 12, 1½ pollices longæ, fusæ viridi adumbratæ, omnium, exceptis intermediis, apice albido.

* * * rectirostres.

capensis. 66. Tr. viridis, rectricibus intermediis longis, tectricibus alarum cæruleis. *Mantiss. pl. alt. 2. p. 525.*

Habitat ad Caput bonæ spei, hirundinis rusticæ magnitudine, sericeo nitens.

Remiges rectricisque nigra; hæ æquales, præter intermedias triplo longiores, margine bascos sericeo-viridi; cristum nigrum cyaneo maculatum.

Colubris. 12. Tr. viridi-aureus, rectricibus nigris: lateralibus tribus ferrugineis apice albis, gula flammea.

Mellisuga carolinensis, gutture rubro. Briss. av. 3. p. 716. n. 13. t. 36. f. 6. 5.

Tomineio mariana virescens, gutture flammeo. Pet. gaz. t. 3. f. 8.

Passer muscatus. Gesn. av. 655.

Guainumbi 1. Marcgr. bras. 196. Will. orn. 165. Raj. av. p. 82. n. 1.

Rubis. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 13.

Humming-bird. Catesb. Carol. 1. p. 65. t. 65.

Red-throated Humming-bird. Edw. av. 1. t. 38. Lath. syn. 1. 2. p. 769. n. 35.

Red-throated Honey-sucker. Arct. zool. 2. p. 286. n. 176.

Tomineo. β. Tr. rectricibus subæqualibus basi ferrugineis apice albis, corpore supra fusco subtrus albido. *Mus. Ad. Fr. 2. p. 23.*

Ouiriffia f. Tomineo. Clus. exot. 96.

Habitat in America, etiam septentrionali, ad Canadam usque, hieme tamen appropinquante in meridionalem redit, 3½ pollices longus.

Rostrum nigrum, ¼ pollices longum; mentum & gula coccinea, cum nitore vivacissimo aureo, in femina alba.

fimbriatus. 45. Tr. viridi-aureus, subtus griseus, cauda chalybea apice grisea, pectoris pennis albo fimbriatis.

Mellisuga cayennensis gutture nœvio. *Briss. av. 3. p. 706. n. 7. t. 36. f. 2.*

Oiseau-mouche à gorge tachetée. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 31.*

Oiseau-mouche tacheté de Cayenne. *Buff. planch. enlum. n. 276. f. 2.*

Spotted-necked Humming-bird. *Lath. syn. I. 2. p. 772. n. 36.*

β. Tr. subtus albus, pectoris pennis griseo-marginatis, cauda tota ex virescente nigra.

Habitat in Cayenna, 4 pollices longus.

Rostrum mandibula superior nigra, inferior albicans, apice nigra; rectrices 2 intermediæ splendore æneo; pedes cum ungibus nigri.

rubineus. 46. Tr. viridi-aureus, gula rubro-aurea, alis caudaque rufis.

Oiseau-mouche à gorge rouge du Brésil. *Buff. pl. enlum. n. 276. f. 4.*

Rubis émeraude. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 31.*

Mellisuga brasiliensis gutture rubro. *Briss. av. 3. p. 720. n. 14. t. 37. f. 4.*

Ruby-throated Humming-bird. *Lath. syn. I. 2. p. 768. n. 34.*

Habitat in Brasilia & Gujana, 4½ pollices longus.

Rostrum, pedes & unguis nigri; rectrices alarum majores, remigesque margine ex violaceo fusca; rectrices margine ex viridi-aureo fusca; intermediæ reliquis breviores.

auritus. 47. Tr. viridi-aureus, subtus albus, fascia infraoculari nigra, fasciculis (in mare) utrinque infra aures duobus pennarum violacearum, pedibus hirsutis.

Mellisuga cayennensis major. *Briss. av. 3. p. 722. n. 15. t. 37. f. 3.*

Oiseau-mouche à oreilles. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 32.*

Violet-eared Humming-bird. *Lath. syn. I. 2. p. 767. n. 33.*

β. Tr. fascia infraoculari purpurea, prope aures terminata area magna, infra quam macula alia ex viridi cærulea.

Habitat in Cayenna, 4½ fere pollices longus.

Rostrum pedesque nigri; femora fusca; rectrices 4 intermediæ nigrae, in cæruleum vergentes, reliquæ albæ;

pennæ fasciculorum 5-6, reliquis molliores & duplo longiores.

Ourissia. 13. Tr. viridi-auratus, rectricibus subæqualibus fusco-aureis, remigibus nigris, abdomine cæruleo.

Mellifuga surinamensis, pectore cæruleo. *Briss. av.* 3. p. 711. n. 10.

Émeraude-améthyste. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 27.

Oiseau-mouche à poitrine bleue de Surinam. *Buff. pl. enl.* n. 227. f. 3.

Green and blue Humming-bird. *Edw. av.* 1. t. 35. f. 2. *Lath. syn.* 1. 2. p. 767. n. 32.

β. Tr. viridis, subtus cæruleus, menti macula aurantia, remigibus caudaque obscuris.

Habitat in Surinamo, vix 4 pollices longus.

Rostrium, pedes & ungues nigri; pectus, dorsum & abdominis pars superior cærulea; abdominis pars inferior, alæ & cauda fusca.

moschitus. 14. Tr. viridi-aureus, rectricibus æqualibus ferrugineis: extimis apice fuscis, remigibus nigris. *Syst. nat.* X. 1. p. 120. n. 8. 12. *Mus. Ad. Fr.* 2. p. 24.

Mellifuga brasiliensis, gutture topazino. *Briss. av.* 3. p. 699. n. 3. t. 37. f. 1.

Avis Colubri Thaumantias. *Seb. mus.* 1. p. 61. t. 37. f. 4.

Guainumbi 8 species. *Marcgr. bras.* 197. *Will. orn.* p. 232. n. 8. *Raj. av.* p. 83. n. 8.

Colibri Nr. 3. *Fermin Surin.* 2. p. 196.

Rubis-topaze. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 19.

Oiseau-mouche à gorge topaze du Brésil. *Buff. pl. enlum.* n. 227. f. 2.

Trochilus with a ferrugineous tail. *Bancr. Guj.* p. 168.

Ruby-necked Humming-bird. *Lath. syn.* 1. 2. p. 779. n. 46.

Habitat in Gujana, Brasilia, Surinamo, Curacao, 4 lineas ultra 3 pollices longus:

Rostrium, pedes & ungues nigricant; vertex & occiput colore rubini; guttur topazii; corpus subtus fuscum, qui tinctus etiam supra admixtus; femina subtus ex griseo albicans, area ad pectus & jugulum aurea.

mellifugus. 15. Tr. viridi-aureus, rectricibus æqualibus cæruleis, remigibus atro-cærulescentibus, tibiis pennatis. *Mus. Ad. Fr.* 2. p. 23.

Mellifuga cayanensis. *Briss. av.* 3. p. 704. n. 6. t. 36. f. 3.

Colubri f. Florifuga. *Seb. mus.* 2. p. 42. t. 41. f. 2. 4.

- Guainumbi 9 species. *Marcgr. bras.* 197. *Will, orn.* p. 232. n. 9. *Raj. av.* p. 83. n. 9.
 Vert-doré. *Buffon hist. nat. des ois.* 6. p. 29.
 Oiseau-mouche de Cayenne. *Buffon pl. enl.* n. 276. f. 3.
Habitat in Cayenna, 2 pollices & 10 lineas longus.
 Rostrum, digiti & unguēs nigri; rectrices caudæ inferiores & crura ex griseo fusca; tibiæ fusca.
- Pegasus. 16. Tr. rectricibus basi virescentibus, corpore virescente aureo, subtus subgriseo, tibiis pennatis.
 Mellifuga cayanensis, ventre griseo. *Briss. uv.* 3. p. 709. n. 9. t. 36. f. 4.
 Grey-bellied Humming-bird. *Lath. syn.* I. 2. p. 778. n. 44.
Habitat in Cayenna; an varietas leucogastri?
 Rostrum, digiti & unguēs nigri; rectrices æquales nigro-purpureæ, laterallum apice griseo.
- leucogast. 48. Tr. viridi-aureus, subtus albus, cruribus fuscis, cauda ter. nigra.
 Mellifuga cayanensis ventre albo. *Briss. av.* 3. p. 707. n. 8. t. 36. f. 7.
 Guainumbi 1 species. *Marcgr. bras.* 197. *Raj. av.* p. 83. n. 1. & p. 187. n. 49. *Will. orn.* p. 231. n. 1.
 Cravate dorée. *Buffon hist. nat. des ois.* 6. p. 25.
 Oiseau-mouche à cravate dorée de Cayenne. *Buffon pl. enlum.* n. 672. f. 3.
 Gold-throated Humming-bird. *Lath. syn.* I. 2. p. 777. n. 43.
 Longitudo $3\frac{1}{4}$ pollicum; costri mandibula superior nigra, inferior alba, apice nigra; cauda nitore chalybis; pedes & unguēs nigri.
- striatus. 49. Tr. fuscus, subtus albus: stria longitudinali viridi-aurea, pileo fusco, remigibus nigris, caudæ basi cinnamomea, apice obscuro.
 Brown-crowned Humming-bird. *Latham syn.* I. 2. p. 776. n. 42.
Habitat in insula Tobago, 3-4 pollices longus.
 Rostrum & pedes nigri; nonnunquam stria longitudinalis fusca aut obscura; rectrices duæ intermediae ex cæruleo atræ; reliquæ rusæ, extrema tertia parte atræ, apice supra albæ.
- obscurus. 50. Tr. cæruleus, vertice obscuro, mento & gutture viridinitentibus, dorsi medio virescente, uropygio, alis caudaque purpureis.
 Dusky-crowned Humming-bird. *Lath. syn.* I. 2. p. 776. n. 41.

Longitudo $4\frac{1}{4}$ pollicum; rostrum obscurum; testrices alarum ex purpurascente cæruleæ; dorſi pars inferior obscure purpurea; pedes nigri.

- bicolor. 51. Tr. smaragdino-aureus, capite gulaque cyaneis.
Colibri Nr. 2. *Fermin surin.* 2. p. 195.
Saphir-émeraude. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 26.
Sapphire-and Emerald-Humming-bird. *Lath. syn.* I. 2. p. 775. n. 40.
Habitat in Guadeloupe, mediæ magnitudinis.
- sapphiri- 52. Tr. viridi-aureus, jugulo & pectore sapphirinis, alis
nus. & testricibus caudæ superioribus fuscis, inferioribus, cauda ipsa & gula rufis.
Saphir. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 26.
Sapphire Humming-bird. *Lath. syn.* I. 2. p. 775. n. 39.
β. Tr. pectore sapphirino, ventre albo, cauda ex cæruleo atra.
Habitat in Gujana.
Rostrum album, apice nigrum; abdominis pars inferior alba.
- niger. 17. Tr. testricibus subæqualibus, corpore nigro subtus aurato, crisso albo, tibiis pennatis. *Mus. Ad. Fr.* I. p. 18.
Mellifuga dominicensis. *Briss. av.* 3. p. 702. n. 5. t. 36. f. 8.
Black Humming-bird. *Lath. syn.* I. 2. p. 774. n. 38.
Habitat in insula S. Dominici, 2 1/4 pollices longus, an femina mellifugi?
Rostrum, digiti & unguis nigri; corpus subtus ex albicante griseum; gula maculis minutis fuscis; cauda chalybea.
- cyanoc- 53. Tr. viridi-aureus, capite, remigibus testricibusque cæru-
phalus. leis, abdomine rubro. *Molin. hist. nat. Chil.* p. 218.
Habitat in Chili, nucis juglandis magnitudine.
Rostrum albidum; alis caudæque corpore triplo longiori admixta purpura.
- amethyf- 54. Tr. viridi-aureus, subtus ex cinerascens & fusco varius,
tinus. gutture amethyflino, cauda furcata.
Petit oiseau-mouche à queue fourchue de Cayenne. *Buff. pl. enlum.* n. 672. f. 1.
Amethyste. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 16.
Amethystine Humming-bird. *Lath. syn.* I. 2. p. 787. n. 59.
Habitat in Cayenna, colubris magnitudine.
Alæ breves.
- viridissi- 55. Tr. viridi-aureus, abdomine albo, cauda chalybea.
mus. Or-vert. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 17.

All-green Humming-bird. *Edw. glean. t. 360. f. 1.*

Lath. syn. I. 2. p. 786. n. 58.

Habitat in insula Tobago, 2 pollices longus.

glaucopis. 56. Tr. viridi-aureus, fronte cærulea, crisso albo, remigibus ex violaceo fuscis, pedibus pennatis, cauda chalybea subfurcata.

Mellisuga brasiliensis cauda bifurca. *Briss. av. 3. p. 724. n. 16. t. 36. f. 5.*

Guainumbi major. *Raj. av. p. 82. n. 2.*

Marcgrave's second Humming-bird. *Will. orn. p. 231. n. 2.*

Blue-fronted Humming-bird. *Lath. syn. I. 2. p. 786. n. 57.*

Habitat in Brasilia, 4½ pollices longus.

Rostrum nigrum; crura, tibiæ, & digiti fusca.

rufus. 57. Tr. rufus subtus exalbidus, vertice viridi-aureo; gutture & pectore coccineo-aureis, remigibus ex purpurascente fuscis.

Ruffed Honey-sucker. *Arct. zool. 2. p. 290. n. 177.*

Ruff-necked Humming-bird. *Lath. syn. I. 2. p. 785. n. 56. t. 35.*

Habitat in sinu Americæ Natka, 3½ pollices longus.

Rostrum pedesque nigri; colli pennæ laterales nonnullæ elongatæ mobiles, tectrices alarum obscure virescentes; rectrices splendide rufæ acuminatæ: linea media longitudinali & apice nigris; cauda cuneata.

Femina corpus supra viridi-aureum; gula maculis modo coccineis.

ornatus. 58. Tr. viridi-aureus, subtus nitente-fuscus, fascia uropygii alba, crista (in mare) verticis & fasciculo peninarum infra aures utrinque rufo.

Hupecol. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 18.*

Oiseau-mouche, dit Hupecol de Cayenne. *Buff. pl. enlum. n. 640. f. 3.*

Tufted-necked Humming-bird. *Lath. syn. I. 2. p. 784. n. 55.*

Habitat in Cayenna, colubri potius minor.

Abdomen inferius album; guttur viridi-aureum; crista capitis longa; pennæ fasciculorum angustæ, mobiles, inæquales, ultra dimidium pollicem non longæ, ad apicem macula viridi nitente notatæ.

puni-
ceus.

59. Tr. pallide fuscus, crista cærulea.
Crested brown Humming-bird. *Lath. syn. I. 2. p. 784.*
n. 54.
Magnitudo *cristati*; alæ & cauda *obscuriores*.

cristatus. 18. Tr. viridis, alis fuscis, abdomine fusco cinereo,
crista cærulescente, tibiis pennatis.

Mellifuga cristata. *Briss. av. 3. p. 714. n. 12. t. 37. f. 2.*
Oiseau-mouche huppé. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 22.*
Oiseau-mouche huppé de Cayenne. *Buff. pl. enlum.*
n. 227. f. 1.

Green frait-billed Humming-bird. *Bancr. Guj. p. 168.*
Crested Humming-bird. *Edw. av. 1. t. 37.*
Crested green Humming-bird. *Lath. syn. I. 2. p. 783.*
n. 53.

Habitat in Cayenna, 3 pollices longus.

Rostrum & digiti *nigri*; cauda *ex violaceo nigra*.

longi-
caudus.

60. Tr. viridi-aureus, gula smaragdina, alis rectricibus-
que fuscis, intermediis duabus longissimis.

Oiseau-mouche à raquettes. *Buff. hist. nat. des ois. 6.*
p. 23.

Racket-tailed Humming-bird. *Latham syn. I. 2. p. 782.*
n. 52.

Longitudo 2¹/₂ pollicum; rectrices 2 *intermediæ* 10 *lineis*
longiores, parte eminente nuda, apice demum barbata.

Carbun-
culus.

61. Tr. niger, capite, collo & pectore rubris, alis fuscis,
cauda rufo-aurea.

Escarboucle. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 28.*

Carbuncle Humming-bird. *Lath. syn. I. 2. p. 782. n. 51.*

Habitat in Cayenna, rarus, paulo major.

Rostrum *ad medium usque pennis tædum.*

cyno-
melas.

62. Tr. ex albo & cæruleo varius, gula & pectore rubris.
Black and blue Humming-bird. *Bancr. Guj. p. 167.*

Lath. syn. I. 2. p. 782. n. 50.

Habitat in Terra firma & insulis Caribæis, exili duplo
major.

Remiges *rectricesque magnæ, splendide nigre.*

gujanen-
sis.

63. Tr. viridis, crista capitis & pectore rubris, remigibus
rectricibusque ex viridi, rubro & purpureo variis.

Small green and crimson Humming-bird. *Bancr. Guj.*
p. 168.

Gujana Humming-bird. *Lath. syn. I. 2. p. 781. n. 49.*

Habitat frequens in Gujana, 2 pollices longus.
Kostrum oculique splendidi nigri.

Tobaci. 64. Tr. viridi-nitens, fascia abdominis femoribusque albis, crisso pallide fusco, remigibus caudaque subfurcata ex cæruleo atris.

Tobago Humming-bird. *Lath. syn. I. 2. p. 781. n. 48.*

Habitat in insula Tobago, 4 pollices longus.

Rostrum obscurum, mandibula inferiore flava; pedes fusci.

elatus. 19. Tr. virescente aureus, rectricibus æqualibus ferrugineis apice nigris, pileo rubro cristato.

Mellisuga americana, gutture topazino. Briss. av. 3. p. 697. n. 2.

Oiseau-mouche à gorge topaze de Cayenne. Buff. pl. enl. n. 640. f. 1.

Ruby-crested Humming-bird. Edw. glean. t. 344. Lath. syn. I. 2. p. 770. n. 47.

Habitat in Terra firma, Gujana, Cayenna, Tobago.

Rostrum pedesque nigra; caput nigrum, pilei pennis in cristam sanguineam elongatis; corpus olivaceum, subtus rufum, linea longitudinali alba; gula viridi-aurea; remiges purpurascens; cauda rufa, terminata fascia nigra.

mellivo- 20. Tr. rectricibus nigris: lateralibus albis, capite cæru-
 rus. leo, dorso viridi, abdomine albo.

Mellisuga furinamensis torquata. Briss. av. 3. p. 713. n. 11.

Oiseau-mouche à collier, dit la Jacobine. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 34.

Oiseau-mouche, dit la Jacobine de Cayenne. Buff. planch. enlum. n. 640. f. 2.

White-bellied Humming bird. Edw. av. 1. t. 35. f. 1. Latham syn. I. 2. p. 765. n. 11.

Habitat in Surinamo, ultra 4 pollices longus.

Rostrum & pedes cum unguibus nigri; collum cæruleo-nitens, cervicis annulus albus; remiges ex violaceo fusca; cauda subfurcata; rectrices omnes apice nigra.

campy- 65. Tr. viridi-aureus subtus griseus, rectricibus lateralibus
 lopterus. fuscis apice albis, remigum, -4 scapis medio incurvis.

Oiseau-mouche à larges tuyaux. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 35.